



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

9
281

J.P.

Arnold Arboretum Library



**Purchased from the Income
of the
Mary Robeson Sargent Fund**

Received



Received Nov 1909

HORTUS DENDROLOGICUS.

Verzeichniss

der

BÄUME, STRÄUCHER UND HALBSTRÄUCHER,

die in

Europa, Nord- und Mittelasien, im Himalaya und in Nordamerika wild wachsen und möglicher Weise in Mitteleuropa im Freien ausdauern; nach dem natürlichen Systeme und mit Angabe aller Synonyme, so wie des Vaterlandes, aufgezählt und mit einem alphabetischen Register versehen

von

Karl Koch, Dr. Prof.

BERLIN, bei F. SCHNEIDER & Comp.

1853.

HORTUS DENDROLOGICUS.

Indices

in usum botanicorum, hortulanorum atque saltuariorum et systematice
et alphabetice compositi

ARBORUM, FRUTICUM ET SUFFRUTICUM

in Europa, in Asia boreali et media, in Himalayae montibus nec
non in America boreali sponte nascentium et in Europa media
sub divo forte colendarum, adjectis synonymis
locisque natalibus.

Auctore

Carolo Koch, Dr. Prof.

BEROLINI, apud F. SCHNEIDER & Comp.

1853.

Q
K 81
H

Q
K 81
H

In einer Zeit, wo von Regierungen sowohl, wie von Gemeinden und Privaten für Landes-Verschönerung viel geschieht, rechtfertigt sich ein Werk, das sich die Nomenklatur der Gehölze, also derjenigen Pflanzen, die vor Allem auf die Physiognomie einer Gegend einen Einfluss ausüben, zur Aufgabe gestellt hat, gewiss von selbst. Es wäre aber immer noch die Frage, ob ich grade der Mann wäre, dem bei den erforderlichen Kenntnissen auch die nöthigen Hilfsmittel zu Gebote ständen. Die Dendrologie ist nämlich leider gerade der Theil der Botanik, der am Meisten der Läuterung bedarf und gerade in der letzten Zeit, wo sonst alle Zweige der Naturwissenschaften gefördert wurden, vernachlässigt worden ist. Es kommt noch dazu, dass ihre Bearbeitung ausserdem aus Gründen, die ich sogleich näher bezeichnen werde, manche Schwierigkeiten darbietet. Zwar von vielen Seiten dazu ermunthigt, bin ich doch nur schüchtern an ein Werk gegangen, das solche Ansprüche macht. Niemand ist wohl auch mehr als ich selbst überzeugt, dass das, was ich jetzt der Oeffentlichkeit übergebe, noch Manches zu wünschen übrig lässt; ich glaube aber doch

A une époque où les gouvernements, les communes et les particuliers contribuent à l'embellissement de la nature, un ouvrage qui s'est proposé la nomenclature des plantes qui exercent une influence marquée sur la physiognomie d'une contrée, je veux dire des bois, se justifie sans doute de soi-même. Mais il s'agirait toujours de savoir, si les connaissances et les moyens que j'ai à ma disposition, suffiraient pour cette entreprise. La dendrologie est précisément cette partie de la botanique qui a le plus besoin de purification, et qui justement dans les tems les plus recents, où en général toutes les branches des sciences exactes ont plus ou moins été perfectionnées, a été négligée de la plupart des naturalistes. Il est d'ailleurs très difficile de traiter cette branche, par des raisons que je vais préciser tout à l'heure. C'est pourquoi malgré les invitations et les encouragements réitérés de personnes instruites j'hésitais beaucoup avant de me mettre à l'ouvrage. Aussi suis-je persuadé, que le traité que je vais publier, loin d'être quelque chose de parfait, laisse encore beaucoup à désirer. Mais je crois néan-

den Botanikern nicht weniger als den Gärtnern und allen denen, die sich für Gehölze und Landschaftsgärtnerei interessiren, dadurch zu nützen, dass ich ihnen ein Buch in die Hand gegeben habe, das sie meistens in den Stand setzt, sich aus dem Labyrinth der Gehölz-Nomenclatur herauszufinden.

Von den Gehölzen sind es hauptsächlich die Bäume, welche bei der Bestimmung die meisten Schwierigkeiten darbieten. Sie müssen zunächst eine bestimmte Höhe, die sie oft erst nach vielen Jahren erreichen, erlangt haben, ehe sie Blüthen und Früchte, nach denen man sich nun einmal gewöhnt hat, Pflanzen zu bestimmen, entwickeln; dann befinden sich gerade die genannten Organe auch noch in der Regel an den oberen Aesten, zu denen man nicht leicht gelangen kann. Viele Gehölze haben ausserdem keine vollständige Blüthen; in der einen bemerkt man nur Staubgefässe, in der andern nur Stempel. Es gibt Bäume, die bei uns im Freien sehr selten und selbst gar nicht zur Blüthe kommen. Ausserdem sind die Fälle gar nicht selten, dass man von einer Art in einer Gegend nur männliche, in einer andern nur weibliche Blüthen findet. Ich erinnere an die italienische Pappel, von der man in ganz Deutschland kaum einige Exemplare mit Stempelblüthen findet. In der Mark ist meines Wissens nach nur eine einzige weibliche Pappel vorhanden; in ganz Thüringen habe ich nur italienische Pappeln mit Staubgefässblüthen gefunden.

Nicht minder erschwert das Bestimmen der Gehölze der Umstand, dass die Blüthen, wie es zum Beispiel bei vielen Weiden der Fall ist, eher zum Vorschein kommen, als die Blätter, und bereits wieder verschwunden sind, wenn die

moins être utile | sous beaucoup de rapports aux botanistes comme aux jardiniers et à tous ceux qui s'intéressent à l'étude des bois en général et surtout à l'arrangement des jardins et des parcs. Je crois leur donner un moyen, qui les met en état de sortir du labyrinthe de la nomenclature des bois.

Ce sont surtout les arbres dont la connaissance se montre très difficile; d'abord ils doivent avoir atteint une certaine hauteur, avant qu'ils développent les organes nécessaires à la détermination des plantes, c'est à dire les fleurs et les fruits, qui d'ailleurs se trouvent pour la plupart aux rameaux supérieurs, qu'on ne pourrait atteindre sans difficultés. Il s'y ajoute qu'il y a beaucoup de bois qui manquent de fleurs parfaites, comme il y en a qui n'ont que des stamens, d'autres qui n'ont que des pistilles. Et même qu'ils se trouvent des arbres en plein air, qui ne fleurissent chez nous pas du tout ou très rarement. Aussi arrive-t-il assez souvent qu'on ne trouve dans une contrée que des espèces staminifères, dans une autre que des espèces pistillifères. Je ne veux alléguer que le peuplier d'Italie, dont on ne trouve dans toute l'Allemagne que très-peu d'exemplaires féminins. Dans toute la Marche on n'en trouve à ce que je sais qu'un seul; dans toute la Thuringe je n'ai vu des peupliers d'Italie à fleurs staminifères.

Ensuite la distinction des bois est encore sujete à une difficulté particulière, comme les fleurs de beaucoup de plantes, p. e. dans le genre saule, paraissent avant les feuilles, et qu'elles ont déjà disparu avant que ces dernières se soient entiè-

letztern sich vollständig ausgebildet haben. Ferner ist die Form der Blätter grade bei den Bäumen weit unbestimmter, als bei den Kräutern; mancher sonst vorsichtige Botaniker hat sich deshalb zur Gründung einer oder der andern Scheinspecies verleiten lassen. Die lange Kultur einzelner Gehölze trägt freilich ebenfalls an den Veränderungen, denen einzelne Arten unterworfen sind, nicht wenig Schuld. Endlich kommt noch dazu, dass, seitdem die Landschaftsgärtnerei in weiterm und engerm Sinne mehr Gemeingut geworden ist, Gärtner und Liebhaber immer Sorge tragen, ihre lebendige Sammlung zu vermehren und dadurch zugleich die Mannigfaltigkeit in den Gruppierungen und sonstigen Zusammenstellungen zu erhöhen. Namentlich hat man aus Nordamerika fast alljährlich eine Menge Gehölz-Samen bezogen, diese gesät und damit Pflanzen erhalten, die keiner botanischen Kontrolle unterlagen, zum Theil auch selbst gar nicht unterliegen konnten; denn manche so herangezogene Bäume haben, obwohl sie 10, 20 und mehr Jahre alt sind, noch nicht geblüht. So bietet sich, wie man sieht, eine Schwierigkeit nach der andern für die richtige Bestimmung der Gehölze dar; es scheint in der That, dass deshalb seit Willdenow selbst die tüchtigsten Systematiker die Dendrologie stiefmütterlich behandelten.

Die Gehölzkunde verlangt ferner auch mehr als andere Theile der systematischen Botanik, dass man die Pflanzen in der Natur studirt. Herbarien sind überhaupt nur eine nothdürftige Aushilfe, für Dendrologie aber noch weniger von Werth. Niemand erkannte dieses mehr, als der Mann, welcher gerade in der Landschaftsgärtnerei und in der ästheti-

rement développées. Or la forme des feuilles, surtout des arbres, est beaucoup plus variée que celle des herbes. Plusieurs botanistes, d'ailleurs très circonspects, se laissent séduire par-là à établir des fausses espèces. Mais beaucoup de bois cultivés pendant un long espace de tems se sont changés visiblement. Enfin depuis que les plantations en général et principalement les parcs sont devenus plus répandus, les jardiniers et les amateurs ont toujours eu soin d'enrichir leur collection vivante et d'augmenter la variété dans l'arrangement. C'est surtout l'Amérique du Nord, qui presque annuellement a fourni une quantité des semences d'arbres, qui ont produits des plantes qu'on n'a pas surveillées par un contrôle botanique. En partie était-il impossible de les examiner, parcequ'il y en a beaucoup, qui atteignent l'âge de dix ans, même de vingt et de plus, sans avoir fleuri. Ainsi s'accroissent les difficultés, lorsqu'il s'agit d'examiner les bois; il paraît en effet que les botanistes même les plus renommés depuis Willdenow, ne se soient point occupés de la dendrologie par cette raison qu'en passant.

Or la description des bois demande encore plus que toutes les parties de la botanique systématique, qu'on étudie les plantes vivantes. En général les herbaires n'offrent qu'un faible secours, et ont encore moins de prix pour la dendrologie. Personne n'a senti mieux cette vérité que l'homme, qui précisément dans l'art d'arranger et d'embellir les contrées et dans

sehen Botanik überhaupt Ausserordentliches geleistet hat. Der Königliche Gartendirector, Herr Lenné, mühte sich seit Jahren, dem Uebelstande möglichst abzuhelpfen. Er rief zunächst eine Anstalt ins Leben, in der die Gehölze, welche der Landschaftsgärtnerei nothwendig sind, als Individuen sowohl kultivirt als auch in Massen gezogen werden. Die Königliche Landesbaumschule in Geltow begnügte sich aber keineswegs damit, sondern suchte und sucht noch fortwährend alle Gehölze sich zu verschaffen, die möglicher Weise bei uns im Freien ausdauern können.

Einem Manne jedoch, der so vielseitig in Anspruch genommen ist, dessen Wirkungskreis sich über die Grenzen der Mark verbreitet und fast in ganz Deutschland eine Stätte gefunden hat, ist die Zeit zu kurz zugemessen, um allein einer solchen Aufgabe, wie die Ausarbeitung einer Dendrologie ist, nachzukommen; Herr Director Lenné suchte daher einen sachkundigen Gelehrten zu gewinnen, der die nöthige Zeit und Musse hatte, um mit ihm ein Unternehmen zu beginnen, das nicht allein zeitgemäss, sondern auch im hohen Grade nützlich ist.

Schon seit längerer Zeit hatte ich mich dem Studium der europäisch-nordasiatischen Flora, sowie der Verbreitung der Pflanzen auf der Erdoberfläche überhaupt, mit Vorliebe gewidmet. Dieser Umstand war es wohl hauptsächlich, der den Herrn Director Lenné veranlasste, mir sein Zutrauen zu schenken und mit Genehmigung des gesammten Directoriums der Königlichen Landesbaumschule mir die wissenschaftliche Leitung derselben mit zu übertragen. Damit wurde zugleich auch die Bear-

la botanique esthétique est parvenu à une perfection si reconnue. Le directeur des jardins royaux, Mr. Lenné, a déjà senti depuis de longues années le besoin d'une dendrologie, qui satisfît au moins en quelques sortes aux demandes; les efforts qu'il a faits, n'ont pas été en vain. Il établit d'abord un institut, dans lequel les bois nécessaires pour les jardins et les plantations en général sont cultivés et multipliés. Cependant la pépinière royale de Geltow, ne se contenta aucunément de cette entreprise, mais tâcha et tâche encore aujourd'hui de se procurer tous les bois qui peut-être peuvent croître chez nous en plein air.

Mais un homme d'une activité si étendue et dont les talents sont même réclamés dans toute l'Allemagne, n'a pas le tems nécessaire pour pouvoir surmonter les difficultés, qui s'opposent à la confection d'une dendrologie. C'est pourquoi Mr. Lenné tâcha de trouver un initié, qui aurait le loisir nécessaire pour commencer avec lui une entreprise, qui suffirait aux besoins de notre époque.

Déjà depuis long tems je m'étais occupé avec prédilection de l'étude du flore de l'Europe et de l'Asie septentrionale; j'ai même fait des recherches sur la patrie de toutes les plantes de la terre. C'est surtout cette circonstance qui aura engagé Mr. Lenné à me faire participer avec le consentement des directeurs à la direction des affaires scientifiques de la pépinière royale de Geltow. On songea dorénavant avec plus d'énergie à la confection d'une dendrologie. Quant à moi j'offre qui

beitung einer Dendrologie bestimmter aufgefasst. Mir konnte ein Anerbieten, das mich in der einmal begonnenen Richtung förderte, ebenfalls nur wünschenswerth sein.

Unter Dendrologie versteht man im Duroi'schen und Willdenow'schen Sinne keineswegs, wie der Name allerdings ausspricht, die Lehre aller Gehölze, sondern nur derjenigen, welche im Freien, wenn auch im Winter bedeckt, bei uns gedeihen. Das Wort „im Freien“ ist allerdings relativ; wollte man gerade nur die Gehölze aufnehmen, die in und um Berlin, oder auch in der Mark im Freien aushalten, so müsste man eine Menge Pflanzen ausschliessen, die im Grossherzogthum Baden oder gar in England und Südfrankreich nie im Winter erfrieren. Wir wünschten aber gerade, dass unser Werk nicht nur einen Local-Werth erhielte, sondern wenigstens für ganz Mittel-Europa brauchbar wäre.

Bei der Aufzählung der in dem eben bezeichneten Ländercomplexe im Freien aushaltenden Gehölze sahen wir alsbald, dass sich dieses nach den vorliegenden Hilfsmitteln gar nicht mit einiger Genauigkeit feststellen lässt. Alljährlich findet man, dass Gehölze, die man bisher nur im kalten Hause kultivirte, bei guter Pflege auch im Freien gedeihen und selbst in harten Wintern ausdauern. Umgekehrt giebt es, wenn auch nur wenige, Sträucher und Bäume, die man früher häufig in den Anlagen fand, in der neuesten Zeit aber nur selten oder gar nicht mehr sieht. Viele Gehölze, die schon lange beschrieben sind, sich aber noch nicht in den Gärten vorfinden, werden allmählig eingeführt, abgesehen davon, dass auch noch ganz unbekanntere Arten durch Reisende uns zu-

donnait l'occasion de me perfectionner, était pour moi bien désirable.

La dendrologie n'est pas, comme dit le nom, la description de tous les bois; mais comme elle est envisagée de Duroi et Willdenow, ne sait-elle que traiter ceux qui prospèrent chez nous en pleine terre, quand même on les couvre en hiver. L'expression „en pleine terre“, n'est que relative, il est vrai. Si l'on ne voulait recevoir que les bois, qui croissent à Berlin ou aux environs, ou bien aussi dans toute la Marche, il faudrait exclure une foule des espèces, qui ne périssent pas en hiver par le froid dans le grand-duché de Bade, en Angleterre et dans la France méridionale. Or nous désirons que notre ouvrage ne suffise pas seulement pour un certain endroit, mais pour toute l'Europe moyenne.

En énumérant les bois qui prospèrent dans ces parties de l'Europe, nous trouvâmes bientôt qu'un tel catalogue ne pouvait être fait avec précision à l'aide des moyens que nous avons. On trouve toutes les années que des bois que l'on ne cultivait jusqu'ici que dans la serre froide, prospèrent aussi en plein air et même, au coeur d'un hiver rigoureux, lorsqu'ils sont bien soignés. Vice versa il y a des arbrisseaux et des arbres, même quand ils ne sont qu'en petit nombre, que l'on trouvait autrefois souvent dans les plantations, mais que l'on n'y voit plus, ou du moins très rarement. Beaucoup de bois qui sont décrits déjà depuis long-tems, mais que l'on ne voit pas encore dans les plantations, sont introduits peu à peu, abstraction faite de ce qu'il y a d'espèces inconnues et ap-

geführt werden. Alle diese Umstände bewogen uns, einen besonderen Werth auf die geographische Verbreitung der Gehölze zu legen; wir glauben gerade dadurch nicht allein eine grössere Vollständigkeit zu erhalten, sondern noch mehr durch die genaue Angabe des Vaterlandes dem Gärtner vom Fache sehr zu nützen. Leider ist die Pflanzengeographie, obwohl sie bereits von dem Nestor in den Naturwissenschaften, Herrn A. v. Humboldt, seit Anfang dieses Jahrhunderts ins Leben gerufen ist, immer noch ein Feld, das der weitem Bearbeitung vergebens entgegensieht, obwohl gerade sie ein ausserordentlich wichtiger Zweig der gesammten Botanik ist, bleiben wird, und vor Allem praktischen Nutzen verspricht. Man verliert sich lieber in einer unnützen Speciesmacherei, oder meint in der Zelle das ganze Pflanzenreich studiren zu können.

Vor Allem schien es uns deshalb nothwendig, genau zu wissen, welche Länder es sind, die mit Mittel- und Nordeuropa so ziemlich gleiches Klima haben und dann, welche Gehölze dort wild wachsen. Eine Menge südeuropäischer und orientalischer Formen halten bei uns im Freien aus, ja selbst Gehölze aus Nepal und China gedeihen. In England kultivirt man viele Arten, die wenigstens subtropischen, wenn auch nicht tropischen Ursprungs sind. Wenn man aber weiss, dass vor Allen Asien, aber auch Amerika sogenannte Stufenländer besitzt, die zum Theil eine Lage von 6—10,000, ja selbst von 12,000' über dem Meere haben und demnach ein Klima besitzen müssen, das hinsichtlich der Temperatur dem unsrigen mehr oder minder an die Seite gestellt werden kann, so erklärt es sich, dass viele Gehölze, die unter weit südlicheren und selbst tropischen Breiten

portées par des voyageurs. Toutes ces circonstances nous engagent à examiner avec soin la patrie des bois. Nous croyons pouvoir les énumérer par-là avec plus de précision. De l'autre part ce qu'on connaît la patrie des plantes exactement, la culture en est bien soulagée. Certainement d'importance pour les jardiniers. Malheureusement la géographie des plantes, quoique déjà tracée au commencement de ce siècle par le plus fameux naturaliste Mr. A. de Humboldt, est toujours encore un champ qui doit être cultivé, bien qu'elle soit une branche importante de toute la botanique et promette avant tout des avantages réels. On aime mieux se perdre dans une fabrication de nouvelles espèces, ou croit pouvoir étudier tout le règne végétale en n'ayant égard qu'à la cellule.

Donc avant tout nous avons crû nécessaire de savoir, quelles sont les contrées, qui ont un climat semblable à celui de l'Europe moyenne, et puis quels sont les bois sauvages qui y croissent. Il y a une quantité de bois de l'Europe méridionale et de l'Orient, même des espèces de Nepal et de la Chine, qui prospèrent chez nous en plein air. Sur-tout en Angleterre on cultive beaucoup de bois qui sont presque d'origine tropique. Or si l'on sait que surtout l'Asie, mais aussi l'Amérique a des terres qui s'élèvent par degrés jusqu'à une hauteur de 6,000, 10,000 et 12,000 pieds au-dessus du niveau de la mer, et qui doivent pour cette raison avoir un climat plus ou moins semblable au nôtre, on conçoit que beaucoup de bois qui végètent sous des latitudes plus méridionales et même tropiques, prospèrent aussi chez nous en certains cas.

wild wachsen, auch bei uns unter gewissen Umständen, wenn ihnen nur sonst die nöthigen Bedingungen geboten werden, gedeihen.

Ehe die Bearbeitung einer Gehölkunde unsererseits beginnen kann, müssen wir die nöthige Zeit haben, um die Pflanzen, welche wir in den Kreis unserer Beobachtungen ziehen, kennen zu lernen. Wir müssen ferner auch die Floren aller der Länder, aus denen möglicher Weise Gehölze bei uns im Freien gedeihen, genau studiren. Aber gerade dieser Umstand bietet neue Schwierigkeiten, da wir zwar von vielen, aber keinesweges von allen hieher gehörigen Ländern Floren besitzen und ausserdem hierher bezügliche Pflanzen in verschiedenen, oft schwer zugänglichen Zeitschriften, Reisewerken u. s. w. beschrieben sind. Nur mit Hilfe einer Bibliothek, wie sie in Berlin dargeboten wird, war es möglich, sich einigermaßen die nöthige Kenntniss der Länder und ihrer Vegetation zu verschaffen.

Wir haben im Herbst 1851 bereits ein Programm ausgegeben und alle Botaniker, Gärtner und Liebhaber der Gehölkunde aufgefordert, uns in unserm schwierigen Vorhaben zu unterstützen. Wir legten damals ein Verzeichniss der Gehölze, die wir gerade kultivirten, bei. Seitdem ist unsre Anstalt um ein Bedeutendes gewachsen; immer kommen noch Sendungen von Gehölzen, die uns bis jetzt fehlten, an. Wir haben uns auch keineswegs damit begnügt, wenige Pflanzen von jeder Art zu kultiviren, sondern es lag uns auch hauptsächlich daran, das, was wir besitzen, auch möglichst zu verbreiten. Es sind im vorigen Jahre mit Einschluss des Obstgehölzes nicht weniger als 299,902 St. Gehölze nach allen Gegenden hin, auch ausserhalb Deutschlands, verbreitet worden. Um auch

Avant que la confection d'une dendrologie pût être commencée, il nous fallait avoir le tems pour l'examen des plantes que nous voulons décrire. Il nous fallait connaître de plus les flores de toutes les terres dont les plantes pourraient prospérer chez nous. Mais justement cette circonstance offre de nouvelles difficultés, puisque nous ne possédons que les flores de quelques pays et non pas de tous, et que d'ailleurs ces plantes sont décrites dans des journaux différents et souvent peu accessibles et dans des rapports de voyages. Ce n'est qu'une bibliothèque comme celle de Berlin qui pouvait être en état à nous procurer la connaissance nécessaire des pays et de leur végétation.

Nous avons édit en automne de 1851 un programme, dans lequel nous avons invité tous les botanistes, les jardiniers et les amateurs à nous secourir dans nôtre entreprise, Nous y ajoutâmes le catalogue des bois que nous cultivions alors. Depuis ce tems nôtre institut s'est beaucoup agrandi. Toujours recevons nous encore des transports de bois qui nous manquaient jusqu'ici. Aussi ne nous sommes-nous pas contentés de cultiver un petit nombre de plantes de chaque espèce, mais nous eûmes surtout à coeur de répandre autant que possible ce que nous possédons. L'année passée nous avons distribué, y compris les arbres fruitiers, 299,902 pièces des bois, même à l'étranger. Pour rendre les bois plus délicats et meilleurs et notamment les Conifères si recherchés

die zarteren Arten und vor Allem die jetzt so beliebten Coniferen mehr zugänglich zu machen, sowie um gleich Alles in Massen vermehren zu können, wurde noch im Herbst 1851 ein Vermehrungshaus erbaut, dem in diesem Jahre die Erbauung eines Conservatoriums folgte. Das Letztere war um so nothwendiger, als wir uns alsbald gezwungen sahen, auch einige Gehölze in den Kreis unserer Beobachtungen zu ziehen, von denen wir zwar mit Bestimmtheit wissen, dass sie nicht bei uns ausdauern, die aber zum bessern Verständniss einer andern im Freien aushaltenden Art für uns durchaus nothwendig sind. Dann giebt es Familien oder grosse Geschlechter (*genera*), die zum grossen Theil den nordischen Klimaten angehören; es wäre aber wiederum zum Verständniss einer solchen Gruppe nicht gut, wenn man die wenigen Arten, die nur in wärmeren Klimaten wachsen, bei der Beobachtung ausschliessen wollte. Wir kultiviren desshalb diese wenigen Arten ebenfalls in unserm Conservatorium.

In dem oben besprochenen Programme ist bereits gesagt, dass es zunächst wünschenswerth sein müsse, ein wissenschaftliches Verzeichniss aller Gehölze, die in den Kreis einer Dendrologie gehören, und zwar mit möglichst vollständiger Synonymie, zu besitzen. Da der Herr Director Lenné, wie schon ausgesprochen, vielseitig auch sonst in Anspruch genommen ist, so hat es der Unterzeichnete unternommen, ein solches allein anzufertigen und freut sich, dieses in dem vorliegenden Werke Botanikern, Gärtnern, Forstleuten und allen Liebhabern der Landschafts-Gärtnerei hiemit vorlegen zu können. Möge es mässigen Ansprüchen genügen! Ich bin, wie ich schon im Anfange offen bekannt habe,

de nos jours, et pour pouvoir les pululer en masses, Mr. Lenné a fait construire encore en automne de 1851 une serre pour cet effet. Dans le cours de cette année on y a ajouté un conservatoire, qui était d'autant plus nécessaire que nous nous vîmes contraint à élever même quelques bois dont nous savons pour sûr, qu'ils ne prospèrent pas chez nous, mais qui devaient être examinés avec soin pour déterminer le meilleur une espèce prochaine. Car il y a des familles ou de grands genres qui appartiennent pour la plus grande partie au climat du Nord; mais d'un autre côté ne serait-il pas à justifier pour la détermination d'un tel groupe d'en exclure le petit nombre d'espèces qui ne se trouvent que dans des climats plus chauds. C'est pourquoi nous les cultivons de même dans la serre.

Dans le programme dont nous venons de parler, nous avons déjà dit, qu'il serait à désirer de posséder un catalogue scientifique de tous les bois, qui appartiennent à la dendrologie, et d'y observer autant que possible la synonymie. Mr. Lenné étant beaucoup occupé, l'auteur s'est proposé d'en faire lui-même. Il est charmé de pouvoir le présenter dans cet ouvrage aux botanistes, aux jardiniers, aux forestiers et aux amateurs de la dendrologie. Je souhaite qu'il suffise en quelque sorte aux demandes. Comme j'ai déjà dit au commencement, je suis persuadé qu'on y trouvera certains erreurs à l'égard de la synonymie et peut-être aussi de l'arrangement, que malgré les efforts que j'ai faits, quelques

selbst überzeugt, dass es manche Irrthümer in Betreff der Synonymie, vielleicht auch in der Zusammenstellung haben möge, dass auch, trotz aller Bemühungen, manches Gehölz übersehen und die Verbreitung der einen oder andern Art doch nicht erschöpft angegeben ist. Es geht demnach nochmals an Alle, die sich für Gehölzkunde interessiren, wenn sie auch nicht im Stande sein sollten, unsre Anstalt zu vermehren, das Ersuchen, mich wenigstens in meinen wissenschaftlichen Ausarbeitungen zu unterstützen. Jede Berichtigung werde ich gewiss mit dem grössten Danke annehmen; vor Allem aber bitte ich um Nachsicht bei einem Werke, was so viele Schwierigkeiten darbietet und doch möglichst schnell bearbeitet werden musste.

Ich erlaube mir am Schlusse zur vortheilhafteren Benutzung Einiges zu erläutern. Wie im Programme bereits ausgesprochen, sind alle Bäume, Sträucher und Halbsträucher aufgenommen, die in ganz Europa, im Oriente (mit Ausnahme der Tiefländer im Süden), in Persien (mit Ausnahme des äussersten Südens), in den Ländern des Himalaya, einschliesslich Nepal, in China (mit Ausnahme des äussersten Südens), in der Mongolei, in der Tatarei, in Sibirien, in Japan und in ganz Nordamerika wild wachsen. Ich war lange in Zweifel, ob die Halbsträucher aufzunehmen seien, zumal gerade sie es sind, die das Werk voluminöser gemacht haben, als ich es selbst wünschte. Alle früheren Dendrologien von Duhamel, Duroi, Des Fontaines, Willdenow, Hayne bis auf Loudon führen einige Halbsträucher auf, andere, die oft weit mehr das Gepräge eines Gehölzes tragen, sucht man vergebens. So sieht man z. B. die nur zum sehr ge-

planten auront été omises, et que l'enregistrement ou la synonymie de l'une ou de l'autre espèce n'aura pas été assez précise. J'invite donc encore une fois tous ceux qui s'intéressent à la dendrologie, lors même qu'ils ne seraient pas en état d'enrichir notre institut, à me secourir au du moins dans mon entreprise. Je leur saurai gré pour la seule considération. Cependant avant tout je prie d'être indulgent vis-à-vis d'un ouvrage qui offre tant de difficultés, et qui avec cela devait être achevé aussi vite que possible.

Pour en rendre plus facile l'usage, je prends la liberté d'ajouter encore quelques observations. Comme il a déjà été dit dans le programme, nous y avons reçu tous les arbres, les grands et les plus petits arbrisseaux (*frutices et suffrutices*) qui végètent dans toute l'Europe, dans l'Orient à l'exception des basses plaines du Sud, en Perse à l'exception des contrées les plus méridionales, dans les pays de l'Himalaya, y compris Nepal, en Chine à l'exception des contrées les plus méridionales, en Mongolie, en Tartarie, en Sibérie, au Japon et dans toute l'Amérique du Nord. Je doutais longtemps, si je devais y recevoir les sous-arbrisseaux (*suffrutices*), vu que ce sont justement eux qui ont rendu l'ouvrage plus compendieux, que je ne le désirais moi-même. Toutes les dendrologies antérieures de Duhamel, Duroi, Desfontaines, Willdenow, Hayne jusqu'à Loudon nomment quelques sous-arbrisseaux tandis que l'on cherche

ringen Theil holzigen *Helianthemum's*, *Dryas's* und andre allenthalben aufgeführt, während die durchaus holzigen *Atraphaxis*, *Noaea spinosissima*, *Acantholinum* etc. mit keiner Sylbe erwähnt sind. Konsequenz hielt ich aber vor Allem nothwendig, zumal das Werk auch einen geographischen Werth besitzen soll. In dem Fall, dass die meisten Arten einer Familie oder eines Geschlechtes in dem eben bezeichneten Länderkomplexe wild wachsen, sind auch die andern, welche wärmern Klimaten angehören, mit aufgeführt worden. Man erhält auf diese Weise ein vollständiges Verzeichniss.

Zur bessern Uebersicht habe ich verwandte Familien zu Gruppen vereinigt und diese als „*Ordines*“ bezeichnet. Das Wort „*Klasse*“ behielt ich mir für die höhere Eintheilung vor. Grosse Familien sind ebenfalls zur besseren Uebersicht in „*Tribus*“, grosse Geschlechter in „*Subgenera*“ gebracht. Eine jede Ordnung hat ihr besonderes Register, in dem die römische Zahl das Geschlecht, die arabische die Art angiebt. Auf diese Weise lässt sich jede Pflanze leicht auffinden. Wo sich eine römische und arabische Zahl zu gleicher Zeit befindet, erkennt man sogleich, dass die Pflanze nicht dahin gehört, wo sie dem Namen nach steht; mit einem Wort, man hat ein Synonym vor sich. Am Ende des ganzen Werkes befindet sich ein General-Register für die Geschlechter und ihre Synonyme, so dass auch selbst der weniger Geübte die gewünschte Belehrung erhält. Die Namen sind immer so geschrieben, wie sie der Autor gegeben hat, selbst in dem Falle, wo die Zusammensetzung sich grammatikalisch nicht rechtfertigen lässt. Nur altgriechische

en vain d'autres portant beaucoup plus l'empreinte d'un bois. C'est ainsi que l'on voit p. e. nommés partout les *Helianthemums*, les *Dryas* etc. qui ne sont ligneuses que pour la mineure partie, tandis qu'on n'a pas fait mention des *Atraphaxis*, *Noaea spinosissima*, *Acantholinum* etc. Mais la consequence me semblait principalement nécessaire, surtout quand l'ouvrage doit porter encore un intérêt géographique. Cependant dans le cas, où la plus grande partie des espèces d'un genre ou d'une famille croit dans les pays justement nommés, y sont aussi énumérées les autres appartenantes à un climat plus chaud. On en reçoit un catalogue complète.

Pour faciliter l'aperçu, les groupes des familles parentes en sont réunies sous le nom des „*ordres*“ et le mot de „*classe*“ est réservé pour les divisions supérieures. Les grandes familles sont rangées en „*tribus*“, et les grands genres en „*sousgenres*“. Chaque ordre a son registre alphabétique. Les chiffres romains désignent les genres, les chiffres arabes les espèces. De cette manière chaque plante peut être facilement trouvée. Où l'on trouve un chiffre romain et arabe à la fois, on voit que la plante ne fait pas partie du genre où l'on trouve le nom, en un mot on a devant les yeux un synonyme. A la fin de l'ouvrage il y a un registre général pour les genres et leurs synonymes, de sorte que même ceux qui commencent l'étude botanique, s'orienteront facilement. Les noms sont toujours écrits comme leur auteur les a donnés, même dans le cas où la composition n'est pas grammaticale. Je n'ai restitué que les anciennes dénominations grecques et latines, lors même qu'elles ont été mal orthographiées par l'auteur. Mais l'orthographe vicieuse a toujours été

und allateinische Benennungen glaubte ich in ihrer Reinheit wieder herstellen zu müssen, wenn sie auch von dem Gründer des Geschlechts falsch geschrieben wurden; die falsche Schreibart ist aber immer in Parenthese angegeben. So heisst, wie übrigens schon Gärtner richtig schreibt, der Birnbaum bei den Römern nicht *Pyrus*, sondern *Pirus*. Wo es möglich war, ist auch allenthalben die Ableitung des Wortes, was zur Benennung eines Geschlechts gebraucht wurde, beigefügt. Nicht minder hielt ich es für gut, in zweifelhaften Fällen die Sylbe, auf der der Ton liegt, mit einem Accent zu bezeichnen. Selbst Botaniker vom Fache sprechenviele Pflanzennamen falsch aus; ich erinnere an *Erica*, *Carpinus* u. s. w., deren falsche Aussprache fast allgemein ist.

Leider haben Deutsche, Engländer und Franzosen für Länder nicht immer dieselbe Bezeichnung; es giebt dieser Umstand nicht selten zu verschiedenen Schreibarten Veranlassung. So liest man *Nepal*, *Nipaul*, *Napaul* und *Napal*, *Bengalien* und *Benghalien*, *Dahurien*, *Davurien* und *Daurien*, *China* und *Sina*. In sofern es für die alphabetische Aufführung nicht erschwerend war, habe ich eine Schreibart (*Nepal*, *Bengalien*, *Dahurien*) möglichst durchgeführt. In Betreff *China's* und *Sina's*, wo die Anfangsbuchstaben so weit auseinanderliegen, sind beide Schreibarten, wenn sie vorkamen und ich es für nothwendig hielt, aufgeführt.

Alle Pflanzen, die mit * bezeichnet sind, werden in der Königlichen Landesbaumschule kultivirt. Gern überlassen wir, besonders an ähnliche Institute, alles was wir besitzen, in sofern Vermehrung vorhanden ist, gegen Tausch; es geht aber auch an alle Besitzer von Baumschulen, Gärten u. s. w. die Bitte, an

écrite en parenthèse. C'est ainsi que p. ex. le poirier ne se nomme chez les Romains pas „pyrus“, mais „pirus“, comme Gaertner a déjà très-bien dit. La dérivation du mot qui sert de détermination d'un genre, est aussi ajoutée partout où il fut possible, de même jusqu'à l'accent du syllabe qui porte le ton. Même les botanistes de métier prononcent souvent mal beaucoup de noms de plantes, p. ex. *Erica*, *Carpinus* etc., dont la prononciation vicieuse est presque générale.

Malheureusement les Allemands, les Anglais et les Français n'ont pas toujours la même dénomination pour les pays. Cette circonstance occasionne assez souvent de différentes orthographes; c'est ainsi qu'on lit: *Nepal*, *Nipaul*, *Napaul* et *Napal*; *Benghale* et *Bengale*; *Dahourie*, *Davourie* et *Daurie*; *Chine* et *Sine*. En tant que l'orthographe n'en fut pas compliquée, j'ai adopté une seule orthographe (*Nepal*, *Bengal*, *Dahourie*): quant à „Chine“ et „Sine“, où les lettres initiales sont si différentes, les deux orthographes sont adoptées.

Toutes les plantes précédées d'un * sont cultivées à la pépinière royale à Geltow. Nous communiquons avec plaisir à des instituts semblables tout ce que nous possédons, en tout nous avons plusieurs exemplaires. Mais nous prions encore tous les possesseurs de pépinières, de jardins et de plantations, de nous

uns abzugeben, was in diesem Hortus dendrologicus nicht mit einem * versehen ist und sich in ihrem Besitze befindet. Wir sind stets bereit, ein Aequivalent an andern Gehölzen abzugeben, oder, wo es gewünscht wird, den verlangten Preis zu bezahlen.

Was endlich die Zeichen anbelangt, deren ich mich für die verschiedenen Arten von Gehölzen bedient habe, so bedeutet:

- ♂ die grössern Bäume,
- ♂ die kleinern Bäume,
- ♂ die grössern Sträucher,
- ♂ die kleinern Sträucher,
- h die Halbsträucher,
- § die rankenden, kletternden und auf der Erde weithin kriechenden Pflanzen.

Gellow und Berlin, den 24. October 1852.

Karl Koch.

communiquer tous les bois qu'ils possèdent, et qui dans notre hortus dendrologicus ne sont pas précédés d'un *. Nous sommes toujours prêts à leur donner un équivalent ou de payer le prix qu'on en demande.

Quant à signes, dont je me suis servi pour les diverses sortes de bois, j'en ai employé:

- ♂ pour les arbres plus grands,
- ♂ pour les arbres plus petits,
- ♂ pour les arbrisseaux plus grands,
- ♂ pour les arbrisseaux plus petits,
- h pour les sous-arbrisseaux,
- § pour les plantes grimpantes et rampantes.

Gellow et Berlin, le 24. Octobre 1852.

Charles Koch.

CLASSIS PRIMA.

Polypetalae.



ORDO I.

Polycarpae.

Fam. 1. Bilimbiaceae.

I. Colbertia Salisb.

(ad honorem Colbert, regis Franco-gallici Ludovici XIV. minister, † 1683.)

1. ♂ *scabrella* Don prodr. fl. nep. 226. Wall. pl. asiat. rar. I, t. 22. India orientalis, Nepal.
Wormia scabrella Spreng. syst. veg. IV, 2. 213.

II. Saurauja W. (Sauravia Spr.)

(Comes de Saurau, tempore Willdenowii minister, cui cura aetaria tradita fuit, austriacus.)

1. ♂ *nepalensis* (nepaulensis, nipaulensis, nepalensis) DC. in
 Mém. de la soc. de Gen. I, 421. Wall. pl. asiat. rar. t. 176. Nepal, India orientalis.
Ternstroemia racemosa Don prodr. fl. nep. 225.
 2. ♂ *fasciculata* (nec *fastigiata*) Wall. pl. asiat. rar. t. 148. Nepal, India orientalis.

III. Trochostigma S. et Z.

(τροχος, rota, Rad et στήμα, Narbe. Teste Planch. Actinidiae syn.)

1. 5 *rufum* S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. III, 727. Japonia.
 2. 5 *argutum* S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. III, 727. Japonia.
 3. 5 *repandum* S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. III, 728. Japonia.
 4. 5 *polygamum* S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. III, 728. Japonia.
 t. 2. f. 2.
 5. § *volubile* S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. III, 728. Japonia.

IV. Actinidia Lindl.

(ακτίη, radius, Strahl.)

1. 5 *chinensis* Planch. in Hk. Lond. journ. of bot. VI, 303. in adn. China.

V. Trachytella De.

(τραχύς, asper, rauh, foliorum asperorum causa.)

1. § *Actaea* DC. syst. I, 410. China (Canton).
Actaea áspera Lour. fl. coch. I, 405.
Delima sarmentósa L. cod. Nro. 3877 (teste H. et Arn.)

Fam. 2. Magnoliaceae.

Trib. I. Magnolieae.

VI. Magnolia L.

(Magnol, Professor medicinae Monspeliensis, † 1715.)

A. Magnoliastrum (Antherae extrorsae).

- * 1. ♂ *grandiflora* L. cod. Nro. 3961. bot. cab. t. 814. America foederata
 virginiana β *foetida* L. sp. pl. ed. 1. 535. australi-orientalis.
 β) *angustifolia* Hort. Loud. arb. brit. I, 261.
 γ) *elliptica* Ait. hort. kew. ed. 2. III, 329.

- * d) *exoniensis* Hort. Loud. arb. brit. I, 261.
 - * e) *ferruginea* Sims. bot. mag. t. 1952.
 - * c) *lanceolata* Ait. hort. kew. ed. 2. III, 329.
 - grandiflora* bot. mag. t. 1952. bot. rep. t. 518.
 - * 7) *obovata* Ait. hort. kew. ed. 2. III, 329.
 - * d) *praecox* Hort. Loud. arb. brit. I, 261.
 - * i) *rotundifolia* Sweet hort. brit. 14.
 - * 2. 5 *glauca* L. cod. Nro. 3982. bot. cab. t. 215. Torr. fl. of N-York I, 27. t. 5. America foederata.
 - fragans* Salisb. prodr. stirp. hort. Allert. 379.
 - virginiana* α *glauca* L. sp. pl. ed. 1. 535.
 - β) *argentea* DC. prodr. I, 80.
 - γ) *Burchelliana* Hort.
 - * d) *longifolia* Ait. hort. kew. ed. 1. II, 251.
 - Gordoniana* Hort.
 - * e) *Thompsoniana* Sweet hort. brit. 14.
 - * c) *semperflorens* Hort.
 - * 3. 3 *tripetala* L. cod. Nro. 3984. Gu. et H. Abbild. fr. Holzart. t. 18. America foederata,
 - frondosa* Salisb. par. lond. 379. praesertim australis.
 - umbellata* Hort.
 - umbrella* Lam. enc. méth. III, 673. bot. cab. 418.
 - virginiana* δ *tripetala* L. sp. pl. ed. 1. 535.
 - * 4. 3 *acuminata* L. cod. Nro. 3983. Gu. et H. fr. Holzart. t. 17. America foederata,
 - bot. mag. 2427. praesertim orientalis.
 - pensylvanica* Hort.
 - rustica* Hort.
 - virginiana* ε *acuminata* L. sp. pl. ed. 1. 535.
 - β) *de Candollei* Savi in bibl. ital. 1819. p. 224. c. ic.
 - γ) *maxima* Lodd. in Loud. arb. brit. I, 273.
 - * 5. 3 *cordata* Mich. fl. bor. am. I, 328. bot. reg. t. 325. America foeder. austr.
 - * 6. 3 *Fraseri* Walt. fl. carol. 159. c. ic. America foederata
 - auriculata* Lam. enc. méth. III, 645. bot. mag. t. 1206. media et australis.
 - auricularis* Salisb. par. lond. 43. t. 43.
 - β) *pyramidata* Bartr. Reis. d. Car. 390, bot. reg. t. 407.
 - * 7. 3 *macrophylla* Mich. fl. bor. am. I, 327. bot. mag. t. 2189. America foeder. austr.
 - Michauxiana* Hort.
- B. *Gwillimia* (*Antherae introrsae*).
(*Domina Gwillim*, botanices amica, in Indiae orientalis urbe Madras.)
- 8. 3 *Yulan* Dsf. hist. d. arbr. II, 6. China.
 - conspicua* Salisb. par. lond. t. 38. bot. mag. t. 1621.
 - Precia* Corr. in Vent. jard. de la Malm. Nro. 24. adn. 2.
 - * β) *alexandrina* Hort. Loud. arb. brit. I, 278.
 - γ) *citriodora* Hort. Loud. arb. brit. I, 279.
 - δ) *Lenné* Hort. Topf. erford.
 - e) *Soulangiana* Mém. de la soc. d'hort. de Par. 1827.
 - Oct. 2. c. ic. bot. mag. t. 1169.
 - c) *speciosa* Hort. Rchb. fl. exot. V, 37. t. 343.
 - * 9. 3 *Kobus* DC. syst. I, 456. Japonia.
 - glauca* var. α Thunb. fl. jap. 236.
 - gracilis* Salisb. par. lond. t. 87.
 - ? *tomentosa* Thunb. in transact. of the Linn. soc. II, 336.
 - 10. 3 *obovata* Thunb. in transact. of the Linn. soc. II, 336. Japonia.
 - denudata* Lam. enc. méth. III, 675. Kaempf. icon. sel. t. 43.
 - glauca* var. β Thunb. fl. jap. 236.
 - * β) *discolor* Vent. jard. de la Malm. t. 24.
 - atropurpurea* Hort.
 - purpurea* bot. mag. t. 390.
 - γ) *liliflora* Lam. enc. méth. III, 675. Kaempf. ic. sel. t. 44.
 - 11. 3 *Sieboldii* C. Koch. Japonia.
 - parviflora* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 187.
 - 12. 3 *parviflora* Bl. bjd. 9. ? China.
 - * 13. 3 *fuscata* Andr. bot. rep. t. 229. bot. mag. t. 1008. India orientalis, China.
 - fasciata* Vent. jard. de la Malm. 24. adn. 2.
 - meleagrioides* Hort.
 - versicolor* Salisb. par. lond. t. 5. in adn.

Michelia fuscata Wight ill. of ind. bot. I, 12.

β) *annonaeifolia* Salisb. par. lond. t. 5.

γ) *hebecifolia* DC. prodr. I, 81.

δ) *rubra* Hort.

14. ♂ *hypoleuca* S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2, 187.

Japonia.

β) *concolor* Sieb. et Zucc.

15. ♂ *desolata* Zucc. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. II, 373. t. 3. et 4.

Japonia.

16. ♂ *inodora* DC. syst. I, 459.
Liriodendron Liliifera β. Lour. fl. coch. I, 424.

China (Canton).

17. 5 ? *Coco* DC. syst. I, 459.

Cochinchina, China

Liriodendron Coco Lour. fl. coch. I, 424.

(Macao, Canton).

18. 5 ? *Figo* DC. syst. I, 460.

China (Canton, Macao).

Liriodendron Figo Lour. fl. coch. I, 424.

Michelia Figo Spr. syst. veget. II, 643.

19. ♂ *excelsa* Wall. tent. fl. nep. V. t. 2.

Nepal.

Michelia excelsa Wall. in Spr. syst. veget. IV, 2, 345.

Not. Praeterea in horto nostro dendrologico species vel varietates sequentes, nobis non satis notae, coluntur: 1) *Buchananiana*, 2) *canaliculata*, 3) *floribunda*, 4) *lanatifolia*, 5) *striata*, 6) *subrotundifolia*, 7) *superba* et 8) *triumphans*.

VII. *Talauma* Juss.

(nomen ab autore in herbario Suriani inventum, sine dubio origine indica.)

1. ♂ *pumila* Bl. fl. Jav. Magn. 38. t. 12. C.

? China, India orientalis c. ins.

Liriodendron Liliifera L. cod. Nro. 3979.

Magnolia pumila Andr. bot. rep. t. 226. bot. mag. 977.

VIII. *Manglietia* Bl.

(Manglet, nomen *M. glaucae* Bl. in Java.)

1. ♂ *insignis* Bl. fl. Jav. Magn. p. 22. in adn.

Nepal, India orientalis.

Magnolia insignis Wall. tent. fl. nep. III, t. 1. pl. asiat. rar. II, 78. t. 182.

IX. *Buergeria* S. et Z.

(Burger, Sieboldii successor in Japonia.)

1. ♂ *stellata* S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2, 186.

Japonia.

2. ♂ *obovata* S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2, 187.

Japonia.

3. ♂ *salicifolia* S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2, 187.

Japonia.

X. *Michelia* L.

(Pietro Ant. Micheli, prof. botan. Florentinus † 1737.)

1. ♂ *Doltsopa* Buchan. in DC. syst. I, 448. Wall. tent. fl. nep. t. 5.

Nepal.

2. ♂ *Kisopa* Buch. in DC. syst. I, 448. Wall. tent. fl. nep. 8. t. 4.

Nepal.

3. ♂ *velutina* DC. prodr. I, 79. Bl. fl. Jav. Magn. t. 5. β.

Nepal.

Tsiampacca Blume bijdr. I, 7.

4. ♂ *lanuginosa* Wall. tent. fl. nep. 8. t. 5.

Nepal, Japonia.

5. ♂ *macrophylla* Don prodr. fl. nep. 226.

Nepal.

6. ♂ *Champacca* (Champacca Osb.) L. cod. Nro. 3985. Bl. fl.

Jav. Magn. 9. t. 1.

India orientalis,
Himalaya, China.

suavéolens Pers. syn. pl. II, 94.

XI. *Liriodendron* L.

(λίριον, lilium, Lillie et δένδρον, arbor, Baum.)

* 1. ♂ *Tulipifera* L. cod. Nro. 3978. bot. mag. 275.

America borealis angl.
et foederata.

procérum Salisb. prodr. stirp. h. Afr. 379.

Tulipifera Liriodendron Mill. dict. Nro. 1.

β) *conferta* Hort. Modic.

γ) *flava* Hort. Loud. arb. brit. I, 265.

δ) *heterophylla* Man. cat. plant. hort. Modic. 59.

ε) *integrifolia* Hort.

ζ) *obtusiloba* Mich.

XII. *Sphenocarpus* Wall.

(σφην, cuneus, Keil et καρπος, fructus, Frucht.)

1. ♂ *pterocarpus* C. Koch.

India orientalis, Nepal.

Liriodendron indicum Spr. syst. veg. II, 642.

Magnolia pterocarpa Roxb. teste Spr.

Trib. 2. Illiceae.

XIII. *Illicium* L.
(*Illicium*, Anlockung, Reiz.)

1. ♂ *floridanum* Ell. phil. transact. LX, 524. t. 12. bot. mag. 439. America foed. austr.
 2. ♂ *parviflorum* Mich. fl. bor. am. I, 526. Vent. jard. Cels. t. 22. America foed. austr.
 anisatum Bartr. Reis. d. Car. 51.
 3. ♂ *anisatum* L. cod. Nr. 3976. Vriese in Tijdschr. v. nat. gesch. I, 31. t. 1.
 4. ♂ *religiosum* S. et Z. fl. jap. I, 5. t. 1. Japonia, China.
 anisatum Thunb. fl. jap. 235. Japonia.

XIV. *Trochodendron* S. et Z.
(*τροχος*, rota, Rad et δένδρον, arbor, Baum.)

1. ♂ *aralioides* Sieb et Zucc. fl. jap. I, 84. t. 39. 40. Japonia.
 Gymnanthus paradoxus Jungh. in Tijdschr. v. nat. gesch. VII, 368.

Fam. 3. *Annonaceae*.XV. *Uvaria* L.
(uva, Traube.)

1. ♂ *discolor* Blume fl. Jav. Annon. 53 t. 26. 31. A. India orientalis, China.
 Desmos chinensis Lour. fl. coch. I, 431.
 Unóna biglandulosa Bl. bijdr. 16.
 - *chinensis* DC. syst. I, 495.
 - *discolor* Vahl symb. bot. II, 63. t. 36.
 2. ♂ *elegans* Wall. num. list. 6420. China, ? India orient.
 Unóna Lessertiana Dun. mon. d. Annon. 107. t. 26.
 3. ♂ *odorata* Lam. enc. méth. I, 595. India orientalis c. ins.,
 Unóna leptopétala DC. syst. I, 496. Deless. icon. sel. I, t. 88.
 - *odorata* Dun. mon. d. Annon. 100. t. 23.
 4. ♂ *rhodantha* Hance pl. nov. austr. Chin. diagn. 18. China (Hongkong).
 5. ♂ *radiiflora* Hance pl. nov. austr. Chin. diagn. 19. China (Hongkong).
 * 6. ♂ *triloba* T. and Gr. fl. of N. Am. I, 45. America foederata
 Annona triloba L. cod. Nro. 3994. media et australs.
 Asimina triloba Dun. mon. d. Annon. 81.
 Orchidocarpum arietinum Mich. fl. bor. am. I, 329.
 Porcelia triloba Pers. syn. pl. II, 95.
 7. ♂ *parviflora* T. and Gr. fl. of N. Amer. I, 45. America foeder. austr.
 Asimina parviflora Dun. mon. d. Annon. 82. t. 9.
 Orchidocarpum parviflorum Mich. fl. bor. am. I, 329.
 Porcelia parviflora Pers. syn. pl. II, 95.
 8. ♀ *obovata* T. and Gr. fl. of N. Am. I, 45. America foeder. austr.
 Annona grandiflora Bartr. Reis. d. Car. 21. t. 2.
 - *obovata* W. sp. pl. II, 1269.
 Asimina grandiflora Dun. mon. d. Annon. 82. t. 11.
 Orchidocarpum grandiflorum Mich. fl. bor. am. I, 30.
 Porcelia grandiflora Pers. syn. pl. II, 95.
 9. ♀ *pygmaea* T. and Gr. fl. of N. Am. I, 45. America foeder. austr.
 Annona pygmaea Bartr. Reis. d. Car. 21, t. 1.
 Asimina pygmaea Dun. mon. d. Annon. 82. t. 10.
 Orchidocarpum pygmaeum Mich. fl. bor. am. I, 330.
 Porcelia pygmaea Pers. syn. pl. II, 95.

XVI. *Artabotrys* R. Br.

1. ♂ *hamatus* Bl. fl. Jav. Annon. 60. t. 29. 31. f. C. China, Cochinchina,
 Unona hamata Dun. mon. d. Annon. 126. t. 27. India orient., Ceylon.
 Uvaria uncata Lour. fl. coch. 426.
 2. ♂ *odoratissimus* R. Br. in bot. reg. V, 423. India orientalis (China).
 Annona hexapétala L. fl. suppl. 270.
 Uvaria odoratissima Rxb. fl. ind. II, 666.
 Unona uncinata Lam. enc. méth. II, 127.
 β) *esculenta* Roxb. in n. Schrift. d. Ges. naturf. Fr. IV,
 201. (sub *Uvaria*.)

Uvaria uncata Roxb. fl. ind. II, 666.
Unona esculenta Dun. mon. d. Annon. 107.

XVII. Hyalestemma Wall.

(ύαλον, vitrum, Glas et στεμμα, corona, Kranz.)

1. 5 *Roxburghianum* Wall. num. list. 6434. Nepal.
Uvaria dioica Roxb. fl. ind. II, 659.

Fam. 4. Schisandreae. (nec Schizandreae Aut.)

XVIII. Kadsúra L. (Cadsura Spr.)

(nomen K. japonicae in Japonia.)

1. η *japonica* Dun. mon. d. Annon. 57. Japonia, Himalaya.
Uvaria japonica L. cod. Nro. 3988.
 - heteroclitia Roxb. fl. ind. II, 663. S. et Z. fl. jap. I, 40. t. 17.
 2. § *chinensis* Kir. in Bull. de la soc. d. nat. de Mosc. 1837. China borealis.
 VII, 149.

XIX. Sphaerostemma (nec Sphaerostema) Blume.

(σφαίρα, globus, Kugel et στεμμα, corona, Kranz.)

1. § *propinquum* Blume bijdr. I, 22. Nepal.
Kadsura propinqua Wall. tent. fl. nep. I, 11. t. 15.
 2. § *grandiflora* Royle ill. of the him. mount. 61. Himalaya.
Kadsura grandiflora Wall. tent. fl. nep. I, 10. t. 14.

XX. Schisandra (nec Schizandra Aut.) Mich.

(σχισαι, fissura, Spalte et άνθη, mas, hoo loco Staubgefaess.)

1. § *coccinea* Mich. fl. bor. amer. II, 219. t. 47. bot. mag. t. 1413. America foeder. austr.

Fam. 5. Menispermaceae.

Trib. 1. Menispermeae.

XXI. Menispermum L.

(μην, mensis, Monat et σπερμα, semen, Samen.)

- * 1. § *canadense* L. cod. Nro. 7485. bot. mag. t. 1910. America britannica
canadense α Lam. enc. méth. IV, 95. et foederata.
angulatum Mneh. méth. 277.
 β) *smilacinum* DC. syst. I, 541.
Cisaampelos smilacina L. cod. Nro. 7517. Jacq. ic.
 rar. III, t. 629.
 γ) *lobatum* DC. syst. I, 540.
virginicum L. cod. Nro. 7486.
 * 2. § *da(h)uricum* DC. syst. I, 540. Deless. ic. sel. I, t. 100. Sibiria austr., Mongolia,
canadense Pall. Reise d. versch. Statth. d. russ. R. II, 687. China borealis.
canadense β Lam. enc. méth. IV, 95.
Trilophus ampeliságria Fisch. (?) hort. gorenk.
 3. § *acutum* Thunb. fl. jap. 193. Japonia.

XXII. Cócclus DC.

(coccum, Scharlachbeere.)

1. § *laurifolius* DC. syst. I, 530. Deless. ic. sel. I, t. 97. India orient., Himalaya.
Menispermum laurifolium Roxb. fl. iad. III, 815.
 2. § *japónicus* DC. syst. I, 516. Japonia.
Menispermum japónicum Thunb. fl. jap. 193.
 * 3. § *trilobus* DC. syst. I, 522. Japonia.
Menispermum trilobum Thunb. fl. jap. 194.
 4. § *Thunbergii* DC. syst. I, 524. Japonia.
Menispermum orbiculatum Thunb. fl. jap. 194.
 5. § *diandrus* H. et Arn. in bot. of Beech. voy. 167. China (Macao).
 6. § *hexágyrus* Colebr. in transact. of the Linn. soc. XIII, 63. China (Canton).
Menispermum hexágyrus Roxb. in Spr. syst. veg. II, 155.
 7. § *Fibraurea* DC. syst. I, 525. Cochinchina, China.
Fibraurea tinctoria Lour. fl. coch. II, 769.
Menispermum tinctorium Spr. syst. veget. II, 156.

8. § ovalifolius DC. syst. I, 526. China, Java.
 Menispermum ovalifolium Pers. syn. pl. II, 628.
- * 9. § carolinus DC. syst. I, 524. America foederata
media et australis.
 Andróphylax scandens Wendl. bot. Beob. 38.
 Baumgartia scandens Mneh. méth. 650.
 Caesalpinia scandens Hort.
 Menispermum carolinianum Walt. fl. car. 248.
 - carolinum L. cod. Nro. 7487.
 Wendlandia caroliniana Nutt. gen. of N. Am. pl. I, 241.
 - populifolia W. sp. pl. II, 275. Wendl. hort. herrenh. t. 26.

XXIII. Clisámpelos L.

(κισσός, hederá, Epheu et ἀμπέλος, vitis, Weinrebe.)

1. § convolvulácea W. sp. pl. IV, 862. India orientalis, Nepal.
 β) glabra Rxb. hort. beng. 74.
 hernandifolia Wall. num. list. 4977.
 ? Braunea menispermoides W. sp. pl. IV, 797.
 γ) hirsuta Buch. in DC. syst. I, 535.
 mauritiana Ham. in Wall. num. list. 4980. a.
 δ) orbiculata DC. syst. I, 537.
 Cócculus Ham. in Wall. num. list. 4857.
2. § obtecta Wall. in Royle ill. of him. mount. 61. Himalaya.

Trib. 2. Lardizabaleae.

XXIV. Stauntonia DC.

(Staunton comitem Macartney, legatum anglicum, in Chinam per annos 1792—94 com-
 mitavit et multas plantas chinenses in Britannia introduxit.)

1. § chinensis DC. syst. I, 514. China.
 2. § hexaphylla Dne in Ann. d. sc. nat. XII, 105. S. et Z. fl.
 jap. I, 140. t. 76. Japonia.
 Rajania hexaphylla Thunb. fl. jap. 149.

XXV. Parvatia Dne.

(Parvati, Indorum dea monticola.)

1. § Brunoniana Dne in Arch. du Mus. I, t. 12. f. A. Himalaya.
 Stauntonia Brunoniana Wall. num. list. 4952.

XXVI. Holboellia Wall.

(Holboell horti botanici hafniensis custos fuit.)

1. § latifolia Wall. tent. fl. nep. I, 24. t. 16. bot. reg. t. 46. Nepal, Himalaya.
 Stauntonia latifolia Wall. num. list. 4950.
 2. § angustifolia Wall. tent. fl. nep. 24. t. 17. Nepal, Himalaya.
 Stauntonia angustifolia Steud. nom. bot. 634.

XXVII. Akébia Dne.

(Fagi-Kadsura-Akebi nom. japon.)

- * 1. § quinata Dne. in Arch. du Mus. I, t. XIII. f. A. bot. reg. XXXII. t. 28. Japonia.
 2. § lobata Dne in Arch. du Mus. I, 195. t. 13. f. B. Japonia.
 3. § clematifolia S. et Z. fl. jap. I, 146. Japonia.
 4. § quercifolia S. et Z. fl. jap. I, 146. Japonia.

Fam. 6. Ranunculáceae.

Trib. 1. Clematídeae.

XXVIII. Clématis L.

(κληματίς, planta sempervirens apud Graecos.)

A. Flámmula. (Invol. 0, Carp. plumoso-caudatae.)

a) Flores paniculati; folia pinnatim secta.

- * 1. § Flámmula L. cod. Nro. 4036. Rchb. icon. fl. germ. et helv. Europa austr., ?Rossia,
Africa borealis,
Isthm. caucasicus.
 IV, t. 63.
 diversifolia Gil. fl. lith. V, 282.

- suavéolens Salisb. prodr. stirp. h. Allert. 361.
 * β) angustifolia Jacq. enum. stirp. vind. 310. (teste Bert.)
 γ) caespitosa Scop. fl. car. I, 380.
 orientalis Seen. (teste Steud.)
 Flammula Bert. amoen. it. 236.
 * δ) maritima Lam. enc. méth. II, 142.
 ε) rotundifolia DC. prodr. I, 2.
 Flammula α odora Presl fl. sic. I, 2.
 fragrans Ten. fl. nap. prodr. 32. fl. nap. I, t. 48.
 ζ) rubella Pers. syn. pl. II, 100.
 * 2. § orientalis L. cod. Nro. 4032. Dill. hort. elth. 144. t. 119. f. 145.
 flava Mnch. meth. 296.
 3. § Ispahanica Boiss. diagn. pl. or. nov. VI, 3.
 * 4. § glauca W. berl. Baumz. 65. t. 4. f. 1.
 ochroleuca Hort.
 orientalis Pall. Reise d. versch. Pr. d. russ. R. II, 499. 507.
 β) angustifolia Led. fl. alt. II, 373.
 5. § paniculata Thunb. in transact. of the Linn. soc. II, 337.
 crispa Thunb. fl. jap. 239.
 Vitalba β japonica Houtt. naturl. hist. plant. St. 7. 309. f. 2.
 6. § longiloba DC. syst. I, 136.
 7. § minor Lour. fl. coch. I, 422.
 8. § chinensis Retz. obs. bot. II, 18. t. 2.
 sinensis Lour. fl. coch. I, 422.
 9. § Meyeniana Walp. in nov. act. ac. Leop. Car. XIX, suppl.
 I, 297.
 10. § oreophila Hance pl. nov. austr. Chin. diagn. 18.
 11. § longicaudata Led. fl. ross. I, 3.
 glauca Claus in Göb. Reise in d. Stepp. d. südl. Russl.
 III, 247.
 orientalis Lep. Reise d. versch. Pr. d. russ. R. I, 310.
 12. § breviaudata DC. syst. I, 138.
 13. § heracleaefolia DC. syst. I, 138.
 14. § Gouriana Rxb. in DC. syst. I, 138.
 indica Heyne in Rth. nov. pl. spec. 252.
 β) subovata Royle ill. of the him. mount. 51.
 * 15. § Vitalba L. cod. Nro. 4035. Jcq. fl. austr. t. 308.
 dumosa Salisb. prodr. stirp. hort. Allert. 371.
 sepium Lam. fl. franc. III, 306.
 β) banática Wierb. in Rchb. Deutschl. Fl. 120.
 γ) integrata DC. prodr. I, 4.
 Vitalba Jcq. fl. austr. IV, t. 308.
 δ) scandens Borkh. in Bechst. Forstbot. 250.
 Flammula Borkh. im rhein. Mag.
 16. § grewiaefolia DC. syst. I, 140.
 17. § Buchaniana DC. syst. I, 140.
 Buchanani Don prodr. fl. nep. 191.
 18. § loasaefolia DC. syst. I, 140.
 vitifolia Wall. num. list.
 19. § connata DC. prodr. I, 4.
 20. § amplexicaulis Edgew. in transact. of the Linn. soc. XX, 24.
 21. § velutina Edgew. transact. of the Linn. soc. XX, 25.
 22. § ligusticifolia Nutt. in T. et Gr. fl. of N. Am. I, 9.
 β) brevifolia T. et Gr. fl. of N. Am. I, 9.
 23. § Drummondii T. et Gr. fl. of N. Am. I, 9.
- b) Flores paniculati; Folia ternatim secta.
- * 24. § virginiana L. cod. Nro. 4034.
 canadensis Mill. dict.
 Gatesbyana Pursh. fl. Am. sept. II, 736.
 cordifolia Mnch. meth. suppl. 104.
 fragrans Salisb. prodr. stirp. hort. Allert. 371.
 β) cordata Pursh fl. Am. sept. II, 384.
 γ) bracteata Mnch. meth. suppl. 103.
- Oriens.
 Persia australis (Kuh-
 Daëna).
 Sibiria australis.
 Japonia.
 China.
 China (Canton).
 (China, ins. Dánae.)
 China (littora
 Sing-Moor).
 China (Hongkong).
 Rossia orientali-
 austr.
 China (Peking, Jehul).
 China (Peking, Jehul).
 India orient., Himalaya.
 Europa, Africa borealis,
 Oriens, (?) Nepal.
 Nepal.
 Nepal.
 India orientalis, Nepal.
 Nepal.
 Himalaya.
 Himalaya.
 America boreali-
 occidentalis.
 Texas.
- America angl. et foeder.

25. § Loureiroana DC. syst. I, 144.
dioica Lour fl. coch. I, 421.
26. § holosericea Pursh fl. Am. sept. II, 394.
27. § Nuttallii C. Koch.
parviflora Nutt. in T. et Gr. fl. of N. Am. I, 9. nec DC.
28. § acuminata DC. syst. I, 148.
29. § apiifolia (nec aquifolia Steud.) DC. syst. I, 149.
- * 30. § trifoliata Thunb. in transcript. of the Linn. soc. II, 337.
- * 31. § grata Wall. pl. asiat. rar. I, 83. t. 98.
32. § biternata (nec triternata S. et Z.) DC. syst. I, 149.
virginiana Lour. fl. coch. 422.
virginica Thunb. fl. jap. 240.
- * 33. § triternata DC. syst. I, 150.
Atrágene triternata Desf. hort. paris.
34. § parviloba Gardn. in Hk. journ. of bot. I, 241.
35. § hedysarifolia DC. syst. I, 148. bot. reg. t. 599.
36. § stans S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 177.
- c) *Pedunculi trifidi aut Flores terni.*
37. § grácilis Edgew. in transcript. of the Linn. soc. XX, 24.
38. § cordata Royle ill. of the him. mount. 51.
39. § nutans Royle ill. of the him. mount. 51.
40. § venosa Royle ill. of the him. mount. 51.
41. § globosa Royle ill. of the him. mount. 51.
42. § tenuifolia Royle ill. of the him. mount. 51.
43. § terniflora (nec tenuiflora DC. prodr.) DC. syst. I, 137.
chinensis Osb. Reis. n. Ostind. u. Ch. 267.
44. § canaliculata Lag. hort. madr. 17.
45. § dahurica C. Patrín in Pers. syn. pl. II, 99.
- d) *Pedunculi solitarii, uniflori; Folia pinnatim secta.*
- * 46. § Viorna L. cod. Nro. 4030. Dill. hort. elth. 144. t. 118. f. 144.
cordata Sims. in bot. mag. t. 1816.
β) magniflora Hfmsgg. Verz. d. Pfl. Kult. I, 167.
γ) Simsii Sweet hort. brit. I. Don dichl. pl. I, 8.
47. § lasiantha Nutt. in T. and Gr. fl. of N. Am. I, 9.
- * 48. § cylindrica Sims. bot. mag. t. 1160.
Viorna Andr. bot. rep. t. 71.
crispa Lam. enc. méth. II, 44.
divaricata Jcq. fl. eclog. pl. rar. t. 33. (teste bot. reg. diversa.)
β) Waltéri Pursh fl. Am. sept. II, 384.
49. § lineariloba DC. syst. I, 155. Deless. ic. sel. I, t. 3.
- * 50. § reticulata Walt. fl. car. 156.
rósea Smith in Abb. ins. am. icon. t. 101.
51. § diversifolia DC. syst. I, 155. Deless. ic. sel. I, t. 4.
52. § fusca Turcz. in Bull. de la soc. de Nat. de Mosc. 1840. 60.
53. § camtschatica Bong. in Bull. de l'ac. de St. Pét. VIII, 339.
- * 54. § japonica Thunb. fl. jap. 240.
crassifolia Hort.
β) flore pleno.
- * 55. § patens Morr. et Dne. in Bull. de l'ac. de Brux. III, 173.
56. § intricata Bge. in Mém. de l'ac. de St. Pét. VI, 2. 75.
57. § aethusaefolia Turcz. dec. pl. chin. 2.
- * 58. § gravéolens Lindl. in journ. of the hortic. soc. I, 307. c. ic.
bot. mag. t. 4495.
59. § parvifolia Edgew. in transcript. of the Linn. soc. XX, 25.
60. § barbellata Edgew. in transcript. of the Linn. soc. XX, 25.
- e) *Pedunculi 3 — pluriflori; Folia indivisa.*
- * 61. § smilacifolia Wall. in asiat. res. XIII, 402. bot. mag. t. 4259.
62. § fruticosa Turcz. dec. pl. chin. 1.
- B. Viticella. (Invol. O, Carp. caudatae.)
- * 63. § flórida Thunb. fl. jap. 240. bot. mag. 834.
Atrágene flórida Pers. syn. pl. II, 93.

China.

America foeder. austr.
America boreali-occid.

Nepal.

Nepal.

Japonia.

India orient., Himalaya.
Japonia, Cochinchina,
Timor.

Patria ignota.

China (Hongkong).

Nepal.

Japonia.

Himalaya.

Kashmir.

Himalaya.

Himalaya.

Himalaya.

Himalaya.

China.

Hispania.

Sibiria (Dahuria).

America foederata
orientalis.

California.

America foeder. austr.

Am. foeder. (Carolina).

America foeder. austr.

Patria ignota.

Camtschatca,

ins. Curilenses.

Camtschatca.

Japonia.

Japonia.

Mongolia.

Mongolia.

Tataria.

Himalaya.

Himalaya.

Nepal.

Mongolia.

Japonia.

- Atrágene indica* Dsf. tabl. de l'œc. de bot. du mus. 128.
 β) flore albo.
 γ) flore minori Pers. syn. pl. II, 98.
 δ) flore pleno.
- * 64. § *coerulea* Lindl. in bot. reg. t. 1955.
florida β. bicolor D. Don bot. reg. XXIV, t. 25.
Sieboldii Hort.
 β) *grandiflora* bot. mag. t. 3983.
 γ) *azurea* Parad. vindob. fasc. 3. e. fe.
- * 65. § *crispa* L. cod. Nro. 4031. bot. reg. XXII, t. 80. Japonia.
- * 66. § *Schillingii* Hort. America foederata
 media et australis.
 * 67. § *Hendersonii* Hort. Patria ignota.
 * 68. § *Viticella* L. cod. Nro. 4029. bot. mag. 564. fl. gr. t. 516. Patria ignota.
lugubris Salisb. prodr. stirp. hort. Allert. 371. Europa australis.
Viticella deltoidea Mneh. meth. 297.
 β) *baccata* Pers. syn. pl. II, 99.
 γ) *coerulea* Sweet hort. brit. 2.
 δ) fl. pleno.
 ε) *pulchella* Pers. syn. pl. II, 99.
 ζ) *tenuifolia* DC. prodr. I, 9.
- * 69. § *Pitchéri* T. and Gr. fl. of N. Am. I, 10. Am. foeder. (Arkansas).
- * 70. § *campaniflora* Brot. fl. lussit. II, 559. br. fl. gard. 2. ser. III, 217. Lusitania.
viornoides Hort.
- * 71. § *parviflora* DC. in Mém. de la soc. de Gén. I, 433. Patria ignota.
campaniflora Lodd. in bot. cab. t. 987.
revoluta Hort par.
- β) *albiflora*.
72. § *Tournefortii* DC. syst. I, 167. Oriens.
- C. *Cheiropsis*. (Invol. calyciforme.)
73. § *cirrrosa* (nec *cirrosa*) L. cod. Nro. 4028. S. et Sm. fl. Graecia, Italia,
 gr. t. 517. Hispania, Africa boreal.
Atrágene cirrhosa Pers. syn. pl. II, 98.
Cheiropsis cirrhosa Presl. fl. sic. I, 4.
 β) *humilior* Bert. fl. it. V, 472.
semitriloba Lag. hort. madr. 17.
 γ) *lanceolata* Don dichl. pl. I, 9.
calycina Ait. hort. kew. ed. 2. III, 344. bot. mag. t. 959.
 δ) *polymorpha* Guss. fl. sic. prodr. II, 40.
74. § *pedicellata* Sweet. hort. brit. I. bot. reg. XXXIII, t. 21. Hispania,
cirrrosa Sims. in bot. mag. t. 1070. (ins. balearicae).
cirrrosa β *pedicellata* DC. syst. I, 163.
75. § *balearica* Rich. in Journ. de phys. IV. (1779.) 127. c. ic. Hispania
 bot. mag. t. 959. (insulae balearicae).
Atrágene balearica Pers. syn. pl. II, 98.
- * 76. § *nepalensis* (napaulensis) DC. syst. I, 164. Nepal, Himalaya.
montana Don prodr. fl. nep. 192.
- * 77. § *montana* Buch. in DC. syst. I, 164. bot. reg. XXVI, t. 53. Nepal, Himalaya.
 Sweet. br. fl. gard. 2. sér. III, 253.
anemoniflora Don prodr. fl. nep. 192.
 β) *grandiflora* Hook. bot. mag. t. 4061.
- Not. In horto nostro dendrologico species vel varietates sequentes, nobis non satis notae, coluntur: 1) *Bidwilliana*, 2) *Hartwegi*, 3) *himalayana*, 4) *indivisa lobata*, 5) *insalensis*, 6) *Leei*, 7) *macrocarpa* (an *macropetala*?), 8) *Meyerii*, 9) *odorata* Wall., 10) *peregrina*.
- XXIX. *Atrágene* L. (*Athragene* Teophr.)
- (ἀθραγενή) nomen a Theophrasto pro *Clematide cirrhosa* usurpatum, itaque rectius *Athragene*.)
- * 1. § *alpina* L. cod. Nro. 4025. Jcq. fl. austr. III. t. 241. Alpes, Rossia borealis,
austriaca Scop. fl. carn. I, 387. bot. repos. t. 180. Camschatka, Sibiria.
Clemátides Grantz stirp. austr. II, 111.
Clématis alpina Mill. dict.
 β) *sibirica* L. cod. Nr. 4027. bot. mag. 1951.
Clematis sibirica Mill. dict.
2. § *Wenderothii* Schlecht. in Linn. XI, 648. Alpes helveticæ.
austriaca Wender. hort. marburg.

- Clématis Wenderothii* Steud. nom. bot. t. 290.
 3. § *ochotensis* Pall. fl. ross. II, 69. Sibiria orientalis,
 Kamtschatka.
Clématis ochotensis Poir. enc. méth. suppl. II, 298. Sibiria (Dahuria).
 4. § *macropétala* Led. fl. alt. II, 376. in adn. ic. pl. fl. ross. t. 11. America borealis:
 * 5. § *americana* Sims. bot. mag. t. 887. britannica et foederata.
Clématis verticillaris DC. syst. I, 166.
 β) *obliqua* Dougl. in Loud. arbor. brit. I, 248. America boreali-occid.
 6. § *Columbiana* Nutt. in Journ. acad. Philad. VII, 7.
Clématis Columbiana T. et Gr. fl. of N. Am. I, 11.
 7. § *japonica* Thunb. fl. jap. 259. Japonia.
Clématis polypétala Poir. enc. méth. suppl. II, 296. Patria ignota.
 8. § *occidentalis* Horn. hort. hafn. II, 520.
Clématis occidentalis DC. prodr. I, 10.

Trib. 2. Cimicifugeae.

XXX. *Thalictrum* L.(Θαλιτρον, nomen Dioscoridis pro aliqua specie generis hodierni *Thalictri*.)

1. ♀ *sinense* Lour. fl. coch. I, 423. China.

XXXI. *Xanthorrhiza* l'Her. (*Xanthorrhiza* Aut. nom.)

(ξανθορ, flavus, gelb et ριζα, radix, Wurzel.)

- * 1. ♀ *apifolia* l'Her. stirp. nov. 79. t. 38. bot. mag. t. 1736. America foederata.
simplicissima Marsh. arbust. am. 167.

XXXII. ? *Fallopia* Lour.

(Fallopia, olim prof. botanices Patavinus.)

1. 5 *nervosa* Lour. fl. coch. 410.

Trib. 3. Paeoniaceae.

XXXIII. *Paeonia* L.

(Paeon, ein griechischer Arzt.)

- * 1. 5 *Moutan* Sims. bot. mag. t. 1154. China.
arborea Donn cat. hort. cantabr. 196.
fruticosa Dum. Cours. bot. cult. ed. 2. IV, 462.
officinalis Thunb. fl. jap. 230.
suffruticosa Andr. bot. rep. t. 373. et 448.
 * β) *albido-plena* Sab. in transact. of the hort. soc. VI, 482.
 γ) *Annéslei* Sab. in transact. of the hort. soc. VI, 482. t. 7.
 δ) *Banksii* Sabine in transact. of the Linn. soc. VI, 472.
 bot. reg. t. 379.
 * ε) *carneo-plena* Sab. in transact. of the hort. soc. VI, 481.
 ζ) *Humei* Ker. bot. reg. t. 379.
 * η) *lácera* Lindl. in bot. reg. t. 1771.
 * θ) *papaverácea* Andr. bot. rep. t. 463. bot. mag. t. 2175.
 ι) *Reewesii* (nec *Rawesii* Loud.) Sab. in transact. of the
 hort. soc. VI, 479.
 * κ) *rósea* DC. prodr. I, 65. bot. cab. t. 1035.
 λ) *roseo-plena* Sab. in transact. of the hort. soc. VI, 477.
 bot. rep. t. 373.
 μ) *variegata* Don in Sweet fl. gard. 2. sér. t. 238.

INDEX.

Actaea aspera Lour. V, 1.
Actinidia Lindl. IV.
 chinensis Planch. 1.
Akebia Dne. XXVII.
 clematifolia S. et Z. 3.
 lobata Dne. 2.

Akebia quercifolia S. et Z. 4.
 quinata Dne. 1.
Androphylax scandens Wendl. XXII, 9.
Annona obovata Willd. XV, 8.
 grandiflora Bartr. XV, 8.
 hexapétala L. fl. XVI, 2.

Annona pygmaea Bartr. XV, 9.

triloba L. XV, 6.

Artabotrys R. Br. XVI.

hamatus Blume 1.

odoratissimus R. Br. 2.

Asinina grandiflora Dun XV, 8.

parviflora Dun. XV, 7.

pygmaea Dun. XV, 9.

triloba Dun. XV, 6.

Atragene L. XXIX.

alpina L. 1.

americana Sims. 5.

austriaca Scop. 1.

- Wender. 2.

balearica Pers. XXIX, 75.

cirrhusa Pers. XXVIII, 73.

Columbiana Nutt. 6.

Clematides Crantz 1.

cordata Wender. 2.

florida Pers. XXVIII, 63.

japonica Thunb. 7.

indica Desf. XXVIII, 63.

macropetala Led. 4.

obliqua Dougl. 5. β.

occidentalis Horn. 6.

ochotensis Pall. 3.

sibirica L. 1 β.

tritermata Desf. XXIX, 33.

Wenderothii Schlecht. 2.

Baumgartia scandens Mneh. XXII, 9.

Braunea menispermoides Willd. XXIII, 1.

Buergeria S. et Z. IX.

obovata S. et Z. 2.

salicifolia S. et Z. 3.

stellata S. et Z. 1.

Cadsura Spr. s. *Kadsura*.

Caesalpinia scandens Hort. XXII, 9.

Cissampelos L. XXIII.

Cocculus Ham. 1. δ.

convolvulacea W. 1.

glabra Rxb. 1. β.

hernandifolia Wall. 1. β.

hirsuta Buch. 1. γ.

mauritanica Ham. 1. γ.

obtectata Wall. 2.

orbiculata DC. 1. δ.

smilacina L. XXI, 1. β.

Cheiropsis cirrhosa Presl. XXVIII, 73.

Clematis L. XXVIII.

acuminata L. 28.

aethusaefolia Turcz. 57.

alpina Mill. XXIX, 1.

amplexicaulis Edgew. 20.

anemoniflora Don. 77.

angustifolia Jacq. 1. β.

apilifolia DC. 29.

azurea Sieb. 64. γ.

baccata Pers. 68. β.

balearica Rich. 75.

banatica Wierb. 15. β.

barbellata Edgew. 60.

Bidwilliana Hort. ad fin.

bitermata DC. 32.

bracteata Mneh. 24. γ.

brevicaudata DC. 12.

Buchaniana DC. 17.

Clematis Buchananii Don 17.

caespitosa Scop. 1. γ.

calycina Ait. 73. γ.

campaniflora Brot. 70.

- Lodd. 71.

camtschatica Bong. 53.

canaliculata Lag. 24.

canadensis Mill. 24.

Catesbyana Pursh 24.

chinensis Osb. 43.

- Retz. 8.

chlorantha bot. reg. 62. β.

cirrhusa L. 73.

- Sims. 74.

coerulea Lindl. 64.

- Sweet. 66. γ.

connata Wall. 16.

Columbiana T. et Gr. XXIX, 6.

cordata Pursh. 24. β.

- Sims. 46.

- Royle. 36.

cordifolia Mneh. 24.

crassifolia Hort. 54.

crispa L. 65.

- Lam. 48.

- Thunb. 5.

cylindrica Sims. 48.

dahurica C. Patr. 45.

dioica Lour. 25.

divaricata Jacq. 48.

diversifolia DC. 51.

- Gilib. 1.

Drummondii Torr. 23.

dumosa Salisb. 15.

Flammula L. 1.

- Borkh. 15. δ.

flava Mneh. 2.

florida Thunb. 63.

β) *bicolor* Don. 64.

fruticosa Turcz. 62.

fusca Turcz. 52.

fragrans Salisb. 24.

- Ten. 1. α.

glauca Claus 11.

- W. 4.

Gouriana Rxb. 14.

globosa Royle. 41.

gracilis Edgew. 37.

grandiflora bot. mag. 64. β.

- Hk. 77. β.

grata Wall. 31.

grewiaeflora DC. 16.

graveolens Lindl. 58.

Hartwegi Hort. ad fin.

hedysarifolia DC. 35.

heracleaefolia DC. 13.

himalayana Hort. ad fin.

holosericea Pursh. 26.

japonica Thunb. 54.

indica Heyne 14.

indivisa lobata Hort. ad fin.

insalensis Hort. ad fin.

intricata Bge. 56.

ispahanica Boiss. 3.

lasiantha Fisch. 47.

Leei Hort. ad fin.

Clematis ligusticifolia Nutt. 22.
lineariloba DC. 49.
loasaeifolia DC. 18.
longicaudata Led. 11.
longiloba DC. 6.
Loureiroana DC. 25.
lugubris Salisb. 68.
macrocarpa Hort. ad fin.
maritima Lam. 1. &
magniflora Hfmsgg. 46. β.
Meyeniana Walp. 9.
Meyerii Hort. ad fin.
minor Lour. 7.
montana Buch. 73.
 - Don. 74.
nepalensis DC. 76.
napaulensis DC. 76.
nutans Royle. 39.
Nuttalii C. Koch. 27.
occidentalis DC. XXIX, 8.
ochotensis Poir. XXIX, 3.
ochroleuca Hort. 4.
odora Wender. 1.
 - Presl. 1. β.
odorata Hort. ad fin.
oreophila Hance. 10.
orientalis L. 2.
 - Pall. 4.
 - Lep. 11.
 - Seen. 1. γ.
paniculata Thunb. 5.
parviflora DC. 71.
 - Nutt. 27.
parvifolia Edgew. 59.
parviloba Gardn. 34.
patens Morr. et Dne. 55.
pedicellata Sweet. 74.
peregrina Hort. ad fin.
Pitcheri T. et Gr. 69.
polymorpha Guss. 73. δ.
polypetala Poir. XXIX, 7.
reticulata Walt. 50.
revoluta Hort. par. 69.
rosea Sm. 50.
scandens Borekh. 15. δ.
semitriloba Lag. 73. β.
sepium Lam. 15.
Schillingii Hort. 60.
sibirica Mill. XXIX, 1. β.
Sieboldii Hort. 64.
Simsii Sweet. 46. γ.
smilacifolia Wall. 61.
sinensis Lour. 8.
stans S. et Z. 36.
suaveolens Salisb. 1.
subovata Royle. 14. β.
tenuiflora Auct. 43.
tenuifolia Royle. 42.
terniflora DC. 43.
Tournefortii DC. 70.
trifoliata Thunb. 30.
trinervis Buch. 27.
triternata DC. 33.
velutina Edgew. 21.
venosa Royle. 40.
verticillaris DC. XXIX, 5.

Clematis Viorna L. 46.
 - Andr. 48.
viornoides Schrd. 70.
virginiana L. 24.
 - Lour. 32.
virginica Thunb. 32.
Vitalba L. 15.
 β) *japonica* Houtt. 5.
Viticella L. 68.
vitifolia Wall. 18.
Walteri Pursh. 48. β.
Wenderothii Steud. XXIX, 2.

Cocculus DC. XXII.
carolinus DC. 9.
diandrus H. et Arn. 5.
Fibraurea DC. 7.
hexagnus Colebr. 6.
japonicus DC. 2.
laurifolius DC. 1.
ovalifolius DC. 8.
trilobus DC. 3.
Thunbergii DC. 4.

Colbertia Salisb. 1.
scabrella Don. 1.

Delima sarmentosa L. V, 1.
Desmos chinensis Lour. XV, 1.
Fallopia Lour. XXXII.
nervosa Lour. 1.

Fibraurea tinctoria Lour. XXII, 7.
Gymnanthus paradoxus Jungh. XIV, 1.
Holboellia Wall. XXVI.
angustifolia Wall. 2.
latifolia Wall. 1.

Hyalostemma Wall. XVII.
Roxburghianum Wall. 1.

Illicium L. XIII.
anisatum Bartr. 2.
 - L. 3.
 - Thunb. 4.
floridanum Ell. 1.
parviflorum Mich. 2.
religiosum S. et Z. 4.

Kadsura L. XVIII.
chinensis Turcz. 2.
grandiflora Wall. XIX, 2.
japonica Dun. 1.
propinqua Wall. XIX, 1.

Liriodendron L. XI.
Coco Lour. VI, 17.
Figo Lour. VI, 18.
indicum Spr. XII, 1.
Liliifera L. V, 1.
Liliifera β. Lour. VI, 16.
procerum Salisb. 1.
Tulipifera L. 1.

Manglietia Blume. VIII.
insignis Blume. 1.

Magnolia L. VI.
acuminata L. 4.
alexandrina Hort. 8. β.
annonaefolia Salisb. 13. β.
atropurpurea Hort. 10. β.
auricularis Salisb. 6.
auriculata Lam. 6.
Buchananiana Hort. ad fin.
Burchelliana Hort. 2. γ.

Magnolia canaliculata Horti ad fin.
citriodora Hort. 8. γ.
Coco DC. 17.
conspicua Salisb. 8.
cordata Mich. 5.
dealbata Zucc. 15.
de Candollei Sav. 4. β.
denudata Lam. 10.
discolor Vent. 10. β.
excelsa Wall. 19.
exoniensis Hort. 1. δ.
fasciata Vent. 13.
ferruginea Sims. 1. α.
Figio DC. 18.
floribunda Hort. ad fin.
fragrans Salisb. 2.
Fraseri Walt. 6.
frondosa Salisb. 3.
fuscata Andr. 13.
glauca L. 2.
 - Thunb. 9. 10.
Gordoniana Hort. 2. δ.
gracilis Salisb. 9.
grandiflora L. 1.
hypoleuca S. et Z. 14.
inodora DC. 16.
insignis Wall. VIII, 1.
Kobus DC. 9.
lancifolia Hort. ad fin.
Lenné. 8. δ.
liliflora Lam. 10. γ.
longifolia Ait. Hort. 2. δ.
macrophylla Mich. 7.
maxima Lodd. 4. γ.
meleagrioides Hort. 13.
Michauxiana Hort. 7.
obovata Thunb. 10.
parviflora Blume. 12.
 - S. et Z. 11.
pensylvanica Hort. 4.
praecox Hort. 1. θ.
Precia Corr. 8.
pterocarpa Rxb. XII, 1.
pumila Andr. VII, 1.
purpurea Curt. 10. β.
pyramidata Bartr. 6. β.
rubra Hort. 13. δ.
rustica Hort. 4.
Sieboldii C. Koch. 11.
Soulangeana Hort. 8. α.
speciosa Hort. 8. ζ.
striata Hort. ad fin.
subrotundifolia Hort. ad fin.
superba Hort. ad fin.
Thompsoniana Hort. 2. α.
tomentosa Thunb. 9.
tripetala L. 3.
triumphans Hort. ad fin.
umbellata Hort. 3.
Umbrella Lam. 3.
versicolor Salisb. 13.
virginiana L. 1—4.
Yulan Dsf. 8.

Menispermum L. XXI.
acutum Thunb. 3.
angulatum Mnch. 1.

Menispermum canadense L. 1.
canadense Pall. 2.
carolinum L. XXII, 9.
carolinianum Walt. XXII, 9.
dahuricum DC. 2.
hexagynum Rxb. XIX, 6.
laurifolium Rxb. XXII, 1.
lobatum DC. 1. γ.
japonicum Thunb. XXII, 2.
orbiculatum Thunb. XXII, 4.
ovalifolium Pers. XXII, 8.
smilacinum DC. 1. β.
tinctorium Spreng. XXII, 7.
trilobum Thunb. XXII, 3.
virginicum L. 1. γ.

Michelia L. X.
Champaca L. 6.
Doltsopa Buch. 1.
excelsa Wall. VI, 19.
Figio Spreng. VI, 18.
fuscata Wight VI, 13.
Kisopa Buch. 2.
lanuginosa Wall. 4.
macrophylla Don. 5.
suaveolens Pers. 6.
Tsiampacca Bl. 3.
velutina DC. 3.

Orchidocarpum arietinum Mich. XV, 6.
grandiflorum Mich. XV, 8.
parviflorum Mich. XV, 7.
pygmaeum Mich. XV, 9.

Paeonia L. XXXIII.
arborea Donn. 1.
Anneslei Sab. 1. γ.
Banksii Sab. 1. δ.
fruticosa Dum. Cours. 1.
Humei Ker. 1. ζ.
Moutan Sims. 1.
officinalis Thunb. 1.
papaveracea Andr. 1. θ.
Reewesii Sab. 1. ι.
suffruticosa Andr.

Parvatia Dne. XXV.
Brunoniana Dne. 1.

Porcelia grandiflora Pers. XV, 8.
parviflora Pers. XV, 7.
pygmaea Pers. XV, 9.
triloba Pers. XV, 6.

Rajania hexaphylla Thunb. XXIV, 2.
Saurauja W. II.
fasciculata Wall. 2.
nepalensis DC. 1.

Sauravia Spr. II.

Schisandra Mich. XX.
coccinea Mich. 1.

Sphaerostemma Blume. XIX.
grandiflorum Royle 2.
propinquum Blume. 1.

Sphenocarpus Wall. XII.
pterocarpus C. Koch. 1.

Stauntonia DC. XXIV.
angustifolia Steud. XXVI, 2.
Brunoniana Wall. XXV, 1.
chinensis DC. 1.
hexaphylla Dne. 2.
latifolia Wall. XXVI, 1.

- Talauma Blume. VII.**
pumila Bl. 1.
Ternstroemia racemosa Don. II, 1.
Thalictrum L. XXX.
sinense Lour. 1.
Trachytella DC. V.
Actaea DC. 1.
Trilophus ampellisagria Fisch. XXI, 2.
Trochodendron S. et Z. XIV.
aralioides S. et Z. 1.
Trochostigma S. et Z. III.
argutum S. et Z. 2.
polygamum S. et Z. 4.
repandum S. et Z. 3.
rufum S. et Z. 1.
volubile S. et Z. 5.
Tulipifera Liriodendron Mill. XI, 1.
Unona biglandulosa Blume. XV, 1.
chinensis DC. XV, 1.
discolor Vahl. XV, 1.
esculenta Dun. XVI, 2. β.
hamata Dun. XVI, 1.
leptopetala DC. XV, 3.
Lessertiana Dun. XV, 2.
odorata Dun. XV, 3.
Unona uncinata Lam. XVI, 2.
Uvaria L. XV.
dioica Rxb. XVII, 1.
discolor Blume. 1.
elegans Wall. 2.
esculenta Roxb. XVI, 2. β.
japonica L. XVIII, 1.
obovata T. et Gr. 8.
odorata Lam. 3.
odoratissima Rxb. XVI, 2.
parviflora T. et Gr. 7.
pygmaea T. et Gr. 7.
radiiflora Hance 5.
rhodantha Hance 4.
triloba T. et Gr. 5.
uncata Lour. XVI, 1.
Rxb. XVI, 2.
Viticella deltoidea Munch. XXVIII, 68.
Wendlandia caroliniana Nutt. XXII, 9.
populifolia W. XXII, 9.
Wormia scabrella Spreng. I, 1.
Xanthorrhiza s. **Zanthorrhiza**.
Zanthorrhiza XXXI.
apiifolia l'Her. 1.
simplicissima Marsh. 1.

ORDO II.

Tachypesanthae.

Fam. 7. Berberideae.

I. *Berberis* L.

(vox barbara, fortasse arabica.)

A. *Pedunculis plurifloris.*

- | | |
|---|--|
| <p>* 1. 5 <i>vulgaris</i> L. cod. Nro. 2555.
 <i>ácida</i> Gilib. fl. lith. V, 137.
 <i>irritábilis</i> Salisb. prodr. stirp. hort. Allert. 213.
 <i>crética</i> Willem. phyt. écon. de la Lorr. 146.
 * β) <i>alba</i> Mill. dict.
 * γ) <i>arborescens</i> Hort.
 * δ) <i>asperma</i> Mill. dict. 7.
 * ε) <i>dulcis</i> Hort. Loud. arb. brit. I, 301.
 * ζ) <i>foliis argenteo-variegatis.</i>
 * η) <i>purpureis.</i>
 * θ) <i>innominata</i> Kielm. char. et descr. dec. rar. pl. hort. Tub. 18.
 <i>aurea</i> Tausch in Flora XVII, 2. 495.
 <i>sibirica</i> Hort.
 <i>vulgaris</i> δ <i>purpurea</i> DC. prodr. I, 105.
 * ι) <i>lutea</i> l'Hér. in DC. prodr. I, 105.
 * κ) <i>macroacantha</i> Guss. syn. fl. sic. I, 439.
 <i>aetnensis</i> Presl. fl. sic. I, 28.
 <i>cretica</i> Viv. fl. cors. spec. nov. diagn. 5.
 <i>sicula</i> Jan elench. pl. hort. parm. 5.
 * λ) <i>microcarpa</i> Schrd. in Linn. XII, 366.
 μ) <i>nigra</i> DC. prodr. I, 105.
 ν) <i>rubra</i> Sweet hort. brit. 16.
 ξ) <i>serótina</i> Schrd. in Linn. XII, 364.
 * ο) <i>violacea</i> W. berl. Baumz. 34.</p> | <p>Europa, Oriens, Sibiria,
 Terra nova, ? America
 britannica et foederata
 borealis.</p> |
| <p>* 2. 5 <i>ibérica</i> Stev. in DC. prodr. I, 105.
 <i>tragacanthoides</i> DC. syst. II, 18.
 <i>lúcida</i> Schrd. in Linn. XII, 363.
 <i>Mahonia tragacanthoides</i> Loud. arb. brit. I, 311.</p> | <p>Transcaucasia.</p> |
| <p>* 3. 5 <i>crética</i> L. cod. Nro. 2556. S. et Sm. fl. gr. t. 342.
 <i>articulata</i> Lois. in dict. d. sc. nat.
 <i>provincialis</i> Audib. in Linn. XII, 381.
 β) <i>glauca</i> Schrd. in Linn. XII, 366.
 γ) <i>serratifolia</i> Poir. enc. méth. VIII, 618.</p> | <p>Corsica, Graecia, Creta.</p> |
| <p>* 4. 5 <i>crataegina</i> DC. syst. II, 9.
 <i>ilicifolia</i> Booth catal. 1833.</p> | <p>Asia minor.</p> |
| <p>* 5. 5 <i>nitens</i> Schrd. in Linn. XII, 382.
 6. 5 <i>obovata</i> Schrd. in Linn. XII, 385.
 7. 5 <i>hispanica</i> Boiss. et Reut. pug. pl. nov. 3.
 <i>vulgaris</i> β <i>australis</i> Boiss. voy. d. le mid. de l'Esp. I, 15.</p> | <p>Patria ignota.
 Patria ignota.
 Africa borealis et
 Hispania australis.
 Patria ignota.</p> |
| <p>* 8. 5 <i>mitis</i> Schrd. in Linn. XII, 371.</p> | <p>Patria ignota.</p> |

9. 5 heterópoda Schrenk enum pl. nov. 102.
? da(h)urica Lodd. in Donn hort. cant. ed. 9. 111.
sphaerocarpa Kar et Kir. in Bull. de la soc. de nat. de
Mosc. 1841. III, 376.
10. 5 turcomanica Kar. in Led. fl. ross. I, 79.
- * 11. 5 emarginata W. hort. berol. I, 395. Gu. et H. fr. Holzart. t. 62.
β) latifolia Tausch in Flora XXI, 729.
γ) dentata Tausch in Flora XXI, 729.
- * 12. 5 integerrima Bge. Arb. d. naturf. Ver. in Rig. I, 129.
- * 13. 5 numularia Bge. in Arb. d. naturf. Ver. in Rig. I, 130.
- * 14. 5 declinata Schrd. in Linn. XII, 368.
- * 15. 5 macrocarpa Schrd. in Linn. XII, 370.
- * 16. 5 sanguinolenta Schrd. in Linn. XII, 378.
- * 17. 5 cerásina Schrd. in Linn. XII, 380.
emarginata Horn. hort. hafn. 348.
18. 5 Thunbergii DC. syst. II, 9.
crética Thunb. fl. jap. 146.
19. 5 caraganaefolia DC. syst. II, 18.
Mahonia caraganaefolia Loud. arb. brit. I, 311.
- * 20. 5 aristata DC. syst. II, 8. bot. mag. t. 2549.
affinis G. Don dichl. pl. I, 115.
angustifolia Rxb. fl. ind. II, 183.
Chitria Don prodr. fl. nepal. 204. bot. reg. t. 729.
β) coetaneo-flora.
nepalensis Lodd. hort. Edinb.
γ) Kushmul Royle ill. of the him. mount. 64.
δ) sinensis Dsf. cat. hort. par. 1804. 158. Wats. dendrol. brit. t. 28.
- * 21. 5 petiolaris Wall. in G. Don dichl. pl. I, 116.
- * 22. 5 umbellata Wall. in G. Don dichl. pl. I, 115. Lindl. bot.
reg. XXX, t. 40. 44.
angulosa Wall. num. list. 1475.
gracilis Hort.
23. 5 ceratophylla G. Don. dichl. pl. I, 115.
- * 24. 5 asiática Rxb. in DC. syst. II, 13.
ilicifolia Rxb. in asiat. res. VI, 357.
β) tinctoria Lesch. in mém. du Mus. IX, 306. Paxt. fl.
gard. I, 13. t. 5. (teste Royle.)
- * 25. 5 coriária Royle in bot. reg. XXVII, t. 46.
26. 5 brachybótrys Edgew. in transact. of the Linn. soc. XX, 29.
27. 5 kunawurensis Royle illustr. of himal. pl. 64.
- * 28. 5 Lycium Royle illustr. of himal. pl. 64.
? angustifolia Rxb. fl. ind. II, 183. (teste Royle.)
? floribunda Wall. num. list. 1474. (teste Royle.)
29. 5 africana Hebenstr. et Ludw. in R. et S. syst. veg. VII, 11.
- * 30. 5 hypoleuca Lindl. in journ. of the hort. soc. II, 246. c. ic.
- * 31. 5 laxiflóra Schrd. in Linn. XII, 367.
- * 32. 5 macracantha Schrd. in Linn. XII, 366.
- * 33. 5 canadensis Pursh fl. Am. sept. I, 219.
vulgaris Walt. fl. car. 120.
vulgaris β canadensis W. sp. pl. II, 228.
- * 34. 5 caroliniana Loud. hort. brit. 2. ed. 584.
- * 35. 5 crenulata Schrd. in Linn. XII, 362.
canadensis Big. fl. boston. ed. 2.
36. 5 melanocarpa S. Schauer Jahresb. d. schles. Ges. f. vat.
Kult. XXVIII, 180.
- * 37. * spathulata Schrd. in Linn. XII, 376.
canadensis Lk. hort. berol. I, 345. Gu. et H. Abb. fr.
Holzart. t. 63.
- * 38. 5 dealbata Lindl. in bot. reg. t. 1750.
39. 5 Fendleri Asa Gr. pl. Fendl. 5. Nro. 15.
- * 40. 5 glauca H. B. et K. nov. sp. et gen. am. V, 71. t. 433.
41. 5 globosa Benth. pl. Hartw. 124.
42. 5 aurahuacensis Lem. in fl. d. serr. IV, t. 334.
glauca Benth. pl. Hartw. Nro. 710.
43. 5 ciliaris Lindl. in fl. d. serr. VI, 68. adnot.
44. 5 loxensis Benth. pl. Hartw. 125. Paxt. fl. gard. I, 13. f. 3.

Siberia (Songaria,
Altai).Tataria.
Siberia.Tataria.
Tataria.
Patria ignota.
Patria ignota.
Patria ignota.
Patria ignota.

Japonia.

China.

Ceylon, India orientalis,
Nepal.

Nepal.

? Nepal.

Nepal.
India orientalis, Nepal.Nepal.
Himalaya.
Himalaya.
Himalaya.Africa.
Nepal.
America foederata.
America foederata.
America foederata
media et australis,
? Canada.
Carolina.
America foederata.America borealis.
America foederata.Mexico, Nova Granada.
Nova Mexico.
Nova Granada.
Nova Granada.
Nova Granada.Bolivia.
Columbia (Ecuador).

45. 5 *multiflora* Benth. pl. Hartw. 124.
 46. 5 *coriacea* St. Hil. fl. bras. mérid. I, 37.
 47. 5 *glaucescens* St. Hil. fl. bras. mérid. I, 37. t. 10.
 vulgaris Arrab.
 48. 5 *spinulosa* St. Hil. fl. brasil. mérid. I, 37.
 49. 5 *laurifolia* Billb. plant. bras. dec. I. (Flora IV, 330.)
 50. 5 *rigidifolia* H. B. et K. nov. gen. et sp. am. V, 70. t. 431.
 51. 5 *Quinduhensis* H., B. et K. nov. gen. et sp. am. V, 70. t. 432.
 * 52. 5 *monosperma* R. et P. fl. per. III, 52.
 53. 5 *latifolia* R. et P. fl. per. III, 52. t. 282a.
 54. 5 *flexuosa* R. et P. fl. per. III, 52. t. 281. f. 2.
 55. 5 *paniculata* Juss. in DC. syst. II, 12.
 56. 5 *undulata* Lindl. in fl. d. serr. VI, 70.
 * 57. 5 *Jamesonii* Veitsch in fl. d. serr. VI, 3.
 58. 5 *parviflora* Lindl. in Journ. of the hort. soc. II, 243. fl. d.
 serr. III. Misc. 45. c. ic.
 59. 5 *chilensis* Gill. in Hk. bot. misc. III, 135.
 60. 5 *corymbosa* Hk. et Arn. in Hk. bot. misc. III, 135.
 61. 5 *glomerata* Hk. in bot. of Beech. voy. 5.
 62. 5 *trigona* Kze. in Poepp. et Endl. nov. gen. ac sp. pl. II, 63. t. 187.
 63. 5 *rotundifolia* Poepp. et Endl. nov. gen. et sp. pl. II, 63.
 64. 5 *ferox* Gay fl. chil. I, 80.
 65. 5 *diffusa* Gay fl. chil. I, 80.
 66. 5 *Gayi* C. Koch.
 brachybotrya Gay fl. chil. I, 81.
 67. 5 *congestiflora* Gay fl. chil. I, 75. t. 3.
 68. 5 *Darwinii* Hk. icon. pl. t. 672. Paxt. fl. gard. I, 13. f. 4.
 69. 5 *ilicifolia* Forst. in comm. goett. IX, 28. bot. mag. t. 4308.
 lagenaria Poir. enc. méth. VIII, 619.
 70. 5 *ruscifolia* Lam. enc. méth. VIII, 619. illustr. d. gener. t. 253. f. 2.
- Columbia (Ecuador).
 Brasilia.
 Brasilia.
 Brasilia.
 Brasilia.
 America tropica.
 America tropica.
 Peru,
 Peru,
 Peru.
 Peru.
 Peru.
 Peru.
 Chili.
 Chili.
 Chili.
 Chili.
 Chili.
 Chili.
 Chili.
 Chili.
 Chili.
 Chili.
 Chili.
 Chili.
 Chili.
 Chili.
 Chili.
 Chili austr., Patagonia.
 Patagonia.
 Resp. Argentina.
- B. *Pedunculis unifloris.*
- * 71. 5 *sibirica* Pall. Reis. d. versch. Statth. d. russ. R. II, app.
 737. t. P. f. 2. bot. reg. t. 487.
 altaica Pall. fl. ross. II, 42. t. 67.
 cretica Falk Beitr. II, 164.
 72. 5 *Wallichiana* DC. prodr. I, 107. Wall. pl. asiat. rar. III, 23. t. 243.
 atrovirens G. Don dichl. pl. I, 117.
 macrophylla Hort.
 73. 5 *xanthoxylon* Hassk. cat. hort. bogor. alt. 180.
 74. 5 *cuneata* Banks in DC. syst. II, 16.
 75. 5 *tomentosa* R. et P. fl. per. III, 52. t. 282. b.
 76. 5 *Haenkeana* Presl. in R. et S. syst. veg. VII, 1616.
 77. 5 *reticulata* Steud. nom. bot. I, 197.
 78. 5 *lutea* R. et P. fl. per. III, 51. t. 280.
 79. 5 *conferta* H. B. et K. nov. gen. et sp. am. V, 54. t. 430.
 lutea β. DC. syst. II, 14.
 * 80. 5 *virgata* R. et P. fl. per. III, 51. t. 281. f. B.
 81. 5 *Grevilleana* Gill. in Hk. bot. misc. III, 136.
 * 82. 5 *actinacantha* Mart. in R. et Sch. syst. veg. VII, 12. bot.
 reg. 1845. t. 55.
 β) *minor* H. et Arn. in Hk. misc. III, 135.
 83. 5 *horrída* Gay fl. chil. I, 84.
 84. 5 *crispa* Gay fl. chil. I, 86.
 * 85. 5 *marginata* Gay fl. chil. I, 88.
 86. 5 *montana* Gay fl. chil. I, 90.
 * 87. 5 *heterophylla* Juss. in enc. méth. VIII, 622. Hk. exot. fl. t. 14.
 ilicifolia Hort.
 * 88. 5 *buxifolia* Lam. illustr. d. gener. t. 253. f. 3. Hombr. et Jacq.
 voy. au pol. sud. bot. phan. t. 21. V.
 dulcis Sweet br. fl. gard. 2. ser. I. t. 100. the bot. I. t. 42.
 rotundifolia Hort.
 β) *inermis* Pers. syn. pl. I, 387. Hombr. et Jacq. voy.
 au pol sud. bot. phan. t. 21. U.
 * 7) *microphylla* Forst. in comm. goett. IX, 29.
- Siberia australis.
 Nepal.
 Chili et Patagonia.
 Peru.
 Chili.
 Chili.
 Peru.
 Nova Granada.
 Peru.
 Peru.
 Chili.
 Chili.
 Chili.
 Chili.
 Patagonia.
 Patagonia.

- * 89. 5 *empetrifolia* Lam. illustr. d. gener. t. 253. f. 4. bot. reg. new. ser. XI. t. 27. Patagonia.
- * 90. 5 *Knightii* Hort. van Houtte fl. d. serr. VI, 80. ? Patagonia.
- C. Folia ternata aut pinnata. (Mahonia.)
(Bernard M'Mahon, hortulanus Philadelphiae, scripsit american gardener's Calendar.)
- * 91. 5 *nepalensis* Wall. num. list. 1480. Japonia, Nepal, India
Miccia Ham. in Don prodr. fl. nep. 205. orientalis.
Mahonia nepalensis (napaulensis) DC. syst. II, 21.
92. 5 *japonica* Spreng. syst. veg. II, 119. fl. d. serr. VI, 79. c. ic. Japonia.
Ilex japonica Thunb. fl. jap. 79. et icon. t. 12.
Mahonia japonica DC. syst. II, 22.
93. 5 *Leschenaultii* Wall. num. list. 1479. Wight icon. pl. t. 940. India orientalis, Nepal.
pinnata Rxb. fl. ind. II, 184.
Mahonia acanthifolia G. Don diehl. pl. I, 118.
- *nepalensis* (napaulensis) β. Roxburghii DC. syst. II, 21.
- * 94. 5 *Fortunei* Lindl. in transact. of the hort. soc. I, 251. adn. China borealis.
et 300. c. ic.
- * 95. 5 *Aquifolium* Pursh fl. am. sept. I, 219. t. 4. Paxt. mag. of America boreali-
bot. IX, 5. c. ic. occidentalis, regiones
a) fol. 3 par. T. et Gr. fl. of N. Am. I, 50. lacus Hudsonii.
pinnata Mühl. cat. pl. Am. sept. ed. 2. 36.
repens Lindl. bot. reg. t. 1176.
Mahonia Aquifolium Nutt. gen. of N. Am. pl. I, 212.
- *repens* G. Don diehl. pl. I.
β) fol. 4—6 par. T. et Gr. fl. of N. Am. I, 50.
pinnata β. Hk. fl. bor. am. I, 28.
γ) fol. 4—5 par. approx. T. et Gr. fl. of N. Am. I, 50.
Aquifolium Lindl. in bot. reg. t. 1425.
pinnata α. Hk. fl. bor. amer. I, 28.
Mahonia Aquifolium β. nutkana DC. prodr. I, 108.
96. 5 *stipulaca* Steud. nom. bot. I, 197. Chili.
- * 97. 5 *nervosa* Pursh fl. Am. sept. I, 219. t. 5. bot. mag. t. 3949. America boreali-occid.
bot. reg. t. 1426.
glumacea Spr. syst. veg. II, 120. Lindl. in bot. reg. t. 1426.
Mahonia nervosa Nutt. gen. of N. Amer. pl. I, 212.
- *glumacea* DC. syst. II, 21. Paxt. mag. of bot. VII,
55. c. ic.
- * 98. 5 *pinnata* Lag. hort. madr. 1803. t. 6. bot. reg. t. 702. America boreali-occid.,
diversifolia Steud. nom. I, 197. ? Uruguay.
fascicularis (nec *fasciculata*) Sims. in bot. mag. t. 2396.
Mahonia diversifolia Sweet br. fl. gard. 2. ser. t. 94.
- *fascicularis* DC. syst. II, 19.
99. 5 *morannensis* Schult. fl. in R. et S. syst. veg. VII, 17. Mexico.
pinnata H. B. et K. nov. gen. ac sp. am. V, 56. t. 434.
100. 5 *trifoliata* Hartw. in bot. reg. XXVII. pl. misc. 149. (ad Mexico.
tab. 52.) Texas, Mexico.
- * 101. 5 *trifoliolata* Moric. pl. nouv. d'Amer. 113. t. 69. Mexico.
ilicifolia Scheele in Linn. XXI, 591. Mexico.
Roemeriana Scheele in Linn. XXII, 352.
102. 5 *Ehrenbergii* Kze. in Linn. XX, 45. Mexico.
(*Escallonia illinita* bot. reg. t. 1900. a Walp. ann. bot. I, 21. ex errore huc relata.)
103. 5 *trifolia* Schult. fl. in R. et S. syst. veg. VII, 1616. Mexico.
Mahonia ilicina Schlecht. in Linn. X, 236.
- *trifolia* Ch. et Schlecht. in Linn. V, 211.
- * 104. 5 *Hartwegi* Benth. pl. Hartw. 34. Mexico.
105. 5 *gracilis* Hartw. in Benth. pl. Hartw. 34. Mexico.
106. 5 *angustifolia* Hartw. in Benth. pl. Hartw. 34. Mexico.
107. 5 *lanceolata* Benth. pl. Hartw. 34. Mexico.
108. 5 *pallida* Hartw. in Benth. pl. Hartw. 34. bot. reg. XXX. t. 11. Mexico.
109. 5 *braxinifolia* Hook. icon. pl. t. 329. et 330. Mexico.
tenuifolia Lindl. bot. reg. XXIV. misc. p. 64. XXX. t. 26.
Mahonia tenuifolia Loud. cat.

II. *Nandina* Thunb.
(Nandin, nom. japon.)

1. 5 *doméstica* Thunb. nov. gen. pl. diss. I, 19. bot. mag. 1109. China, Japonia.

Fam. 8. **Cruciferae.**

Trib. 1. **Siliquosae.**

III. *Matthiola* (nec *Mathiola* hort. kew.) R. Br.

(Matthioli, Sienae natus, archiaterus austriacus † 1577.)

1. *h* *undulata* Tin. hort. panorm. a. 1827. 279. Sicilia.
 * 2. *h* *rupestris* DC. syst. II, 714. Sicilia.
 incana Presl. fl. sic. I, 39.
 Hesperis rupestris Raf. in specch. delle scienc. 46.
 * 3. *h* *glabrata* DC. syst. II, 165. Patria ignota.
 incana & *glabra* R. Br. in Ait. hort. kew. ed. 2. IV, 119.
 Cheiranthus glaber Mill. dict.
 - *glaberrimus* Colla antol. bot. V, 861.
 β) *alba* Sweet hort. brit. 21.
 γ) *coccinea* Sweet hort. brit. 21.
 δ) *flore pleno*.
 * 4. *h* *fenestralis* R. Br. in Ait. hort. kew. ed. 2. IV, 119. Creta.
 Cheiranthus fenestralis L. fl. dec. pl. rar. hort. upsal. 31. t. 16.
 Hesperis fenestralis Lam. enc. méth. III, 324.

IV. *Cheiranthus* L.

(derivatio dubia a χερ, manus, Hand et ἀθος, flos, Blüthe.)

- * 1. *h* *linifolius* Pers. syn. pl. II, 201. Hispania.
 Hesperis linifolia Pourr. in Dsf. tabl. de l'ec. de bot. 129.
 - *semperflórens* β. Poir. enc. méth. suppl. III, 196.
 2. *h* ? *salinus* L. cod. Nro. 4816. Tataria, Sibiria austr.
 Hesperis salina Lam. enc. méth. III, 324.
 3. *h* *ochroleucus* Knowl. et Westec. in fl. cab. III. t. 120. Sibiria.
 Knowlesii Walp. repert. bot. I, 125.

V. *Hesperis* L.

(ἑσπερος, vespera, Abend, quia vesperi optime olet.)

1. *h* *speciosa* Sweet br. fl. gard. 2. ser. II. t. 135. Sibiria.
 Neurolóma speciosum Steud. nom. bot. II, 192.
 Párrya integerrima G. Don dichl. pl. I, 173.

VI. *Brássica* L.

1. *h* *insularis* Mor. fl. sard. I, 168. t. 11. Sardinia.
 crética Mor. stirp. sard. elench. I, 3.
 2. *h* *fruticulosa* Cyr. pl. rar. regni neap. II, 7. t. 1. Terrae maris medi-
 Sinapis radicata Dsf. fl. atl. II, 98. t. 167. terranei.
 3. *h* *crética* Lam. enc. méth. I, 747. S. et Sm. fl. gr. t. 645. Graecia c. ins., Creta.
 4. *h* *nivea* Boiss. et Sprunn. in Boiss. diagn. pl. or. nov. I, 72. Graecia.
 5. *h* *incana* Ten. fl. nap. prodr. 39. fl. nap. t. 165. Italia inferior.
 6. *h* *rupestris* Rafin. caratt. alc. nuov. gen. 77. Sicilia.
 baleárica Presl. fl. sic. I, 91.
 crética Guss. cat. h. r. in Bocc. p. 11.
 β) *longirostris* Guss. fl. sic. prodr. II, 1. 196.
 montana Rafin. specch. delle scienc. 69.
 7. *h* *Gravinae* Ten. fl. neap. prodr. 39. fl. nap. t. 62. Italia.
 8. *h* *villosa* Biv. Bern. stirp. rar. sic. man. IV, 20. Sicilia.
 incana Presl. fl. sic. I, 90.
 9. *h* *macrocarpa* Guss. ind. sem. hort. Bocc. ad. a. 1824. Sicilia et ins. proximae.
 10. *h* *crispa* Raf. specch. delle scienc. 69. Sicilia.
 * 11. *h* *baleárica* Pers. syn. pl. II, 206. Deless. ic. sel. II, 86. Hispania (ins. balear.).
 sempervirens Schrank hort. monac. t. 10.
 12. *h* *hybrida* Ten. in Spr. syst. veg. II, 910. Italia inferior.

VII. *Sinapis* L.

(Σινάπι, nomen veterum.)

1. *h virgata* Presl del. prag. 19. Italia inferior, Sicilia.
sicula L. in Bertol. fl. it. VII, 169.
Erucastrum virgatum Presl fl. sic. I, 94.
2. *h pubescens* L. cod. Nro. 4866. Africa borealis,
Hispania, Italia.
 β) *circinnata* Dsf. fl. atl. II, 96.

VIII. *Arabis* L.

(nomen origine incerta, teste Matthioli minime graeca.)

1. *h saxicola* Edgew. in transact. of the Linn. soc. XX, 33. Himalaya.
2. *h fruticulosa* C. A. Mey. in Led. fl. alt. III, 19. Led. icon. pl. Altai.
 fl. ross. t. 336.

Trib. 2. Latiseptae.

IX. *Farsétia* Turra.

(Farsetti, nobilis Venetianus c. 1770 vixit.)

1. *h aegyptiaca* Turr. diss. Fars. I. t. 1. Aegyptus, Arabia.
Graecia.
cheiranthoides R. Br. in Ait. hort. kew. ed. 2. IV, 96.
Cheiranthus Farsetia L. cod. Nro. 4825.
 - *linearis* Forsk. fl. aeg. arab. 120.
Hesperis Farsetia Poir. enc. méth. suppl. II, 196.
Lunaria scabra Forsk. fl. aeg. arab. 117.
2. *h suffruticosa* DC. syst. II, p. 287. Persia (Kuhistan).
Lunaria suffruticosa Vent. jard. Cels. t. 19.
3. *h lunarioides* R. Br. in hort. kew. ed. 2. IV, 96. bot. mag. Insulae Archipelagi.
 t. 3067.
Alyssum lunarioides W. sp. pl. III, 461.
Fibigia lunarioides S. et Sm. fl. gr. t. 625.
Lunaria graeca W. hort. berol. II, 675.
4. *h eriocarpa* DC. syst. II, 288. Cyprus.
5. *h triquetra* DC. syst. II, 290. Rehb. icon. fl. Germ. et Helv. II, t. 33. Dalmatia.

X. *Vesicaria* Lam.

(Vesica, Blase.)

- * 1. *h utriculata* Lam. illustr. d. genr. t. 559. S. et Sm. fl. gr. t. 607. Europa australis.
Alyssoides utriculosum Mch. meth. 265.
Alyssum Oederi Durand. fl. de Bourg. I, 161.
 - *utriculatum* L. cod. Nro. 4742. bot. mag. t. 130.
Cystocarpium utriculatum Spach vég. phan.
Myagrum utriculatum Berger. phytonom. univ. c. ic.
 β) *denticulata* Gris. spic. fl. Rum. et Bith. I, 270.
2. *h crética* Poir. enc. méth. VIII, 570. Persia (Gilan, Kuhistan).
Alyssoides tomentosum Mch. méth. 264.
Alyssum créticum L. cod. Nro. 4739.
3. *h gnaphalodes* Boiss. in Ann. d. sc. nat. 2. sér. XVII, 2. 161. Persia (Hamadan).
Alyssum gnaphalodes DC. syst. II, 311.
4. *h vestita* Dsv. journ. de bot. III, 171. et 184. Candia.
5. *h paniculata* Dsv. journ. de bot. III, 171. Insulae Archipelagi.
6. *h fruticulosa* Dsv. journ. de bot. III, 171. et 184. Insulae Archipelagi.
crética Poir. enc. méth. VIII, 570. (teste Spreng.)

XI. *Berteroa*.

(Carlo Joseph Bertero, lusitanicus, Americam australem permigravit.)

1. *h orbiculata* DC. syst. II, 293. Italia, Rumelia, Graecia.
 ? *Alyssum incanum* S. et Sm. prodr. fl. gr. II, 13.
Alyssum orbiculatum d'Urv. enum. pl. ins. Archip. 79.
Farsétia orbiculata Spr. syst. veg. II, 870.
 β) *obliqua* DC. syst. II, 292. S. et Sm. fl. gr. t. 623.
Alyssum obliquum S. et Sm. prodr. fl. gr. II, 12.
Farsétia Guentheriana Andr. (teste Steud.)
 - *obliqua* Spreng. syst. veg. II, 870.

XII. *Aurinia* Dsv.

- *1. *h saxatilis* Dsv. journ. de bot. III, 162.
 Adyséton saxatile Sweet hort. brit. 25.
 Alyssum cheirifolium Berger. phytonom. univ.
 - saxatile L. cod. Nro. 4729. bot. mag. t. 159.
 β) petraea Led. fl. ross. I, 136.
 Alyssum petraeum Andr. in DC. syst. II, 302.
- *2. *h gemonensis* C. Koch.
 Adyséton gemonense Sweet hort. brit. 25.
 Alyssum gemonense L. cod. Nro. 4741.
 - incanum Crantz stirp. austr. I, 16.
 - medium Koch syn. p. 63. (an Host. fl. austr. II, 244?)
 - petraeum Ard. anim. bot. spec. II, 30. t. 14. (teste Guss.)
 Vesicaria gemonensis Poir enc. méth. VIII, 571.
- *3. *h orientalis* C. Koch.
 Adyséton orientale Sweet hort. brit. 25.
 Alyssum affine B. lucanum Ten. fl. nap. V, 56. t. 241. f. 2.
 - orientale Ard. anim. bot. spec. II, 32. t. 15. f. 1.
 S. et Sm. fl. gr. t. 623.
 Clypéola tomentosa L. cod. Nro. 4746.
4. *h leucadaea* C. Koch.
 Alyssum leucadaeum Guss. pl. rar. 268. t. 47.

Rossia australi-occid.,
 Pannonia, Dalmatia,
 Germania austr.-orient.

Italia, imp. austriaci
 terrae orientales.

Italia inferior, Creta,
 insulae Archipelagi,
 Bospori littora.

Sicilia et ins. parvae
 finitimae.

XIII. *Alyssum* L.

(ἀλυσσον, apud Graecos Marrubii species.)

- *1. *h Marschallianum* Andr. in DC. syst. II, 308.
 alpestro Bieb. fl. taur. cauc. II, 102.
 Adyséton Marschallianum Sweet hort. brit. 25.
 Odontarrhéna Marschalliana C. A. Mey. Verz. kauk. Pf. 182.
2. *h minutiflorum* Boiss. diagn. pl. or. nov. I, 73.
3. *h petalodes* DC. syst. II, 312.
4. *h flexicaule* Jord. obs. s. plus. esp. nouv. de la Fr. I, 10.
 t. 1. f. E.
5. *h còrsicum* Dub. bot. gall. ed. 2. I, 34.

Krim, Caucasus.

Asia minor.
 Syria.

Gallia (Delphinatus).
 Corsica.

XIV. *Koniga* R. Br.

(Konig, musei britannici custos.)

1. *h tortuosa* C. Koch.
 Ptilótrichum tortuosum Willk. in bot. Zeit. V, 234.
2. *h longicaulis* C. Koch.
 Ptilótrichum longicaule Boiss. voy. d. le mid. de l'Esp. t. 11.
 Alyssum longicaule Boiss. in bibl. univ. gen. fébr. 1838.
3. *h pyrenáica* C. Koch.
 Alyssum halimifolium β. DC. fl. franç. V, 594.
 - pyrenáicum Lapeyr. hist. abr. d. pl. d. Pyren. 371.
 fl. pyren. t. 50.
 Lobularia pyrenáica Steud. nom. bot. II, 64.
4. *h Lapeyrousiana* C. Koch.
 Alyssum Lapeyrousianum Jord. obs. s. plus. esp. nouv.
 de la Fr. I, 3. t. 1. f. A. 1—11.
 - Perusianum Gay in Gr. et G. fl. de Fr. I, 118.
- *5. *h spinosa* Spach vég. phan. VI, 493.
 Alyssum spinosum L. cod. Nro. 4727. Jord. obs. s. plus.
 esp. nouv. de la Fr. I. t. 1. f. 6. D.
 Anodóntea spinosa Sweet hort. brit. 25.
 Draba spinosa Lam. fl. franç. II.
6. *h macrocarpa* C. Koch.
 Alyssum macrocarpum DC. syst. II, 321. Deless. icon.
 sel. II. t. 41.
 Anodóntea macrocarpa Sweet hort. brit. 25.
- *7. *δ halimifolia* Rechb. fl. excurs. 669. icon fl. Germ. II, t. 18.
 Alyssum halimifolium W. sp. pl. III, 460.
 Anodóntea halimifolia Sweet hort. brit. 25.
 Lobularia halimifolia Steud. nomencl. II, 64.
 Lunaria halimifolia All. fl. pedem. I, 245. t. 54. f. 1.

Hispania (Valencia).

Hispania australis.

Pyrenaeus.

Pyrenaeus.

Hispania (Aragonia),
 Gallia australis.

Gallia austr., Cevennae.

Hispania, Italia, Gallia
 austro-orientalis.

8. *h* *Lagascae* Webb it. hispan. 76. Hispania (Granada).
Alyssum dubium Bory in ann. d. sc. pys. III, 4.
 - *purpureum* Lag. in ann. scienc. nat. V, 275.
Lobularia Lagascae Steud. nom. bot. II, 64.
Ptilótrichum purpureum Boiss. elench. pl. hisp. 10.
- * 9. *h* *marítima* R. Br. in Denh. et Clapp. narr. of trav. 214. Europa australis.
Alyssum halimifolium L. cod. Nro. 4728. bot. mag. t. 101.
 - *maritimum* Lam. enc. méth. I, 98.
Clypéola marítima L. cod. Nro. 4747.
Draba marítima Lam. fl. franc. II, 461.
Lepidium fragrans W. in Ust. bot. mag. XI, 37.
Lobularia marítima Dsv. journ. de bot. III, 162.

XV. *Vella* L.

(Mínime, ut Linn. dicit, nomen Galeni, sed origine incerta, teste Loud., gallica.)

1. *h* *Pseudo-Cytisus* L. cod. Nro. 4664. Hispania.
 2. *h* *spinosa* Boiss. elench. pl. nov. hisp. 11. voy. d. le mid. de l'Esp. 117. t. 10. Hispania (Granada).
 3. *h* *áspera* Pers. syn. pl. II, 185. Hispania.
Bólium ásperum Dsv. journ. de bot. III, 163. et 175. t. 6.

Trib. 3. *Angustiseptae*.XVI. *Morióra* Boiss.

(James Morier, itineribus pluribus per Armeniam et Persiam celebr.)

1. *h* *spinosa* Boiss. in ann. d. sc. nat. 2. sér. XVII, 182. Persia orientalis.
 2. *h* *virgata* Boiss. in ann. d. sc. nat. 2. sér. XVII, 183. Persia (Ispahan).

XVII. *Iberidella* Boiss.

(Iberidi similis.)

1. *h* *sagittata* Boiss. in ann. d. sc. nat. XVII, 188. Persia.
 2. *h* *ovalifolia* Boiss. in ann. d. sc. nat. 2. ser. XVII, 189. Armenia.

XVIII. *Iberis* L.(*Ἰβρις*, teste Spr. apud Graccos *Lepidium Iberis* L.)

1. *h* *contracta* Pers. syn. pl. II, 186. Hispania.
 2. *h* *Pruitii* Tin. pl. rar. Sic. I, 11. Sicilia.
bellidifolia Presl delic. Prag. 13. (teste Presl pl. perennis.)
cepeaeifolia Guss. cat. pl. in Boccadif. a. 1821. 32.
Tenoreana Presl fl. sic. I, 64.
- * 3. *h* *Tenoreana* DC. syst. II, 404. Sweet br. fl. gard. t. 88. Italia.
cepeaeifolia Ten. napl. I. in prodr. p. XXXVII.
Tenorii Spr. syst. veget. II, 864.
- * 4. *h* *Garrexiana* All. fl. pedem. I, 250. t. 40. f. 3. Italia, Gallia australis,
sempervirens All. fl. pedem. I, 250. (teste Bertol.) Pyrenæi.
sempervirens β . W. sp. pl. III, 453.
5. *h* *integerrima* Moris stirp. sard. elench. I, 4. fl. sard. I, 119. t. 8. Sardinia.
 * 6. *h* *saxatilis* L. cod. Nro. 4718. Gouan fl. monsp. t. 3. Europa austro-occid.,
Garrexiana Scop. del. fl. et faun. insubr. I, 16. t. 7. Helvetia, Italia.
 β *corifolia* Sims. bot. mag. t. 1642.
 γ *vermiculata* Willd. sp. pl. III, 454.
- * 7. *h* *sempervlórens* L. cod. Nro. 4715. Sicilia.
cuneata Moench meth. 269.
flórida Salisb. prodr. stirp. hort. Allert. 267.
Thlaspidium sempervlórens Andr. (teste Steud.)
 β *humilis* Presl delic. Prag. 12.
8. *h* *conferta* Lag. varied. II. Nro. 22. 1805. p. 213. Hispania.
 9. *h* *subvelútina* DC. syst. II, 397. Hispania.
sempervirens Lag. hort. madrit. 19.
10. *h* *pubescens* W. hort. berol. suppl. 43. Patria ignota.
 * 11. *h* *sempervirens* L. cod. Nro. 4716. Sicilia, Creta.
 12. *h* *Gibraltárica* L. cod. Nro. 4717. bot. mag. t. 124. Hispania (Gibraltar).
dentata Moench meth. suppl. 88.
13. *h* *cappadóica* W. sp. pl. III, 452. Asia min. (Cappadocia).
 14. *h* *brachystýla* Fenzl pug. pl. nov. syr. 14. Asia minor (Taurus).

XII. *Lepidium* L.(λεπιδιον, apud Graecos teste Spr. *Lepidium latifolium* L.)

1. *h* *lineare* DC. in dict. enc. V, 48. Hispania.
2. *h* *suffruticosum* L. cod. Nro. 4690. Hispania.
3. *h* *subulatum* L. cod. Nro. 4698. Asso syn. stirp. Arag. 83. t. 6. f. 3. Hispania.
- Thlaspi subulatum* Cav. descr. de las plant. Nro. 935.

XI. *Aethionema* R. Br.

(αἰθιον, splendens, glänzen et νημα, filum, Faden.)

1. *h* *polygaloides* DC. syst. II, 562. Colechis, ins. Archipel.
2. *h* *stylosum* DC. syst. II, 562. Syria (Libanon).
3. *h* *membranaceum* DC. syst. II, 561. Persia (Kuhistan).
- Lepia membranacea* Dsv. journ. de bot. II, 561.
- * 4. *h* *coridifolium* DC. syst. II, 561. Deless. ic. sel. II, t. 76. Syria (Libanon).

INDEX.

- Adyseton gemonense* Sweet XII, 2.
Marschallianum Sw. XIII, 1.
orientale Sw. XII, 3.
saxatile Sweet XII, 1.
- Aethionema* R. Br. XX.
coridifolium DC. 4.
membranaceum DC. 3.
polygaloides DC. 1.
stylosum DC. 2.
- Alyssoides tomentosum* Munch X, 2.
utriculosum Munch X, 1.
- Alyssum* L. XIII.
affine B. Ten. XII, 3.
alpestre Bieb. 1.
cheirifolium Berg. XII, 1.
corsicum Dub. 5.
creticum L. X, 2.
dubium Bory XIV, 8.
flexicaule Jord. 4.
gemonense L. XII, 2.
gnaphalodes DC. X, 3.
halimifolium L. XIV, 9.
 - Willd. XIV, 7.
 - β . DC. XIV, 3.
incanum Crantz XII, 2.
 - S. et Sm. XI, 1.
Lapeyrousianum Jord. XIV, 4.
leucadaeum Guss. XII, 4.
longicaule Boiss. XIV, 2.
lunarioides W. IX, 3.
macrocarpum DC. XIV, 6.
maritimum Lam. XIV, 9.
Marschallianum Andr. 1.
medium Koch XII, 2.
minutiflorum Boiss. 2.
obliquum S. et Sm. XI, 1. β .
Oederi Durand. X, 1.
orbiculatum d'Urv. XI, 1.
orientale Ard. XII, 3.
- Alyssum paniculatum* Dsf. X, 5.
Perusianum Gay XIV, 4.
petalodes DC. 3.
petraeum Andr. XII, 1.
 - Ard. XII, 2.
purpureum Lag. XIV, 8.
pyrenaicum Lapeyr. XIV, 3.
saxatile L. XII, 1.
spinosa L. XIV, 5.
utriculatum L. X, 1.
- Anodonteia halimifolia* Sweet XIV, 7.
macrocarpa Sweet XIV, 6.
spinosa Sweet XIV, 5.
- Arabis* L. VIII.
fruticulosa C. A. Mey. 2.
saxicola Edgew. 1.
- Aurinia* Dsv. XII.
gemonensis C. Koch 2.
leucadaea C. Koch 4.
orientalis C. Koch 3.
saxatilis Dsv. 1.
- Berberis* L. I.
acida Gilib. 1.
actinacantha Mart. 82.
aetnensis Presl 1. α .
affinis G. Don 20.
africana Hebenstr. 29.
altaica Pall. 71.
angulosa Wall. 22.
angustifolia Rxb. 20. 28.
 - Hartw. 106.
Aquifolium L. 95.
arborescens Hort. 1. γ .
aristata DC. 20.
articulata Lois. 3.
asiatica Rxb. 24.
asperma Mill. 1. δ .
atrovirens Don 72.
aurahuacensis Lehm. 42.

Berberis aurea Tausch 1. ♂.
brachybotrya Gay 66.
brachybotrys Edgew. 26.
buxifolia Lam. 88.
canadensis Bigel. 35.
 - Lk. 37.
 - Pursh 33.
caraganaefolia DC. 19.
caroliniana Loud. 34.
cerasina Schrd. 17.
ceratophylla Don 23.
chilensis Gill. 59.
chinensis Desf. 20. ♂.
Chitria Don 20.
ciliaris Lindl. 43.
conferta Humb. 79.
congestiflora Gay 67.
coriacea St. Hil. 48.
coriaria Royle 25.
crataegina DC. 4.
corymbosa Hook. et Arn. 60.
crenulata Schrd. 35.
cretica Falk 71.
 - L. 3.
 - Thunb. 18.
 - Viv. 1. x.
 - Willem. 1.
crispa Gay 84.
cuneata Banks 74.
da(h)urica Lodd. 9.
dealbata Lindl. 38.
Darwinii Hook. 68.
declinata Schrd. 14.
diffusa Gay 65.
diversifolia Steud. 98.
dulcis Hort. 1. x.
 - Sweet 88.
Ehrenbergii Kze 102.
emarginata Horn. 17.
 - W. 11.
empetrifolia Lam. 89.
fascicularis Sims 98.
fasciculata Sims 98.
Fendleri Asa Gr. 39.
ferox Gay 64.
flexuosa R. et P. 54.
floribunda Wall. 28.
Fortunei Lindl. 94.
fraxinifolia Hook. 109.
Gayi C. Koch 66.
glauca Humb. 40.
 - Benth. 42.
glaucescens St. Hil. 47.
globosa Benth. 41.
glomerata Hook. 61.
glumacea Spr. 97.
gracilis Hartw. 105.
 - Hort. 22.
Grevilleana Gill. 81.
Haenkeana Presl 76.
Hartwegi Benth. 104.
heterophylla Juss. 87.
heteropoda Schrenk 9.
hispanica Boiss. et Reut. 7.
horrida Gay 83.
hypoleuca Lindl. 30.

Berberis Jamesonii Veitch 57.
japonica Spr. 92.
iberica Stev. 2.
ilicifolia Booth 4.
 - Forst. 69.
 - Hort. 87.
 - Rxb. 24.
 - Scheele 101.
ininita bot. mag. 102.
inermis Pers. 88. β.
innominata Kielm. 1. ♂.
integerrima Bge 12.
irritabilis Salisb. 1.
Knightii Hort. 90.
kunawurensis Royle 27.
lagenaria Poir. 69.
lanceolata Benth. 107.
latifolia R. et P. 53.
laurina Billb. 49.
laxiflora Schrd. 31.
lanceolata Benth. 107.
Leschenaultii Wall. 93.
loxensis Benth. 44.
lucida Schrd. 2.
lutea R. et P. 78.
 - β. DC. 79.
Lycium Royle 28.
macracantha Schrd. 32.
macroacantha Guss. 1. x.
macrocarpa Schrd. 15.
macrophylla Hort. 72.
marginata Gay 85.
melanocarpa S. Schauer 36.
Miccia Ham. 91.
microphylla Forst. 88. γ.
mitis Schrd. 8.
monosperma R. et P. 52.
montana Gay 86.
morannensis Schult. fil. 99.
multiflora Benth. 45.
nepalensis Wall. 91.
 - Lodd. 20. β.
nervosa Pursh 97.
nitens Schrd. 5.
nummularia Bge 13.
obovata Schrd. 6.
pallida Hartw. 108.
paniculata Juss. 55.
parviflora Lindl. 58.
petiolaris Wall. 21.
pinnata Hook. 95. β. et γ.
 - H. B. K. 99.
 - Lag. 98.
 - Muehlenb. 95. α.
 - Rxb. 93.
provincialis Audub. 3.
quinduensis Humb. 51.
recta Hort. 89. β.
repens Lindl. 95. α.
reticulata Steud. 77.
rigidifolia Humb. 50.
Roemeriana Scheele 101.
rotundifolia Hort. 88.
 - Poepp. et Endl. 63.
ruscifolia Lam. 70.
sanguinolenta Schrd. 16.

Berberis sibirica Pall. 71.
 - Hort. 1. 8.
 sicula Jan. 1. 2.
 sinensis Dsf. 20. 3.
 spathulata Schrd. 37.
 sphaerocarpa Kar. et Kir. 9.
 spinulosa St. Hil. 48.
 stipulacea Steud. 96.
 tenuifolia Lindl. 109.
 Thunbergii DC. 18.
 tinctoria Leschen. 24. 2.
 tomentosa R. et P. 75.
 tragacanthoides DC. 2.
 trifolia Schult. fl. 103.
 trifoliata Hartw. 100.
 trifoliolata Moric. 101.
 trigona Kze. 62.
 turcomannica Kar. 10.
 umbellata Wall. 22.
 undulata Lindl. 56.
 virgata R. et P. 80.
 vulgaris Arrab. 47.
 - L. 1.
 - Walt. 33.
 - 2. australis Boiss. 7.
 - 2. canadensis W. 33.
 Wallichiana DC. 72.
 xanthoxylon Hassk. 73.
Berberoa DC. XI.
 obliqua DC. 1. 2.
 orbiculata DC. 1.
Bolium asperum Dsv. XV, 3.
Brassica L. VI.
 balearica Pers. 11.
 - Presl 6.
 cretica Lam. 3.
 - Guss. 6.
 - Moris. 1.
 crispa Raf. 10.
 fruticulosa Cyr. 2.
 Gravinæ Ten. 7.
 hybrida Ten. 12.
 incana Ten. 5.
 - Presl 8.
 insularis Mor. 1.
 longirostris Guss. 6. 2.
 macrocarpa Guss. 9.
 montana Raf. 6. 2.
 nivea Boiss. et Spr. 4.
 rupestris Raf. 6.
 sempervirens Schrank 11.
 villosa Biv. 8.
Cheiranthus L. IV.
 Farsetia L. IX, 1.
 fenestralis L. III, 4.
 glaber Mill. III, 3.
 glaberrimus Colla III, 3.
 Knowlesii Walp. 3.
 linearis Forsk. IX, 1.
 limifolius Pers. 1.
 ochroleucus Knowl. et Westc. 3.
 salinus L. 2.
Clypeola maritima L. XIV, 9.
 - tomentosa L. XII, 3.
Cystocarpium utriculatum Spach X, 1.
Draba spinosa Lam. XIV, 5.

Draba maritima Lam. XIV, 9.
Erucastrum virgatum Presl VII, 1.
Farsetia Turra IX.
 aegyptiaca Turr. 1.
 cheiranthoides R. Br. 1.
 eridcarpa DC. 4.
 Guentheriana Andr. XI, 1. 2.
 lunarioides R. Br. 3.
 obliqua Spr. XI, 1. 2.
 orbiculata Spr. XI, 1.
 suffruticosa DC. 2.
 triquetra DC. 5.
Fibigia lunarioides S. et Sm. IX, 3.
Hesperis L. V.
 aegyptiaca Lam. IX, 1.
 fenestralis Lam. III, 4.
 linifolia Dsf. IV, 1.
 rupestris Raf. III, 2.
 salina Lam. IV, 2.
 semperflorens 2. Poir. IV, 1.
 speciosa Sweet 1.
Iberidella Boiss. XVII.
 ovalifolia Boiss. 2.
 sagittata Boiss. 1.
Iberis L. XVIII.
 bellidifolia Presl 2.
 brachystyla Fenzl 14.
 cappadocica W. 13.
 cepeaeifolia Guss. 2.
 - Ten 3.
 conferta Lag. 8.
 contracta Pers. 1.
 corifolia Sims 6. 2.
 cuneata Mneh 7.
 dentata Mneh 12.
 florida Salisb. 7.
 Garrexiana All. 4.
 - Scop. 6.
 Gibraltaria L. 12.
 humilis Presl 7. 2.
 integerrima Moris 5.
 pilosa Dsv. 3.
 Pruitii Tin. 2.
 pubescens W. 10.
 saxatilis L. 6.
 semperflorens L. 7.
 sempervirens All. 4.
 - L. 11.
 - Lag. 9.
 - 2. W. 4.
 subvelutina DC. 9.
 Tenoreana Presl 2.
 - DC. 3.
 Tenorii Spr. 3.
 vermiculata W. 6. 2.
Ilex japonica Thunb. 1, 92.
Koniga R. Br. XIV.
 halimifolia Rehb. 7.
 Lagascae Webb 8.
 longicaulis C. Koch 2.
 macrocarpa C. Koch 6.
 Lapeyrousiana C. Koch 4.
 maritima R. Br. 9.
 pyrenaica C. Koch 3.
 spinosa Spach 5.
 tortuosa C. Koch 1.

Lepia membranacea Dsv. XX, 3.
Lepidium L. XIX.
 fragrans W. XIV, 9.
 graminifolium Cav. 2.
 lineare DC. 1.
 subulatum L. 3.
 suffruticosum L. 2.
Lobularia halimifolia Steud. XIV, 7.
 Lagascae Steud. XIV, 8.
 maritima Dsv. XIV, 9.
 pyrenaica Steud. XIV, 3.
Lunaria graeca Willd. IX, 3.
 halimifolia All. XIV, 7.
 scabra Forsk. IX, 1.
 suffruticosa Vent. IX, 2.
Mahonia acanthifolia G. Don I, 93.
 Aquifolium Nutt. I, 95. α .
 caraganaefolia Loud. I, 19.
 diversifolia Sweet I, 98.
 fascicularis DC. I, 98.
 glumacea DC. I, 97.
 japonica DC. I, 92.
 ilicina Schlecht. I, 103.
 napaulensis DC. I, 91.
 - β . *Roxburghii* DC. I, 93.
 nervosa Nutt. I, 97.
 repens G. Don I, 95. α .
 tenuifolia Loud. I, 109.
 tragacanthoides Loud. I, 2.
 trifolia Ch. et Schlecht. I, 103.
Matthiola R. Br. III.
 fenestralis R. Br. 4.
 glabrata DC. 3.
 incana Presl 2.
 - ϵ . *glabra* R. Br. 3.

Matthiola rupestris DC. 2.
 undulata Tin. 1.
Moriera Boiss. XVI.
 spinosa Boiss. 1.
 virgata Boiss. 2.
Myagrum utriculatum Berg. X, 1.
Nandina Thunb. II.
 domestica Thunb. 1.
Neuroloma speciosum Steud. V, 1.
Odontarrhena Marshalliana C. A. Mey. XIII, 1.
Parrya integerrima G. Don V, 1.
Ptilotrichum longicaule Boiss. XIV, 2.
 purpureum Boiss. XIV, 8.
 tortuosum Willk. XIV, 1.
Sinapis L. VII.
 circinnata Dsf. 2. β .
 pubescens L. 2.
 radicata Dsf. VI, 2.
 sicula Bert. 1.
 virgata Presl 1.
Thlaspi carneum Russ. XX, 2.
 subulatum Cav. XIX, 3.
Thlaspidium semperflorens Andr. XVIII, 7.
Vella L. XV.
 aspera Pers. 3.
 Pseudo-Cytisus L. 1.
 spinosa Boiss. 2.
Vesicaria Lam. X.
 cretica Poir. 2. et 6.
 fruticulosa Desv. 6.
 gemonensis Poir. XII, 2.
 gnaphalodes Boiss. 3.
 paniculata Desv. 5.
 utriculata Lam. 1.
 vestita Desv. 4.

ORDO III.

Toechospermae.

Fam. 9. Violaceae.

I. *Noisettia* H. B. et K.
(Noisette, hortulanus parisiensis.)

1. 5 *acuminata* DC. prodr. I, 290.

America borealis.

II. *Viola* L.
(lov, Veilchen.)

1. \bar{n} *arborescens* L. cod. Nro. 6784. Barr. icon. 566.
 β) *integrifolia* DC. prodr. I, 299.
 γ) *latifolia* DC. prodr. I, 299.
 δ) *linearifolia* DC. prodr. I, 299.
 ϵ) *serratifolia* DC. prodr. I, 299.

Graecia, Corsica,
Hispania,
Africa boreali-occid.

III. *Jopidium* Vent.
(lov, Viola, Veilchen et $\acute{\alpha}\iota\delta\omicron\varsigma$, figura, Gestalt.)

1. \bar{n} *heterophyllum* Vent. jard. de la Malm. 27. in adn.
Solea heterophylla Spreng. syst. veg. I, 804.
Viola heterophylla Poir. enc. méth. VIII, 646.
 β) *malabaricum* DC. prodr. I, 309.
 γ) *zeylanicum* DC. prodr. I, 309.

China, India orientalis,
Ceylon.

Fam. 10. Cistineae.

IV. *Cistus* L.

(κιστός aut κισθός apud Graecos Cisti species signif.)

A. *Eucistus* (Sepala 5 persistentia; Flores arrecti.)

- * 1. 5 *purpureus* Lam. enc. méth. bot. II, 14. bot. mag. 408. Sw.
 Cist. t. 17. bot. reg. t. 408.
 * 2. 5 *heterophyllus* Dsf. fl. atl. I, 411. t. 104. Sw. Cist. t. 6.
vulgaris ζ . *heterophyllus* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 368.
 * 3. 5 *creticus* L. cod. Nro. 3893. S. et Sm. fl. gr. t. 495. Sw. Cist. t. 112.
Dunalianus Sweet. (teste Steud.)
Garganicus Ten. fl. nap. IV, 311. t. 235. f. 2.
undulatus Dun. in DC. prodr. I, 264. Sw. Cist. t. 63.
vulgaris β . *creticus* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 368.
 β) *crispatus* DC. prodr. I, 264.
 γ) *tauricus* DC. prodr. I, 264.

Oriens.
Algeria.

Europa australis,
Oriens, Krim.

- * 4. 5 *incanus* L. cod. Nro. 3892. Sweet. Cist. t. 44.
Cupanianus Presl fl. sic. I, 117.
ericephalus (nec *eriosepalus* Steud.) Viv. fl. cors. sp.
 nov. diagn. I, 8.
villosus Sav. botan. etrusc. II, 125. DC. prodr. I, 264.
vulgaris γ . *incanus* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 195.
 β) *canescens* Sweet Cist. t. 45.

Hispania, Italia, Turcia.

- γ) corsicus Gr. et G. fl. de Fr. I, 162.
 Garganicus Ten. syll. pl. fl. neap. 256. (teste Gr. et G.)
 δ) oblongifolius Guss. suppl. fl. sic. 174.
 ε) peduncularis Presl fl. sic. I, 117.
 ζ) villosus L. cod. Nro. 3686. Sweet Cist. t. 35.
 rotundifolius Sw. Cist. t. 75.
 villosus β. virescens DC. prodr. I, 264.
 * 5. 5 crispus L. cod. Nro. 3895. Sw. Cist. t. 22. Terrae maris medi-
 terranei.
 Gallia australis.
 Terrae maris medi-
 terranei.
 6. 5 Pouzolzii Del. in Gr. et G. fl. de Fr. I, 165.
 * 7. 5 albidus L. cod. Nro. 3894. Sw. Cist. t. 31.
 tomentosus Lam. enc. méth. II,
 vulgaris δ. albidus Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 195.
 8. 5 albido-crispus Del. in Gr. et G. fl. de Fr. I, 162. Gallia australis.
 * 9. 5 complicatus Lam. enc. méth. bot. II, 14. Europa austr., Oriens.
 creticus Sweet Cist. t. 112.
 β) cymosus Dun. in DC. prodr. I, 265. Sw. Cist. t. 90.
 incanus S. et Sm. fl. gr. t. 494. (teste Sw. et Sp.)
 γ) parviflorus Lam. enc. méth. II, 14. Sw. Cist. t. 14.
 Sibth. et Sm. fl. gr. t. 496.
 lilacinus Hoffm. Verz. d. Pfl. Kult. 99.
 10. 5 sericeus Vahl symb. I, 37. Barrel. ic. 1315. Hispania.
 * 11. 5 hybridus Vahl symb. bot. I, 37.
 12. 5 roseus Tausch in Flora VII, 84. XIII, 561. Patria ignota.
 13. 5 viscosissimus Tausch in Flora XIX, 418. Patria ignota.
- B. Rhodocistus (Sepala 5 demum decidua; Flores rubri nutantes).**
 14. 5 vaginatus Ait. hort. kew. ed. 2. III, 304. Sw. Cist. t. 9. Insulae canarienses.
 bot. reg. t. 225.
 symphytifolius Lam. enc. méth. II, 15.
 Rhodocistus Bertholetianus Spach in ann. d. sc. nat. 2.
 sér. VI, 367.
 β) leucophyllus Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 367.
 candidissimus Dun. in DC. prodr. I, 264. Sw. Cist. t. 3.
- C. Ledonia (Sepala 5; Flores albi aut flavescentes).**
 * 15. 5 salvifolius L. cod. Nr. 3891. Sw. Cist. t. 54. T. et Sm. fl. Terrae maris medit.
 gr. t. 497.
 obtusifolius Sweet Cist. t. 42. hort. brit. 468.
 Sideritis Presl fl. sic. I, 116.
 Ledonia peduncularis Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 369.
 β) calycinus Ten. syll. pl. fl. neap. 665.
 γ) ochroleucus DC. prodr. I, 265.
 16. 5 Corbariensis Pourr. in DC. prodr. I, 265. Sw. Cist. t. 8. Gallia narbonn.
 hybridus Pourr. extr. de la chlor. narb. 36.
 17. 5 populifolius L. cod. Nro. 3887. Sw. Cist. t. 23. Marocco, Gallia austr.,
 Cistus cordifolius Mnch. meth. 245. peninsula pyrenaica.
 - Cupanianus Sw. Cist. t. 70. (teste Spach.)
 Ledonia populifolia α. cordifolia Spach in ann. d. sc.
 nat. 2. sér. VI, 369.
 β) latifolius Sw. hort. brit. 34. Cist. t. 15.
 18. 5 acutifolius Sw. Cist. t. 78. Patria ignota (? Sicilia).
 Cupanianus Presl fl. sic. I, 117. (teste Loud.)
 salvifolius β. humifusus DC. prodr. I, 265.
 * 19. 5 laxus Ait. hort. kew. ed. 2. III, 305. Sw. Cist. t. 12. Peninsula pyrenaica.
 ? capensis L. cod. Nro. 3885.
 Ledonia populifolia β. longifolia Spach in ann. d. sc.
 nat. 2. sér. VI, 369.
 * 20. 5 longifolius Lam. enc. méth. II, 16. Pyrenaei.
 nigricans Pourr. act. Toul. III, 311.
 oblongifolius Sw. Cist. t. 67.
 Ledonia heterophylla Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 369.
 β) asperifolius Sw. Cist. t. 87.
 γ) grandiflorus Tausch in Flora XIX, 413.
 δ) obtusifolius Sw. hort. brit. 468. Cist. t. 42. (teste Spach.)

- * 21. 5 *hirsutus* Lam. enc. méth. II, 17. Sw. Cist. t. 19. Hispania, Creta,
Gallia boreali-occid.
Ledonia hirsuta Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 369.
 β) *platysepalus* Sw. hort. brit. 468. Cist. t. 47.
 γ) *psilosepalus* Sw. Cist. hort. brit. 468. Cist. t. 33.
22. 5 *Ledon* Lam. enc. méth. II, 17. Gr. et G. fl. de Fr. I, 166. Gallia.
undulatus Lk. enum. pl. hort. berol. II, 74.
Heliánthemum Ledum Zeyh. (teste Steud.)
- D. *Ladanium* (Sepala 3; Flores maximi, albi).
- * 23. 5 *laurifolius* L. cod. Nro. 3888. Sw. Cist. t. 52. Peninsula pyren., Gallia
australis, Asia minor,
Sicilia.
 ? *Cistus Ledon* Lam. enc. méth. bot. II, p. 17. (teste Spach.)
Ladanium laurifolium Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér.
 VI, 2. 367.
- β) *floribundus* Tausch in Flora XIX, 417.
- * 24. 5 *cyprius* Lam. enc. méth. bot. II, 16. Sw. Cist. t. 39. Cyprus.
ladaniferus Sims bot. mag. t. 112.
laurifolius β. *cyprius* Pers. syn. pl. II, 74.
 ? *stenophyllus* Lk. enum. pl. hort. berol. II, 74.
Ladanium cyprium Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 2. 367.
- * 25. 5 *ladaniferus* L. cod. Nro. 3889. Sw. Cist. t. 84. Terrae maris medit.
occidentales.
Ladanium officinarum Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér.
 VI, 367.
- β) *Ladanosma Hoffmagg* Verz. d. Pfl. Kult. 2. u. 3. Nachtr. 90.
 γ) *maculatus* DC. prodr. I, 266. Sw. Cist. t. 1.
ladaniferus β. *foliis planis* Ait. hort. kew. ed. 2. III, 305.

V. *Stephanocarpus* Spach.

(στεφανος, corona, Kranz et καρπος, fructus, Frucht.)

- * I. *h* *monspeliensis* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 2. 369. Terrae maris medit.,
ins. canarienses.
Cistus monspeliensis L. cod. Nro. 3890. S. et Sm. fl. gr.
 t. 493. Sw. Cist. t. 27.
 - *oleaeifolius* Mill. (teste Steud.)
 β) *affinis* Bert. in Guss. prodr. fl. sic. II, 12.
 γ) *Florentinus* Lam. enc. méth. II, 17. ? Sw. Cist. t. 59.

VI. *Halimium* Spach.

(άλιμα, plantae marinae, Salzpflanzen.)

A. Petala alba; Folia linearia.

1. *h* *Clusii* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 2. 365. Terrae maris medit.
occidentales.
Cistus Clusii Dun. in DC. prodr. I, 266. Sw. Cist. t. 32.
 - *Libanotis* Desf. fl. atl. I, 412.
 - *Libanotis* β. Lam. enc. méth. II, 18.
 ? - *stenophyllus* Lk. enum. fil. hort. berol. II, 74.
Heliánthemum Clusii Dun. pet. bouq. médit. t. 3.
 β) *fastigiatum* Guss. fl. sic. prodr. II, 13. (sub Cisto.)
Heliánthemum umbellatum Presl. fl. sic. I, 118.
2. *h* *sericeum* C. Koch. Algeria.
Cistus sericeus Mumby. fl. de l'Alg. 53.
3. *h* *rosmarinifolium* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 366. Marocco,
Penins. pyrenaica austr.
Cistus Libanotis L. cod. Nro. 3897.
Heliánthemum Libanotis W. hort. ber. I, 570.
 - *rosmarinifolium* Lag. in DC. prodr. I, 267.
4. *h* *umbellatum* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 366. Peninsula pyrenaica,
Gallia.
Cistus umbellatus L. cod. Nro. 3898.
 - *anthurus* Hort.
Heliánthemum umbellatum Mill. diot. Sw. Cist. t. 5.
 β) *erectus* DC. prodr. I, 267.
Cistus verticillatus Brot. fl. lusit. II, 262.
5. *h* *calycinum* C. Koch.
Cistus calycinus L. cod. Nro. 3900.
Heliánthemum calycinum Dun. pet. bouq. medit. t. 2.

B. Petala citrina, basi maculâ atropurpureâ notata.

6. *h* *heterophyllum* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 366. Peninsula pyrenaica.
Cistus ocymoides Lam. enc. méth. bot. II, 18.

- Cistus sampsucifolius* Cav. icon. et descr. pl. I, 65. t. 96.
Helianthemum heterophyllum Steud. nom. bot. ed. 2. I, 734.
 - *ocymoides* Pers. syn. pl. II, 76. Sw. Cist. t. 13.
 β) *algarvense* DC. prodr. I, 286. Sw. Cist. t. 40. (sub *Helianthemo*.)
 Cistus algarvensis bot. mag. 627.
 γ) *microphyllum* Sw. Cist. t. 96. (sub *Helianthemo*.)
 δ) *rugosum* Sweet Cist. t. 65. (sub *Helianthemo*.)
 Helianthemum candidum Sweet Cist. t. 25.
7. ♀ *atriplicifolium* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 2. 366.
 Barr. icon. t. 292. Hispania.
 Cistus atriplicifolius Lam. enc. méth. bot. II, 19.
 Helianthemum atriplicifolium Pers. syn. pl. II, 76.
8. ♀ *lepidotum* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 2. 366. Peninsula pyrenaica,
Italia, Africa borealis.
 Cistus halimifolius L. cod. Nro. 3996.
 Helianthemum halimifolium Pers. syn. pl. II, 75.
 β) *elongatum* Pers. syn. pl. II, 76.
 Cistus elongatus Vahl symb. bot. I, 38.
 γ) *multiflorum* Salzm. in Dun. pet. bouqu. medit. t. 1.
 (sub *Helianthemo*.)
 δ) *obtusifolium* Pers. syn. pl. II, 75.
9. ♀ *alyssoides* C. Koch. Peninsula pyrenaica,
Gallia.
 lasianthum α. Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 366.
 Cistus alyssoides Lam. enc. méth. bot. II, 20.
 Helianthemum alyssoides Vent. choix d. pl. du jard.
 Cels. t. 20.
 β) *rugosum* Dun. in DC. prodr. I, 268. (sub *Helianthemo*.)
 γ) *scabrosum* Pers. syn. pl. II, 76. (sub *Helianthemo*.)
 Sw. Cist. t. 81.
 Cistus scabrosus Ait. hort. kew. ed. 1. II, 36.
10. ♀ *formosum* C. Koch. Lusitania.
 lasianthum β. Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 2. 366.
 Cistus formosus Curt. bot. mag. t. 264.
 Helianthemum formosum Dun. in DC. prodr. I, 268. Sw.
 Cist. t. 50.
11. ♀ *cheiranthoides* C. Koch. Peninsula pyrenaica.
 lasianthum γ. Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 2. 366.
 Cistus cheiranthoides Lam. enc. méth. II, 19.
 Helianthemum cheiranthoides Pers. syn. pl. II, 76. Sw.
 Cist. t. 107.
 β) *involveratum* Pers. syn. pl. II, 76. (sub *Helianthemo*.)
 Cistus involeratus Lam. enc. méth. II, 20.
 γ) *lasianthum* Pers. syn. pl. II, 76. (sub *Helianthemo*.)
 Cistus lasianthus Lam. enc. méth. II, 19. Barr. icon. t. 289.
12. ♀ *ternifolium* C. Koch. Hispania (Galicia).
 Helianthemum ternifolium Colm. et Willk. in bot. Zeit. V, 236.
13. ♀ *syriacum* C. Koch. Syria (Libanon).
 Helianthemum syriacum Boiss. pl. orient. nov. diagn. VIII, 49.
14. ♀ *pomeridianum* C. Koch. Algeria.
 Helianthemum pomeridianum Dun. pet. bouq. medit. t. 4.
15. ♀ ? *coriaceum* C. Koch. Madagascar.
 Helianthemum coriaceum Pers. syn. pl. II, 76.
 β) *lanceolatum* Pers. syn. pl. II, 76.

VII. *Helianthemum* Pers.

(ἡλιος, sol, Sonne et ἀθος, flos, Blüthe.)

- A. Fumana (Fol. omnia aut saltem supr. alterna; Caps. 6—12 sperma, puberula).
1. ♀ *arabicum* Pers. syn. pl. II, 80. Sw. Cist. t. 97. Terrae maris medit.
 ibericum Dsf. cat. pl. hort. paris.
 Cistus arabicus L. cod. Nro. 3927. S. et Sm. fl. gr. t. 503.
 - *ericoides* Jan elench. pl. 8.
 - *ferrugineus* Lam. enc. méth. bot. II, 25.
 Fumana arabica Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 2. 359.
 β) *glutinosa* Ten. syll. fl. neap. 258.
 Lippii Ten. prodr. fl. neap. 30. (nec Pers.)
 Savii Bert. amoen. ital. 78.

- Cistus Savii* Bert. rar. ital. pl. dec. II, 36.
2. *h* *laevipes* Pers. syn. pl. II, 76. Sw. Cist. t. 24.
Cistus laevipes L. cod. Nro. 3899. bot. mag. t. 1782.
Fumana laevipes Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 2. 359.
3. *h* *procumbens* Dun. in DC. prodr. I, 275. Sw. Cist. t. 68.
Fumana γ. *procumbens* Camb. in mém. du Mus. XIV, 215.
Cistus Fumana Bieb. fl. taur. cauc. II, 7.
Fumana procumbens Gr. et G. fl. de Fr. I, 175.
 β) *gracile* Ten. syll. pl. neap. app. IV, 20.
- * 4. *h* *Fumana* Mill. dict. Nro. 6. Sw. Cist. t. 16.
Cistus Fumana L. cod. Nro. 3901. Jacq. fl. austr. t. 252.
Fumana vulgaris α. *minor* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 2. 359.
 β) *virgatum* DC. prodr. I, 275.
fumanoides Desf. hort. Paris.
5. *h* *Spachii* C. Koch. Barr. ic. pl. rar. 246. 446.
Fumana β. *minor* DC. prodr. I, 275.
Cistus Fumana Dsf. fl. atl. t. 105.
Fumana Spachii Gr. et G. fl. de Fr. 175.
- * 6. *h* *ericoides* Dun. in DC. prodr. I, 274.
Fumana β. *ericoides* Camb. in mém. du Mus. XIV, 215.
Cistus ericoides Cav. icon. et descr. pl. II, 56. t. 172.
 - *Fumana* A. Desf. fl. atl. I, 414. t. 105.
 - *nudifolius* Lam. (teste Steud.)
Fumana vulgaris β. *major* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 2. 359.
 β) *calycinum* Pers. syn. pl. II, 76.
Fumana Presl fl. sic. I, 124.
Cistus calycinus W. sp. pl. II, 1190. (teste Presl.)
 γ) *pubescens* Ten. syll. fl. neap. 257.
7. *h* *laevis* Pers. syn. pl. II, 78. Rehb. icon. fl. Germ. III, t. 29. f. 4541.
Cistus laevis Cav. ic. et descr. II, 35. t. 145. f. 1.
Fumana viscida β. *longifolia* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 2. 359.
8. *h* *glutinosus* Pers. syn. pl. II, 79. Benth. catal. pl. Pyren. 85. Sw. Cist. t. 83.
Fumana viscida α. *thymifolia* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 2. 359.
Cistus glutinosus L. cod. Nro. 3919.
 β) *juniperinum* (nec *juniperifolium* Gr. et G.) Lag. in DC. prodr. I, 275. Barr. ic. 443.
 ? *Cistus laevipes* Dur. in Gouan fl. monsp. 263.
 γ) *thymifolium* Pers. syn. pl. II, 79. Sw. Cist. t. 102.
Barrelieri Ten. prodr. fl. neap. 31. fl. napol. t. 145. bot. mag. t. 2371.
Cistus thymifolius L. cod. Nro. 3920. S. et Sm. fl. gr. t. 500.
 δ) *viride* Ten. prodr. fl. neap. 31. fl. napol. t. 47.
9. *h* *syrticum* Spr. syst. veg. II, 593.
Cistus syrticus Viv. fl. Lib. 27. t. 14. f. 2.
10. *h* *Jaubertii* C. Koch. Asia min. (Cappadocia).
Fumana grandiflora Jaub. et Sp. illustr. pl. orient. III, 173. t. 258.

B. *Eriocarpum* (Fol. superiora alterna; Caps. polysperma, pilosa).

11. *h* *ventosum* Boiss. diagn. pl. orient. nov. VIII, 49. Arabia petraea.
12. *h* *Kahiricum* (Cahiricum) DC. fl. d'Egypte 93. t. 31. f. 2. Aegyptus inferior.
Cistus stipulatus β. Forsk. fl. aeg. arab. 100.
13. *h* *micranthum* Spr. syst. veg. II, 588. Libya.
Cistus micranthus Viv. fl. Lib. 28. t. 14. f. 4.
14. *h* *lanuginosum* Spr. syst. veg. II, 589. Libya.
Cistus lanuginosus Viv. fl. Lib. 28. t. 14. f. 1. 3.
15. *h* *ruficomum* Spr. syst. veg. II, 589. Libya.
Cistus ruficomus Viv. fl. Lib. 27. t. 14. f. 5.
16. *h* *Lippii* Pers. syn. pl. II, 78. Aegyptus, Syria.
Helianthemum lavandulaefolium Sieb. Herb. Palaest.

- Helianthemum rosmarinifolium* Presl symb. I, 32. t. 21.
Cistus Lippii L. cod. Nr. 3915.
17. *h* *sessiliflorum* Pers. syn. pl. II, 78. Italia, Algeria.
Cistus sessiliflorus Desf. fl. atl. I, 417. t. 106.
 β) *ellipticum* Pers. syn. pl. II, 78. Sw. Cist. t. 108.
Cistus ellipticus Desf. fl. atl. I, 418. t. 107. S. et
 Sm. fl. gr. t. 502.
18. *h* *calcáreum* Jord. grain. recolt. au jard. de Gren. en 1849. 16. Gallia australis.
 19. *h* *gorgóneum* Webb in Hook. Nig. fl. 102. Insulae promont. virid.
 20. *h* *canariense* Pers. syn. pl. II, 78. Insulae canarienses,
canescens Mneh. meth. suppl. 75. Hispania.
glaucum Sweet Cist. t. 111.
Cistus canariensis Jacq. icon. I, t. 97.
 ? - *glaucus* Cav. ic. et descr. III, 31. t. 261.
 β) *confertum* Dun. in DC. prodr. I, 274. Berth. et Webb
 phytogr. can. t. 13.
 γ) *mucronatum* Dun. in DC. prodr. I, 274.
21. *h* *distáchyos* Mneh. meth. suppl. 76. Lusitania.
Cistus distachyos Roth catalect. I, 62.
- C. *Rhodax* (Folia opposita, omnia aut inferiora saltem exstipulata).
- * 22. *h* *organifolium* Pers. syn. pl. II, 76. Hispania, Gallia.
marifolium Gr. et G. fl. de Fr. I, 174.
Cistus organifolius Lam. enc. méth. II, 21. Cav. ic. et
 descr. III, 31. t. 262. f. 1.
Rhodax organifolius Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 2. 364.
 β) *glabrum* Spach in ann. d. sc. nat. 2. ser. VI, 2. 364. (sub Rhodace.)
dichotomum Pers. syn. pl. II, 77.
Cistus dichotomus Cav. icon. et descr. III, 32. t. 263. f. 1.
 γ) *tomentosum* Gr. et G. Fl. de Fr. I, 174. Barr. ic. pl. rar. t. 44.
marifolium Dun. in DC. prodr. I, 277.
Cistus marifolius L. cod. Nro. 3904. Cav. ic. et descr. II, t. 143.
23. *h* *molle* Pers. syn. pl. II, 76. Hispania.
Cistus mollis Cav. icon. et descr. pl. III, 32. t. 262. f. 2.
Rhodax montanus β. *mollis* Spach. in ann. d. sc. nat. 2.
 sér. VI, 2. 364.
24. *h* *rotundifolium* Dun. in DC. prodr. I, 277. Sicilia, Hispania,
Cistus nummularius Cav. ic. et descr. II, 34. t. 142. Barbaria.
 β) *rubellum* Presl del. Prag. 25.
- * 25. *h* *oelandicum* Wahlenb. fl. suec. 333. Sw. Cist. t. 85. Europa bor. et media,
Rhodax Steud. nom. bot. ed. 2. I, 735. Hispania.
Cistus oelandicus L. cod. Nro. 3906.
Rhodax Chamaecistus Spach. (teste Steud.)
 - *montanus* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 364. ex p.
 β) *anglicum* L. cod. Nro. 3905. (sub Cisto.)
Cistus marifolius Sm. fl. brit. 572. engl. bot. t. 396.
 - *hirsutus* Huds. fl. angl. 232.
 γ) *canum* Dun. in DC. prodr. I, 277. Sw. Cist. t. 56.
marifolium DC. fl. franç. IV, 817.
piloselloides DC. prodr. I, 284.
Cistus canus L. cod. Nro. 3902. Jacq. fl. austr. t. 277.
 - *piloselloides* Lapeyr. hist. abr. d. pl. d. Pyr. 301.
 - *myrtifolius* Lam. enc. méth. bot. II, 20.
- δ) *hirtum* Koch syn. ed. 2. 86.
echioides Pers. syn. pl. II, 77.
Cistus echioides Lam. enc. méth. II, 21.
 - *Seguieri* Crntz. stirp. austr. II, 74. t. 6. f. 1.
- ε) *vineale* Pers. syn. pl. II, 77. Sw. Cist. t. 77.
pulchellum Sw. Cist. t. 74.
Cistus vinealis W. sp. pl. II, 1195.
 - *tomentosus* Scop. fl. carn. I, 376. t. 24. (teste Rchb.)
26. *h* *italicum* Pers. syn. pl. II, 76. Gr. et G. fl. de Fr. I, 171. Alpes, Gallia, Turcia,
eriosépalam Sw. Cist. t. 76. (teste Rch.) Italia, Oriens.
oelandicum DC. fl. fr. IV, 817. (teste Gr. et G.)
Cistus italicus L. cod. Nro. 3903. Barr. ic. t. 366.
Rhodax montanus Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 364. ex p.

- β) *albidum* DC. prodr. I, 277.
oelandicum z. *marifolium* Gris. spic. fl. Rum. et Bith. I, 233.
- γ) *alpestre* Poll. fl. Veron. II, 183. Sw. Cist. t. 2.
Cistus alpestris Scop. fl. carn. I, 375. t. 23.
 - *oelandicus* Jacq. fl. austr. t. 399.
- δ) *candidissimum* DC. prodr. I, 277.
oelandicum δ. *scardicum* Gris. spic. fl. Rum. et Bith. I, 233.
- ε) *micranthum* Gr. et G. fl. de Fr. I, 171.
penicillatum Thib. in DC. prodr. I, 277.
obovatum Dun. in DC. prodr. I, 277.
27. *h paniculatum* Dun. in DC. prodr. I, 278. Hispania.
Cistus paniculatus Jan. elench. 8.
Rhodax montanus α. *paniculatus* Spch. in ann. d. sc.
 nat. 2. sér. VI, 2. 364.
28. *h nebrodense* Heldr. in Guss. fl. sic. syn. II, 1. 18. Sicilia.
29. *h lunulatum* DC. fl. franc. IV, 816. Italia superior.
Cistus lunulatus All. auct. ad fl. pedem. 30. t. 2. f. 3.
30. *h Allionii* Tin. pl. rar. Sic. 43. Italia.
Rhodax montanus z. *oliganthus* Spach in ann. d. sc.
 nat. 2. sér. VI, 2. 364.
31. *h dichroum* Kunze in Flora XXIX, 633. Hispania (Valencia).
32. *h Serrae* Cambess. in mém. du Mus. XIV, 216. t. 11. *insulae canarienses.*
33. *h polyanthos* Pers. syn. pl. II, 78. Africa borealis.
Cistus polyanthos Dsf. fl. atl. I, 420. t. 108.
Rhodax polyanthus Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 2. 364.
34. *h viscidulum* Boiss. elench. pl. nov. hisp. Nro. 21. voy. d. Hispania.
 le mid. de l'Esp. t. 15.
35. *h pannosum* Boiss. elench. pl. nov. hisp. Nro. 22. voy. d. Hispania.
 le mid. de l'Esp. t. 19. A. f. 6.
36. *h cinereum* Pers. syn. pl. II, 76. Hispania.
Cistus cinereus Cav. icon. et descript. II, 33. t. 141.
 β) *Lagascanum* DC. prodr. I, 278.
- D. *Argyrólepis* (Folia omnia opposita, stipulata; Fl. densi, distichi).
37. *h squamatum* (nec squamatum) Pers. syn. pl. II, 78. Hispania, Barbaria,
Cistus squamatus L. cod. Nro. 3914. Cav. ic. et descr. Mauritania.
 II, t. 139.
- E. *Euhelianthemum* (Fol. omnia opposita, stipulata; Fl. laxi, secundi).
38. *h Broussonetii* Dun. in DC. prodr. I, 279. Webb phytogr. Ins. canar.
 canar. 119. t. 13. B. Terrae maris medit.
39. *h lavandulaefolium* Pers. syn. pl. II, 79. Cistus lavandulaefolius Lam. enc. méth. II, 25. Barr. ic. t. 288.
β) stoechadifolium Pers. syn. pl. II, 79.
Cistus stoechadifolius Brot. fl. lus. II, 270.
- γ) *syriacum* DC. prodr. I, 279. Cistus syriacus Jacq. icon. pl. rar. t. 96.
- δ) *Thibaudi* Pers. syn. pl. II, 79. piliferum Boiss. voy. d. le mid. de l'Esp. t. 17.
racemosum Benth. cat. pl. Pyren. 87.
Cistus racemosus Cav. icon. et descr. II, 33. t. 140.
40. *h Caput felis* Boiss. elench. pl. nov. Nro. 25. voy. d. le mid. Hispania australis.
 de l'Esp. t. 16. Italia.
41. *h semiglabrum* Bad. in Morett. bot. ital. 14. β) *luteum* Rehb. ic. fl. Germ. III. t. 35. f. 4558.
42. *h Morisianum* Bert. fl. ital. V, 374. Sardinia.
ciliatum Mor. stirp. sard. elench. I, 6.
semiglabrum Mor. fl. sard. I, 202. t. 13.
- * 43. *h cróceum* Pers. syn. pl. II, 79. Sw. Cist. t. 53. Africa boreali-occid.,
arcuatum Ten. sylf. pl. neap. 260. Hispania, Italia.
variabile γ. *hololeucum* Spach in ann. d. sc. nat. 2.
 sér. VI, 2. 362.
vulgare z. Bert. amoen. it. 32.
Cistus croceus Dsf. fl. atl. I, 422. t. 110.
 β) *albiflorum* Boiss. voy. d. le midi de l'Esp. II, 70.
 γ) *Andersoni* Sw Cist. t. 89. (hybrida e ♂ *pulverulento*.)

- δ) *bicolor* Presl fl. sic. I, 128.
 ε) *eriosépalon* Sw. hort. brit. t. 76.
 ζ) *glaucum* Pers. syn. pl. II, 78.
 Cistus glaucus Cav. ic. et descr. III, 31. t. 261.
 η) *intermedium* Guss. prodr. fl. sic. suppl. 177.
 θ) *nudicaule* Dun. in DC. prodr. I, 279.
 ι) *suffruticosum* Boiss. elench. pl. nov. hisp. Nro. 25.
 κ) *tomentosum* Guss. suppl. ad fl. sic. II, 177.
 44. η *stellatum* Guss. suppl. ad fl. sic. II, 178. Sicilia.
 45. η *siculum* Tin. plant. rar. Sic. 44. Sicilia.
 46. η *hirtum* Pers. syn. pl. II, 79. Sw. Cist. t. 109. Gallia, Hispania.
 baeticum Lag. hort. Madr.
 Lagascae Dun. in DC. prodr. I, 281.
 Cistus hirtus L. cod. Nro. 3924. Cav. ic. et descr. II. t. 146.
 β) *albiflorum* Gr. et G. fl. de Fr. I, 169.
 majoranaefolium DC. fl. fr. V, 625.
 hispidum Dun. in DC. prodr. I, 282.
 Cistus hispidus Lam. enc. meth. II, 26.
 - *majoranaefolius* Gouan herbar. de Montp. 26.
 γ) *áureum* Pers. syn. pl. II, 78.
 * 47. η *vulgare* Grtn. de fr. et sem. I, t. 76. Sw. Cist. 34. Europa, Oriens.
 germanicum Mill. dict.
 tomentosum Dun. in DC. prodr. I, 279.
 variabile Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 2. 362.
 Cistus Helianthemum L. cod. Nro. 3923.
 - *Ledon* Erndt virid. Warsaw. 32.
 - *hirtus* Gilib. fl. lith. V, 225.
 - *tomentosus* engl. bot. t. 2208.
 β) *acuminatum* Pers. syn. pl. II, 79.
 Cistus acuminatus Viv. fragm. 13. t. 14. f. 1.
 γ) *albiflorum* Koch syn. ed. 2. 87.
 apenninum Schleich. in Koch syn. ed. 2. 87.
 confusum Sweet Cist. t. 91.
 Cistus apenninus L. cod. Nro. 3925.
 δ) *angustifolium* Pers. syn. pl. II, 79.
 leptophyllum Dun. in DC. prodr. I, 279. Sw. t. 20.
 Cistus angustifolius Jcq. hort. Vind. III, 53.
 - *Barrellieri* bot. mag. t. 2371.
 - *stoechadifolius* Hort.
 ε) *glabrum* Koch syn. ed. 2. 87.
 lucidum Horn. cat. pl. hort. hafn. 498.
 Cistus helianthemoides Crantz stirp. austr. fasc. II, 69. t. 6. f. 2.
 - *serpyllifolius* Crantz stirp. austr. fasc. II, 70. t. 6. f. 3.
 - *splendens* Lam. enc. méth. bot. II, 26.
 ζ) *grandiflorum* Pers. syn. pl. II, 79. Sw. Cist. t. 69.
 Seguieri Poll. viag. al lag. di Gard. 99.
 tauricum Fisch in Sw. hort. brit. 42. Cist. t. 105.
 Cistus grandiflorus Scop. fl. carn. I, 377. t. 25.
 - *serpyllifolius* Krock. fl. sil. II, 204.
 - *tomentosus* Scop. fl. carn. I, 376. t. 24.
 η) *hirsutum* Dun. in DC. prodr. I, 284.
 Cistus hirsutus Lap. hist. abr. d. Pyren. 303.
 θ) *hyssopifolium* Ten. prodr. fl. nep. suppl. 68. (teste Gr. et G.)
 ι) *leptopetalum* Koch syn. ed. 2. 87.
 surrejanum Mill. dict. Nro. 15. Sw. Cist. t. 28.
 Cistus surrejanus L. cod. Nro. 3916. engl. bot. t. 2207.
 κ) *multiplex* Sweet Cist. t. 64.
 λ) *nummularium* Pers. syn. pl. II, 78. Sw. Cist. t. 80.
 arcuatum Presl fl. sic. I, 128.
 ovatum Dun. in DC. prodr. I, 280.
 Cistus nummularius L. cod. Nro. 3917.
 - *ovatus* Viv. suppl. ad fl. lib. I, 6. t. 8. f. 2.
 μ) *obscurum* Pers. syn. pl. II, 79.
 barbatum Pers. syn. pl. II, 80. Sw. Cist. t. 73.
 cistifolium Mill. dict.
 obtusifolium Dun. in DC. prodr. I, 281.

- Cistus barbatus* Lam. enc. méth. II, 24.
 - *hirsutus* Thuill. fl. d. env. de Par. 266.
 v) *serpyllifolium* Mill. dict. Nro. 8. Sw. Cist. t. 60.
Cistus serpyllifolius L. cod. Nro. 3918.
48. h *Stabianum* Ten. fl. neap. syll. 605. 633. fl. napl. IV, 318. Italia inferior.
lavandulaefolium Ten. prodr. fl. neap. 30.
vulgare Var. C. et D. Ten. syll. pl. neap. 259.
49. h *pallens* Kit. in Roch. pl. rar. Ban. 26. (sine descriptione.) Hungaria (Banatus).
 * 50. h *roseum* Pers. syn. pl. II, 80. Sw. Cist. t. 55. Italia.
foetidum Pers. syn. pl. II, 79.
Cistus roseus All. fl. pedem. II, 105. t. 45.
 - *foetidus* Jacq. icon. pl. rar. I, t. 98.
 β) *multiplex* Sw. Cist. t. 86.
51. h *Berteroanum* Bert. fl. ital. V, 387. Italia.
rhodanthum Coll. herb. pedem. I, 254.
52. h *Sherardi* Steud. nomencl. bot. ed. 2 I, 735. Asia minor.
roseum Mill. dict.
53. h *rhodanthum* Dun. in DC. prodr. I, 208. Sw. Cist. t. 7. Hispania.
 ? *Cistus roseus* Jacq. hort. Vindob. III, t. 65.
 β) *carneum* Lag. in DC. prodr. I, 283.
54. h *ciliatum* Pers. syn. pl. II, 79. Hispania, Africa bor.,
asperum Lag. in DC. prodr. I, 283. Oriens.
variabile ξ. *ciliatum* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér.
 VI, 2. 363.
Cistus ciliatus Dsf. fl. atl. I, 421. t. 109.
 β) *Roussaei* DC. prodr. I, 283.
55. h *racemosus* Pers. syn. pl. II, 79. Sw. Cist. t. 82. Ins. canarienses, Gallia,
reflexum Mneh. meth. 233. Africa boreali-occid.,
variabile η. *calycinum* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. Hispania.
 VI, 2. 362.
Cistus racemosus L. cod. Nro. 3922.
 β) *farinosum* Sw. Cist. p. XVIII.
 γ) *lanceolatum* Sw. Cist. t. 100.
 δ) *strictum* Pers. syn. pl. II, 79.
Cistus strictus Cav. ic. et descr. III, 32. t. 263. f. 2.
- * 56. h *mutabile* Pers. syn. pl. II, 79. Europa australis.
Cistus mutabilis Jcq. icon. pl. rar. I, t. 99.
 β) *canescens* Sw. hort. brit. 36. Cist. t. 51.
venustum Sw. hort. brit. 36. Cist. t. 10.
versicolor Sw. hort. brit. 36. Cist. t. 26.
 γ) *diversifolium* Sw. Cist. t. 95.
 δ) *multiplex* Sw. Cist. t. 98.
 ε) *roseum* Sw. Cist. t. 106.
 ζ) *variegatum* Sw. hort. brit. 469. Cist. t. 38.
57. h *virgatum* Pers. syn. pl. II, 79. Sw. Cist. t. 79. Africa borealis.
Cistus virgatus Dsf. fl. atl. I, 432.
58. h *polifolium* Pers. syn. pl. II, 80. Sw. Cist. t. 88. Europa media et austr.
incanum Mneh. meth. suppl. 76.
lusitanicum Mill. dict.
pilosum Bert. amoen. it. 242.
variabile θ. *polifolium* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 2. 363.
Cistus polifolius L. cod. Nro. 3926.
 β) *apenninum* Sw. Cist. t. 62. DC. fl. franç. IV, 824.
 ? *Cistus apenninus* L. cod. Nro. 3925.
 γ) *pulverulentum* Pers. syn. pl. II, 80. Sw. Cist. t. 29.
Cistus polifolius Lam. enc. méth. II, 26.
 - *pulverulentus* Pourr. act. Toul. III, 311.
 δ) *velutinum* Jord. obs. d. pl. franç. 35.
59. h *pilosum* Pers. syn. pl. II, 79. Sw. Cist. t. 49. Gallia, Hispania.
racemosum Dun. in DC. prodr. I, 281. (teste Boiss.)
vaviabile ι. *linearifolium* Spch. in ann. d. sc. nat. 2.
 sér. VI, 2. 363.
Cistus pilosus L. cod. Nro. 3921. All. fl. ped. t. 45. f. 2.
 β) *linearifolium* Mneh. meth. suppl. 75.
lineare Pers. syn. pl. II, 78. Sw. Cist. t. 48.
Cistus linearis Cav. ic. et descr. III, 8. t. 16.

- γ) violaceum Pers. syn. pl. II, 78.
Cistus violaceus Cav. ic. et descr. II, 38. t. 147.
60. *h* songaricum (soongaricum) Schrenk enum. pl. nov. 94. Songaria.
61. *h* vesicarium Boiss. diagn. pl. orient. nov. VIII, 50. Arabia petraea.
62. *h* nitidum Clem. atti d. tertia riun. 517. Dalmatia.
63. *h* sulphureum W. hort. ber. suppl. 39. Sw. Cist. t. 37. Hispania.
β) stramineum Sw. Cist. t. 93.
γ) macranthum Sw. Cist. t. 103.
δ) multiplex Sw. Cist. t. 94. et 104.
64. *h* hyssopifolium Ten. syn. fl. neap. 48. Sw. Cist. t. 92. s. 46 §. Italia inferior.
β) cupreum Sw. Cist. t. 58.
γ) multiplex Sw. Cist. t. 72.
δ) Milléri Sw. Cist. t. 101.
65. *h* crassifolium Pers. syn. pl. II, 78. Hispania, Marocco.
variabile t. glaberrimum Spach in ann. d. sc. nat. 2.
sér. VI, 2 362.
Cistus glaucus Desf. fl. atl. I, 418.
66. *h* oligophyllum DC. prodr. I, 284. Syria.
Cistus oligophyllus Clark in Spr. n. Entd. III, 163.
- F. Tuberaria (Fol. supr. alterna; Caps. polysperma, opaca; Stylus rectus).
67. *h* lignosum Sw. hort. brit. 469. Cist. t. 46. Europa australis.
- G. Lecheoides (Fol. superiora alterna, Caps. polysperma, nitida).
68. *h* brasiliense Pers. syn. pl. II, 77. Sw. Cist. 43. Brasilia, Montevideo.
Cistus alternifolius Vahl symb. I, 38.
- brasiliensis Lam. enc. méth. II, 22.
Crocanthemum brasiliense Spach in ann. d. sc. nat. 2.
sér. VI, 2 370.
Hudsonia australis Spreng. syst. veg. II, 452.
69. *h* polygalaefolium Sw. Cist. t. 11. Brasilia.
70. *h* astylum Moç. et Sess. in DC. prodr. I, 284. Mexico.
71. *h* tripetalum Moç. et Sess. in DC. prodr. I, 284. Mexico.
72. *h* obcordatum Moç. et Sess. in DC. prodr. I, 284. Mexico.
73. *h* mexicanum Steud. nom. bot. ed. 2 I, 735. Mexico.
Heteromeris mexicana Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 2 370.
74. *h* glomeratum Lag. in DC. prodr. I, 269. Sweet Cist. t. 110. Mexico.
Cistus glomeratus Lag. gen. et sp. 16.
Taeniostemma micranthum Spach in Hook. bot. mag. comp. II, 289.
75. *h* corymbosum Mich. fl. bor. amer. I, 307. America boreali-occid.
Heterómeris cymosa Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 2 370.

VIII. Hudsonia L.

(Will. Hudson, pharmacopola Londinensis et florum angliae autor, † 1793.)

1. *h* ericoides L. cod. Nro. 3456. Sw. Cist. t. 36. W. hort. America foed. borealis.
berol. t. 15.
Nuttallii Sw. Cist. p. 19.
2. *h* montana Nutt. gen. of N. Amer. pl. II, 5. Amer. foed. (Carolina).
3. *h* tomentosa Nutt. gen. of N. Amer. pl. II, 5. Sw. Cist. t. 27. Amer. brit. et foed. bor.

Fam. II. Bixaceae.

IX. Phoberos Lour.

(φοβερος, formidabilis, furchtbar, ob caulem maxime horridum.)

1. 5 chinensis Lour. fl. coch. 389. China.

X. Flacourtia l'Her.

(Etienne Flacourt, praefectus francogallicus ins. Madagascar, edidit 1661: histoire de la grande isle Madagascar.)

1. 5 sávida Rxb. fl. corom. I, 49. t. 69. India orient., Nepal.
2. 5 racemosa Presl reliq. Haenk. II, 2. 93. California.
3. 5 sepiaria Rxb. fl. corom. I, 48. t. 68. India orientalis, Nepal.
4. 5 cataphracta Rxb. in W. sp. pl. IV, 830. India orientalis, Nepal.

XI. *Hisingera* Hellen.

(Hisinger, a consiliis rei metallicae in urbe finnica Abo, vix. ad fin. saec. praeter.)

1. *H. japonica* (nec *racemosa* Walp.) S. et Z. fl. jap. I, 169. t. 88. 100. Japonia.

Fam. 12. *Samydeae*.XII. *Casearia* Jcq.

(Joh. Casearius, missionarius sic dictus, hortum malabaricum a Adr. van Rheeде editum redegit.)

1. *H. Hamiltonii* Wall. num. list. Himalaya.
 ? *alnifolia* Royle ill. of the him. mount. 170.
 2. *H. ovata* W. sp. pl. II, 629. India orient., Himalaya.
Anavinga Pers. syn. pl. I, 485.
Anavinga ovata Lam. in enc. méth. I, 148.
 β) *Conzialis* Ham. in Royle ill. of the himal. mount. 170.

Fam. 13. *Tamariscineae*.XIII. *Myricaria* Dsv.

(μυρικη, nomen jam ab Homero Tamarici gallicae adhibitum.)

A. *Racemi terminales*.

1. *H. longifolia* Ehrenb. in Linn. II, 279. Sibiria australi-orient.
linearifolia Dsv. in ann. d. sc. nat. IV, 349.
Tamarix longifolia W. in Verh. d. Ac. d. Wiss. zu Berl. 1812. II, 86.
 β) *coarctata* Ehrenb. in Linn. II, 279.
Tamarix decandra Pall. fl. ross. II. t. 80. f. A.
 - *germanica* Pall. fl. ross. II, 73.
 2. *H. alopecuroides* Schrenk enum. pl. nov. 65. Songaria.
macrostachya Kar. et Kir. in Bull. de la soc. d. nat. de Mosc. 1841. II, 423.
 3. *H. bracteata* Royle illustr. of the himal. mount. 214. t. 44. f. 2. Cashmir.
 4. *H. germanica* Desv. in ann. d. sc. nat. IV, 349. Europa, Caucasus.
Tamariscus decandra Much meth. 123.
 - *germanicus* Scop. fl. carn. I, 224.
Tamarix germanica L. cod. Nro. 2150.
 5. *H. herbacea* Dsv. in ann. d. sc. nat. IV, 350. Littora maris caspii.
Tamarix decandra Pall. fl. ross. II, 73. t. 80. f. B.
 - *germanica* β. W. sp. pl. I, 1499.
 - *herbacea* W. in Verh. d. Berl. Acad. 1812. II, 84.
 β) *patens* Rchb. fl. exc. 587.
 γ) *squamosa* Rchb. fl. exc. 587. (teste Bert.)

B. *Racemi laterales*.

6. *H. dahurica* (*daurica*, *davurica*) Ehrenb. in Linn. II, 278. Sibiria australis.
squamosa Desv. in ann. d. sc. nat. IV, 350.
Tamarix dahurica W. in Verh. d. Berl. Acad. 1812. II, 85.
 β) *macrophylla* Bunge in mém. d. sav. étr. prés. à l'ac. de Pétersb. II, 582.
 7. *H. brevifolia* Turcz. in Bull. de la soc. d. nat. de Mosc. XIV, 70. Mongolia.
 8. *H. elegans* Royle illustr. of the him. mount. 214. Himalaya.

XIV. *Trichurus* Arn.

(θριξ, pilus, Haar et οδρα, cauda, Schwanz.)

1. *H. pycnocarpus* Dne in Jacqem. voy. IV, 59. t. 70. Persia (Cuhistan)
Tamarix pycnocarpa DC. prodr. III, 97. Cashmir.
 2. *H. Aucherianus* Dne in Jacqem. voy. IV, 59. Persia.
 3. *H. ericoides* W. et Arn. prodr. fl. penins. Ind. or. I, 40. Wight ill. India orient.
 of ind. bot. I, 53. t. 24. f. B.
vaginatus Walp. rep. bot. syst. II, 115.
Myricaria vaginata Dsv. in ann. d. sc. nat. IV, 350.
Tamarix ericoides Rottl. in Roth. nov. sp. Ind. or. 184.
 - *mucronata* Sm. in Herb. Linn.
 - *tenacissima* Ham. in Wall. num. list. 3757.

IV. *Támarix* L.(nomen jam a *Columella Tamarici gallicae* adhibitum.)

A. Polyadénia (Stamina 10).

1. 5 *amplexicaulis* Ehrenb. in Linn. II, 275.
 2. 5 *passerinoïdes* Del. fl. d'Égypte. 58.
 β) *Hammonis* Ehrenb. in Linn. II, 275.
 γ) *macrocarpa* Ehrenb. in Linn. II, 275.

Aegyptus.
Arabia, Aegyptus.

B. Decadénia (Stamina 5).

3. 5 *effusa* Ehrenb. in Linn. II, 258.
 * 4. 5 *africana* Poir. voy. en Barb. II, 139. (ed. germ. II, 171.)
gallica γ. *africana* W. sp. pl. I, 1498.
gallica Ucria hort. panorm. 143.
 * 5. 5 *gallica* L. cod. Nro. 2149. S. et Sm. fl. gr. t. 291.
Pallásii C. A. Mey. Verz. kauk. Pfl. 164.
senegalensis DC. prodr. III, 96. (teste Gr. et G.)
Tamariscus gallicus All. fl. ped. II, 87.
 - *pentandra* Mneh meth. 123.
 β) *arbórea* Sieb. in Linn. II, 269.
 γ) *canariensis* W. in Verh. d. Berl. Acad. 1812. II, 79.
 δ) *heterophylla* Ehrenb. in Linn. II, 270.
 * ε) *libanótica* Hort.
 ζ) *mannifera* Ehrenb. in Linn. II, 270.
 η) *narbonensis* Ehrenb. in Linn. II, 267.
 θ) *nilótica* Ehrenb. in Linn. II, 269.
 6. 5 *ánglica* Webb in Hook. journ. of bot. III, 430. t. 15. f. A.
gallica engl. bot. t. 1318.
 7. 5 *tetrágyna* Ehrenb. in Linn. II, 258.
 8. 5 *Pallásii* Dsv. in ann. d. sc. nat. IV, 349.
gallica Bieb. fl. taur. cauc. I, 246.
 - β. *pycnostachys* Led. fl. ross. II, 135.
pentandra Pall. fl. ross. II, 72. t. 79. f. A.
 9. 5 *ramosíssima* Led. fl. alt. I, 424. icon. pl. fl. ross. t. 256.
gallica γ. *mierantha* Led. fl. ross. II, 135.
 10. 5 *hispida* W. in Verh. d. Berl. Acad. 1812. II, 77.
canescens Desv. in ann. d. sc. nat. IV, 348.
pentandra var. Pall. fl. ross. II, 72. t. 79. (excl. A.)
tomentosa Sm. in Rees cycl.
 11. 5 *grácilis* W. in Verh. d. Berl. Acad. d. Wiss. 1812. II, 81.
 12. 5 *junipérina* Bge. in mém. d. sav. étr. de St. Pét. II, 102.
 13. 5 *élegans* Spach (teste Steud. nom. bot. II, 661).
indica Hort. Paris.
 * 14. 5 *indica* Willd. in n. Verh. d. Ges. naturf. Fr. IV, 214.
epacróides Sm. in Rees cycl.
gallica d. *indica* Ehrenb. in Linn. II, 268. Wight ill. I, 53. t. 24. f. A.
 15. 5 *orientalis* Forsk. fl. aeg. arab. 206.
articulata Vahl symb. II, 48. t. 32.
indica Koen. in Rxb. fl. ind. II, 100.
 16. 5 *Pharos* (nec *Furas* Royle) Ham. in Wall. num. list. 3756.
 17. 5 *dioica* Roth. nov. sp. Ind. or. 185.
articulata Wall. num. list. 3756. b.
 * 18. 5 *chinensis* Lour. fl. coch. 228. S. et Z. fl. jap. I, t. 71.
gallica Thb. fl. jap. 126.
gallica b. *chinensis* Ehrenb. in Linn. II, 267.
 19. 5 *cupressiformis* Led. fl. alt. I, 423. icon. pl. fl. ross. t. 253.
 20. 5 *angustifolia* Led. in Eichw. pl. nov. casp. cauc. 12. t. 8.

Aegyptus.
Africa bor., Hispania,
Italia, Graecia, Pontus,
Asia minor.
Europa austr., Oriens,
Sibiria austr., Africa
borealis et ? occident.
ins. Canarienses.Britannia, Gallia bor.
Europa austr., Aegypt.
Isthm. caucasicus,
Astrachan.Sibir. austr. (Songaria),
Astrachan.
Astrachan.Astrachan, Sibiria.
Mongolia.

Europa australis.

India orientalis.

Arabia, Persia,

India orient., Himal.
India orientalis.

China (Canton),

Songaria.
Isthm. caucas. orient.

C. Oligadénia (Stam. 4. 8.)

21. 5 *elongata* Led. fl. alt. I, 421. icon. pl. fl. ross. 254.
 22. 5 *tetrandra* Pall. in Bieb. fl. taur. cauc. I, 247.
gallica Bess. enum. pl. Volh. Pod. 57.
 β) *taurica* Pall. in nov. act. ac. Petr. X, 2. 376.
 γ) *rósea* Gris. spic. fl. Rum. et Bith. I, 219.
articulata W. sp. pl. I, 1498. nec Vahl.
Thuja aphylla L. cod. Nro. 7254.

Turkestan, Songaria.
Rossia australis.

23. 5 *laxa* Willd. in Verh. d. Berl. Ac. 1812. II, 82.
 24. 5 *polystachya* Led. fl. ross. II, 133.
 25. 5 *parviflora* DC. prodr. III, 97.
 tetrandra β. *brevifolia* Gris. spic. fl. Rum. et Bith. I, 220.
 26. 5 *Hampeana* Boiss. et Heldr. diagn. pl. or. nov. X, 8.
 27. 5 *Meyeri* Boiss. diagn. pl. or. nov. X, 9.
 teträgyna C. A. Mey. Verz. kauk. Pfl. 165.
 28. 5 *deserti* Boiss. diagn. pl. or. nov. X, 9.

Astrachan, Sibiria.
 Turkestan.
 Littora Bospori.
 Graecia.
 Transcaucasia orient.
 Arabia, Aegyptus.

Fam. 14. Beaumuriaceae.

XVI. *Hololachne* Ehrenb.

(ὅλος, totus, ganz et λαχνη, lana, Wolle.)

1. *h. songarica* (soongarica) Ehrenb. in Linn. II, 273. Sibiria australis.
Tamarix songarica Pall. in nov. act. Petrop. X, 374. t. 10. f. 4.

XVII. *Reaumuria* L.

(Ren. Ant. de Réaumur, naturae investigator Franco-Galliae sagacissimus, † 1757.)

1. *h. filifolia* Jaub. et Sp. ill. pl. orient. III, 58. t. 246. Persia (desert. sals.).
 2. *h. palaestina* Boiss. diagn. pl. nov. or. X, 10. Palaestina.
 3. *h. hyrcanica* Jaub. et Sp. ill. pl. orient. III, 60. t. 248. Persia (Hyrcania).
 4. *h. cistoides* Adam in Web. et Mohr Beitr. I, 61. Transcaucasia.
 hypericoides Jacq. fl. ecl. pl. rar. I, 92. t. 62. bot. mag. 2057.
 linifolia Salisb. parad. lond. t. 18.
 vermiculata Bieb. fl. taur. cauc. II, 17.
 5. *h. tatárica* Jaub. et Sp. ill. pl. orient. III, 55. Littora orient. maris
 hypericoides Eichw. pl. nov. casp. cauc. 6. 7. caspili.
 6. *h. Billardiéri* Jaub. et Sp. ill. pl. orient. III, 55. Syria (Libanon).
 hypericoides Lam. illustr. d. gener. t. 489. f. 2. enc. méth. VI, 85.
 Hypéricum alternifolium Lab. ic. pl. rar. Syr. II, 17. t. 10.
 7. *h. squarrosa* Jaub. et Sp. ill. pl. orient. III, 59. t. 247. Persia (desert. sals.).
 8. *h. vermiculata* (L.) Guss. prodr. fl. sic. II, 35. Sicilia, ? Africa bor.

XVIII. *Eichwaldia* Led.

(Eichwald, naturae scrutator clar., acad. Petrop. soc., isthm. caucas. permigr.)

1. *h. Oxiana* Led. in Eichw. pl. nov. casp. cauc. 7. 38. t. 34. Turkestan.

Fam. 15. Frankeniaceae.

XIX. *Frankenia* L.

(Frankenius, prof. Upsaliensis, primus plantas succicas enumeravit, † 1661.)

1. *h. Aucheri* Jaub. et Sp. illustr. pl. or. II, t. 187. Persia (desert. sals.).
 2. *h. revoluta* Forsk. fl. aeg. arab. 75. Africa bor., Hispania.
 corymbosa Dsf. fl. atl. I, 315. t. 93.
 3. *h. hispida* DC. prodr. I, 349. Rossia austr., Asia min.,
 hirsuta Bieb. fl. taur. cauc. II, 286. S. et Sm. fl. gr. t. 343.
 4. *h. capitata* B. Webb et Berth. phytogr. can. 131. t. 16. Britannia, Bessarabia,
 hirsuta L. cod. Nro. 2570. ? Africa australis.
 intermedia DC. prodr. I, 349.
 Nothria Thunb. prodr. pl. cap. 58.
 Nothria repens Berg descr. pl. ex cap. bon. sp. 171. t. 1. f. 2.

INDEX.

Anavinga ovata Lam. XII, 2.
 Casearia Jeq. XII.
 alnifolia Royle 1.
 Anavinga Pers. 2.
 Conziala Ham. 2. β.

Casearia Hamiltonii Wall.
 ovata W. 2.
 Cistus L. IV.
 acuminatus Viv. VII, 47. β.
 acutifolius Sweet 18.

- Cistus affinis* Bert. V, 1. β.
albido-crispus Del. 8.
albidus L. 7.
algarvensis Sims. VI, 6. β.
alpestris Scop. VII, 26. γ.
alternifolius Vahl VII, 68.
alyssoides Lam. VI, 9.
anglicus L. VII, 25. β.
angustifolius Jcq. VII, 47. δ.
anthurus Hort. VI, 4.
apenninus L. VII, 47. γ. 58. β.
arabicus L. VII, 1.
asperifolius Sweet 20. β.
atriplicifolius Lam. VI, 7.
barbatus Pers. VII, 47. μ.
Barrelieri bot. mag. VII, 47. δ.
brasiliensis Lam. VII, 68.
calycinus L. VI, 5. VII, 6. β.
 - Ten. 15. β.
canariensis Jacq. VII, 20.
candidissimus Dun. 14. β.
canus L. VII, 25. γ.
canescens Sweet 4. β.
capensis L. 19.
cheiranthoides Lam. VI, 11.
ciliatus Dsf. VII, 54.
cinereus Cav. VII, 36.
Clusii Dun. VI, 1.
complicatus Lam. 9.
Corbariensis Pourr. 16.
cordifolius Mnch. 17.
corsicus G. et Gr. 4. γ.
creticus L. 3.
 - Sweet 9.
crispus L. 5.
croceus Dsf. VII, 43.
Cupanianus Presl 4. 18.
 - Sweet 17.
cymosus Dun. 9. β.
cyprius Lam. 24.
dichotomus Cav. VII, 22. β.
distachyos Rth VII, 21.
Dunalianus Sweet 3.
echioides Lam. VII, 25. δ.
ellipticus Dsf. VII, 17. β.
elongatus Vahl VI, 8. β.
ericoides Cav. VII, 6.
 - Jan VII, 1.
eriocephalus Viv. 4.
eriosepalus Steud. 4.
fastigiatus Guss. VI, 1. β.
ferrugineus Lam. VII, 1.
Florentinus Lam. V, 1. γ.
floribundus Tausch 23. β.
foetidus Jcq. VII, 50.
formosus Curt. VI, 10.
Fumana Bieb. VII, 3.
 - Dsf. VII, 5. 6.
 - L. VII, 4.
Garganicus Ten. 3. 4. γ.
glaucus Cav. VII, 20. 43. ζ.
 - Dsf. VII, 65.
glomeratus Lag. VII, 74.
glutinosus L. VII, 8.
grandiflorus Tausch 20. γ.
 - Scop. VII, 47. ζ.
- Cistus halimifolius* L. VI, 8.
helianthemoides Crntz VII, 47. ε.
Helianthemum L. VII, 47.
heterophyllum Dsf. 2.
hirsutus Dun. VII, 47. γ.
 - Huds. VII, 25. β.
 - Lam. 21.
 - Lapeyr. VII, 47. γ.
hirtus Gilfb. VII, 47.
 - L. VII, 46.
hispidus Lam. VII, 46.
hybridus Vahl 11.
 - Pourr. 16.
incanus L. 4.
 - S. et Sm. 9. β.
involutcratus Lam. VI, 11. β.
italicus L. VII, 26.
ladaniferus L. 25.
 - Sims 24.
Ladanosma Hffmsgg 25. β.
laevipes L. VII, 2.
 - Dur. VII, 8. β.
laevis Cav. VII, 7.
lasianthus Lam. VI, 11. γ.
lanuginosus Viv. VII, 14.
latifolius Sweet 17. β.
lavandulaefolius Lam. VII, 39.
laurifolius L. 23.
 - β. cyprius Pers. 24.
laxus Ait. 19.
Ledon Lam. 22. 23.
 - Erndt VII, 47.
Libanotis Dsf. VI, 1.
 - L. VI, 3.
lilacinus Hffmsgg. 9. γ.
linearis Cav. VII, 50. β.
Lippii L. VII, 16.
longifolius Lam. 20.
lunulatus All. VII, 29.
maculatus DC. 25. γ.
marifolius L. VII, 22. γ.
 - Sm. VII, 25. β.
majoranaefolius Gouan VII, 46.
micranthus Viv. VII, 13.
mollis Cav. VII, 23.
monspeliensis L. V, 1.
mutabilis Jacq. VII, 56.
myrtifolius Lam. VII, 25. γ.
nudifolius Lam. VII, 6.
nummularius Cav. VII, 24.
 - L. VII, 47. λ.
oblongifolius Guss. 4. δ.
 - Sweet 20.
obtusifolius Sweet 15. 20. δ.
ochroleucus DC. 15. γ.
ocymoides Lam. VI, 6.
oelandicus L. VII, 25.
 - Jcq. VII, 26. γ.
oleaefolius Mill. V, 1.
oligophyllum Clark VII, 66.
organifolius Lam. VII, 22.
ovatus Viv. VII, 47. λ.
paniculatus Jan VII, 27.
parviflorus Lam. 9. γ.
peduncularis Presl 4. ε.
piloselloides Lap. VII, 25. γ.

Cistus pilosus L. VII, 59.
platysepalus Sweet 21. β.
polifolius Lam. VII, 58. γ.
 - L. VII, 58.
polyanthos Dsf. VII, 33.
populifolius L. 17.
Pouzolzii DC. 6.
psilosepalus Sweet 21. γ.
pulverulentus Pourr. VII, 58. γ.
purpureus Lam. 1.
racemosus Cav. VII, 39. δ.
 - L. VII, 55.
roseus All. VII, 50.
 - Jcq. VII, 53.
 - Tausch 12.
rotundifolius Sweet 4. ζ.
rufocomus Viv. VII, 15.
salvifolius L. 15.
 - β. *humifusus* DC. 18.
sampsucifolius Cav. VI, 6.
Savii Bert. VII, 1. β.
scabrosus Ait. VI, 9. γ.
Seguieri Crntz. VII, 25. δ.
sericeus Mumby VI, 2.
 - Vahl 10.
serpyllifolius Crntz. VII, 47. ε.
 - Krock. 47. ζ.
 - L. VII, 47. ν.
sessiliflorus Dsf. VII, 17.
Sideritis Presl 15.
splendens Lam. VII, 47. ε.
squamatus L. VII, 37.
stenophyllus Lk. 24. et VI. 1.
stipulatus β. Forsk. VII, 12.
stoechadifolius Brot. VII, 39. β.
 - Hort. VII, 47. δ.
strictus Cav. VII, 55. δ.
surrejanus L. VII, 47. ι.
symphytifolius Lam. 14.
syriacus Jacq. VII, 39. γ.
syrticus Viv. VII, 9.
tauricus Presl 3 γ.
thymifolius L. VII, 8. γ.
tomentosus eng. bot. VII, 47.
 - Lam. 7.
 - Scop. VII, 25. ε. 47. ζ.
umbellatus L. VI, 4.
undulatus Lk 22.
 - Dun. 3.
vaginatus Ait. 14.
verticillatus Brot. VI, 4. β.
villosus L. 4. ζ.
 - Savi 4.
vinealis Willd. VII, 25. ε.
violaceus Cav. VII, 59. γ.
virgatus Dsf. VII, 57.
viscosissimus Tausch 13.
vulgaris Spach 2. 3. 4. 7.
Crocanthemum brasiliense Spach VII, 68.
Eichwaldia Led. XVIII.
oxiana Led. 1.
Flacourtia l'Her. X.
cataphracta Rxb. 4.
racemosa Presl 2.
sapida Rxb. 1.
sepiaria Rxb. 3.

Frankenia L. XIX.
Aucheri Jaub. et Sp. 1.
capitata B. Webb et Berth. 4.
corymbosa Dsf. 2.
hirsuta Bieb. 3.
 - L. 4.
hispida DC. 3.
intermedia DC. 4.
Nothria Thunb. 4.
revoluta Forsk. 2.
Fumana arabica Spach VII, 1.
grandiflora Jaub. et Sp. VII, 10.
laevipes Spach VII, 2.
procumbens G. et Gr. VII, 3.
Spachii G. et Gr. VII, 5.
viscida L. VII, 7. 8.
vulgaris Sp. VII, 4. 6.
Halimium Spach VI.
alyssoides C. Koch 9.
atriplicifolium Spach 7.
calycinum C. Koch 5.
cheiranthoides C. Koch 11.
Clusii Spach 1.
coriaceum C. Koch 15.
formosum C. Koch 10.
heterophyllum Spach 6.
lepidotum Spach 8.
pomeridianum C. Koch 14.
rosmarinifolium Spach 3.
sericeum C. Koch 2.
syriacum C. Koch 13.
ternifolium C. Koch 12.
umbellatum Spach 4.
Helianthemum Gaertn. VII.
acuminatum Pers. 47. β.
albidum DC. 28. β.
albiflorum Boiss. 43. β.
algarvensis Dun. VI, 6 β.
Allionii Tin. 30.
alpestre Poll. Sw. 26. γ.
alyssoides Vent. VI, 9.
Andersoni Sweet 43. γ.
angustifolium Pers. 47. δ.
apenninum Schlecht. 47. γ.
 - Sweet 58. β.
arabicum Pers. 1.
arcuatum Presl 47. λ.
 - Ten. 43.
asperum Lag. 54.
astylum Moq. Sess. 70.
atriplicifolium W. VI, 7.
aureum Pers. 46. γ.
baeticum Lag. 46.
barbatum Pers. 47. μ.
Barrelieri Ten. 8. γ.
Berteroanum Bert. 51.
bicolor Presl 43. δ.
brasiliense Pers. 68.
Broussonetii Dun. 38.
Cahiricum Del. 12.
calcareum Jord. 18.
calycinum Pers. 6. β.
 - Dun. VI, 5.
canariense Pers. 20.
candidissimum DC. 26. δ.
canescens Mnch. 20.

Helianthemum canescens Sweet 56. β.
 canum Dun. 25. γ.
 Caput felis Boiss. 40.
 carneum Lag. 53. β.
 cheiranthoides Pers. VI, 11.
 ciliatum Moris 42.
 - Pers. 54.
 cinereum Pers. 36.
 cistifolium Mill. 47. μ.
 Clusii Dun. VI, 1.
 confertum Dun. 20. β.
 confusum Sweet 47. γ.
 coriaceum Pers. VI, 15.
 corymbosum Mich. 75.
 crassifolium Pers. 65.
 croceum Pers. 43.
 cupreum Sweet 64.
 dichotomum Pers. 22. β.
 dichroum Kze. 31.
 distachyum Mneh. 21.
 diversifolium Sweet 56. γ.
 echioides Pers. 25. δ.
 ellipticum Pers. 17. β.
 elongatum Pers. VI, 8. β.
 ericoides Dun. 6.
 eriosepalon Sweet 26. 43. ε.
 farinosum Sweet 55. β.
 foetidum Pers. 50.
 formosum Dun. VI, 10.
 Fumana Mill. 4.
 - Presl 6. β.
 - γ. procumbens Camb. 3.
 fumanoides Dsf. 4. β.
 germanicum Mill. 47.
 glaucum Pers. 43. ζ.
 - Sweet 20.
 glomeratum Lag. 74.
 glutinosum Pers. 8.
 gorgoneum Webb 19.
 gracile Ten. 3. β.
 grandiflorum Pers. 47. ζ.
 halimifolium Pers. VI, 8.
 heterophyllum Steud. VI, 6.
 hirsutum Dun. 47. η.
 hirtum Pers. 46.
 hispidum Dun. 46. β.
 hyssopifolium Ten. 47. θ. 64.
 Jaubertii C. Koch 10.
 ibericum Dsf. 1.
 incanum Mneh 58.
 intermedium Guss. 43. η.
 involucratum Pers. VI, 11. β.
 italicum Pers. 26.
 - Ten. 25. γ.
 juniperinum Lag. 8. β.
 Kahircicum Del. 12.
 laeve Pers. 7.
 laevipes Pers. 2.
 Lagascae Dun. 46.
 lanceolatum Sweet 55. γ.
 lanuginosum Spr. 14.
 lasianthum Pers. VI, 11. γ.
 lavandulaefolium Pers. 39.
 - Sieb. 16.
 - Ten. 48.
Ledum Zeyh. IV, 22.

Helianthemum leptophyllum Dun. 47. δ.
 Libanotis W. VI, 3.
 lignosum Sweet 67.
 lineare Pers. 59. β.
 linearifolium Mneh 59. β.
 Lippii Pers. 16.
 - Ten. 1. β.
 lucidum Horn. 47. ε.
 lunulatum DC. 29.
 luteum Rehb. 41. β.
 lusitanicum Mill. 58.
 macranthum Sweet 63. γ.
 majoranaefolium DC. 46. β.
 marifolium DC. 25. γ.
 - Dun. 22. γ.
 - G. et Gr. 22.
 - Pers. 25. γ.
 mexicanum Steud. 73.
 microphyllum Sweet VI, 6. γ.
 micranthum G. et Gr. 26. ε.
 - Spr. 13.
 Milleri Sweet 64. δ.
 molle Pers. 23.
 Morisianum Bert. 42.
 mucronatum Dun. 20. γ.
 multiflorum Salzm. VI, 8. γ.
 mutabile Pers. 56.
 nebrodense Heldr. 28.
 nitidum Clem. 62.
 nudicaule Dun. 43. θ.
 nummularium Pers. 47. λ.
 - Guss. 27. b.
 obovatum Moq. Sess. 72.
 obovatum Dun. 26. ε.
 obscurum Pers. 47. μ.
 oeymoides Pers. VI, 6.
 oelandicum DC. 26.
 - Wahlenb. 25.
 - ε. marifolium Gris. 26. β.
 - δ. scardicum Gris. 26. δ.
 oligophyllum DC. 66.
 organifolium Pers. 22.
 ovatum Dun. 47. λ.
 pallens Kit. 49.
 paniculatum Dun. 27.
 penicillatum Thib. 26. ε.
 pannosum Boiss. 35.
 piliferum Boiss. 39. δ.
 - Gm. 53. δ.
 piloselloides DC. 25. γ.
 pilosum Bert. 58.
 - Pers. 59.
 polifolium Pers. 58.
 polyanthos Pers. 33.
 polygalaeefolium Sweet 69.
 pomeridianum Dun. VI, 14.
 procumbens Dun. 3.
 pubescens Ten. 6. γ.
 pulchellum Sweet 25. ε.
 pulverulentum Pers. 58. γ.
 racemosum Benth. 39. δ.
 - Dun. 59.
 - Pers. 55.
 rhodanthum Colla 51.
 - Dun. 53.
Rhodax Steud. 25.

- Helianthemum roseum* Mill. 52.
roseum Pers. 50.
 - Sweet 56. z.
rosmarinifolium Lag. VI, 3.
 - Presl 16.
rotundifolium Dun. 24.
rubellum Presl 24. β.
rufoomum Spr. 15.
rugosum Dun. VI, 9. β.
 - Sweet VI, 6. δ.
Savii Bert. 1. β.
scabrosum Pers. VI, 9. γ.
Seguieri Poll. 47. ζ.
semiglabrum Bad. 41.
 - Moris 42.
serpyllifolium Mill. 47. v.
Serrae Camb. 32.
sessiliflorum Pers. 17.
Sherardi Steud. 52.
siculum Tin. 45.
songaricum Schrenk 60.
Spachii C. Koch 5.
squamatum Pers. 37.
Stabianum Ten. 48.
stellatum Guss. 44.
stoechadifolium Pers. 39. β.
 - Hort.
stramineum Sweet 63. β.
strictum Pers. 55. δ.
suffruticosum Boiss. 43. u.
sulphureum Willd. 63.
surrejanum Mill. 47. t.
syriacum Boiss. VI, 13.
 - DC. 39. γ.
syrticum Spr. 9.
tauricum Sweet 47. ζ.
ternifolium Colm. et Willk. VI, 12.
Thibaudii Pers. 39. δ.
thymifolium Pers. 8. γ.
tomentosum Dun. 47.
 - Guss. 43. z.
tripetalum Moq. Sess. 71.
umbellatum Mill. VI, 4.
 - Presl VI, 1. β.
variabile Spach 43. 47. 54. 55. 58. 59. 65.
variegatum Sweet 56. ζ.
velutinum Jord. 58. δ.
ventosum Boiss. 11.
venustum Sweet 56. β.
versicolor Sweet 56. β.
vesicarium Boiss. 61.
vineale Pers. 25. z.
violaceum Pers. 59. γ.
virgatum Pers. 57.
 - DC. 5. β.
viride Ten. 8. δ.
viscidulum Boiss. 34.
vulgare Gaertn. 47.
 - z. Bert. 43.
 - var. C. et D. Ten. 48.
- Heteromeris cynosa* Spach VII, 75.
 mexicana Spach VII, 73.
- Hisingera* Hellen. XI.
 japonica Walp. 1.
 racemosa S. et Z. 1.
- Holachne* Ehrenb. XVI.
- Hololachne songarica* Ehrenb. 1.
Hudsonia L. VIII.
 australis Spreng. VII, 68.
 cricoides L. 1.
 montana Nutt. 2.
 Nuttalii Sweet 1.
 tomentosa Nutt. 3.
- Hypericum alternifolium* Lab. XVII, 6.
Jonidium Vent. III.
 heterophyllum Vent. 1.
- Ladanium cyprium* Spach IV, 24.
 laurifolium Spach IV, 23.
 officinatum Spach 25.
- Ledonia heterophylla* Spach IV, 20.
 hirsuta Spach IV, 21.
 peduncularis Spach IV, 15.
 populifolia Spach IV, 17. 19.
- Myricaria* Desv. XIII.
 alopecuroides Schrenk 2.
 bracteata Royle 3.
 brevifolia Turcz. 7.
 dahurica Ehrenb. 6.
 elegans Royle 8.
 germanica Dsv. 4.
 herbacea Dsv. 5.
 linearifolia Dsv. 1.
 longifolia Ehrenb. 1.
 macrostachya Kar. et Kir. 2.
 macrophylla Bge. 6. β.
 squamosa Desv. 6.
 - Rehb. 5. γ.
 vaginata Dsv. XIV, 3.
- Noisetia* H. B. et K. I.
 acuminata DC. 1.
- Nothria repens* Berger. XIX, 4.
- Phoberos* Lour. IX.
 chinensis Lour. 1.
- Reaumuria* L. XVII.
 Billardieri Jaub. et Sp. 6.
 cistoides Adam 4.
 filifolia Jaub. et Sp. 1.
 hypericoides Eichw. 5.
 - Jcq. 4.
 - Lam. 6.
 hyrcanica Jaub. et Sp. 3.
 linifolia Salisb. 4.
 palaestina Boiss. 2.
 squarrosa Jaub. et Sp. 7.
 tatarica Jaub. et Sp. 5.
 vermiculata Bieb. 4.
 - (L.) Guss. 8.
- Rhodax Chamæcistus* Spach VII, 25.
 montanus Spach VII 23. 26. 27. 30.
 organifolius Spach VII, 22.
 polyanthus Spach VII, 33.
- Rhodocistus Bertholetianus* Spach IV, 14.
- Solea heterophylla* Spr. III, 1.
- Stephanocarpus* Spach V.
 monspehiensis Spach 1.
- Taeniostemma micranthum* Spach VII, 74.
- Tamariscus decandra* Munch. XIII, 4.
 gallicus All. XV, 5.
 germanicus All. XIII, 4.
 pentandra Munch. XV, 5.
- Tamarix* L. XV.
 africana Poir. 4.

Tamarix amplexicaulis Ehrenb. 1.
anglica Webb 6.
angustifolia Led. 20.
arborea Sieb. 5. β .
articulata Vahl 15.
 - Wall. 17.
 - W. 22. γ .
canariensis W. 5. γ .
canescens Dsv. 10.
chinensis Lour. 18.
cupressiformis Led. 19.
dahurica W. XIII, 6.
decandra Pall. XIII, 1. β . 5.
deserti Boiss. 28.
dioica Rth. 17.
effusa Ehrenb. 3.
elegans Spach 13.
elongata Led. 21.
epacrioides Sm. 14.
ericoides Rottl. XIV, 3.
Furas Royle 16.
gallica Bess. 22.
 - Bieb. 8.
 - engl. bot. 6.
 - L. 5.
 - Thunb. 18.
 - Ueria 4.
 - b. *chinensis* Ehrenb. 18.
 - d. *indica* Ehrenb. 14.
 - γ . *africana* W. 4.
 - β . *pycnostachys* Led. 8.
 - γ . *micrantha* Led. 9.
germanica L. XIII, 4.
 - Pall. XIII, 1. β .
 - β . W. XIII, 5.
gracilis Willd. 11.
Hampeana Boiss. et Heldr. 26.
hispida W. 10.

Tamarix indica Hort. 13.
 - - Koen. 15.
 - - Willd. 14.
juniperina Bge. 12.
laxa W. 23.
libanotica Hort. 5. ϵ .
longifolia W. XIII, 1.
Meyeri Boiss. 27.
mucronata Sm. XIV, 3.
orientalis Forsk. 15.
Pallasii C. A. Mey. 5.
 - Desv. 8.
parviflora DC. 25.
passerinoides Del. 2.
pentandra Pall. 8.
 - var. Pall. 10.
Pharos Ham. 16.
pyncocarpa DC. XIV, 1.
polystachya Led. 24.
ramosissima Led. 9.
senegalensis DC. 5.
songarica Pall. XVI, 1.
taurica Pall. 22. β .
tenacissima Ham. XIV, 3.
tetragyna C. A. Mey. 27.
 - Ehrenb. 7.
tetrandra Pall. 22.
 - β . *brevifolia* Gris. 25.
tomentosa Sm. 10.
Thuja aphylla L. XV, 22. γ .
Trichaurus Arn. XIV.
Aucherianus Dne. 2.
ericoides Walk. and Arn. 3.
pyncocarpus Dne. 1.
vaginatus Walp. 3.
Viola L. II.
arborescens L. 1.
heterophylla Poir. III, 1.

ORDO IV.

Isómerae.

Fam. 16. Ampelidæ.

I. *Vitis* L.

(Vitis apud Latinos Weinstock.)

A. Folia simplicia; Flores hermaphroditi.

- * 1. § *vinifera* L. cod. Nro. 1639. Sponte in Colchide et Ponto.
- * *sylvestris* Heg. et H. Fl. d. Schw. 250.
- * β) *sativa* DC.
- * γ) *apyréna* Hort.
- * δ) *laciniósa* L. cod. Nro. 1644.
- * *apiifolia* Hort.
- * ε) *foliis incanis* Loud. arbor. brit. I, 478.
- * ζ) - *rubescéntibus* Loud. arbor. brit. I, 478.
- 2. § *dentata* Lk. enum. pl. hort. Berol. I, 236. Nepal.
- 3. § *Wallichii* DC. prodr. I, 634. Nepal.
- 4. § *Purani* Ham. in Don prodr. fl. nep. 188. Nepal.
- 5. § *flexuosa* Thunb. in transact. of the Linn. soc. II, 332. Japonia.
- * *indica* Thunb. fl. jap. 103.
- 6. § *Kaempferi* C. Koch. Japonia.
- * *Labrusca* Thunb. fl. jap. 103.
- 7. § *rugosa* Wall. in Roxb. fl. ind. II, 480. Nepal.
- 8. § *parviflora* Roxb. fl. ind. II, 475. Nepal.
- 9. § *bryoniaefolia* Bge. in mém. d. sav. étrang. de St. Pét. II, 86. Mongolia.

B. Folia simplicia; Flores polygamæ aut dioecæ.

- 10. § *caribæa* DC. prodr. I, 634. India occid., California.
- * *indica* Swartz observ. bot. 95.
- 11. § *rupestris* Scheele in Linn. XXI, 591. Texas.
- * 12. § *Labrusca* L. cod. Nro. 1641. Jacq. hort. Schoenbr. IV, t. 426. America borealis.
- * *taurina* Walt. fl. carol. 242.
- * β) *blanda* G. Don dichl. pl. I, 711.
- * γ) *Catawba* Hort.
- * δ) *Isabella* Hort.
- * 13. § *aestivális* Mich. fl. bor. amer. II, 230. Jacq. hort. America foederata
- * *Schoenbr. t. 425.* media et australls.
- * *vinifera americana* Marsh. arbust. amer. 165.
- * *intermédia* Muehlenb. cat. pl. amer. sept. 26.
- * ? *palmata* Vahl symb. bot. III, 42.
- * *Labrusca* Walt. fl. carol. 243. (teste Mich.)
- * β) *sinuata* Pursh fl. amer. sept. I, 169.
- * 14. § *cordifolia* Mich. fl. bor. amer. II, 231. America borealis.
- * *vulpina* (L.) Torr. fl. of the north. and middle sect. of the Un. st. I, 264.
- * *incisa* Jacq. hort. Schoenbr. t. 427.
- * 15. § *riparia* Mich. fl. bor. amer. II, 231. bot. mag. t. 2429. America brit. et foed.
- * *odoratissima* Donn catal. pl. hort. Cantabr. 66. bor. atque media.

- * 16. § *vulpina* L. cod. Nro. 1642. Jacq. hort. Schoenbr. t. 425. *America foederata.*
rotundifolia Mich. fl. bor. amer. II, 231.
 17. § *virginiana* Poir. in enc. méth. VIII, 608. *Virginia.*
 18. § *ficifolia* Bge. in mém. d. sav. étrang. de St. Pét. II, 86. *Mongolia, Japonia.*
 β) Thunbergii S. et Z. Abh. d. baier. Ac. IV, 2. 198.
- C. *Folia ternata aut quinata.*
19. § *semicordata* Wall. in Roxb. fl. ind. II, 481. *Nepal.*
- D. *Incertae sedis.*
- * 20. § *obtecta* Wall. num. list. *Nepal.*
 ? *nepalensis* Hort.
21. § *macrophylla* Royle ill. of the him. mount. 145. *Himalaya.*
 * 22. § *Longi* Hort. *Patria ignota.*
 23. § *Solonis* Hort. *Patria ignota.*

II. *Ampelopsis* Mich.

(ἀμπέλος, vitis, Weinstock et ὄψις, visus, Ansehen.)

A. *Folia simplicia.*

- * 1. § *cordata* Mich. fl. bor. amer. I, 159. *America foederata*
Cissus Ampelopsis Pers. syn. pl. I, 142. *media et australis.*
Vitis indivisa Willd. berl. Baumz. 538.
 2. § *humulifolia* Bge. in mém. d. sav. étrang. de St. Pét. II, 86. *Mongolia, Japonia.*
 * β) *heterophylla* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. IV, 2. 197.
Vitis heterophylla Thb. fl. jap. 103.
 3. § *tricuspidata* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 196. *Japonia.*
- B. *Folia ternata aut quinata.*
4. § *incisa* Nutt. in Torr. and Gr. fl. of N. Amer. I, 243. *Texas, Arkansas.*
 * 5. § *quinquefolia* Mich. fl. bor. amer. I, 160. *America borealis.*
hederacea DC. prodr. I, 633.
Cissus hederacea Pers. syn. pl. I, 143.
 - *quinquefolia* Dsf. hort. Paris.
Hédera quinquefolia L. cod. Nro. 1638.
Vitis hederacea Ehrh. Beitr. VI, 85.
 - *quinquefolia* Mnch. meth. 76.
 * β) *hirsuta* Donn cat. pl. hort. Cantabr. 166.
6. § *aconitifolia* Bge. in mém. d. sav. étr. de St. Pét. II, 86. *Mongolia.*
 7. § *serjaniaefolia* Bge. in mém. d. sav. étr. de St. Pét. II, 86. *Mongolia.*
 8. § *latifolia* Tausch Flora XXI, 738. *Mongolia.*
 9. § *himalayana* Royle ill. of the him. mount. 149. *Himalaya.*

C. *Folia pinnata aut bipinnata.*

- * 10. § *bipinnata* Mich. fl. bor. am. I, 160. *America foederata*
Cissus bipinnata Ell. sk. of the bot. of S. Car. I, 304. *media et australis.*
 - *stans* Pers. syn. pl. I, 143.
Hédera arborea Walt. fl. carol. 102.
Vitis arborea W. sp. pl. I, 1183. (an L. cod. Nro. 1646?)
 - *bipinnata* Torr. and Gr. fl. of N. Amer. I, 243.
11. § *cantoniensis* C. Koch. *China (Canton).*
Cissus cantoniensis Hook. and Arn. the bot. of Beech. voy. 175.

III. *Cissus* L.

(κισσός, apud Craecos hederá, Epheu.)

A. *Folia simplicia, interdum terna.*

1. § *repens* Lam. enc. méth. I, 31. *India orientalis, Nepal.*
Vitis repens W. et Arn. prodr. fl. pen. Ind. or. I, 125.
 - *glauca* Wall. num. list. 5990.
2. § *vitifolia* Boiss. diagn. pl. orient. nov. VI, 31. *Persia australis.*
 3. § *rosea* Royle ill. of the him. mount. t. 26. f. 1. *Himalaya.*
Vitis rosea Royle ill. of the him. mount. 149.
4. § *aegirophylla* Bge. in Arb. d. naturf. Ver. in Rig. I, 193. *China (Canton).*
 5. § *umbellata* Lour. fl. coch. I, 106. *Japonia.*
 6. § *Thunbergii* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. IV, 2. 195.

B. Folia palmato-3—9na.

7. § *vitiifolia* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 196. Japonia.
 β) *integra* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 196.
 8. § *pentaphylla* W. sp. pl. 1, 659. Japonia.
Vitis filiformis Lam. (teste Steud. nec in enc. méth.)
 - *pentaphylla* Thunb. fl. jap. 105.

C. Folia pedato-5—9na.

9. § *japonica* Willd. sp. pl. 1, 659. Japonia.
Vitis japonica Thunb. fl. jap. 104.
 10. § *nepalensis* (nipaulensis) DC. prodr. 1, 632. Nepal.
cymosa Steud. nom. bot. ed. 2. 1, 372.
Vitis cymosa Wall. num. list. 6017. (teste W. et Arn.)
 11. § *lanceolaria* Roxb. fl. ind. 1, 412. India orientalis, Nepal.
Vitis lanceolaria Wall. num. list. 6015.
 12. § *capreolata* Don fl. nep. 188. Nepal.
Vitis capreolata Royle ill. of the him. mount. 149.
 - *hederacea* Wall. num. list. Nro. 6019 b.

D. Folia pinnata aut bipinnata.

13. § *pinnata* Russ. nat. hist. of Aleppo II, 267. Syria septentr.
 14. § *orientalis* Lam. illustr. d. genr. 332. t. 84. f. 2. Oriens.
Praeterea Cissus araliaefolia Hort., nobis non satis nota, in horto nostro dendr. colitur.

IV. *Leea* L.

(James Lee, horti et arboreti fundamenta in pago Hammersmith jecit.)

1. 5 *aspera* Wall. in G. Don dichlam. pl. 1, 713. Nepal, Himalaya.
 2. 5 *rubra* Blume bijdr. 197. Java, Himalaya.

Fam. 17. *Tiliaceae*.Trib. 1. *Elaeocarpeae* (Petala incisa aut fimbriata).V. *Elaeocarpus* L.

(έλαιον, oleum, Oel et καρπος, fructus, Frucht.)

1. § *photiniaefolius* Hook. and Arn. bot. of Beech. voy. 259. t. 53. China, Japonia.
 2. § *japonicus* S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 165. Japonia.
 3. § *Zollingéri* C. Koch. Japonia.
japonicus Zoll. et Cum. in Bull. de la soc. d. natur. de Mosc. XIX, 492.
 4. § *dioicus* Zoll. et Cum. in Bull. de la soc. d. nat. de Mosc. XIX, 493. Japonia.

Trib. 2. *Grewiaceae* (Petala integra).VI. *Corchoropsis* S. et Z.

(κορχορος, *Corchorus olitorius* et όψις, visus, Ansehen.)

1. ♀ *crenata* S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. III, 738. t. 4. f. 1. Japonia.

VII. *Corchorus* L.

(κορχορος, apud Graecos sine dubio *Corchorus olitorius* L.)

1. 5 *tomentosus* Thunb. fl. jap. 228. Japonia.
 2. § *scandens* Thunb. in transact. of the Linn. soc. II, 335. Japonia.
 3. 5 *serratus* Thunb. in transact. of the Linn. soc. II, 335. Japonia.
 4. 5 *flexuosus* Thunb. in transact. of the Linn. soc. II, 335. Japonia.

VIII. *Héptaca* Lour.

(ήπταχη, septifariam, siebenreihig, ob baccam in 7 locula divisam.)

1. § *latifolia* Gardn. et Ch. in Journ. of bot. Kew. a. gard. misc. 1, 245. China (Hongkong).

IX. *Grewia*.

(Nebem. Grew, phytotomiae prof. Londini, autor operis gravissimi: anatomy of plants, † 1711.)

A. *Microcos* (Flores involucreti).

1. 5 *ulmifolia* Roxb. fl. ind. II, 591. Wight ic. pl. I, t. 84. India orientalis, China.
Microcos W. Arn. prodr. fl. penins. Ind. orient. 81. (excl. syn.)

B. *Eugrewia* (Flores nudi).

2. 5 *nitida* Juss. in ann. du Mus. IV, 90. t. 47. f. 2.
 3. 5 *pumila* Ham. in Don prodr. fl. nep. 227.
 sapida Rxb. fl. ind. II, 590. (teste Royle.)
 4. 5 *oppositifolia* Buch. in DC. prodr. I, 509.
 5. 5 *biloba* G. Don dichl. pl. I, 549.
 6. 5 *parviflora* Bge. in mém. d. étr. de St. Pét. II, 83.
 7. 5 *elastica* Royle ill. of the him. mount. 104.
 8. 5 *scleorophylla* (nec scabrophylla) Rxb. fl. ind. II, 585.
 9. 5 *didyma* Rxb. fl. ind. II, 591.

China.
 India orientalis, Nepal.
 Himalaya, Nepal.
 China.
 Mongolia.
 Himalaya.
 India orient, Himalaya.
 Himalaya, India orient

X. *Tilia* L.

(Tilia jam apud Veteres Linde.)

A. *Staminodia nulla; Stamina petalis longiora.*

- * 1. 5 *ulmifolia* Scop. fl. carn. I, 374. (a. 1772.)
 communis α. Spenn. fl. Friburg. III, 875.
 europaea L. cod. Nro. 3870. γ. et δ.
 microphylla Loud. arb. brit. I, 364.
 - Vent. monogr. du genre till. 4. t. 1. f. 1. (a. 1802.)
 parvifolia Ehrh. Beitr. z. Naturk. V, 159. (a. 1794.) Hayn. Arzn. Gew. III, t. 46.
 - α. *polyantha* Koch in Flora XXIV, 523.
 sylvestris Desf. cat. pl. hort. Paris. 152. (a. 1805.)
 β) *ovalifolia* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 2. 331.
 γ) *rotundifolia* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 2. 331.
 δ) *caucasica* C. Koch in Linn. XV, 713.
 e) fol. varieg.
 * 2. 5 *vulgaris* Hayn. Arzn. Gew. III, t. 47.
 communis β. *intermedia* Spenn. fl. Friburg. III, 878.
 europaea Sm. br. fl. III, 17. engl. bot. t. 810.
 - ζ. *bohemica* L. cod. Nro. 3870.
 - 1. *borealis* Wahlenb. fl. Ups. 181. fl. dan. t. 553.
 intermedia DC. prodr. I, 513.
 parvifolia β. *intermedia* Koch in Flora XXIV, 523.
 β) *hybrida* Bechst. Forstbot. 5. Aufl. 161.
 γ) *multicostata* Peterm. fl. Lips. exc. 394.
 * 3. 5 *vitifolia* Host. fl. austr. II, 59. Reich. icon. bot. t. 319. f. 5140. Hungaria.
 grandifolia f. *laciniata* Ortm. in Flora XVIII, 502.
 * 4. 5 *rubra* DC. cat. pl. hort. Monsp. 150. Krim, isthmus caucas.
 corinthiaca Bosc. in nouv. cours d'agric. XIII, 139.
 europaea β. *corallina* Ait. hort. Kew. ed. 1. II, 229.
 - β. *rubra* Sibth. fl. Oxon. 166.
 grandifolia e. *rubella* Ortm. in Flora XVIII, 502.
 - β. Sm. engl. fl. III, 19.
 platyphylla C. A. Mey. Verz. kauk. Pfl. 224.
 triflora Puer. in Horn. cat. pl. hort. Hafn. 493.
 * 5. 5 *multiflora* Led. fl. ross. I, 442. Colchis.
 * 6. 5 *dasystyla* Stev. in Bull. de la soc. de nat. de Mosc. IV, 260. Krim, Transcaucasia.
 europaea 8. *dasystyla* Loud. arb. brit. I. 366.
 platyphylla Bieb. fl. taur. cauc. II, 6.
 7. 5 *platyphyllos* Scop. fl. carn. I, 373. Europa (Scandinavia
 communis γ. *grandifolia* Spenn. fl. Frib. III, 878. excepta).
 cordata Mill. dict.
 cordifolia Bess. prim. fl. galic. I, 343.
 corylifolia Host. fl. austr. II, 59.
 europaea L. cod. Nro. 3870. β. ε.
 - *platyphylla* Loud. arbor. brit. I, 365.
 grandifolia Ehrh. Beitr. z. Naturk. V, 158. engl. bot. t. 2720.
 hollandica Hort.
 mollis Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 2. 331.
 pauciflora Hayne Arzn. Gew. III. t. 48.
 β) *affinis* Opiz Natur. Tausch 461.
 tenuifolia Host fl. austr. II, 61.
 γ) *angulata* Ortm. in Flora XVIII, 503.
 Preslei Ortm. in Opiz nomencl. bot. 24.
 pyramidalis Host fl. austr. II, 61.

- δ) *asplenifolia* Hort.
 ε) *aurea* Loud. arbor. brit. I, 366.
 ζ) *brévipes* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 2. 338.
 η) *corymbosa* Ortm. in Opiz nomencl. bot. 25.
 praecox Host fl. austr. II, 60.
 θ) *foliis variegatis*.
 ι) *laciniata* Loud. arb. brit. I, 366.
 κ) *leptolépis* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 2. 338.
 λ) *longepedunculata* Spach. in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 2. 338.
 μ) *mollis* Ortm. in Opiz nom. bot. 22.
 ν) *nítida* Ortm. in Flora XVIII, 501.
 obliqua Host fl. austr. II, 62.
 ξ) *ovata* Ortm. in Flora XVIII, 502.
 ο) *obliqua* Ortm. in Flora XVIII, 501.
 latebracteata Host fl. austr. II, 60.
 obliquifolia Ortm. in Opiz nom. bot. 24.
 π) *péndula* Hort.
 ρ) *pluriflora* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 2. 337.
 σ) *retusa* Ortm. in Flora XVIII, 504.
 mutabilis Host fl. austr. II, 60.

8. 5 *lánguida* Hffmssgg. 2. u. 3. Nachtr. zu d. Verz. 220.

Patria ignota.

B. *Staminodia*; Gemm. parvae; Fol. subtus glabra aut pubescentia.

- * 9. 5 *tomentosa* Mch. Verz. ausl. Bäume u. Str. d. Lustschl.
 Weiss. 136. (a. 1785.) *Europa australi-orient.*
 alba W. et K. pl. rar. Hung. I. t. 3. (a. 1802.) *Podolia.*
 americana Duroi Harbk. Baumz. 1. Aufl. II, 467. (teste Loud.)
 argentea Dsf. cat. pl. hort. Paris. 150. (a. 1805.)
 communis ζ. *argentea* Spenn. fl. Friburg. III, 880.
 pannónica Jacq. (ubi?)
 rotundifolia Vent. monogr. du genre till. 13. t. 4. (a. 1802.)
 β) *petiolaris* DC. prodr. I, 514.
 γ) *virescens* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 2. 344.
 * 10. 5 *flava* Wolny in Rehb. fl. exc. 831. *Hungaria.*
 * 11. 5 *pubescens* Ait. hort. Kew. ed. 2. III, 299. Vent. mon. du
 g. till. 10. t. 3. *America foeder. austr.*
 americana Wengenb. Beitr. z. deutsch. Forstw. amer. Hoelz. 55.
 americana 3. *pubescens* Loud. arb. brit. I, 374.
 communis α. *pubescens* Spenn. fl. Friburg. III, 880.
 truncata Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 2. 342.
 * 12. 5 *laxiflora* Mich. fl. bor. amer. I, 306. *America foeder. austr.*
 americana 2. *laxiflora* et 4. *pubescens leptophylla* Loud.
 arb. brit. I, 375.
 Mississippiensis Dsf. cat. pl. hort. Paris.
 pubescens β. *leptophylla* Vent. mon. du g. till. 11.
 * 13. 5 *heterophylla* Vent. mon. du g. till. 16. t. 5. *America foederata.*
 americana Duroi Harbk. Baumz. 1. Aufl. II, 467.
 - 5. *heterophylla* Loud. arb. brit. I, 375.
 communis γ. *heterophylla* Spenn. fl. Friburg. III, 881.
 macrophylla Hort.
 * 14. 5 *alba* Mich. hist. d. arbr. for. de l'Amer. sept. III, 315. t. 2. *America foed. sept.*
 laxiflora Pursh fl. Am. sept. II, 363. *et media.*
 C. *Staminodia*; Gemm. magnae, lucidae; Fol. subtus pilis sellatis vestita.
- * 15. 5 *neglecta* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 2. 341. *America foederata.*
 * 16. 5 *americana* L. cod. Nro. 3871. Mich. hist. d. arbr. for. de
 l'Amer. sept. II, 233. t. 131. *America borealis.*
 canadensis Mich. fl. bor. amer. I, 306.
 caroliniana Wengenb. Beitr. z. deutsch. Forstw. amer. Hoelz. 56.
 communis δ. *glabra* Spenn. fl. Frib. III, 879.
 glabra Vent. mon. du genre till. I. t. I. f. I.
 hollandica Duroi.
 β) *laxiflora* W. sp. pl. (teste Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 340.)
 Mississippiensis Bosc. in nouv. cours d'agric.
 γ) *nigra* Borkh. Handb. d. Forstbot. II, 1219.
17. 5 *flavescens* A. Braun in bot. Zeit. I, 566. *Patria ignota.*

18. ♂ floribunda A. Braun in bot. Zeit. I, 586.
 19. ♂ praecox A. Braun in bot. Zeit. I, 586.
 corallina Hort. nonn.
 20. ♂ mexicana Schlecht. in Linn. XI, 377. Mexico.
 Not. Praeterea in horto nostro dendrologico species aut varietates, nobis non satis notae, coluntur: 1) apiculata, 2) begoniaefolia, 3) bicuspidata, 4) flaccida, 5) hybrida superba, 6) longidentata, 7) longifolia dentata, 8) macro-poda, 9) monstrosa, 10) oblongata, 11) platýptera, 12) serratifolia et 13) sphaerocarpa.

Fam. 18. Sterculiaceae.

XI. Sterculia L.

(stercus, Excremente, Koth, ob flores foliaque foetida.)

1. ♂ lanceolata Cav. monad. class. diss. V, 287. t. 143. f. 1. bot.
 reg. t. 1256. China, Cochinchina.
 Helicteres undulata Lour. fl. coch. 649.
 2. ♂ nobilis Smith in Rees cyclop. Nro. 4. China, India orientalis.
 Balanghas Roxb. fl. ind. III, 144.
 monosperma Vent. jard. de Malm. t. 91.
 Southwellia nobilis Salisb. parad. Londin. t. 69.
 3. ♂ angustifolia Rxb. fl. ind. III, 148. Nepal.
 Southwellia angustifolia Wight ill. of ind. bot. I, 77.
 4. ♂ peltata G. Don dichlam. pl. I, 517. China.

XII. Firmiana Marsili.

(Carolus, comes de Firmian, Archicancellarius austriacus in Longobardia c. 1770.)

- *1. ♂ platanifolia Schott et Endl. meletem. bot. 422. Japonia, China septent.
 Hibiscus simplex L. cod. Nro. 5083.
 Sterculia platanifolia L. fl. suppl. 423.
 - tomentosa Thunb. icon. pl. japon. 38.
 - pyriformis Bge. in mém. d. sav. étr. de St. Pét. II, 83.

XIII. Reevesia (nec Reveesia) Lindl.

(John Reeves, consul britannicus Cantoni in China, multas plantas chinenses introduxit.)

1. ♂ thyrsoides Lindl. bot. reg. t. 1236. China borealis.

XIV. Helicteres L.

(ἄλιοςτιν, volvere, drehen, ob carpella serius magis minusve torta.)

1. ♀ angustifolia L. cod. Nro. 6971. China (Canton), Java.
 virgata Wall. num. list. (teste Hook.)

Fam. 19. Buettneriaceae.

XV. Microchlaena (nec Microlaena Endl.) Wall.

(μικρος, parvus, klein et χλαίνα, tunica, hoc loco: involucrem, Hülle.)

1. ♂ spectabilis Wall. num. list. Nepal.
 Jackia spectabilis Spreng. syst. veget. III, 85.
 Wallichia spectabilis DC. in mém. du Mus. X, 104. t. 6.

XVI. Philippodendron Poit.

(i. e. arbor Philippi, Philippsbaum, ad honorem regis francog. Ludovici Philippi.)

1. ♂ regium Poiteau in ann. d. sc. nat. 2. sér. VIII, 2. 183. Nepal.

XVII. Melochia L.

(Melochisch apud Arabes Corchorum olitorum significat.)

1. ♀ pyramidata L. cod. Nro. 4923. Texas, Ind.occ., Brasilia.

Fam. 20. Malvaceae.

Trib. 1. Malveae (Calyx involucratu; Carpella libera).

XVIII. Lavatera L.

(nomen ascivit a Lavateris, medicis Tigurinis 17. et 18. saeculi.)

A. Axolopha (Receptaculum apice truncatum, in cristas expansum.)

1. ♀ oblongifolia Boiss. voy. d. le mid. de l'Esp. II, 111. t. 33. Hispania.

2. 5 *maritima* Gouan ill. et obs. bot. 46. t. 21. f. 2. Hispania, Gallia, Italia.
hispanica Mill. dict.
rotundifolia Lam. fl. franç. III, 138.
triloba Lapeyr. hist. abr. d. plant. d. Pyr. 397.
Olbia canescens Munch. meth. suppl. 290.
3. 5 *triloba* L. cod. Nro. 5063. bot. mag. t. 2226. Hispania, Sardinia.
calycina Poir. in enc. méth. suppl. III, 310.
moschata Mor. elench. stirp. sard. I, 9.
4. *h* *agrigenina* Tin. pl. rar. Sic. pug. 13. Italia.
flava Guss. in cat. pl. reg. hort. in Boccad. 1821, 36.
Olbia flava Presl fl. sic. I, 180.

B. *Stegia* (Receptaculum in discum ovaria tegentem *expansum*).

5. *h* *Pseudo-Olbia* Poir. enc. méth. suppl. III, 309. Patria ignota.
undulata Dsf. hist. d. arbr. et arbriss. I, 471.

C. *Olbia* (Receptaculum conicum).

6. 5 *hispidia* Dsf. fl. atl. II, 118. t. 171. Algeria, Italia, Hispania.
Olbia Poir. voy. en Barb. II, 204.
Olbia hispidia Presl fl. sic. I, 180.
7. 5 *africana* Cav. monad. class. diss. V, 282. t. 139. f. 1. Hispania, Morocco.
hispidia bot. mag. t. 2541.
β. africana W. sp. pl. III, 793.
- * 8. *h* *Olbia* L. cod. Nro. 5062. Rehb. icon. fl. Germ. V. t. 177. Italia, Gallia merid.
acutifolia Lam. fl. franç. III, 137.
thuringiaca All. fl. pedem. II, 42.
Olbia hastata Munch. méth. 613.
9. *h* *unguiculata* Dsf. hist. d. arbr. et arbriss. I, 471. Archipelagi graeci ins.
tomentosa Dum. Cours. bot. cult. 2. édit. V, 74.
10. 5 *micans* L. cod. Nro. 5061. Peninsula pyrenaica.
bryoniaefolia Mill. dict.
Olbia micans Munch. meth. 613.
11. 5 *lusitanica* L. cod. Nro. 5064. Peninsula pyrenaica.
undulata Mill. dict. Nro. 10.
septémloba Hoffm. 2. u. 3. Nachtr. zu d. Verz. II, 146.
12. *h* *pallescens* Mor. fl. sard. I, 301. Insulae Sardiniae prox.

D. *Anthema* (Receptaculum foveolatum, non exsertum).

- * 13. 5 *arborea* L. cod. Nro. 5060. Sm. engl. bot. t. 1841. (teste Afr. bor., penins. pyr.,
Guss., Mor., aliorumque semper basi frutescens. Italia, Britannia,
Anthema arborea Munch. méth. 612. ins. Canariensis.
Malva arborea Webb phyt. can. I, 30.

XIX. *Malva* L.

(μαλαχθη, malva, a verbo μαλασσειν, emolire, sine dubio derivanda.)

1. *h* *odorata* Westc. in the Bot. V. t. 218. Patria ignota.

XX. *Sphaeralcea* St. Hil.

(σφααιρα, globus, Kugel et Alcea, ob carpellorum dispositionem.)

1. 5 *abutiloides* G. Don dichl. pl. I, 465. Carolina,
Malva abutiloides L. cod. Nro. 5059. bot. mag. t. 2544. Insulae Bahamenses.
Phymosia abutiloides Dsv. in Ham. prodr. pl. Ind. occ. 50.

XXI. *Pavonia* Cav.

(Pavon et Ruiz, Hispani, cum Jos. Dombey Peruviam et Chill a. 1779—1789 permigrarunt.)

1. 5 *Drummondii* Torr. and Gr. fl. of N. Amer. I, 682. Texas.
2. 5 *lasiopétala* Scheele in Linn. XXI, 470. Texas.

XXII. *Uréna* L.

(Uren significat apud Malabaricae incolae Urenae speciem.)

1. *h* *lobata* L. cod. Nro. 5070. bot. mag. t. 1043. China, Cochinchina,
β) *tomentosa* Walp. in nov. act. acad. Caes. Leop. XIX, Manilla.
suppl. 1. 304.
2. *h* *procumbens* L. cod. Nro. 5073. China, Cochinchina.

Trib. 2. Hibisceae (Calyx involucreatus; Capsula).

XXIII. *Hibiscus* L.(ἵβισκος, hibiscus s. hibiscum, *Althaeum officinalem* sine dubio significat.)

- * 1. 5 *syriacus* L. cod. Nro. 5090. bot. mag. 83. Oriens, Japonia.
Ketmia syriaca Scop. fl. carn. II, 45.
 - *arborea* Mneh. meth. 617.
- β) flore rubro.
 • γ) flore albo.
 • δ) flore purpureo-pleno.
 • ε) flore albo-pleno.
 ζ) *marginatus*.
 η) *variegatus*.
2. 5 *acerifolius* Salisb. parad. Lond. t. 33. nec DC. China.
 Japonia.
3. 5 *Hamabó* S. et Z. fl. jap. I, 176. t. 93. China, Japonia (nec
 India orientalis
 teste Rxb.).
4. 5 *mutabilis* L. cod. Nro. 5087. Cav. monad. cl. diss. III. t. 63. f. 1.
sinensis Mill. dict. teste Rxb.).
Kotula mutabilis Mneh. meth. 617.
5. 5 *chinensis* DC. prodr. I, 455. ic. pl. sponte in Chin. nasc. e
 bibl. Braam. t. 24. China.
6. 5 *raemosus* Lindl. bot. reg. t. 917. Nepal.
7. 5 *Lampas* Cav. monad. cl. diss. III, 154. t. 56. f. 2. Nepal, India orientalis
Gangeticus Rxb. (teste G. Don.) c. ins.
Paritum Gangeticum G. Don diehl. pl. I, 485.
8. ♀ *denudatus* Benth. in bot. of Belch. voy. 7. t. 3. California.
9. 3 *tiliaceus* L. cod. Nro. 5082. Cav. cl. monad. diss. III, t. 55. f. 1. India orientalis, Java,
similis Blume bijdr. 75. China, Brasilia.
tiliaefolius Salisb. prodr. stirp. hort. Allert. 363.
tortuosus Wall. num. list. Nro. 1913.
Paritum simile G. Don diehl. pl. I, 485.
 - *tiliaceum* St. Hil. fl. bras. I, 156.

XXIV. *Malvaviscus* Cav.

(Malva, Melve, et viscus vel viscum hoc loco Leim; nomen jam ab Apulejo usurpatum.)

1. ♀ *floridanus* Nutt. in Journ. of the acad. Philad. VII, 89. Florida, Mexico.
 ? *penduliflorus* DC. prodr. I, 445.
2. 5 *Drummondii* T. and Gr. fl. of N. Amer. I, 230. Texas.

Trib. 3. Sideae (Calyx nudus).

XXV. *Malachra* L.

(apud Plinium arborem in Bactriana crescentem significat.)

1. ♀ *Uréna* DC. prodr. I, 441. China (Canton).
Urena polyflóra Lour. fl. coch. 508.
 - *Loureiroi* Meisn. (teste Steud.)

XXVI. *Abutilon* Kth.

(nomen est arabicum, quod Avicenna botanicae intulit.)

1. ♀ *cysticarpum* Hance pl. nov. austr. China. diagn. 10. China (Hongkong).
 2. ♀ *orbiculatum* G. Don diehl. pl. I, 504. China.
Sida orbiculata DC. prodr. I, 471.

XXVII. *Sida* Cav.

(σίδη, apud Graecos teste Spr. Nymphaea alba.)

1. ♀ *Stantoniana* DC. prodr. I, 460. China, India orientalis,
 ? *stipulata* var. Cavan. class. monad. diss. I, 23. ? Senegal.
lanceolata W. sp. pl. III, 736.
scoparia Lour. fl. coch. II, 504.
acuta Cav. cl. monad. diss. I, 15. t. 2. f. 3.
2. 5 *chinensis* Retz observ. bot. IV, 29. China.

INDEX.

- Abutilon** Kth. XXVI.
 cysticarpum Hance 1.
 orbiculatum G. Don 2.
Ampelopsis Mich. II.
 aeonitifolia Bge 6.
 bipinnata Mich. 10.
 cantoniensis C. Koch. 11.
 cordata Mich. 1.
 hederacea DC. 5.
 heterophylla S. et Z. 2. β.
 himalayana Royle 9.
 hirsuta Donn 5. β.
 humulifolia Bge 2.
 incisa Nutt. 3.
 latifolia Tausch 8.
 quinquefolia Mich. 5.
 serjaniaefolia Bge 7.
 tricuspidata S. et Z. 3.
Anthema arborea Munch XVIII, 13.
Cissus L. III.
 aegirophylla Bge 4.
 Ampelopsis Pers. II, 1.
 araliaefolia Hort. ad fln.
 bipinnata Ell. II, 10.
 cantoniensis H. et Arn.
 capreolata Don 12.
 hederacea Pers. II, 5.
 japonica Willd. 9.
 lanceolaria Rxb. 11.
 nepalensis DC. 10.
 nipaulensis DC. 10.
 orientalis Lam. 14.
 pentaphylla Willd. 8.
 pinnata Russ. 13.
 quinquefolia Dsf. II, 5.
 repens Lam. 1.
 rosea Royle 3.
 stans Pers. II, 10.
 Thunbergii S. et Z. 6.
 umbellata Lour. 5.
 viticifolia S. et Z. 7.
 vitifolia Boiss. 2.
Corchoropsis S. et Z. VI.
 crenata S. et Z. 1.
Corechorus L. VII.
 flexuosus Thunb. 4.
 scandens Thunb. 2.
 serratus Thunb. 3.
 tomentosus Thunb. 1.
Elaeocarpus L. V.
 dioicus Zoll. et Cum. 4.
 japonicus S. et Z. 2.
 - Zoll. et Cum. 3.
 photiniaefolius Hook. et Arn. 1.
 Zollingeri C. Koch 3.
Firmiana Marsili XII.
Firmiana platanifolia Schott et Endl. 1.
Grewia L. IX.
 biloba G. Don 5.
 didyma Rxb. 9.
 elastica Royle 7.
 Microcos W. et Arn. 1.
 nitida Juss. 2.
 oppositifolia Buch. 4.
 parviflora Bge 6.
 pumila Ham. 3.
 sapida Rxb. 3.
 sclerophylla Rxb. 8.
 ulmifolia Rxb. 1.
Hedera arborea Walt. II, 10.
 quinquefolia L. II, 5.
Helicteres L. XIV.
 angustifolia L. 1.
 undulata Lour. XI, 1.
 virgata Wall. 1.
Heptaca Lour. VIII.
 latifolia Gardn. et Ch. 1.
Hibiscus L. XXIII.
 acerifolius Salisb. 2.
 chinensis DC. 5.
 denudatus Benth. 8.
 gangeticus Rxb. 7.
 Hamabo Sieb. et Zucc. 3.
 Lampas Cav. 7.
 mutabilis L. 4.
 racemosus Lindl. 6.
 simplex L. XII, 1.
 sinensis Mill. 4.
 syriacus L. 1.
Jackia spectabilis Spreng. XV, 1.
Ketmia arborea Munch XXIII, 1.
 mutabilis Munch XXIII, 4.
 syriaca Scop. XXIII, 1.
Lavatera L. XVIII.
 acutifolia Lam. 8.
 africana Cav. 7.
 agrigena Tin. 4.
 arborea L. 13.
 bryoniaefolia Mill. 10.
 calycina Poir. 3.
 flava Guss. 4.
 hispanica Mill. 2.
 hispida bot. mag. 7.
 - Dsf. 6.
 - β. W. 7.
 lusitanica L. 11.
 maritima Gouan 2.
 micans L. 10.
 moschata Moris 3.
 oblongifolia Boiss. 1.
 Olbia L. 8.
 - Poir. 6.

- Lavatera pallescens* Moris 12.
Pseudo-Olbia Dsf. 5.
rotundifolia Lam. 2.
septemloba Hffmsgg 11.
thuringiaca All. 8.
tomentosa Dum. Cours. 9.
 - Lapeyr. 2.
 - L. 3.
undulata Dsf. 5.
 - Mill. 11.
unguiculata Dsf. 9.
Laea L. IV.
aspera Wall. 1.
rubra Bl. 2.
Malachra L. XXV.
Urena DC. 1.
Malva L. XIX.
abutiloides L. XX, 1.
odorata Westc. 1.
Malvaviscus Cav. XXIV.
Drummondii Torr. and Gr. 2.
floridanus Nutt. 1.
penduliflorus DC. 1.
Melochia L. XVII.
pyramidata L. 1.
Microchlaena Wall. XV.
spectabilis Wall. 1.
Olbia flava XVIII, 4.
hastata Mnch XVIII, 8.
hispida Presl XVIII, 6.
canescens Mnch XVIII, 2.
micans Mnch XVIII, 10.
Paritium gangeticum G. Don XXIII, 7.
Pavonia Cav. XXI.
Drummondii Torr. and Gr. 1.
lasiopetala Scheele 2.
Philippodendron Poit. XVI.
regium Poit. 1.
Phymosia abutiloides Desv. XX, 1.
Reevesia Lindl. XIII.
thyrsoidea Lindl. 1.
Sphaeralcea St. Hil. XX.
abutiloides G. Don 1.
Sida Cav. XXVII.
acuta Cav. 1.
chinensis Retz. 2.
lanceolata W. 1.
orbiculata DC. XXVI, 2.
scoparia Lour. 1.
Stauntoniana DC. 1.
stipulata var. Cav. 1.
Southwellia angustifolia Wight XI, 3.
nobilis Salish. XI, 2.
Sterculia L. XI.
angustifolia Rxb. 3.
Balanghas Rxb. 2.
lanceolata Cav. 1.
monosperma Cav. 2.
nobilis Sm. 2.
peltata G. Don 4.
pyriformis Bge XII, 1.
tomentosa Thunb. XII, 1.
Tilia L. X.
affinis Opiz 7. β .
alba Mich. 14.
 - W. et K. 9.
Tilia angulata Ortm. 7 γ .
americana Duroi 9. 13.
 - L. 16.
 - Wangenh. 11.
 - Loud. 11. 12. 13.
apiculata Hort. ad fin.
argentea DC. 9.
asplenifolia Hort. 7. 8.
aurea Loud. 7 ϵ .
begoniaefolia Hort. ad fin.
bicuspidata Hort. ad fin.
canadensis Mich. 16.
corinthiaca Bosc. 4.
caroliniana Wangenh. 16.
communis Spenn. 1. 2. 7. 9. 11. 13. 16.
corallina Ait. 4.
 - Aut. nonn. 19.
cordata Mill. 7.
cordifolia Bess. 7.
corylifolia Host 7.
eorymbosa Ortm. 7 η .
dasystyla Stev. 6.
europaea L. 1. 2. 7.
 - Sm. 2.
 - 1. borealis Wahlb. 2.
 - ζ . bohemica L. 2.
 - β . rubra Sibth. 4.
 - β . corallina Ait. 4.
 - γ . dasystyla Loud. 6.
flaccida Hort. ad fin.
flava Wolney 10.
flavescens A. Br. 17.
floribunda A. Br. 18.
glabra Vent. 16.
grandifolia Ehrh. 7.
 - Ortm. 3. 4.
heterophylla Vent. 13.
hollandica Duroi 16.
 - Hort. 7.
hybrida Bechst. 2 β .
 - superba Hort. ad fin.
intermedia DC. 2.
laciniata Loud. 7 ϵ .
languida Hffmsgg 8.
latebracteata Host 7 σ .
laxiflora Mich. 12.
 - Pursh 14.
 - W. 16 β .
longidentata Hort. ad fin.
longifolia dentata Hort. ad fin.
macrophylla Hort. 13.
macropoda Hort. ad fin.
mexicana Schlecht. 20.
microphylla Vent. et Loud. 1.
Mississippiensis Bosc. 16 β .
 - Dsf. 12.
mollis Ortm. 7 μ .
 - Spach 7.
monstrosa Hort. ad fin.
multiflora Led. 5.
mutabilis Host 7 σ .
neglecta Spach 15.
nigra Borkh. 16 γ .
nitida Ortm. 7 ν .
obliqua Host 7 ν .
 - Ortm. 7 σ .

Tilia *obliquifolia* Ortm. 7 o.
oblongata Hort. ad fn.
ovata Ortm. 7 f.
pannonica Jacq. 9.
parvifolia Ehrh. 1.
 - Koch 1. 2.
pauciflora Hayne 7.
petiolaris DC. 9 β.
platyphylla C. A. Mey. 4.
 - Bieb. 6.
 - Scop. 7.
platyptera Hort. ad fn.
praecox Al. Br. 19.
 - Host 7 γ.
Preslii Ortm. 7 γ.
pubescens Ait. 11.
 - leptophylla Vent. 12.
pyramidalis Host 7 γ.
rotundifolia Vent. 9.
rubra DC. 4.
serratifolia Hort. ad fn.
sphaerocarpa Hort. ad fn.
sylvestris Dsf. 1.
tenuifolia Host 7 β.
tomentosa Mnch 9.
triflora Puer. 4.
truncata Spach 11.
ulmifolia Scop. 1.
vitifolia Host 3.
vulgaris Hayne 2.
Urena L. XXII.
lobata L. 1.
Loureirol Meissn. XXV, 1.
polyflora Lour. XXV, 1.
procumbens L. 2.
Vitis L. 1.
aestivalis Mich. 13.
apiifolia Hort. 1 β.
apyrena Hort. 1 γ.
arborea W. II, 10.
bipinnata T. et Gr. II, 10.
blanda G. Don 12 β.
bryoniaefolia Bge 9.
capreolata Royle III, 12.
caribaea DC. 10.
Catawba Hort 12 γ.
cordifolia Mich. 14.
cymosa Wall. III, 10.

Vitis *dentata* Link 2.
ficifolia Bge 18.
filiformis Lam. III, 8.
flexuosa Thunb. 5.
glauca Wall. III, 1.
hederacea Ehrh. II, 5.
 - Wall. III, 12.
heterophylla Thunb. II, 2 β.
japonica Thunb. III, 9.
incisa Jacq. 14.
indica Thunb. 5.
 - Swartz 10.
intermedia Muehlenb. 13.
indiana W. II, 1.
isabella Hort. 12 β.
Kaempferi C. Koch 6.
Labrusca L. 12.
 - Thunb. 6.
 - Walt. 13.
laciniata L. 1 β.
lanceolaria Wall. III, 11.
Longi Hort. 22.
macrophylla Royle 21.
obtecta Wall. 20.
odoratissima Donn 15.
palmata Vahl 13.
parvifolia Roxb. 8.
pentaphylla Thunb. III, 8.
Purani Ham. 4.
quinquefolia Mnch II, 5.
repens W. et Arn. III, 1.
riparia Mich. 15.
rosea Royle III, 3.
rupestris Schaele 11.
rugosa Wall. 7.
semicordata Wall. 19.
sinuata Pursh 13 β.
Solonis Hort. 23.
sylvestris Heg. et H. 1.
taurina Walt. 12.
Thunbergii S. et Z. 18 β.
vinifera L. 1.
 - americana Marsh. 13.
virginiana Dsf. 17.
vulpina L. 16.
 - Torr. 14.
Wallichii DC. 3.
Wallichia spectabilis DC. XV, 1.

ORDO V.

Anisómerae.

Fam. 31. Sapindaceae.

I. *Sapindus* L.

(quasi *sapo indus*, ob *fructus corticem*, qui *saponis usum praebet*.)

1. ♂ *acuminatus* Wall. in Royle ill. of the him. mount. 139. Himalaya, India orient., Japonia.
2. ♂ *Mukorossi* Gaertn. de fruct. et sem. I, 342. t. 70. China (Canton).
3. ♂ *abruptus* Lour. fl. coch. 293.
4. ♂ *marginatus* Willd. hort. Berol. 432.
Drummondii Hook. and Arn. bot. of Beech. voy. 289. (exc. var. β.)
Saponaria Mich. fl. bor. amer. I, 242.

II. *Cardiospermum* L.

(καρδια, cor, Herz et σπέρμα, semen, Same.)

1. § *Loureiroi* C. Koch. China (Canton).
Corindum β. Lour. fl. coch. 295.
2. 5 *tortuosum* Benth. in bot. of Belch. voy. 9. t. 6. California.

III. *Nephelium* L.

(*Nephelium* est herbae nomen apud Apulejum et forte a v. νεφέλη, nubis, Wolke, derivatum.)

1. ♂ *Longana* Camb. in mém. du Mus. XVIII, 30. India orientalis, China.
Dimocarpus Longan Lour. fl. coch. 288.
- *longus* Dietr. Nachtr. z. vollst. Lex. d. Gaertn. II, 704.
Euphoria Longana Lam. enc. méth. III, 574.
Scytalia Longan Roxb. fl. ind. II, 270.
β) *bengalense* (*benghalense* W. et Arn.) G. Don diehl. pl. I, 670.
Sapindus bengalensis in Eastind. Comp. mus. t. 941.
2. ♂ *Litchi* Camb. in mém. du Mus. XVIII, 30. India orientalis, China.
Dimocarpus Lichi Lour. fl. coch. 287.
- *Litchi* Willd. sp. pl. II, 346.
Euphoria Litchi Desf. cat. pl. hort. Paris. 159.
- *punicea* Lam. enc. méth. III, 573.
Litchi chinensis Sonn. voy. aux Ind. orient. et à la Ch. II, 180. t. 129.
Litsaea chinensis Lam. enc. méth. III, 574.
Sapindus edulis Ait. hort. Kew. ed. I, II, 36.
Scytalia chinensis Gaertn. de fr. et sem. I, 197. t. 42.
- *Lichi* Rxb. fl. ind. II, 269.

IV. *Koelreuteria* Laxm.

(Jos. Gottl. Koelreuter, professor Carlsruhensis fuit, †1799.)

- * 1. ♂ *paniculata* Laxm. nov. comm. ac. Petrop. XVI, 561. t. 18.
bot. reg. t. 330. China, Japonia.
paullinoides l'Herit. sert. angl. 18. t. 19.
Sapindus chinensis L. fl. suppl. 228.

V. *Dodonaea* L.

(Ramb. Dodoens, vulgo *Dodonaeus*, archiater austriacus, † 1585.)

1. 5 *viscosa* L. cod. Nro. 2696. Florida, India occid.,

lúcida Mch. meth. 358.
Ptélea viscosa L. sp. pl. ed. 2. 173.

America austr., Guinea.

VI. Xanthóceras Bge.

(ξανθός, flavus, gelb et κέρα, cornu, Horn, ob glandulas cornuiformes inter petala sitas.)

1. ♂ sorbifolia Bge in mém. d. sav. étrang. de St. Pét. II, 85. China borealis.

Fam. 22. Meliosmeae. (Millingtoniaceae W. et Arn.)

VII. Meliosma Blume.

(μελι, mel, Honig, et ὄσμη, odor, Geruch.)

1. ♂ dilleniaefolia Blume fl. Jav. praef. VII. India orientalis, Nepal.
Millingtonia dilleniaefolia Wall. in new Edinb. journ. a. 1833. 178.
2. ♂ pungens Blume fl. Jav. praef. VII. India orientalis, Nepal.
Millingtonia pungens Wall. in new Edinb. journ. a. 1833. 178.
β) acuminata Royle ill. of the himal. mount. 139.
3. ♂ rigida S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 153. Japonia.
4. ♂ myriantha S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 153. Japonia.

Fam. 23. Hippocastaneae.

VIII. Unguadia Endl.

(Dav. ab Ungnad, Rudolphi II, imperatoris germanici, apud Turcas orator, semina Aesculi Hippocastani Constantinopoli a. 1576 primus Vindobonam misit.)

1. ♂ speciosa Endl. nov. stirp. dec. 75. at. botan. t. 36. Texas.
heptaphylla Scheele in Linn. XXII, 352.
heterophylla Scheele in Linn. XXI, 589.

IX. Aesculus L.

(Aesculus a. Esculus, i. e. quercus fructibus edulibus, Graecorum ἤνος.)

A. Hippocástanum. (Capsulae echinatae.)

(ἵππος, equus, Pferd et καστανόν, castanea, Kastanie.)

- * 1. ♂ Hippocástanum L. cod. Nro. 2638. ? Thibet.
Castánea Gillib. fl. lith. V, 197.
Hippocástanum vulgare Gaertn. de fruct. et sem. II, 135. t. 111.
- Aesculus Cavan. (teste Steud.)
* β) argenteo-variegata Hort.
* γ) aureo-variegata Hort.
* δ) flore carneo.
* ε) - pleno.
* ζ) - rubro.
* η) incisa Hort.
* θ) laciniata (heterophylla) Hort.
* ι) maxima Hort.
* κ) monstrosa Hort.
* λ) nigra Hort.
* μ) praecox Hort.
* ν) spectabilis Hort.
* ξ) tortuosa Hort.
2. ♂ rubicunda Lois. herb. gén. de l'amat. t. 367. (frustra a me quaes.) ? America borealis.
cárnea Willd. in Gu. u. H. fr. Holzart. t. 22. bot. reg. t. 1066.
Pavia cárnea Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 53.
* β) Watsoniana Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 53. (sub Pavia).
cárnea Wats. dendrol. brit. t. 121.
rubicunda Lodd. bot. cab. t. 1242.
3. ♂ chinensis Bge in mém. d. sav. étr. de St. Pét. II, 84. Mongolia, Japonia.
* 4. ♂ glabra W. hort. Berol. 406. Gu. et H. fr. Holzart. t. 24. America foed. borealis.
echinata Muehlenb. cat. pl. Amer. sept. 38.
Pavia glabra Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 54.
* β) ohioensis DC. prodr. II, 597.
Pavia ohioensis Mich. hist. d. arbr. forest. de l'Am. sept. III, 242.
* γ) pallida W. hort. Berol. 406. Gu. et H. fr. Holzart. t. 25.
Pavia pallida Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 54.

- * 5. ♂ *Lyoni* Hort. Loud. arb. brit. I, 468.

B. *Pavia*. (*Capsulae laeves*.)

6. ♂ *indica* Jacquem. voy. dans l'Inde IV, 31. t. 35. Himalaya.
Pavia indica Wall. num. list.
7. ♂ *turbinata* Blume Rumph. III, 195. Japonia.
Pavia Thunb. fl. jap. 154.
- * 8. ♂ *Pavia* L. cod. Nro. 2639. Gu. et H. fr. Holzart. t. 21. America foederata
Pavia rubra Lam. illustr. d. gener. t. 273. media et australis.
 - *octandra* Mill. dict.
 - *Michauxii* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 61.
 - *parviflora* Hort.
 ♂) *arguta* Lindl. in bot. reg. t. 993.
 7) *hybrida* DC. cat. pl. hort. Monsp. 75.
Pavia hybrida DC. prodr. I, 598.
 ♂) *intermedia* Steud. nom. bot. ed. 2. I, 32.
Pavia intermedia Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 60.
 ♂) *Lindleyana* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 59. (sub *Pavia*).
 ♂) *livida* Steud. nomencl. bot. ed. 2. I, 32.
Pavia livida Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 56.
 7) *lúcida* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 60. (sub *Pavia*).
 ♂) *mutabilis* Steud. nom. bot. I, 32.
Pavia mutabilis Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 57.
 ♂) *sublaciniata* Wats. dendr. brit. t. 120.
Pavia atropurpurea Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 56.
 ♂) *versicolor* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 57. (sub *Pavia*).
Aesculus Pavia Wats. dendr. brit. t. 1643.
 λ) *Willdenowiana* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 59. (sub *Pavia*).
- * 9. ♂ *discalor* Pursh fl. Amer. sept. I, 255. bot. reg. t. 310. America foederata
Pavia discolor Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 58. media et australis.
- * 10. ♂ *macrocarpa* Hort. Loud. arb. brit. I, 473. Planta certe hybrida.
Pavia β. macrocarpa Lodd. cat. 1830.
- * 11. ♂ *húmilis* Lodd. catal.; bot. reg. t. 1018. America foederata.
Pavia húmilis G. Don in Loud. hort. brit. 143.
 ♂) *pendula* Loud. arb. brit. I, 470.
- * 12. ♂ *flava* Ait. hort. Kew. ed. 1. I, 494. Gu. et H. fr. Holzart. t. 23. America foederata
lútea Wangenh. in Verh. naturf. Fr. in Berl. VIII, 133. t. 6. borealis et media.
Pavia flava Mneh. meth. 66.
 - *lútea* Poir. in enc. méth. V, 94.
- * ♂) *neglecta* Lindl. in bot. reg. t. 1009.
Pavia neglecta G. Don in Loud. hort. brit. 143.
13. ♂ *odorata* Dietr. Nachtr. z. vollst. Lex. d. Gaertn. I, 118. America borealis.
14. ♂ *californica* Nutt. in Torr. and Gr. fl. of N. Amer. I, 251. California.
Calothyrsus californica Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 62.
- * 15. ♂ *parviflora* Walt. fl. carol. 128. America foed. austr.
macrostachya Mich. fl. bor. amer. I, 220. Gu. et H. fr. Holzart. t. 26.
macrostachys Pers. syn. pl. I, 403.
nana Dsf. hort. Par.
Pavia macrostachya DC. prodr. I, 598.
 - *alba* Poir. enc. méth. V, 95.
 - *edulis* Poir. in nouv. Duham. t. 88.
Macrothyrsus discolor Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 61.

C. *Species minus aut vix cognitae*.

16. ♂ *Panduana* Wall. numer. list. Nepal, India orientalis.
 17. ♂ *púmila* Hort. angl. Patria ignota.
 18. ♂ *rubescens* Tausch in Flora XXI. Beib. 1. 46. (s. descr.) Patria ignota.
 19. ♂ *aculeata* Hort. angl. Patria ignota.
 20. ♂ *arbórea* Bartr. Reise d. Car. 39. (s. descr.) Carolina.
 21. ♂ *sylvatica* Bartr. Reise d. Car. 44. (s. descr.) Carolina.
 Not. Praeterea in horto nostro dendrologico species sequentes vel varietates coluntur: 1) *coriácea*, 2) *gráecis*, 3) *marylándica*, 4) *Whitlegi*.

Fam. 24. Hippocrateaceae.**X. Salasia L.**

(dea maris et Neptuni conjux.)

1. *S. chinensis* L. cod. Nro. 6011.
cochinchinensis Lour. fl. coch. II, 642.
Roxburghii Wall. num. list. Nro. 4217.
Johnia salacioides Rxb. fl. ind. I, 168.
Tonsella chinensis Spr. syst. veg. I, 177.

China, Cochinchina,
 India orientalis.

Fam. 25. Polygalae.**XI. Polygala L.**

(πολυγαλα, a verbis πολω, multum, viel et γαλα, lac, Milch; apud Graecos certe planta a Polygala amara L. diversa.)

1. *P. saxatilis* Dsf. fl. alt. II, 123. t. 175.
rupestris Pourr. in act. Toul. 325.
 2. *P. ascendens* Clark in Spreng. n. Entd. III, 165.
 3. *P. rosea* Dsf. fl. atl. II, 128. t. 176.
 4. *P. scabra* Edgew. transact. of the Linn. soc. XX, 33.
 5. *P. Chamaebuxus* L. cod. Nro. 5151. Jcq. fl. austr. t. 233.
 6. *P. chinensis* L. cod. Nro. 5150.
 7. *P. microphylla* L. cod. Nro. 5149.
 ? *juniperina* Cav. in ann. scienc. nat. 1801. IV, 53.

Africa bor., Hispania,
 Gallia merid.
 Insulae archip. graec.
 Africa bor., Sicilia.
 Himalaya.
 Ital., Helvet., imp. austr.
 China.
 Penins. pyrenaica.

Fam. 26. Krameriaceae.**XII. Krameria L.**

(J. G. Henr. Kramer, pater, tentamen botanicum a. 1728 et Gulth. Henr. Kramer, filius, elenchum vegetabilium et animalium per Austriam infer. observatorum a. 1756 scripserunt.)

1. *K. lanceolata* Torr. in ann. Lyc. New-York II, 168.
 2. *K. parvifolia* Benth. in bot. of Belch. voy. 6. t. 1.

Texas, Oregon.
 California.

INDEX.

Aesculus L. IX.
arborea Bartr. 20.
arguta Lindl. 8 β.
aculeata Hort. 19.
californica Nutt. 14.
carnea Willd. 2.
 - Wats. 2 β.
Castanea Gilib. 1.
chinensis Bge 3.
coriacea Hort. ad fin.
discolor Pursh 9.
echinata Muehlenb. 4.
flava Ait. 12.
glabra Willd. 4.
gracilis Hort. ad fin.
heterophylla Hort. 1 φ.
Hippocastanum L. 1.
humilis Lodd. 11.
hybrida DC. 8 γ.
indica Jacquem. 6.
intermedia Steud. 8 δ.
livida Steud. 8 ζ.

Aesculus lutea Wangerh. 12.
Lyoni Hort. 5.
macrocarpa Hort. 10.
macrostachya Mich. 15.
macrostachys Pers. 15.
marylandica Hort. ad fin.
maxima Hort. 1 α.
mutabilis Steud. 8 θ.
nana Dsf. 15.
neglecta Lindl. 12 β.
nigra Hort. 1 λ.
odorata Dietr. 13.
ohiohensis DC. 4 β.
pallida Willd. 4 γ.
Panduana Wall. 16.
parviflora Walt. 15.
Pavia L. 8.
 - Thunb. 7.
 - Wats. 8 α.
 - β. *macrocarpa* Lodd. 10.
praecox Hort. 1 μ.
pumila Hort. 17.

- Aesculus rubescens* Tausch 18.
 rubicunda Lois. 2.
 spectabilis Hort. 1 v.
 sylvatica Bartr. 21.
 tortuosa Hort. 1 f.
 turbinata Blume 7.
 Whitlegi Hort. ad fn.
Cardiospermum L. II.
 Corindum β. Lour. 1.
 Loureiroyi C. Koch 1.
 tortuosum Benth. 2.
Calothyrsus californica Spach IX, 14.
Dimocarpus Lichi Lour. III, 2.
 Litchi Willd. III, 2.
 Longan Lour. III, 1.
 longus Dietr. III, 1.
Dodonaea L. V.
 lucida Mnch 1.
 viscosa L. 1.
Euphoria Litchi Desf. III, 2.
 Longana Lam. III, 1.
 pumicea Lam. III, 2.
Hippocastanum Aesculus Cav. IX, 1.
 vulgare Gaertn. IX, 1.
Johnia salacioides Roxb. X, 1.
Koelreuteria Laxm. IV.
 paniculata Laxm. 1.
 paullinioides l'Her. 1.
Krameria L. XII.
 lanceolata Torr. 1.
 parvifolia Benth. 2.
Litchi chinensis Sonn. III, 2.
Litsaea chinensis Lam. III, 2.
Macrothyrsus discolor Spach IX, 15.
Meliosma Blume VII.
 dilleniaefolia Blume 1.
 myriantha S. et Z. 4.
 pungens Blume 2.
 rigida Sieb. et Zucc. 3.
Nephelium L. III.
 bengalense Don 1. β.
 Litchi Camb. 2.
 Longana Camb. 1.
Pavia alba Poir. IX, 15.
 atropurpurea Spach IX, 8 c.
 carnea Spach IX, 2.
 discolor Spach IX, 9.
 edulis Poit. IX, 15.
 flava Mnch IX, 12.
 glabra Spach IX, 4.
 humilis G. Don IX, 11.
 hybrida DC. IX, 8 γ.
 indica Wall. IX, 6.
Pavia intermedia Spach IX, 8 β.
 Lindleyana Spach IX, 8 c.
 livida Spach IX, 8 c.
 lutea Poir. IX, 12.
 lucida Spach IX, 8 γ.
 macrostachya DC. IX, 15.
 Michauxii Spach IX, 8.
 mutabilis Spach IX, 8.
 neglecta G. Don IX, 12 β.
 octandra Mill. IX, 8.
 ohioensis Mich. IX, 4 β.
 pallida Spach IX, 4 γ.
 parviflora Hort. 8.
 rubra Lam. IX, 8.
 versicolor Spach IX, 8 x.
 Watsoniana Spach IX, 2 β.
 Willdenowiana Spach IX, 8 λ.
Polygala L. XI.
 ascendens Clark 2.
 Chamaebuxus L. 5.
 chinensis L. 6.
 juniperina Cav. 7.
 microphylla L. 7.
 rosea Dsf. 3.
 rupestris Pourr. 1.
 saxatilis Dsf. 1.
 scabra Edgew. 4.
Ptelea viscosa L. V, 1.
Salacia L. X.
 chinensis L. 1.
 cochinchinensis Lour. 1.
 Roxburghii Wall. 1.
Sapindus L. 1.
 abruptus Lour. 3.
 acuminatus Wall. 1.
 bengalensis Roxb. III, 1 β.
 chinensis L. fl. IV, 1.
 Drummondii Hook. et Arn. 4.
 edulis Ait. III, 2.
 marginatus Willd. 4.
 Mukorossi Gaertn. 2.
 Saponaria Mich. 4.
Scytalia chinensis Gaertn. III, 2.
 Lichi Roxb. III, 2.
 Longan Roxb. III, 1.
Tonsella chinensis Spreng. X, 1.
Ungnadia Endl. VIII.
 heptaphylla Scheele 1.
 heterophylla Scheele 1.
 speciosa Endl. 1.
Xanthoceras Bge VI.
 sorbifolia Bge 1.

ORDO VI.

Mesospermae.

Fam. 27. Lineae.

I. Linum L. (Λίνον, linum, Lein.)

A. Linastrum (Pedicelli breves; Petala libera).

1. *h. salsoloides* Lam. enc. méth. III, 521. Barr. ic. 795. Italia, Gallia, Hispania.
2. *h. suffruticosum* Lam. et DC. fl. franç. V, 616. Hispania.
- tenuifolium* Asso syn. stirp. ind. Arag. 41.
- β) *Jacquini* Planch. in Hook. Lond. journ. VII, 183.
3. *h. Ortegae* Planch. in Hook. Lond. journ. VII, 184. Hispania.

B. Syllinum (Pedicelli breves; Petala unguibus cohaerentia).

4. *h. Simsii* Planch. in Hook. Lond. journ. VII, 512. Oriens.
- arboreum* Sims. in bot. mag. t. 234
5. *h. arboreum* S. et Sm. fl. gr. t. 305. Graecia.
- glandulosum* α. Ser. in DC. prodr. I, 425.
6. *h. caespitosum* Sibth. et Sm. fl. gr. t. 306. Graecia, Creta.
- β) *Steberi* Planch. in Hook. Lond. journ. VI, 513.
- globulariaefolium* Poir. in enc. méth. suppl. III, 445.
7. *h. persicum* Boiss. in Hook. Lond. journ. VII, 516. Persia australis.
- β) *Aucheri* Planch. in Hook. Lond. journ. VII, 516.
8. *h. velutinum* Steud. in Hook. Lond. journ. VI, 517. Kurdistan.

II. Reinwardtia Dumort.

(Reinwardt, prof. emer. botanices Lugduno-Batavus, Javam ineunte saeculo nostro permigr.)

1. *h. trigyna* Planch. in Hook. Lond. journ. VI, 522. India orient., Himalaya.
- Linum trigynum* Roxb. fl. ind. II, 110. bot. mag. t. 1100.
- *boerhaviaefolium* Hort.
2. *h. repens* Planch. in Hook. Lond. journ. VI, 523. Nepal.
- Linum repens* Don prodr. fl. nep. 217.
- β) *Cicanobum* Don prodr. fl. nep. 217. (sub Lino.)
- Linum trigynum* Sm. ex. bot. 31. t. 17.
3. *h. tetragyna* Planch. in Hook. Lond. journ. VI, 523. Nepal, India orientalis.

III. Roucheria Planch.

(Jean Antoine Roucher, autor cel. poematis „les mois“, saeva securi percussus a. 1794.)

1. *h. Griffithiana* Planch. in Hook. Lond. journ. VI, 143. Himalaya, India orient.

Fam. 28. Hypericaceae.

Trib. I. Desmostemoneae (Squamulae aut Glandulae hypogynae).

IV. Anciströlobus Spach.

(ἀγκίστρον, hamus, Angel et λοβός, capsula, Kapsel.)

1. ♂ *ligustrinus* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. V, 360. Cochinchina, China
- Hypericum cochinchinense* Lour. fl. coch. II, 577. (Macao, Hongkong).

- Hypericum chinense* Retz obs. bot. V, 27.
 - *biflorum* Desrouss. in enc. méth. IV, 170.
 - *carneum* Wall. num. list. Nro. 4820.
Vismia cochinchinensis Spreng. syst. veg. III, 350.
 ? *Elodea chinensis* Hance in Lond. Journ. VII, 472.
 β) *petiolatus* Lour. fl. coch. II, 577. (sub *Hyperico*, nec. L. et Pursh.)

V. *Adenotrias* Jaub. et Sp.

(δδρν, glandula, Drüse et τριας, triplex, Dreizahl.)

1. ♀ *phrygia* Jaub. et Sp. illustr. pl. orient. I, 76. t. 39. Asia minor.
 2. ♀ *Kotschyi* Jaub. et Sp. ill. pl. orient. I, 77. Asia minor (*Taurus*).

Vk. *Triadema* Spach.

(τρι, tres, drei et δδρν, glandula, Drüse.)

1. ♀ *microphylla* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. V, 2. 173. Sicilia, Cyprus, Syria,
aegyptiaca Jack in Hook. Journ. of bot. IV, 373. in adn. Aegyptus.
Hypericum aegyptiacum L. cod. Nro. 5748. bot. reg. t. 196.
 - *creticum* Hort.
Martia polyandra Spreng. syst. veget. III, 333.
 2. ♀ *Sieberi* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. V, 2. 175. Creta.
Hypericum aegyptiacum β. Steud. nom. bot. I, 786.
 3. ♀ *thymifolia* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. V, 2. 174. Ins. Archipelagi graeci.
Hypericum Spachianum Steud. nom. bot. ed. 2. I, 789.
 4. ♀ *Webbii* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. V, 2. 174. Oriens, insula Malta.
Hypericum Webbii Steud. nom. bot. ed. 2. I, 790.
 5. ♀ *Russegeri* Fenzl pug. pl. nov. syr. I, 7. Atl. zu Russ.
 Reis. III, t. 13. Syria borealis.
Elodea Russegeri Walp. rep. bot. I, 391.

Trib. 2. *Hypericineae* (*Squamulae* aut *Glandulae hypogynae nullae*).

VII. *Thymopsis* Jaub. et Sp.

(θυμος, Thymus, Thymian et ὄψις, visus, Ansehen.)

1. ♀ *aspera* Jaub. et Sp. ill. pl. orient. I, 72. t. 37. Asia min. (ad Euphrat.)

VIII. *Eremosperus* Spach.

(ἐρημος, sterilis, unfruchtbar et σπορα, reclusus σπέρμα, semen, Same.)

1. ♀ *Olivérii* Spach hist. d. végét. phan. V, 375. Oriens.

IX. *Hypericum* L.

(ὕπερικον, derivatione dubia, apud Graecos nomen *Hyperici crisp* L.)

A. *Holosépalum* (Folia opposita; Calycis lacinae integerrimae).

1. ♀ *nanum* Poir. in enc. méth. suppl. III, 699. J. et Sp. ill. pl. orient. I, 46. t. 23. Cilicia, Libanon.
 2. ♀ *myrtilloides* Fenzl pug. pl. nov. syr. I, 7. Syria borealis.
 3. ♀ *heterophyllum* Vent. jard. Cels t. 68. Persia.
 4. ♀ *rupestre* Jaub. et Sp. ill. pl. orient. I, 44. t. 21. Asia minor (Cilicia).
 β) *ovalifolium* Jaub. et Sp. ill. pl. orient. I, 44. t. 22.

B. *Adenosépalum* (Fol. opposita; Cal. lacinae serrulatae; Caps. longitudinaliter striata.)

5. ♀ *serpyllifolium* Lam. enc. méth. bot. IV, 176. Persia.
 6. ♀ *ramosissimum* Led. fl. ross. I, 449. Colchis.
 β) *intermedium* Led. fl. ross. I, 449.
 γ) *multiflorum* Led. fl. ross. I, 449.
 7. ♀ *afrum* Lam. in enc. méth. IV, 166. Syria, Africa borealis,
perforatum Poir. voy. en Barb. II, 224. Lusitania.
 8. ♀ *lusitanicum* Poir. in enc. méth. suppl. III, 702. Lusitania.

C. *Drosocarpium* (Fol. opposita; Cal. lacinae serrulatae; Caps. verruculosa aut transv. rugosa.)

9. ♀ *pulverulentum* Fenzl pug. pl. nov. syr. I, 7. Asia minor (*Taurus*).

D. *Coridium* (Folia verticillata).

10. *h* *empetrifolium* W. sp. pl. III, 1452. Europa austr., Afr. bor.
 11. *h* *ericoides* L. cod. Nro. 5753. Cav. ic. et descr. II, 20. t. 122. Penins. pyren., Oriens.

E. *Olympia* (Folia opposita; Calycis basi nudi sepala inaequalia, integerrima).

12. 5 *Loureiroy* C. Koch. Cochinchina, China.
Olympicum Lour. fl. coch. II, 577.
 13. *h* *Olympicum* L. cod. Nro. 5744. S. et Sm. fl. gr. t. 772. Asia min., ? Pyrenaeus.
Olympia glauca Spach in hist. d. végét. phan. V, 406.
 β) *latifolium* Hook. bot. mag. t. 1867.

X. *Androsaemum* All.

(ἀνθηρ, vir, Mann et ἀμα, sanguis, Blut.)

- * 1. 5 *officinale* All. fl. ped. II, 47. Britannia, Eur. merid.,
 vulgare Grtn. de fruct. et sem. I, 282. t. 59. f. 2. Pontus, isthm. caucas.,
Hypéricum Androsaemum L. cod. Nro. 5743. engl. bot. t. 1225. Asia minor.
 - *bacciferum* Lam. fl. franç. III, 151.
 2. 5 *emarginatum* C. Koch. Patria ignota.
Hypéricum emarginatum Lam. enc. méth. IV, 154.
 * 3. 5 *parviflorum* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. V, 2. 361. ? America borealis.
 pyramidale β. *grandifolium* Spach hist. d. végét. phan. V, 360.
Hypéricum elatum Ait. hort. Kew. ed. 2. III, 104. Wats. dendr. brit. t. 85.
 4. 5 pyramidale Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. V, 2. 362. ? America borealis.
Hypéricum elatum Desrouss. in Lam. enc. méth. bot. IV, 156.
 * 5. 5 *hircinum* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. V, 2. 362. Europa australis,
Hypéricum hircinum L. cod. Nro. 5747. S. et Sm. fl. gr. t. 773. Africa borealis,
 - canariense Cambess. in mém. du Mus. XIV, 226. Syria (Libanon).
 6. 5 *xylostefolium* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. V, 2. 363. Graecia, Oriens.
 Jaub. et Sp. ill. pl. orient. I, 74. t. 38.
Hypéricum inodorum W. sp. pl. III, 1449.
 7. 5 *adenophyllum* C. Koch. Colchis.
Hypéricum adenophyllum Led. fl. ross. I, 445.

XI. *Bremante* Spach.

(ἐρημος, sterilis, unfruchtbar et ἀνθος, flos, Blüthe.)

- * 1. *h* *calycina* Spach hist. d. végét. phan. V, 421. Colchis, Pontus,
Ascyrum coriaceum Moench meth. 130. Asia minor.
Hypéricum calycinum L. cod. Nro. 5740. bot. mag. t. 146. fl. gr. t. 771.
 - *Ascyrum* Mill. dict.
 β) *acutifolium* DC. prodr. I, 546.
 2. 5 *pátula* C. Koch. Japonia, Himalaya,
Hypéricum pátulum Thunb. fl. jap. 295. Nepal, India orientalis.
 - *oblongifolium* Choisy prodr. d'une mon. de la fam.
 d. Hyp. 42. t. 4. (teste Royle.)
 3. 5 *venósa* C. Koch. Patria ignota.
Hypéricum venósum Lam. enc. méth. bot. IV, 146.
 4. 5 *cordifolia* C. Koch. Nepal.
Hypéricum cordifolium Chois. in DC. prodr. I, 545. Wall.
 pl. asiat. rar. III, t. 220.
 - *bracteatum* Don prodr. fl. nep. 218.

XII. *Pseróphytum* Spach.

(ψωρος, scabiosus, kraetzig et ψρον, planta, Pflanze.)

1. *h* *undulatum* Spach in hist. d. végét. phan. V, 413. Insulae balearicae.
Hypéricum balearicum L. cod. Nro. 5736.
Ascyrum glandulosum Mch meth. suppl. 42.

XIII. *Norysca* Spach.(transmutatione literarum e verbo *Ascyron*, quod genus *Hyperico* simile praebet, formata.)

1. *h* *salicifolia* C. Koch. Japonia.
Hypéricum monógynum Thb. fl. jap. 297.
 - *salicifolium* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 162.
 * 2. *h* *chinensis* Spach hist. d. végét. phan. V, 413. China, India orientalis,
Hypéricum chinense L. amoen. VIII, 323. Mill. dict. t. 151. f. 2. Cochinchina,
 - *aúreum* Lour. fl. coch. II, 578. ? Africa australis.

- Aseyrum monógynum Mneh meth. suppl. 42.
 * β) epunctata; Hypéricum monogynum L. cod. Nro. 5772. bot. mag. t. 334.
 3. *h* Urala C. Koch. Nepal, Himalaya.
 Hypéricum Uralum Don prodr. fl. nep. 218. bot. mag. t. 2375.
 - oblongifolium Chois. prodr. d'une mon. de la fam. d.
 Hyper. 42. t. 4. (teste Don.)
 4. *h* cernua C. Koch. Nepal, Himalaya,
 Hypéricum cernuum Roxb. hort. beng. 59. Jacquem. voy. India orientalis.
 dans l'Inde or. IV, 30. t. 33.
 - speciosum Wall. num. list.
 5. *h* myrtifolia Spach in hist. d. végét. phanér. V, 413. Himalaya.
 * 6. *h* Kalmiana C. Koch. America britannica
 Hypéricum Kalmianum Willd. sp. pl. III, 1438. et foederata borealis.
 - Bartramium Mill. (teste Steud.)

IV. Myriandra Spach.

- (μυριος, innumerabilis, unzaehlb. et ἀνερ, vir, hoc loco: stamen, Staubgefäss.)
 * 1. *h* prolifica Spach in hist. d. végét. phanér. V, 364. America foederata.
 Hypéricum prolificum L. cod. Nro. 5752.
 - cryptopetalum Lam. illustr. d. genr. t. 643. f. 2.
 - foliosum Jacq. hort. Schoenbr. III, 27. t. 299.
 - Kalmianum Duroi Harbk. Baumz. I, 130.
 - densiflorum Pursh fl. Amer. sept. II, 376.
 β) ramosa.
 Hypéricum galioides Pursh fl. Amer. sept. II, 376.
 γ) spathulata Spach in hist. d. végét. phan. V, 364.
 Hypéricum spathulatum Steud. nom. bot. ed. 2. 789.
 2. *h* adpressa C. Koch. America foederata
 Hypéricum adpressum Bart. fl. Philad. II, 15. borealis et media.
 - Bonaparteae Bart. fl. Amer. sept. 3. t.
 3. *h* rosmarinifolia C. Koch. America foederata
 Hypéricum rosmarinifolium Lam. enc. méth. IV, 159. borealis et media.
 4. *h* galioides Spach hist. d. végét. phanér. V, 442. America foederata
 β) fasciculatum Mich. fl. bor. Amer. II, 80. (sub Hyperico.) media et australis.
 Michauxii Spach hist. d. vég. phan. V, 442.
 Hypéricum axillare Lam. in enc. méth. IV, 161.
 - Michauxii Desr. in enc. méth. suppl. III, 696.
 5. *h* nitida Spach hist. d. végét. phan. V, 442. America foed. austr.
 Hypéricum Coris ? Walt. fl. carol. 190.
 - fasciculatum Lam. enc. méth. bot. IV, 160.
 - nitidum Lam. in enc. méth. bot. IV, 160.
 β) brachyphylla Spach hist. d. végét. phan. V, 442.
 Hypéricum aspalathoides W. sp. pl. III, 1451.
 - brachyphyllum Steud. nom. bot. ed. 2. I, 787.
 - tenuifolium Pursh fl. Amer. sept. II, 377.

IV. Brathydium Spach.

- (Diminutivum verbi «βραθυσ, brathys, Sadebaum», quod vero hoc loco Hypericum Brathys L. significat.)
 1. *h* aureum C. Koch. America foeder. austr.
 Hypéricum amoenum Pursh fl. Amer. sept. II, 375.
 - aureum Bartr. trav. trough Car. Georg. Flor. 383.
 - frondosum Mich. fl. bor. amer. II, 81.
 2. *h* myrtifolium C. Koch. America foeder. austr.
 Hypéricum glaucum Mich. fl. bor. am. II, 78.
 - myrtifolium Lam. enc. méth. bot. IV, 180.
 - rosmarinifolium Chois. in DC. prodr. I, 547. nec Lam.
 - sessiliflorum W. in Spr. syst. veg. III, 546.
 Myriandra glauca Spach hist. d. végét. phan. V, 442.
 3. *h* grandiflorum Spach hist. d. végét. phan. V, 442. America foed. media.
 Hypéricum dolabrifforme Vent. jard. Cels t. 45.
 - procumbens Mich. fl. bor. amer. II, 81.
 4. *h* ambiguum C. Koch. America foeder. austr.
 Hypéricum ambiguum Ell. sk. of the bot. of S. Car. II, 30.
 5. *h* nudiflorum C. Koch. America foederata.
 Hypéricum nudiflorum Mich. fl. bor. amer. II, 78. Digitized by Google

- Hypericum ligustrinum* Banks (teste Steud.).
Myriandra nudiflora Spach hist. d. végét. phan. V, 442.
 6. *h* *sphaerocarpum* Spach. hist. d. végét. phanér. V, 442. America foed. media.
Chamaenerium Spach hist. d. végét. phanér. V, 442.
Hypericum Chamaenerium Steud. nom. bot. I, 787.
 - *sphaerocarpum* Mich. fl. bor. am. II, 78.
 7. *h* *hysopifolium* Spach hist. d. végét. phanér. V, 442. America foed. austr.
Hypericum cistifolium Desr. in enc. méth. bot. IV, 158.
 - *opacum* Torr. and Gr. fl. of N. Amer. I, 163.
 - *rosmarinifolium* Ell. sc. of the bot. of S. Car. II, 20.
 8. *h* *fastigiatum* C. Koch. America foed. austr.
Hypericum fastigiatum Ell. sk. of the bot. of S. Car. II, 31.
 9. *h* *Rugelianum* C. Koch. America boreali-occid.
Hypericum Rugelianum Kunze del. sem. hort. Lips. a. 1847.
 10. *h* *fulgidum* C. Koch. America foed. media.
Hypericum fulgidum Raf. fl. Ludov. 88.

XVI. *Ascyrum* L.

(ἀσχυρον, apud Graecos teste Sprengel *Hypericum perforatum* significat.)

1. *h* *Crux Andréae* L. cod. Nro. 5773. America foederata.
multicaule Mich. fl. bor. amer. II, 77.
oblongifolium Spach in hist. d. végét. phan. V, 346.
hypericifolium Hill. hort. Kew. 172.
Hypericum Crux Andréae Crntz (ubi?).
 β) *angustifolium* Nutt. gen. of N. Amer. pl. II, 16.
 linifolium Spach in hist. d. végét. phan. V, 346.
 γ) *spatulatum* Spach in hist. d. végét. phan. V, 346.
 δ) *helianthemifolium* Spach hist. d. végét. phan. V, 346.
 2. *h* *stans* Mich. fl. bor. amer. II, 77. America foederata.
 ? *hypericoides* L. cod. Nro. 5774.
 β) *obovatum* Chapm. in Torr. and Gr. fl. of N. Amer. I, 157.
 3. *h* *amplexicaule* Mich. fl. bor. amer. II, 77. America foed. austr.
stans Willd. sp. pl. III, 1473.
Hypericum tetrapetalum Lam. enc. méth. bot. IV, 153.
 4. *h* *microsepalum* Torr. and Gr. fl. of N. Amer. I, 157.
Hypericum Isophyllum Steud. nom. bot. ed. 2. 788.
Isophyllum Drummondii Spach hist. d. végét. phan. V, 346.

Fam. 29. Dipterocarpeae.

XVII. *Vatica* L.

(de nominis ratione Linnaeus nihil memorat; an a verbo „vates, Wahrsager“? quia sacerdotēs sacrificantes in China Vatica chinensi L. utuntur.)

1. *h* *robusta* Steud. nom. bot. ed. 2. II, 745. India orient., Himalaya.
Shorea robusta Rxb. fl. ind. II, 615.
 2. *h* *laccifera* W. et Arn. prodr. fl. penins. Ind. or. I, 84. India orient., Himalaya,
 ? *chinensis* L. cod. Nro. 3439. China.
Shorea Talura Rxb. hort. heng. 95. fl. ind. II, 618.
 - *laccifera* Heyne in Wall. num. list. 967.
 - *Roxburghii* G. Don dichl. pl. I, 813.
 - *robusta* Rth nov. pl. sp. 221.

Fam. 30. Ternstroemiaceae.

Trib. 1. Ternstroemiace (Calyx basi bibracteatus).

XVIII. *Ternstroemia* L.

(*Ternstroem*, Holmianus, Chinam permigravit, † 1745.)

1. *h* *Lushia* Ham. in Don prodr. fl. nepal. 225. Nepal.
 ? *Cleyera ochnácea* β. DC. in mém. de la soc. de phys.
 et d'hist. nat. de Gén. I, 413.
 - *Lushia* G. Don dichl. pl. I, 566.
 2. *h* *japonica* Thunb. in transact. of the Linn. soc. II, 335. Sieb.
 et Zucc. fl. jap. I, 148. t. 80. Japonia.
Cleyera japonica Thunb. fl. jap. 224.

XX. *Eurya* Thunb.

(εὐρύς, magnus, gross, ob flores speciosos.)

1. 5 japonica Thunb. fl. jap. 191. t. 25. Japonia, ins. Lurtschu
2. 5 chinensis R. Br. in Abel's narr. of a journ. in China 379. c. ic.;
bot. cab. t. 1213. China.
3. 5 acuminata DC. in mém. de la soc. de phys. et d'hist. nat. I,
418. Royle ill. of the him. mount. 127. t. 25. f. 1. Nepal, Himalaya.
- β) multiflora DC. in mém. de la soc. de phys. et d'hist. nat. de Gén. I, 417.
4. 5 littoralis Sieb. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 163. Japonia.
5. 5 microphylla Sieb. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 163. Japonia.
6. 5 uniflora Sieb. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 163. Japonia.
7. 5 hortensis Sieb. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 163. Japonia.
8. 5 montana Sieb. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 163. Japonia.

XX. *Cleyera* Thunb.

(Andr. Cleyer, batavus, Bataviae medicus medio saeculo praeterito.)

1. 3 Millettii Hook. et Arn. bot. of Beech. voy. 171. t. 33. China (Macao).
2. 3 japonica Thunb. fl. jap. 12. (nec 224.) S. et Z. fl. jap. I, 153. t. 81. Japonia, Nepal.
- ochnácea DC. in mém. de la soc. de phys. et d'hist. nat. de Gén. I, 413.
- β) Wallichiana Royle ill. of the him. mount. 108.
3. 3 Mertensiana S. et Z. fl. jap. 154. Japonia.

XXI. *Pentáphyllax* Gardn. et Champ.

(πεντα, quinque, fuenf et φολαξ, custos, Waechter; an propter sepala 5 persistentia, fructum cingentia?)

1. 5 euryoides Gardn. et Ch. in Hk. journ. of bot. a. Kew gard. misc. I, 245. China (Hongkong).

Trib. 2. *Gordonieae* (Calyx ebracteatus; Capsula 5 locularis).XXII. *Stuartia* Catesb. (Stewartia L. et Cav.)

(Joh. Stuart [Stewart], marchio Bute, botanices cultor saeculi XVIII.)

1. 5 Malacodendron (nec Malachodendron Aut.) L. cod. Nro. 5109. America foederata.
virginica Cav. monad. cl. diss. V. Nro. 438. t. 159. f. 2.
- marilandica Andr. bot. rep. t. 397.
2. 5 pentágyina l'Herit. stirp. nov. 155. t. 74. America foeder. austr.
Malacodendron ovatum Cav. mon. cl. diss. V. Nro. 437. t. 158. f. 2.
bot. reg. t. 1104.
3. 5 monadelpha S. et Z. fl. jap. I, 181. t. 96. Japonia

XXIII. *Gordonia* Ell.

(Alexander Gordon, hortulanus in pago Mile-end prope Londinum ineunte saec. praeter.)

1. 3 lasianthus L. cod. Nro. 5110. bot. mag. t. 688. America foederata.
2. 3 pubescens l'Her. stirp. nov. I, 156. Vent. jard. du Malm. t. 1. America foeder. austr.
Franklinia americana Marsh. arbust. amer. (ed. germ.) 48.
- β) Franklinii l'Her. stirp. nov. I, 156.
Franklinia Alatomáha Marsh. arb. amer. (ed. germ.) 86.
Lacathéa flórida Salisb. par. Lond. t. 56.
3. 3 Wallichii DC. prodr. I, 528. India orientalis, Nepal.
Chilaunea Ham. in Don prodr. fl. nep. 225.
integrifolia Roxb. fl. ind. II. 572.

XXIV. *Schima* Reinw.

(derivatione mihi ignota, forte origine javanica.)

1. 3 superba Grdn. et Ch. in journ. of bot. a. Kew gard. misc. I, 246. Japonia (Hongkong).

Trib. 3. *Camelliaceae* (Calyx ebracteatus; Capsula 3 locularis).XXV. *Camellia* L.

(Georg Jos. Kamel, Bruennae natus, pharmacopola, saec. XVII. insulas Philippinas permigravit et Petiverio, Rajoque multas plantas misit.)

1. 5 Kaempferiana Reoub. in atti della 3. riun. 494. Japonia.
- * 2. 5 japonica L. cod. Nro. 5111. S. et Z. fl. jap. I, 155. t. 82. Japonia.

Thea Camellia Hfmsgg 1. Nachtr. zu d. Verz. d. Pfl. Kult. 117.

- β) *alba plena* bot. cab. t. 269.
 γ) *anemoneiflora* bot. mag. t. 1654.
 δ) *atrorubens* bot. cab. t. 170.
 ε) *crassinervis* Lodd. bot. cab. t. 1475.
 ζ) *imbriata* Lodd. bot. cab. t. 1103.
 η) *imbricata* transact. of the hort. soc. VII, 555. bot. reg. t. 1398.
 θ) *incarnata* bot. reg. t. 112.
 ι) *luteo-albicans* bot. reg. t. 708.
 Welbankii Chandl. ill. t. 27.
 κ) *myrtifolia* bot. mag. t. 1670.
 involuta bot. reg. t. 633.
 λ) *paconiflora* Sab. in transact. of the hort. soc. VII, 547.
 μ) *pomponia* bot. reg. t. 22.
 ν) *rubra plena* bot. repos. t. 199.
 ξ) *Sabiniana* Sab. in transact. of the hort. soc. VII, 557.
 ο) *speciosa* Sab. in transact. of the hort. soc. VII, 554.
 Reevesiana (nec *Ravesiana*) Hort. Chandl. ill. t. 32.
 π) *variegata* bot. reg. t. 887.
 Chandleri Loud. hort. brit. 74.
 * 3. δ *Sasanqua* (nec *Sesangua* DC. *Sasangua* Steud. *Salangua*
 Walp.) Thunb. fl. jap. 273. t. 30. S. et Z. fl. jap. 158. t. 83. Japonia.
 Thea latifolia Aut. nonn.
 Sasangua Nois. (teste Steud.)
 4. 5 *Kissi* Wall. in asiat. res. XIII, 428. Nepal.
 Keina Ham. in Don prodr. fl. nep. 924.
 5. 5 *reticulata* Lindl. in bot. reg. t. 1078. bot. mag. t. 2784. China.
 6. 5 *maliflora* Lindl. bot. reg. ad t. 1078. in adn. transact. of the
 hort. soc. VII, 526. Japonia, China.
 β) *multiplex*; *Sasangua flore pleno* Ker bot. reg. t. 547.
 bot. mag. t. 2080.
 7. 5 *oleifera* R. Br. in Abel's narr. of a journ. in China 363.
 bot. reg. t. 942. China.
 8. 5 *euryoides* Lindl. bot. reg. t. 983. bot. cab. t. 1493. China.
 Thea euryoides Booth in transact. of the hort. soc. VII, 560.

XXVI. *Thea* L.

- * 1. 5 *chinensis* L. sp. pl. ed. 1. bot. mag. t. 3148. China, Japonia.
 Bohea β. *stricta* Ait. hort. Kew. ed. 2. III, 303.
 cantoniensis Lour. fl. coch. 414. bot. cab. t. 227.
 viridis L. cod. Nro. 3883.
 Camellia viridis Lk. enum. pl. hort. Berol. II, 73.
 β) *Bohea* L. cod. Nro. 3882. bot. mag. t. 998.
 Camellia Thea Lk. enum. pl. hort. Berol. II, 73.
 γ) *latifolia* Lodd. bot. cab. 1828.
 2. 5 *oleosa* Lour. fl. coch. 414. China (Canton).
 ? *Camellia oleifera* R. Br. in Abel's narr. of a journ. in China 363.

Fam. 31. *Oleaceae*.

XXVII. *Cassipourea* Juss.

(*Tsjeru-Cassjeram*, nomen indicum.)

1. δ *lanceolata* Benth. in Hook. Lond. journ. of bot. I, 491. China (Hongkong).

XXVIII. *Schoepfia* L.

(*Joannes Schoepflus* anno 1622 *hortum Ulmensem* edidit.)

1. 5 *chinensis* Grdn. et Ch. in journ. of bot. a. Kew gard. misc. I, 308. China (Hongkong).
 2. 5 *jasminodora* S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 8. 135. Japonia.
 3. δ *fragrans* Wall. in Rxb. fl. ind. edit. Seramp. 1824. II, 188.
 tent. fl. nep. I, 18. t. 9. Nepal.
 4. δ *acuminata* Wall. num. list. Nro. 486. Nepal.

XXIX. *Oleax* L.

(*oleax*, riechend, quia lignum teterrimum odorem spirat.)

1. δ *nana* Wall. num. list. Nro. 6783. ann. of nat. hist. VII, 217.

XXX. *Tripetaloleia* S. et Z.

(τρι, tres, drei et πετάλον, folium corollae, Blumenblatt.)

1. 5 paniculata S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. III, 731. t. 3. f. 2. Japonia.

Fam. 32. *Aurantiaceae*.XXXI. *Triphásia* Lour.

(τριφασος, triplex, dreifach, a forma ternaria foliorum perigonique utriusque.)

1. 5 aurantiola Lour. fl. coch. 189. India orientalis, China,
 trifoliata DC. prodr. I, 536. Jacq. ic. pl. rar. t. 463. Cochinchina.
 Limonia trifoliata L. cod. Nro. 3053.
 - diacantha DC. prodr. I, 536.

XXXII. *Atalantia* Correa.

(ob fructus aurantiacos; nam Hippomanes Atalantam, filiam Schoenios, quae tantum viro celerius currenti se ipsam nubere voluit, malis aureis ad terram projectis, vicit.)

1. 5 monophylla DC. prodr. I, 535. India orientalis, China,
 Limonia monophylla L. cod. Nro. 3052. Roxb. pl. of Corom. t. 83. Cochinchina.
 Trichilia spinosa W. sp. pl. fl. 554.
 Turraea virens Hell. in act. Holm. 1788, 294. t. 10. f. 1.

XXXIII. *Limonia* L.

(„Limonia“ scripsit Raj. hist. pl. II, 1656. Teste G. Don Arabes citrum „limun“ vocant.)

1. 5 retusa Don prodr. fl. nep. 224. Nepal.
 2. 5 acidissima L. cod. Nro. 3054. Rumph herb. amb. II, t. 43. India orient., ? Florida.
 ambigua DC. prodr. I, 222.
 orenulata Rxb. pl. of Corom. I, t. 86. (teste W. et Arn.)

XXXIV. *Cookia* Sonn.

(ad honorem James Cook, qui pluries, ut scrutaretur, orbem terrae circumvexit, caesus est ab incolis insulae Tahiti a. 1779.)

1. 5 punctata Retz obs. bot. VI, 29. Jacq. hort. Schoenbr. I, t. 101. China, India orientalis,
 Quinaria Lansium Lour. fl. coch. 334. ins. Moluccanae.
 Lansium domesticum Jack in Spr. syst. veg. III, 66.
 Limonia ? pubescens Wall. num. list. 4338.

XXXV. *Murraya* Koen.

(Joh. And. Murray, professor botanices Gottingae, † 1791.)

1. 5 exotica L. cod. Nro. 3022. Wight ic. pl. I. t. 96. India orient., Himalaya,
 Chalca japonensis Lour. fl. coch. 332. China, Japonia.
 - paniculata L. cod. Nro. 3021.
 Marsana buxifolia Sonn. voy. aux Ind. orient. et à la Chine III. t. 139.
 2. 5 paniculata Jack in Hook. bot. misc. II, 79. China, Cochinchina.
 Chalca paniculata Lour. fl. coch. 331.

XXXVI. *Glycosmis* Corr.

(γλυκος, dulcis, suess et οσμη, odor, Geruch, ob flores optime olentes.)

1. 5 citrifolia Lindl. in transact. of the hort. soc. VI, 72. China.
 parvifolia Sims. (teste Steud.)
 Limonia citrifolia Willd. hort. Ber. 448.
 - parviflora Sims. bot. mag. t. 2416.

XXXVII. *Aegle* Corr.

(Aegle, Hesperii filia, cum duabus sororibus hortum pomis aureis insignem possedit.)

1. 5 sepiaria DC. prodr. I, 538. Kaempf. amoen. 801. t. 802. Japonia.
 Citrus trifoliata L. cod. Nro. 5729.

XXXVIII. *Citrus* L.

(κιτριον et Citrus derivatione incertá.)

1. 5 microcarpa Bge in mém. d. sav. étrang. de l'ac. de St. Pét. II, 84. China.
 * 2. 5 decumana L. cod. Nro. 5728. Rumph. herb. amb. II, t. 24. f. 2. China, Japonia.
 3. 5 inermis Rxb. fl. ind. III, 393. China.
 4. 5 japonica Thunb. fl. jap. 292. icon. pl. japon. t. 15. S. et Z.
 fl. jap. I, t. 16. Japonia.

5. *5 fasca* Lour. fl. coch. 571. Rumph. herb. amb. II. t. 33. China, Cochinchina, Ins. Moluccanae.
 6. *5 nobilis* Lour. fl. coch. 569. bot. rep. t. 608. China, Cochinchina.
 β) minor bot. reg. t. 211.
 7. *5 margarita* Lour. fl. coch. 570. China (Canton).
 8. *5 Madurensis* Lour. fl. coch. 570. Rumph. herb. amb. II. t. 31. China, Cochinchina.
 9. *5 buxifolia* Poir. in enc. méth. V, 681. China.

XXXIX. *Skimmia* Thb.

(Mijama Skimmi, nomen japonicum.)

1. *5 japonica* Thb. fl. jap. 62. ic. fl. jap. t. 5. S. et Z. fl. jap. t. 68. Japonia.
 lex *Skimmia* Spr. syst. veg. I, 495.
 2. *5 Lauréola* S. et Z. fl. jap. I, 127. Nepal, Japonia.
 Limonia Laurebla DC. prodr. I, 536. Wall. pl. asiat. rar. III. t. 245.

Fam. 33. *Clusiaceae*.XI. *Clusia* L.

(Charles de l'Ecluse, vulgo Clusius, professor Lugduni Batavorum, autor operis gravissimi: rariorum plantarum historiae, † 1609.)

1. *5 rósea* L. cod. Nro. 7627. Catesby nat. hist. of Car. Flor. t. 99. Florida, India occid.

XII. *Calophyllum* L.

(καλος, pulcher, schoen et φλλον, folium, Blatt.)

1. *5 membranaceum* Gard. et Champ. in Hook. journ. of bot. and Kew gard. misc. I, 309. China (Hongkong).
 2. *5 Inophyllum* L. cod. Nro 3968. Hk. bot. misc. II, t. 17. Japonia (Bonina),
 Brintagor Rxb. fl. ind. II, 607. Cochinchina,
 Balsamaria Inophyllum Lour. fl. coch. 574. India orientalis.
 3. *5 spectabile* W. in d. Ges. naturf. Fr. zu Berl. Mag. V, 8. China, India orientalis,
 acuminatum Lam. enc. méth. I, 553. Java, ins. Mauritius.
 Suriga Buch. in Rxb. fl. ind. II, 608.

XIII. *Garcinia* L.

(Laur. Garcin, Gratianopolitanus, Indiam orientalem permigravit, † 1752.)

1. *5 cochinchinensis* Choisy in DC. prodr. I, 561. China, Cochinchina,
 amboinensis Spr. syst. veg. II, 448. India orientalis.
 Brintonia cochinchinensis Pet. Th. in dict. d. sc. nat. V, 341.
 Oxycarpus cochinchinensis Lour. fl. coch. 796.
 Stalagmites cochinchinensis G. Don dichl. pl. I, 620.

XIII. *Mesua* L.

(Jahiah ebn Masawaih, vulgo Mesue major natu, regis (Chaliphæ) Harun al Raschid archiater, † 857. Masawaih ebn Hamech, Avicennæ discipulus, vulgo Mesue minor natu, regis (Chaliphæ) Al Hakem Cahiræ archiater, canones generales de medicamentis simplicibus scripsit, † 1028.)

1. *5 speciosa* Choisy in DC. prodr. I, 562. Wight spic. Neilgh. I, t. 30. 31. India orientalis, Nepal.

XLIV. *Dichrea* Lour.

(δύς, bis, zweimal et χροα, color, Farbe.)

1. *5 febrifuga* Lour. fl. coch. 369. Cochinchina, China.

Fam. 34. *Meliaceae*.XLV. *Turraea* L.

(Turre, professor Patavinus, nonnulla opera botanica: Junonis et Vestis vires a. 1668 et Dryadum, Amadryadum, Chloridisque triumphum a. 1685 scripsit.)

1. *5 pubescens* Hell. in nov. act. Holm. 1788. 296. t. 10. f. 3. China (insula Hainan).

XLVI. *Melia* L.

(μελια apud Homerum et omnino apud Graecos Fraxinus Ornus L.)

- * 1. *5 Azedarách* (nec Azedarak Rxb.) L. cod. Nro. 3031. bot. Graecia, Syria,
 mag. t. 1066. India orientalis,
 Azederach deleteria Munch meth. 171. China, Japonia.

2. ♂ Bukáyum Royle ill. of the him. mount. 141. Persia, India orientalis.
 3. ♂ japonica G. Don dichl. pl. I, 680. Japonia.
 4. ♂ Hasskarli C. Koch. Japon.(nec JavaWalp.).
 japonica Hasst. cat. alt. pl. hort. Bogor. 219.
 5. ♂ Toosendan S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 159. China, ? Japonia.

XLVII. Aglaja Lour.

(ἀγλαία, splendor, Glanz, ex plantae nitore, odore et venustate.)

1. ♀ odorata Lour. fl. coch. 216. Rumph. herb. amb. V, t. 18. f. 2. China, Cochinchina.
 Opilia odorata Spreng. syst. veg. I, 766. II, 757.
 ? Vitex pinnata L. cod. Nro. 4640.
 2. ♀ decandra Wall. in Roxb. fl. ind. II, 427. Nepal, Himalaya.
 Sphaerosacma fragrans Wall. in Royle ill. of the him. mount. 141.

XLVIII. Amoora Rxb. (Amura Schult.)

(Amur, nomen bengalicum.)

1. ♂ laxa Royle ill. of the him. mount. 141. Nepal, Himalaya.

II. Heynea Rxb.

(Dr. Benj. Heyne per annos 25 Indiam orient. permigr. et a. 1819 prope Madras obiit.)

1. ♂ trijuga Rxb. fl. ind. II, 390. bot. mag. t. 1738. Nepal.

Fam. 35. Cedrelaceae.

L. Cédrela L.

(Num ex Cedrelate contraxit Linnaeus nomen, ob Cedri similitudinem?)

1. ♂ Toona Roxb. pl. of the coast of Corom. t. 238. India orientalis, Nepal.
 β) hexandra Royle ill. of the him. mount. 142.
 2. ♂ serrata Royle ill. of the him. mount. 144. t. 24. Himalaya.
 3. ♂ sinensis A. Juss. mém. du Mus. d'hist. nat. XIX, 255. 294. China (Peking).
 chinensis Karel. in Bull. de la soc. d. nat. de Mosc. VII, 148.

Fam. 36. Erythroyleae.

LII. Sethia H. B. et K.

(Simeon Seth, medicus et protobestarches Constantinopoli, exeunte 11. saeculo συναρμα περι τροφων δυναμεων scripsit.)

1. ♂ indica DC. prodr. I, 576. China, India orientalis.
 Erythroxylon monógynum Rxb. pl. of Corom. I, t. 88.

Fam. 37. Pittosperae.

LII. Pittosperum Banks.

(πίττα, resina, Harz et σπορα s. σπέρμα, ob capsulam resina liquida scatentem.)

1. ♀ eriocarpum Royle ill. of himal. pl. 77. Himalaya.
 2. ♀ floribundum Wight et Arn. prodr. fl. pen. Ind. or. I, 154. India orientalis, Nepal.
 Senacia nepalensis (napaulensis, nipaulensis) DC. prodr. I, 347.
 Celastrus verticillata Rxb. hort. beng. 18. fl. ind. I, 624.
 - nepalensis Steud. nom. bot. ed. 2. I, 315.
 * 3. ♀ Tobira Ait. hort. Kew. ed. 2. II, 27. bot. mag. t. 1396. Japonia.
 chinense Donn hort. Cantabr. 48. (in ed. 12. frustra quaes.)
 arbutifolium Hort.
 Evónymus Tobira Thunb. fl. jap. 99.
 β) foliis variegatis Lodd. catal. 37.
 4. ♀ glabratum Lindl. journ. of the hort. soc. I, 230. adn. China (Hongkong).
 5. ♀ pauciflorum Hook. and Arn. bot. of Beech. voy. 168. t. 32. China (Macao),
 β) obtusifolia H. and Arn. bot. of Beech, voy. 259. ins. Bonin et Lutschu.

LIII. Stachyúrus Sieb. et Zucc.

(σταχυς, spica, Aehre et όυρα, cauda, Schwanz.)

1. ♀ praecox S. et Z. fl. jap. I, 43. t. 18. Japonia.

INDEX.

- Adenotrias** J. et Sp. V.
 Kotschyi J. et Sp. 2.
 phrygia J. et Sp. 1.
Aegle Corr. XXXVII.
 sepiaria DC. 1.
Aglaja Lour. XLVII.
 decandra Wall. 2.
 odorata Lour. 1.
Amoora Rxb. XLVIII.
 laxa Royle 1.
Amura Schult. s. Amoora.
Ancistrolobus Spach IV.
 ligustrinus Spach 1.
Androsæmum All. X.
 adenophyllum C. Koch 7.
 emarginatum C. Koch 2.
 hircinum Spach 5.
 officinale All. 1.
 parviflorum Spach 3.
 pyramidale Spach 4.
 - grandifolium Spach 3.
 vulgare Grtn. 1.
 xylosteifolium Spach 6.
Ascyrum L. XVI.
 amplexicaule Mich. 3.
 angustifolium Nutt. 1 β.
 coriaceum Mneh XI, 1,
 Crux Andreae L. 1.
 glandulosum Mneh XII, 1.
 helianthemifolium Spach 1 δ.
 hypericifolium Hill 1.
 hypericoides L. 2.
 linifolium Spach 1 β.
 microsepalum T. et Gr. 4.
 monogynum Mneh XIII 2.
 multicaule Mich. 1.
 oblongifolium Spach 1.
 obovatum Chapm. 2 β.
 spathulatum Spach 1 γ.
 stans Mich. 2.
 - W. 3.
Atalantia Correa XXXII.
 monophylla DC. 1.
Azederach deletaria Mneh XLVI, 1.
Brathydium Spach XV.
 ambiguum C. Koch 4.
 aureum C. Koch 1.
 fastigiatum C. Koch 8.
 fulgidum C. Koch 10.
 grandiflorum Spach 3.
 hyssopifolium Spach 7.
 myrtifolium C. Koch 2.
 nudiflorum C. Koch 5.
 Rugelianum C. Koch 9.
 sphaerocarpum Spach 6.
Calophyllum L. XLI.
 acuminatum Lam. 3.
 membranaceum Grdn. et Ch. 1.
 spectabile W. 3.
 Suriga Ham. 3.
Camellia L. XXV.
 anemonaeflora bot. mag. 2 γ.
 Chandleri Loud. 2 π.
 crassinervis Lodd. 2 ε.
 euryoides Ldl. 8.
 japonica L. 2.
 imbricata Lodd. 2 η.
 Kaempferiana Reb. 1.
 Keina Don 4.
 Kissi Wall. 4.
 maliflora Ldl. 6.
 myrtifolia bot. mag. 2 α.
 oleifera R. Br. 7. et XXVI, 2.
 paeoniflora Sab. 2 λ.
 pomponia bot. reg. 2 μ.
 reticulata Ldl. 5.
 Sabiniana Sab. 2 ξ.
 Sasanqua Thb. 3.
 - flore pleno bot. reg. 6 β.
 speciosa Sab. 2 ο.
 Thea Lk. XXVI, 1 β.
 viridis Lk. XXVI, 1.
 Welbankii 2 α.
Cansjera Juss. XXVII.
 lanceolata Benth. 1.
Cedrela L. 1 α.
 hexandra Royle 1 β.
 serrata Royle 2.
 sinensis A. Juss. 3.
 Toona Rxb. 1.
Celastrus nepalensis Steud. LII, 2.
 verticillata Rxb. LII, 2.
Chalcas japonensis Lour. XXXV, 1.
 paniculata L. XXXV, 1.
 - Lour. XXXV, 2.
Citrus L. XXXVIII.
 buxifolia Poir. 9.
 decumana L. 2.
 fusca Lour. 5.
 japonica Thunb. 4.
 inermis Rxb. 3.
 Madurensis Lour. 8.
 margarita Lour. 7.
 microcarpa Bge 1.
 nobilis Lour. 6.
 trifoliata L. XXXVII, 1.
Cleyera Thb. XX.
 japonica Thunb. 2. et XVIII, 2.
 Lushia G. Don XVIII, 1.
 Mertensiana S. et Z. 3.

- Cleyera Millettii** H. et Arn. 1.
ochracea DC. 2.
 - β . DC. XVIII, 1.
Wallichiana Royle 2 β .
Clusia L. XL.
rosea L. 1.
Cookia Sonn. XXXIV.
punctata Retz 1.
Dichroa Lour. XLIV.
febrifuga Lour. 1.
Elodea chinensis Hance IV, 1.
Russegeri Walp. VI, 5.
Eremanthe Spach XI.
calycina Spach 1.
cordifolia C. Koch 4.
patula C. Koch 2.
venosa C. Koch 3.
Eremosporus Spach VIII.
Oliverii Spach 1.
Erythroxylon monogynum Rxb. LI, 1.
Eurya Thb. XIX.
acuminata DC. 3.
chinensis R. Br. 2.
hortensis Sieb. 7.
japonica Thunb. 1.
littoralis Sieb. 4.
microphylla Sieb. 5.
montana Sieb. 8.
uniflora Sieb. 6.
Evonymus Tobira Thunb. LI, 5.
Franklinia Alatomaha Marsh. XXIII, 2 β .
americana Marsh. XXIII, 2.
Garcinia L. XLII.
amboinensis Spr. 1.
cochinchinensis Choisy. 1.
Glycosmis Corr. XXXVI.
citrifolia Ldl. 1.
parvifolia Sims. 1.
Gordonia Ell. XXIII.
Chilaunea Ham. 3.
Franklinii l'Her. 2 β .
integrifolia Rxb. 3.
lasianthus L. 1.
pubescens l'Her. 2.
Wallichii DC. 3.
Heynea Rth. II.
trijuga Rxb. 1.
Hypericum L. IX.
adenophyllum Led. X, 7.
adpressum Bartr. XIV, 2.
aegyptiacum L. VI, 1.
 - β . Steud. VI, 2.
afrum Lam. 7.
ambiguum Ell. XV, 4.
amoenum Pursh XV, 1.
Androsæmum L. X, 1.
Ascyrum Mill. XI, 1.
aspalathoides W. XIV, 5 β .
aureum Lour. XIII, 2.
 - Bartr. XV, 1.
axillare Lam. XIV, 4 β .
bacciferum Lam. X, 1.
balearicum L. XII, 1.
Bartremicum Mill. XIII, 6.
biflorum Desr. IV, 1.
Bonapartense Bartr. XIV, 2.
Hypericum brachyphyllum Steud. XIV, 5 β .
bracteatum Don XI, 4.
calycinum L. XI, 1.
canariense Camb. X, 5.
carneum Wall. IV, 1.
cernuum Rxb. XIII, 4.
Chamaenerium Steud. XV, 6.
chinense L. XIII, 2.
 - Retz IV, 1.
cistifolium Desr. XV, 7.
cochinchinense Lour. IV, 1.
cordifolium Choisy. XI, 4.
Coris Walt. XIV, 5.
creticum Hort. VI, 1.
Crux Andreæ Crantz XVI, 1.
cryptopetalum Lam. XIV, 1.
densiflorum Pursh XIV, 1.
dolabriforme Vent. XV, 3.
elatum Ait. X, 3.
 - Desr. X, 4.
emarginatum Lam. X, 2.
empetrifolium W. 10.
ericoides L. 11.
fasciculatum Lam. XIV, 5.
 - Mich. XIV, 4 β .
fastigiatum Ell. XV, 8.
foliosum Jcq. XIV, 1.
frondosum Mich. XV, 1.
fulgidum Raf. XV, 10.
galloides Lam. XIV, 4.
 - Pursh XIV, 1 β .
glaucum Mich. XV, 2.
heterophyllum Vent. 3.
hircinum L. X, 5.
inodorum W. X, 6.
Isophyllum Steud. XVI, 4.
Kalmianum W. XIII, 6.
 - Dur. XIV, 1.
ligustrinum Banks XV, 5.
Loureiroi C. Koch 12.
lusitanicum Poir. 8.
Michauxii Desr. XIV, 4 β .
monogynum L. XIII, 2 β .
 - Thb. XIII, 1.
myrtifolium Lam. XV, 2.
myrtilloides Fenzl 2.
nanum Poir. 1.
nitidum Lam. XIV, 5.
nudiflorum Mich. XV, 5.
oblongifolium Choisy. XI, 2 XIII, 3.
Olympicum L. 13.
 - Lour. 12.
opacum T. et Gr. XV, 7.
ovalifolium J. et Sp. 4 β .
patulum Thb. XI, 2.
petiolatum Lour. IV, 1 β .
procumbens Mich. XV, 3.
prolificum L. XIV, 1.
pulverulentum Fenzl 9.
ramosissimum Led. 6.
rosmarinifolium Choisy XV, 2.
 - Ell. XV, 7.
 - Lam. XIV, 3.
Rugelianum Kze. XV, 9.
rupestre J. et Sp. 4.
salicifolium S. et Z. XIII, 1.

- Hypericum serpyllifolium** Lam. 5.
 sessiliflorum W. XV, 2.
Spachianum Steud. VI, 3.
 speciosum Wall. XIII, 4.
 spathulatum Steud. XIV, 1 7.
 sphaerocarpum Mich. XV, 6.
 tetrapetalum Lam. XVI, 3.
 Uralum Don XIII, 3.
 venosum Lam. XI, 3.
 Webbii Steud. VI, 4.
Ilex Skimmia Spr. XXXIX, 1.
Isophyllum Drummondii Spach XVI, 4.
Lacathea florida Salisb. XXIII, 2 ̢.
Lansium domesticum Jack XXXIV, 1.
Limonia L. XXXIII.
 acidissima L. 3.
 ambigua DC. 3.
 citrifolia W. XXXVI, 1.
 crenulata Rxb. 2.
 diacantha DC. XXXI, 1.
 Laureola DC. XXXIX, 2.
 monophylla L. XXXII, 1.
 parviflora Sims. XXXVI, 1.
 pubescens Wall. XXXIV, 1.
 retusa Don 1.
 trifoliata L. XXXI, 1.
Linum L. I.
 arboreum S. et Sm. 5.
 - Sims. 4.
 boerhaviaefolium Hort. II, 1.
 caespitosum S. et Sm. 6.
 Cicanoba Ham. II, 2 ̢.
 glandulosum a. Ser. 5.
 globulariaefolium Poir. 6.
 Ortegae Planch. 3.
 persicum Boiss. 7.
 repens Don II, 2.
 salsoloides Lam. 1.
 Simsii Planch. 4.
 suffruticosum L. 2.
 - DC. 1.
 tenuifolium Asso 2.
 trigynum Rxb. II, 1.
 - Sm. II, 2 ̢.
 velutinum Steud. 8.
Malacodendron ovatum Cav. XXII, 2.
Marsana buxifolia Sonu. XXXV, 1.
Martia polyandra Spr. VI, 1.
Melia L. XLVI.
 Azedarach L. 1.
 Bukayun Royle 2.
 Hasskarli C. Koch 4.
 japonica G. Don 3.
 - Hassk. 4.
 Toosendan S. et Z. 5.
Mesua L. XLIII.
 speciosa Choisy 1.
Murraya Koen. XXXV.
 exotica L. 1.
 japonensis Raeusch. 1.
 paniculata DC. 2.
Myriandra Spach XIV.
 adpressa C. Koch 2.
 aurea Spach XV, 1.
 brachyphylla Spach 5 ̢.
Chamaenerium Spach XV, 6.
Myriandra galioides Spach 4.
 glauca Spach XV, 2.
 Michauxii Spach 4 ̢.
 nitida Spach 5.
 nudiflora Spach XV, 5.
 prolifica Sp. 1.
 rosmarinifolia C. Koch 3.
 spathulata Spach 1 7.
Norysca Spach XLI.
 cernua C. Koch 4.
 chinensis Spach 2.
 Kalmiana C. Koch 6.
 myrtifolia Spach 5.
 salicifolia C. Koch 1.
 Urala C. Koch 3.
Olax L. XXIX.
 nana Wall. 1.
Olympia glauca Spach IX, 13.
Opilia odorata Spr. XLVII, 1.
Oxycarpus cochinchinensis Lour. XLII, 1.
Pentaphylax Grdn. et Ch. XXI.
 euryoides Grdn. et Ch. 1.
Pittosporum Banks LII.
 arbutifolium Hort. 3.
 chinense Donn 3.
 eriocarpum Royle 1.
 floribundum W. et Arn. 2.
 glabratum Lindl. 4.
 pauciflorum H. et Arn. 5.
 Tobira Ait. 3.
Psorophyllum Spach XII.
 undulatum Spach 1.
Quinnaria Lansium Lour. XXXIV, 1.
Reinwardtia Dumort. II.
 repens Planch. 2.
 tetragyna Planch. 3.
 trigyna Planch. 1.
Roucheria Planch. III.
 Griffithiana Planch. 1.
Schima Reinw. XXIV.
 superba Grdn. et Ch. 1.
Schoepfia L. XXVIII.
 acuminata Wall. 4.
 chinensis Grdn. et Ch. 1.
 fragrans Wall. 3.
 jasminodora S. et Z. 2.
Senecia nepalensis DC. LII, 1.
Sethia H. B. K. LI.
 indica DC. 1.
Shorea laccifera Heyne XVII, 2.
 robusta Roth XVII, 2.
 - Rxb. XVII, 1.
 Roxburghii G. Don XVII, 2.
 Talura Rxb. XVII, 2.
Skimmia Thb. XXXIX.
 japonica Thb. 1.
 Laureola S. et Z. 2.
Sphaerosacma fragrans Wall. XLVII, 2.
Stachyurus S. et Z. LIII.
 praecox S. et Z. 1.
Stalagmites cochinchinensis G. Don XLII, 1.
Stewartia Cav. v. Stuartia.
Stuartia Catesb. XXII.
 Malacodendron L. 1.
 marilandica Andr. 1.
 monadelphica S. et Z. 3.

- Stuartia pentagyna** Hier. 2.
virginica Cav. 1.
Ternstroemia L. XVIII.
japonica Thunb. 2.
Lushia Ham. 1.
Thea L. XXVI.
Bohea L. 1 β .
- β . *stricta* Alt. 1.
Camellia Hfmsgg XXV, 2.
chinensis L. 1.
cantonensis Lour. 1.
euryoides Booth XXV, 8.
latifolia Aut. XXV, 3.
oleosa Lour. 2.
Sasangua Nois. XXV, 3.
viridis L. 1.
Thymopsis J. et Sp. VII.
aspera J. et Sp. 1.
Triadenia Spach VI.
aegyptiaca Jack 1.
Triadenia microphylla Spach 1.
Russeggeri Fenzl 5.
Sieberi Spach 2.
thymifolia Spach 3.
Webbii Spach 4.
Trichilia spinosa W. XXXII, 1.
Tripetaleia S. et Z. XXX.
paniculata S. et Z. 1.
Triphasia Lour. XXXI.
aurantiola Lour. 1.
trifoliata DC. 1.
Turraea L. XLV.
pubescens Hell. 1.
virens Hell. XXXII, 1.
Vatica L. XVII.
chinensis 2.
laccifera W. et Arn. 2.
robusta Steud. 1.
Vismia cochinchinensis Spr. IV, 1.
Vitex pinnata L. XLVII, 1.



ORDO VII.

Lobocarpae.

Fam. 38. Staphyleaceae.

I. *Ochranthe* Lindl.

(*ωχρος*, pallidus, blass et *αυθος*, flos, Bluethe.)

1. 5 arguta Lindl. bot. reg. t. 1819.

China.

II. *Staphylia* L.

(*σταφυλη*, uva, hoc loco racemus, Traube.)

1. 5 simplicifolia Gardn. et Ch. in Journ. of bot. and Kew
gard. misc. I, 309.

China (Hongkong).

2. 5 Emodi Wall. num. list.

Himalaya.

3. 5 Bumalda DC. prodr. II, 2. S. et Z. fl. jap. I, 180. t. 95.

Japonia.

Bumalda trifolia Thunb. fl. jap. 114.

- * 4. 5 trifolia L. cod. Nro. 2148. Torr. fl. of New-Y. I, 139. t. 19.
Staphylodendron trifoliatum Mueh meth. 65.

America britannica
et foederata.

5. 5 colchica Stev. in ann. d. sc. nat. 3. sér. XII, 1. 375.

Transcaucasia occid.

- * 6. 5 pinnata L. cod. Nro. 2147.

Europa austr.-orient.
Orions.

Staphylodendron pinnatum Scop. fl. carn. I, 223.

III. *Turpinia* Vent.

(P. J. F. Turpin, Parisiensis, plantarum pictor insignis cum botanico Poiteau flore parisiense et pomologie française, opera illustrata, edidit, † 1840.)

1. 5 nepalensis Wall. num. list. Nro. 4277. Wight spic. fl.

Neilgh. I, 39. t. 44.

Nepal.

2. 5 pomifera DC. prodr. II, 3.

India orient., Nepal.

Dalrymplea pomifera Rxb. fl. cor. III, 76. t. 279.

IV. *Miscaphis* (nec *Eutraphis* Walp.) Sieb. et Zucc.

(cò, pulchre, schoen et *σκαφς*, scaphula, Kahn, ob capsulas scaphiformes.)

1. 5 staphyleoides S. et Z. fl. jap. I, 124. t. 67.

Japonia.

Sambucus japonica Thb. fl. jap. 125.

2. 5 simplicifolia S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 151.

Japonia.

Fam. 39. Acerineae.

V. *Acer* L.

(*Acer jam* apud Latinos Ahorn; derivatio a verbo „acer, scharf“ maxime dubia mihi videtur.)

A. Folia integerrima.

1. 5 oblongum Wall. in DC. prodr. I, 593. Jacquem. voy. aux
Ind. orient. IV, 31. t. 34.

Nepal.

laurifolium D. Don prodr. fl. nep. 249.

2. 5 laevigatum Wall. pl. asiat. rar. II, 3. t. 104.

India orientalis.

3. 5 niveum Blume Rumphia III, 193. t. 167. B. f. 1.

Java.

javanicum Jungh. in Tydschr. nat. Wetens. VIII, 391.

laurinum Hassk. cat. alt. pl. hort. Bogor. 222.

4. 5 cassiaefolium Blume Rumphia III, 193. t. 167. B. f. 2.

5. *distylum* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 154. Japonia.
 6. *carpinifolium* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 154. Japonia.
 7. *javanicum* Vitm. summ. plant. VI, 36. Java.
- B. Folia serrata et saepius lobata; Flores racemosi.**
8. *sterculiaceum* Wall. pl. asiat. rar. II, 3. t. 105. Nepal.
 9. *caudatum* Wall. pl. asiat. rar. II, 4. et 28. t. 132. Nepal.
 pectinatum Wall. in Steud. nom. I, 11.
 10. *villosum* Wall. pl. asiat. rar. II, 4. Nepal, Himalaya.
 11. *crataegifolium* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 155. Japonia.
 12. *rufinerve* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 155. Japonia.
 13. *micranthum* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 155. Japonia.
 * 14. *tataricum* L. cod. Nro. 7634. Gu. et H. fremde Holzart. t. 97. Europa orientalis
 cordifolium Mach meth. 55. Caucasus.
 * 15. *campestre* L. cod. Nro. 7640. Gu. et H. deutsche Holzart. t. 213. Europa, Asia minor,
 trilobum Gilib. fl. lithuan. V, 198. isthmus caucasicus.
 Marsicum Guss. pl. rar. 375. (nec marucum Walp.)
 β) *Aetnense* Hort.
 γ) *affine* Opiz in Flora VII, Beil. 1. 83.
 δ) *austriacum* Tratt. Arch. d. Gew. K. I, Nro. 36.
 ε) *collinum* Wallr. in DC. prodr. I, 594.
 leiocarpum Opiz in Flora VII, Beil. 1. 82.
 ζ) *eriocarpon* Opiz in Flora VII, Beil. 1. 83.
 η) *foliis variegatis*.
 θ) *integrilobum* Tausch in Flora XII, 547.
 ι) *macrocarpon* Opiz in Flora VII, Beil. 1. 82.
 κ) *microcarpon* Masn. in Flora VII, Beil. 1. 82.
 λ) *microphyllum* Opiz in Flora VII, Beil. 1. 82.
 μ) *molle* Opiz in Flora VII, Beil. 1. 83.
 ν) *nanum* Hort.
 ξ) *orthopteron* Masn. in Flora VII, Beil. 1. 82.
 ο) *palmatifidum* Tausch in Flora XII, 547.
 π) *polycarpon* Opiz in Flora VII, Beil. 82.
 ρ) *quatuorlobatum* Wagn. in Flora VII, Beil. 82.
 σ) *suberosum* Dumort. florula belg. 113.
 16. *sylvestre* Wender. ind. sem. hort. Marburg. a. 1840. Linn. XV. Liter. Ber. 99. Patria ignota.
 * 17. *Pseudoplatanus* L. cod. Nro. 7635. Gu. et H. deutsche Holzart. t. 210. Europa media et austr.,
 montanum Lam. fl. franç. II, 553. isthmus caucasicus.
 quinquelobum Gilib. fl. lith. V, 198.
 platanoides Scop. fl. carn. II, 290.
 β) *acuminatum* Tausch in Flora XII, 548.
 γ) *foliis laciniatis* Loud. hort. brit. 412.
 δ) - *purpureis* Hort.
 ε) - *variegatis* Hort.
 ζ) *longifolium* Heynh. nomencl. bot. hort. 8.
 η) *lutescens* Heinh. nomencl. bot. hort. 8.
 θ) *macropteron* Hayne dendrol. Flor. 212.
 ι) *micropteron* Hayne dendrol. Flor. 212.
 κ) *palmifolium* Borkh. Handb. d. Forstbot.
 λ) *stenopteron* Hayne dendrol. Flor. 212.
 μ) *subobtusum* DC. prodr. I, 594.
 opulifolium Thuill. fl. d. env. de Par. 538.
 ν) *tricolor* Hort.
 ξ) *villosum* Presl del. Prag. 31.
 ο) *vitifolium* Opiz in Flora XII, 549.
 18. *velutinum* Boiss. diagn. pl. orient. nov. VI, 28. Persia (Gilan).
 * 19. *hybridum* Bosc. nouv. cours d'agric. V, 251. Patria ignota.
 * 20. *pensylvanicum* L. cod. Nro. 7639. Tratt. Arch. d. Gew. I. Nro. 41. America britannica
 striatum Lam. enc. méth. bot. II, 381. Duroi Harbk. et foederata.
 Baumz. I, t. 1.
 canadense Duh. traité d. arbr. et arbr. I, t. 12,
 β) *integrifolium* G. Don diehl. pl. I, 648.
 * 21. *Boscii* Spach in ann. d. so. nat. 2. sér. II, 2. 162. Patria ignota.
 lobatum Bosc. in hort.

- * 22. *♂* *spicatum* Lam. enc. méth. bot. 391. America brit. et foed.
montanum Ait. hort. Kew. ed. 1. III, 435. Gu. et H. Abb. fr. Holzart. t. 48.
pensylvanicum Duroi Harbk. Baumz. I, 22.
parviflorum Ehrh. Beitr. z. Naturk. IV, 25.
 β) *foliis variegatis* Duroi Harbk. Baumz. I, 23.
- * 23. *♂* *macrophyllum* Pursh fl. Amer. sept. I, 267. Hook. fl. bor. Am. bor.-occ., Californ.
 amer. t. 38.
- C. Folia serrata et saepius lobata; Flores umbellati aut corymbosi.**
- * 24. *♂* *trifidum* Thunb. fl. jap. 163. Japonia.
 β) *integrifolium* Thunb. fl. jap. 163.
 γ) *grandifolium* Thunb. fl. jap. 163.
- * 25. *♂* *sempervirens* L. cod. Nro. 7633. Oriens.
heterophyllum Willd. Berl. Baumz. 12.
sempervirens δ. *nanum* Tausch in Flora XII, 550.
creticum Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 2. 174.
 β) *cuneifolium* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 2. 174.
26. *♂* *creticum* L. cod. Nro. 7642. Ins. Archipelagi, Creta.
sempervirens Tausch in Flora XII, 550.
monsessulanum β. L. spec. pl. ed. 1. (a. 1753.) 1056.
 β) *cuneifolium* Tausch in Flora XII, 550.
creticum Willd. sp. pl. IV, 991.
27. *♂* *parvifolium* Tausch in Flora XII, 552. Europa australi-orient.
creticum Hort. Vind. Tratt. Arch. d. Gew. K. I, Nro. 45.
polymorphum B. minus Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 2. 173.
28. *♂* *obtusifolium* S. et Sm. fl. gr. prodr. I, 263. fl. gr. t. 361. Creta.
creticum γ. *sublobatum* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 2. 175.
sempervirens γ. *obtusifolium* Tausch Flora XII, 550.
- * 29. *♂* *coriaceum* Bosc. in Flora XII, 550. Patria ignota.
polymorphum α. *majus* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 2. 173.
- * 30. *♂* *monsessulanum* L. cod. Nro. 7641. Tratt. Arch. d. Gew. Europa australis,
 K. I, Nro. 46. Pannonia, isthm. cauc.
trifolium Duham. traité d. arbr. et arb. I, t. 10. f. 8.
trilobatum Lam. enc. méth. II, 382.
trilobum Mneh meth. 56.
 β) *commutatum* Presl del. Prag. 31.
 γ) *denticulatum* Hort.
 δ) *ibericum* Bieb. fl. taur. cauc. II, 447.
 ε) *illyricum* Jacq. fil. in Rehb. fl. exc. 769.
 ζ) *microcarpum* C. A. Mey. Verz. kauk. Pfl. 206.
31. *♂* *cinerascens* Boiss. diagn. pl. nov. or. VI, 29. Persia australis.
- * 32. *♂* *opulifolium* (nec *opalifolium*) Vill. hist. d. pl. du Dauph. Hispania, Gallia,
 I, 333. III, 802. Ten. in att. d. R. istit. alle sc. nat. Helvetia, Italia,
 di Nap. VII, 320. c. ic. ? Transcauc. (Talysh).
granatense Boiss. elench. pl. hisp. 19.
italum Lauth de acere Nro. 8.
Pseudo-Platanus Seb. et Maur. fl. Rom. prodr. 139.
rotundifolium Lam. enc. méth. III, 382.
 β) *microcarpum* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 171.
 γ) *Opalus* (nec *Opulus*) Ait. hort. Kew. ed. 1. III, 436.
 Ten. in att. d. reale ist. alle sc. nat. di Nap.
 VII, 320. c. ic.
hispanicum Pourr. act. Toul. III, 305.
vernum Reyn.
coriaceum Lodd. (teste Fintelm.)
- * 33. *♂* *obtusatum* Kit. in W. sp. pl. IV, 984. Ten. in att. d. R. Italia, Pannonia,
 istit. alle sc. nat. di Nap. VII, 321. c. ic. Croatia, Rumelia,
hybridum Hort. (teste Fintelm.) Albania.
neapolitanum Ten. fl. nap. t. 100. (quoad plantam floriferam.)
opulifolium β. *tomentosum* Koch syn. ed. 2. 149.
34. *♂* *neapolitanum* Ten. in att. d. R. istit. alle sc. nat. di Nap. Italia inferior.
 VII, 321. c. ic. fl. nap. t. 100. (quoad samaras.) Transcauc. (Talysh).
- * 35. *♂* *hyrcanum* F. et M. ind. IV. sem. hort. Petrop. 31. Himalaya, Nepal.
36. *♂* *cultratum* Wall. pl. asiat. rar. II, 4. Nepal.
37. *♂* *acuminatum* Don prodr. fl. nep. 249. Japonia.
38. *♂* *japonicum* Thunb. fl. jap. 160. Tratt. Arch. d. Gew. K. I, t. 16.

39. δ *polymorphum* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 158. Japonia.
 * β) *dissectum* Thunb. fl. jap. 160. Tratt. Arch. d. Gew. K. I, t. 18.
 * γ) *palmatum* Thunb. fl. jap. 161. Tratt. Arch. d. Gew. K. I, 17.
 * δ) *septémlobum* Thunb. fl. jap. 161.
40. δ *pictum* Thunb. fl. jap. 161. Tratt. Arch. d. Gew. K. I, t. 15. Japonia.
 (huc referunt Sieb. et Zucc. varietates: A. *truncatum* Bge et *laetum* C. A. Mey.)
41. δ *truncatum* Bge in mém. d. sav. étr. de St. Pétersb. II, 84. China borealis.
 * 42. δ *Lobelii* Ten. fl. neap. prodr. suppl. 3. Italia inferior.
 * ? *laetum* C. A. Mey. Verz. kauk. Pfl. 206. isthm. cauc. orientalis.
platanoides β . *integrilobum* Tausch Flora XII, 2. 548.
 - 2. *Lobelii* Loud. arb. brit. I, 409.
 β) *lobis anguloso-cuneatis* Ten. app. 5 ad fl. neap. syll. 5.
- * 43. δ *platanoides* L. cod. Nro. 7638. Gu. et H. deutsche Holzart. t. 211. Europa, Oriens,
lactescens Hort. montes Uralenses.
 * β) *argenteo-variegatum* Hort.
 * γ) *aureo-variegatum* Hort.
 * δ) *laciniatum* Ait. hort. Kew. ed. 1. III, 435. Tratt. Arch. d. Gew. K. I, Nro. 35.
crispum Lauth de acere Nro. 4.
lobatum Hort.
 ϵ) *macrocarpum* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 2. 168.
 ζ) *palmatifidum* Tausch in Flora XX, 2. 548.
platanoides dissectum Jacq. fl. in hort. Vind.
 η) *pubescens* Hayne dendrol. Fl. 215.
44. δ *Platanus* Vitm. summ. plant. VI, 36. India orientalis.
45. δ *circinatum* Pursh fl. Amer. sept. I, 267. Hook. fl. bor. amer. t. 39. America bor.-occid.
46. δ *glabrum* Torr. in ann. lyc. New-York II, 172. America bor.-occid.
47. δ *tripartitum* Nutt. in T. and Gr. fl. of N. Amer. I, 247. America bor.-occid.
48. δ *Douglasii* Hook. Lond. journ. of bot. VI, 77. t. 6. America bor.-occid.
barbatum Dougl. in Hook. fl. bor. amer. I, 113.
grandidentatum Nutt. in T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 247.
49. δ *saccharóphorum* C. Koch. America britannica
saccharinum Mich. fl. hist. d. arbr. for. de l'Amer. sept. et foederata.
 II, t. 15. I, t. 43. Tratt. Arch. d. Gew. K. I, Nro. 32.
palmifolium Thunb. (ubi?)
- * 50. δ *barbatum* Mich. fl. bor. amer. II, 252. Carolina.
- * 51. δ *nigrum* Mich. hist. d. arbr. for. de l'Amer. sept. II, 238. t. 16. America britannica
saccharinum 2. *nigrum* Loud. arb. brit. I, 411. et foederata.
- * 52. δ *saccharinum* L. cod. Nro. 7637. (nec Aut.) America foederata
dasy carpum Ehrh. Beitr. z. Naturk. IV, 24. Tratt. Arch. borealis et media.
 d. Gew. K. I, Nro. 38.
eriocarpum Mich. fl. bor. amer. II, 253.
floridanum Hort.
rubrum Lam. enc. méth. II, 380.
rubrum γ . *pallidum* Ait. hort. Kew. ed. I, III, 434.
tomentosum hort. Paris.
virginianum Mill. dict.
- * 53. δ *rubrum* L. cod. Nro. 7636. Tratt. Arch. d. Gew. K. I, Nro. 39. America borealis.
carolinianum Walt. fl. carol. 251.
 * β) *coccineum* Mich. hist. d. arbr. for. de l'Amer. sept. I, 209.
glaucum Marsh. arb. amer. (ed. germ.) 2.
sanguineum Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. II, 2. 176.
 * γ) *tomentosum* Dsf. tabl. de l'éc. de bot. 136. (teste Dsf.)
 * δ) *trilobum* T. et Gr. fl. of N. Am. I, 249.
54. ? *neglectum* Hfmsgg Preisverz. v. Pfl. VIII. Nachtr. 38.
55. ? *affine* Hfmsgg Preisverz. v. Pfl. VIII. Nachtr. 38.
recurvatum Hort.

D. Folia terna aut quina.

56. δ *sessilifolium* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 158. Japonia.
 Praeterea in horto nostro dendrologico coluntur species aut varietates, nobis non
 satis notae, sequentes: 1) *caucasicum*, 2) *colchicum*, 3) *colchicum fol. var.*, 4) *Pavia*,
 5) *pulverulentum* et 6) *Wagneri*.

VI. *Negundo* Mnch.

- (nomen indicum, quod Acosta primus evulgavit. Conf. Bauh. hist. pl. I, 184.)
 * 1. δ *aceroides* Mnch meth. 334. America borealis.
fraxinifolium Nutt. gen. of N. Am. pl. I, 253. Gu. et H. fr. Holzart. t. 95.

Acer Negundo L. cod. Nro. 7634.

Negundium fraxineum Rafin. in New-Y. med. repos. (hex. 2.) V, 350.

β) *crispum* G. Don dichl. pl. I, 651.

γ) *foliis variegatis*.

2. δ *californicum* Hook. and Arn. bot. of Beech. voy. 327. t. 77. California.
 3. δ *mexicanum* DC. prodr. I, 596. Mexico.
 Acer ternatum Moq. et Sess. in DC. prodr. I, 596.
 4. δ *cochinchinense* DC. prodr. I, 596. Cochinchina.
 Acer pinnatum Lour. fl. coch. 797.
 5. δ *cissifolium* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 159. Japonia.

VII. *Dobinea* Ham.

(nomen nepalense, modo linguae latinae commutatum.)

1. 5 *vulgaris* Ham. in Don prodr. fl. nep. 249. Nepal.

Fam. 40. *Malpighiaceae*.

VIII. *Hiptage* Grtn.

(ἵπταμαι, volo, ich fliege, ob fructus alatos.)

1. § *obtusifolia* DC. prodr. I, 583. China.
 Gaertnèra obtusifolia Rxb. hort. beng. 32. fl. ind. II, 369.
 2. 5 *Madablotia* Grtn. de fr. et sem. II, 169. t. 116. f. 4. India orientalis, Nepal,
 Banisteria bengalensis L. cod. Nro. 3324. China.
 - *unicapsularis* Lam. enc. meth. I, 368.
 - *tetraptera* Sonn. voy. aux Ind. or. et à la Ch. II, 238. t. 135.
 Gaertnèra racemosa Rxb. corom. pl. I, 19. t. 18.
 Molina racemosa Cav. diss. IX, 435.
 Succowia fimbriata Dennst. clav. ad hort. mal.

IX. *Aspidópterys* Adr. Juss.

(ἀσπίς, clypeus, Schild et πτεροῦς, ala, Fluegel.)

1. § *nutans* A. Juss. in arch. du Mus. d'hist. nat. III, 513. India orient., Nepal.
 Miraea nutans Rxb. hort. beng. 34. fl. ind. II, 448. Wall. pl. asiat. rar. I, 13.

X. *Aspicarpa* (neo *Aspicarpa*) A. Rich.

(ἀσπίς, clypeus, Schild et καρπός, fructus, Frucht.)

1. η̄ *hyssopifolia* Asa Gr. in Bost. journ. VI, 167. adn. 1. Texas.

XI. *Janusia* Adr. Juss.

(Janus Cornarius, professor Jenensis, † 1558.)

1. § *californica* Benth. in bot. of Belch. voy. of Sulph. 8. t. 4. California.

Fam. 41. *Zanthoxyleae*.

XII. *Zanthoxylum* L. (*Xanthoxylum* Sm.)

(ξανθός, flavus, gelb et ξύλον, lignum, Holz.)

- * 1. 5 *fraxineum* W. sp. pl. IV, 757. Catesb. nat. hist. of Car. Flor. t. 26. America borealis,
 americanum Wangenh. Beitr. z. Forstw. nordam. Hoeltz. 116. India occidentalis.
 ramiflorum Mich. fl. bor. amer. II, 235.
 tricarpum Hook. fl. bor. amer. I, 118.
 Clava Herculis L. cod. Nro. 7421.
 caribaeum Grtn. de sem. et fruct. I, 333.
 2. 5 *nitidum* DC. prodr. I, 727. bot. mag. t. 2558. China.
 Fagará nitida Rxb. fl. ind. I, 419.
 - *Piperíta* Lour. fl. coch. 101.
 β) *mite* Willd. hort. Berol. 1013.
 3. 5 *schinifolium* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. IV, 2. 137. Japonia.
 4. 5 *ailantoides* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. IV, 2. 138. Japonia.
 5. 5 *planispinum* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. IV, 2. 138. Japonia.
 6. 5 *Piperíta* DC. prodr. I, 725. Japonia.
 Fagará Piperíta L. cod. Nro. 968.
 7. 5 *Beecheyanum* C. Koch. Japonia (ins. Bonin).
 Fagará Piperíta H. et Arn. in Beech. voy. bot. 261.

8. 5 *Avicennae* DC. prodr. I, 726. China, Cochinchina.
Clava Hérculis Lour. fl. cochinch. 810.
Fagará Avicennae Lam. enc. méth. bot. II, 445.
9. 5 *carolinianum* Lam. enc. méth. bot. II, 39. America foederata
media et australis.
tricarpum Mich. fl. bor. amer. II, 235.
fraxinifolium Walt. fl. carol. 243.
Fagará fraxinifolia Lam. illustr. d. genr. t. 334.
10. 5 *alatum* (nec *armatum* DC. prodr. I, 727.) Rxb. hort. beng. Nepal.
72. fl. ind. III, 768.
β) *acanthopodium* DC. prodr. I, 727.
11. 5 *hastile* (nec *hostile* Royle) Wall. Himalaya, India orient.
12. 5 *hórridum* DC. prodr. I, 728. (teste S. et Z. *Gleditschiae* sp.) Japonia.
Fagará hórrida Thunb. in transact. of the Linn. transact. II, 329.
13. 5 *Pteróta* H. B. et Kth. nov. gen. et sp. amer. VI, 3. Texas, Antillae.
Fagará Pteróta L. cod. Nro. 967.
- *lentiscifolia* W. hort. Ber. I, 166.
Schinus Fagará L. sp. pl. ed. I, 389.
14. ? *cauliflorum* Mich. (teste Steud. nom. bot. II, 796.) Tauria.
fraxinifolium Bieb. (teste Steud., sed deest in fl. taur.-cauc.)

XIII. *Toddalia* Juss.

(Kaka-Toddali, nomen malabaricum T. aculeatae Pers.)

1. 5 *floribunda* Wall. pl. as. rar. III, 17. t. 232. Nepal, India orientalis.
Zanthoxylon floribundum Wall. num. list.
2. 5 *aculeata* Pers. syn. pl. I, 249. Ins. Archipel. indici,
Ceylon, ins. Lutschu,
Mauritius, India orient.
Himalaya.
asiatica Lam. enc. méth. VII, 693.
Paullinia asiatica L. cod. Nro. 2886.
Scopolia aculeata Sm. ic. pl. hact. ined. II, t. 34.
β) *nitida* Lam. illustr. d. genr. t. 139. f. 1.
γ) *rubicaulis* W. in R. et S. syst. veg. V, 323.

XIV. *Boymia* Adr. Juss.

(Mich. Boym, Jesuita, floram sinensem Vindobonae a. 1656 scripsit.)

1. 5 *rutaeacarpa* Adr. Juss. in mém. du Mus. XII, 507. t. 25. China, Japonia.

XV. *Megabátrya* Hance.

(μαγας, magnus, gross et βετρυς, uva, Traube.)

1. 5 *meliaeifolia* Hance pl. nov. austr. Chin. 14. Walp. ann. bot. China (Hongkong).
syst. II, 258.

XVI. *Ptélea* L.

(πτελεα apud Graecos *Ulmus campestris* L. et *effusa* W.)

- * 1. 5 *trifoliata* L. cod. Nro. 973. Gu. et H. Abbild. fremd. Holzart. t. 74. America britannica
et foederata.
β) *foliis variegatis.*
γ) *pentaphylla* Muenchh. Hausv. III, 242.
δ) *pubescens* Pursh fl. Amer. sept. I, 107.
2. 5 *Baldwinii* Torr. and Gr. fl. of N. Amer. I, 215. Florida.
3. 5 *mollis* Curt. in Sillim. and Dan. amer. jourm. VII, 407, Texas.
trifoliata β. *mollis* Torr. and Gr. fl. of N. Amer. I, 680.
4. 5 ? *monophylla* Lam. enc. méth. bot. V, 707. (teste Adr. Juss. Carolina.
Rumicis species.)

XVII. *Pitavia* Molin.

(derivatione incognita.)

1. 5 *dumósa* Nutt. in Torr. and Gr. fl. of N. Amer. I, 215. California.

XVIII. *Philagonia* Blume.

(derivatione plane dubia.)

1. 5 *fraxinifolia* Hook. icon. pl. t. 710. Nepal.
Rhus fraxinifolium Don prodr. fl. nep. 248.

XIX. *Thamnosma* Torr. et Frem.

(θαμνος, virgultum, Gesträuch et δσμη, odor, Geruch.)

1. 5 *montana* Torr. in Frém. rep. of the expl. exp. to the rocky mount. 313. California.

IX. Jambolifera L.

(Jambolana, fructus edulis Syzygii Jambolani DC., arboris indicæ, qui ex opinione falsa Linnaei a Jambolifera pedunculata originem trahere dicitur, et ferre, tragen.)

1. ♀ pedunculata Lour. fl. coch. 283.

China (Macao).

Cyminosma chinensis Spreng. syst. veg. II, 216.

Fam. 49. Simarubaceae.**XXI. Ailantus Dsf. (nec Ailanthus Aut.).**

(Ailanto, nomen moluccanum Ailanti glandulosæ.)

* 1. ♀ glandulosa Dsf. in mém. de l'ac. d. Par. a. 1786. 265. t. 8. Mongolia, China,
procéra Salisb. prodr. stirp. hort. ad chap. Allert. 271. ins. Moluccanae.

Rhus Hypsolodendron Mch. meth. 73.

- Caecodendron Ehrh. Beitr. z. Nat. K. II, 111.

- sinense Ell. in phil. transact. II, 870. t. 25. f. 5.

- succedaneum Dum. Cours. botan. cult. ed. 2. VII, 326.

β) foliis variegatis.

XXII. Castela Turp.

(René Rich. Castel poema celebratum „les plantes“ 1797 in lucem edidit, † 1832.)

1. ♀ Nicholsoni Hk. bot. misc. I, 271. t. 56.

Ins. Antillae minores

β) texana T. et Gr. fl. of N. Am. I, 680.

et Galapagos, Texas.

XXIII. Picrasma Blume.

(πικρασμα, amaritudo, Bitterkeit.)

1. ♀ quassioïdes Horsf. et Benn. pl. jav. rar. I, 198. adn.

• Nepal.

Simaba quassioïdes Don prodr. fl. nep. 248.

Zwingera quassioïdes Spreng. syst. veg. IV, 2. 163.

2. ♀ nepalensis (napalensis) Horsf. et Benn. pl. jav. rar. I, 201.

Nepal.

Brucea ? arbor Wall. num. list. Nro. 7499.

3. ♀ ailantoïdes (nec ailanthoides) Planch. in Hook. Lond. journ. V, 573.

China borealis,

Rhus ailantoïdes Bge in mém. d. étrang. sav. de St. Pétersb. II, 89.

Mongolia.

Fam. 48. Ochnaceae.**XXIV. Ochna Schrb.**

(όχνη, pyrum sylvestre, wilde Birn, sine dubio ob fructus acerbos.)

1. ♀ púmila Buchan. in DC. prodr. I, 736.

Nepal, Himalaya:

nana Ham. in Wall. num. list. Nro. 3761.

collina Edgew. transact. of the Linn. soc. XX, 43.

XXV. Brucea Mill.

(James Bruce Aegyptum, Nubiam et Abyssiniam a. 1768—1772 permigravit.)

1. ♀ virginica Horn. hort. (teste Steud., sed deest in horto Hafniensi).

Virginia.

2. ♀ sumatrana Rxb. fl. ind. I, 449.

China, Cochinchina,

sumatrensis Spr. pl. min. cogn. pug. II, 90.

ins. Moluccanae,

Gonus amarissimus Lour. fl. coch. 809.

Sumatra, India orient.

β) gracilis DC. prodr. II, 88.

Ailantus gracilis Salisb. prodr. stirp. hort. Allert 171.

Fam. 44. Rutaceae.**XXVI. Péganum L.**

(πηγανον, apud Graecos rutam i. e. Raute significat.)

1. crithmifolium Retz. obs. bot. III, 34.

Littora orient. maris

Hármala β. crithmifolium DC. prodr. I, 712.

caspii.

XXVII. Boeninghausenia Rehb.

(C. M. F. a Boeninghausen, a consil. rer. publ. admin. Monasterii, prodromum florae Monasteriensem Westphalorum a. 1824 scripsit.)

1. ♀ albiflora Steud. nom. bot. I, 213.

Japonia, Nepal.

Ruta albiflora Hk. exot. fl. t. 79.

XVIII. *Ruta* L.

(ρῶτη apud Graecos et ruta apud Latinos: Raute.)

A. Petala ciliata.

- * 1. *h* bracteosa DC. prodr. I, 710. Rehb. icon. bot. VIII, t. 789. Gallia, Italia, Turcia,
angustifolia Ten. prodr. fl. neap. app. V, 13. ins. Archipelagi.
chalepensis Ten. fl. Napl. I, 222.
- tenuifolia d'Urv. enum. pl. ins. Archip. 44.
- bracteosa Mor. fl. sard. I, 368.
gravéolens All. fl. pedem I, 281.
macrophylla Mor. stirp. sard. elench. I, 11.
- * 2. *h* chalepensis L. cod. Nro. 3015. Africa borealis, Syria:
macrophylla Sol. in bot. mag. t. 2018.
3. *h* fumariaefolia Boiss. et Heldr. in Boiss. diagn. pl. orient.
nov. VIII, 125. Creta.
- * 4. *h* angustifolia Pers. syn. pl. I, 464. Rehb. icon. bot. t. 789.
fl. Germ. V, t. 155. Gallia, Italia, ? China.
chalepensis Vill. hist. d. pl. du Dauph. III, 583.
- β . L. cod. Nro. 3015.
gravéolens L. cod. Nro. 3014. excl. var. β . et γ . (teste Mor.)
- minor All. fl. pedem I, 281.
5. *h* Fernandésia Colla in mem. di Torino XXXVII, 52. Patria ignota.

B. Petala integra.

- * 6. *h* legitima Jcq. icon. rar. I, t. 76. Europa australis, Africa
montana W. sp. pl. II, 543. Rehb. icon. bot. VIII, t. 789. borealis, Oriens.
sylvestris Mill. dict.
- * 7. *h* tenuifolia Dsf. fl. atl. I, 336.
- * 7. *h* gravéolens L. cod. Nro. 3014. β . W. sp. pl. II, 542. Europa australis, Africa
hortensis Lam. fl. franç. II, 527. borealis, Oriens.
- * 8. *h* divaricata Ten. cat. hort. Neap. a. 1819. 42. fl. Napl. t. 36. Littorale, Italia, Turcia.
crithmifolia Moric. in DC. prodr. I, 710. Rehb. icon. bot. VIII, t. 789.
gravéolens L. cod. Nro. 3014. excl. var. β . et γ . (teste Koch).
9. *h* corsica DC. prodr. I, 710. Rehb. icon. bot. VIII, t. 789. Corsica.
divaricata Salzm. in Flora II, 109.

XXIX. *Haplophyllum* (Aplophyllum) Adr. Juss.

(ἀπλοος, simplex, ganz et φύλλον, folium, Blatt.)

1. 5 sulphureum Boiss. diagn. pl. orient. nov. V, 87. Asia minor (Caria).
2. *h* fruticosum G. Don dichl. pl. I, 780. Syria.
3. *h* villosum G. Don dichl. pl. I, 780. Jaub. et Sp. ill. pl. or. t. 264. Transcaucasia.
Ruta parviflora Desf. choix d. pl. de Tourn, t. 54.
- villosa Bieb. fl. taur. caur. I, 310.
4. *h* obtusifolium Led. fl. ross. I, 490. Litt. orient. maris casp.
Ruta obtusifolia Led. in Eichw. pl. nov. casp. cauc. 37. t. 32.
5. *h* virgatum Jaub. et Sp. ill. pl. orient. III, t. 267. Persia australis.
6. *h* Sieversii Fisch. in Schrenk enum. pl. nov. 89. Altai.
perforatum Kar. et Kir. in bull. de la soc. d. nat. de Mosc. XV, 397.

Fam. 45. *Zygophyllaceae*.XXX. *Zygophyllum* L.

(ζυγος, jugum, hoc loco: Blattpaar et φύλλον, folium, Blatt.)

1. 5 atriplicoides Fisch. et Mey. ind. 1. sem. pl. hort. Petrop. 41. Armenia rossica.

XXXI. *Sarcorygium* Bge.

(σαρξ, caro, Fleisch et ζυγος, jugum, hoc loco: Blattpaar.)

1. *h* xanthoxylyum Bge in Linn. XVII, 8. t. 1. Mongolia.

Fam. 46. *Oncoreae*.XXXII. *Cneorum* L.

(κναιρον, apud Graecos Daphnes species significat.)

1. *h* tricoccon L. cod. Nro. 273. Italia, Gallia, Hispania,
chamaelea tricoccos Gaertn. de fr. et sem. I, 342. Mauritania.

Fam. 47. Coriariaceae.**XXXIII. Coriaria L.**

(apud Latinos frutex coriarius, a v. corium, Leder, derivanda.)

1. 5 myrtifolia L. cod. Nro. 7480. Africa bor., Eur. austr.
 2. 5 nepalensis Wall. pl. asiat. rar. III, d. 289. Nepal.

Fam. 48. Euphorbiaceae.**Trib. 1. Buxeeae (Stamina sub ovarii rudimento inserta; Germen 2-ovulatum).****XXXIV. Buxus L.**

(Buxus jam apud Latinos Buchsbaum; verbum forte a πυκνος, dicit, derivandum.)

- * 1. 5 sempervirens L. cod. Nro. 7126. Europa austr., Oriens,
 arborescens Lam. fl. franç. II, 203. China, Cochinchina.
 * β) angustifolia Mill. dict. W. sp. pl. IV, 1. 337.
 * γ) suffruticosa L. cod. Nro. 7126. β. Lam. enc. méth. I, 511.
 * δ) myrtifolia Lam. enth. méth. I, 54.
 * ε) variegata DC. fl. franç. III, 345.
 marginata Hort.
 * 2. 5 balearica Lam. enc. méth. I, 511. Ins. balearicae,
 3. 5 chinensis Lk. enum. pl. hort. Berol. II, 386. China.
 4. 5 microphylla S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 142. Japonia.

XXXV. Gebléra Fisch. et Mey.

(Dr. Gebler, a consiliis statu, de cognitione Siberiae, praesertim altaicae, meritissimus.)

1. ♀ suffruticosa F. et M. ind. sem. pl. hort. Petrop. I, 28. Sibiria (Dauria),
 Xylophylla ramiflora Ait. hort. Kew. ed. 1. I, 376. Mongolia.
 Phyllanthus ramiflorus Pers. syn. pl. II, 591.
 Pharnaceum? suffruticosum Pall. Reis. n. d. versch. Prov.
 d. russ. R. III, app. 716. t. E. f. 2.

XXXVI. Sarcococca Lindl.

(σαρκί, caro, Fleisch et κερκον, nucleus s. bacca, hoc loco: merocarpium, Theilfrucht.)

1. 5 pruniformis, Lindl. in bot. reg. t. 10012. Nepal.
 coriacea Sweet hort. brit. 456.
 Buxus coriacea Spreng. syst. veg. IV, 2. 314.
 Pachysandria coriacea Hook. exot. fl. t. 148.
 β) saligna Don prodr. fl. nep. 63 (sub Buxo).

Trib. 2. Phyllantheeae (Stamina floris centro inserta; Germen 2-ovulatum).**XXXVII. Cloca L.**

(origine ignota.)

1. 5 flexuosa S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 143. Japonia.

XXXVIII. Glochidion Forst.

(γλωχιν, cuspis, Spitze, ob antheras cuspidatas.)

1. 5 obovatum S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 143. Japonia.
 2. 5 sinicum (nec sinaicum S. et Z.) Hk. et Arn. bot. of Beech. voy. 210. China.
 Bradlea sinica Gaertn. de fr. et sem. II, 127. t. 109. f. 1.
 ? Nymphanthus chinensis Lour. fl. coch. 664.
 ? Phyllanthus chinensis Hort.
 ? - villosus Poir. enc. méth. V. 297.
 3. 5 dasyphyllum C. Koch. China.
 molle H. et Arn. bot. of Beech. voy. 210. (nec Blume).

XXXIX. Dichelactina Hance.

(διχρηλος, biungulus, zweihufig et ακτιν, radius, Strahl.)

1. 5 nodicaulis Hance pl. nov. austr. chin. diagn. 2. Walp. ann.
 bot. syst. III, 376.

XL. Melanthesa Blume.

(μελανθης, flos niger, schwarze Bluethe.)

1. 5 chinensis Blume bijdr. 592. China, Cochinchina.
- ? Nymphanthus rubra Lour. fl. coch. 665.
- Phyllanthus introductus Stud. nom. bot. II, 327.
- lucens Poir. enc. méth. V, 296.
- turbinatus Sims in bot. mag. t. 1862.

XLI. Phyllanthus L.

(φυλλον, folium, Blatt et άνθος, flos, Bluethe.)

1. 5 cinerascens H. et Arn. bot. of Beech. voy. 211. China.
2. ♀ parvifolius Don prodr. fl. nep. 63. Nepal.
3. ♀ laxifolius Don prodr. fl. nep. 63. Nepal.

XLII. Emblica (nec Embelica) Gaertn.

(nomen indicum, e voce Sanscritorum Amalaka forte orta ?)

1. 5 officinalis Gaertn. de sem. et fr. II, 122. t. 108. Cochinchina, China, India orient.
- Phyllanthus Emblica L. cod. Nro. 7114

XLIII. Bridélla (nec Briedelia) Willd.

(S. E. a Bridel-Brideri a consiliis secretis legationis Saxo-Gothanae a. 1826 et 1827 bryologiam universum, opus omni laude dignum, in lucem edidit.)

1. 5 Loureiroi H. et Arn. bot. of Beech. voy. 211. China.
- Cluytia monoica Lour. fl. coch. II, 784.

XLIV. Andrachne L.

(άνδραχνη, apud Theophrastum] Arbutum Andrachnem L. et Portulacam oleraceam L. significat.)

1. ♀ fruticulosa Boiss. diagn. pl. orient. nov. VII, 86. Persia australis.
2. 5 chinensis Bge in mém. d. sav. étrang. de St. Petersb. II, 127. China borealis.
3. 5 fruticosa L. cod. Nro. 7351. China, India orientalis.
- β) andrógyna L. mant. 128. sp. pl. ed. 12. 663. (sub Clutia).

XLV. Agynéja L.

(ά priv. et γυνη, hoc loco: flos femineus, qui ovarium quidem sed poris pertusum et nullum stigma habet.)

1. 5 impubes L. cod. Nro. 7352. Adr. Juss. de Euph. gen. tent. t. 6. f. 19. China, India orientis.
- ? Bradléja impuber Rxb. fl. ind. III, 698.
2. 5 púbera L. cod. Nro. 7353. China, ins. Moluccanae.
- ? Bradléja pubera Rxb. fl. ind. III, 698.
3. ? tetrandra Ham. in D. Dietr. syn. pl. V, 383. (s. descr.) Nepal.

Trib. 3. Crotonae (Flor. masc. et saepe fem. corolla praediti; Germen 1-ovulatum.)**XLVI. Tridesmis (nec Tridesmus) Lour.**

(τρεις, tres, drei et δεσμις, fasciculus, Bueschel, ob ternos stylosum fasciculos.)

1. ♀ hispida Lour. fl. coch. 706. Ghina (Canton).
2. 5 tomentosa Lour. fl. coch. 707. China (Canton).

XVII. Tigilium Klotzsch.

(derivatio mihi incognita.)

1. ♂ officinale Klotzsch in Hayne Arzn. Gew. XIV, t. 3. India orientalis, China.
- Croton Tigilium L. cod. Nro. 7276.

XLVIII. Croton L.

(κροτων, apud Graecos Ricinum communem L. significat.)

1. 5 maritimus Walt. fl. carol. 239. America foederata austr.
- disjunctiflorus Mich. fl. bor. amer. II, 114.
2. ♀ argyránthemus Mich. fl. bor. amer. II, 214. America borealis.
- punctatus Jcq. icon. pl. rar. III, t. 621.
3. ♀ congestus Lour. fl. coch. 714. China (Canton).
4. 5 crassifolius Geis. Crot. monogr. 19. China (ins. Hainan).
5. 5 aromaticus L. cod. Nro. 7280. China (ins. Hainan).
- β) lacciferus L. cod. Nro. 7278. India orientalis, Ceylon.
- Aleurites laccifera W. sp. pl. IV, 590.
6. 5 laevigatus Vahl symb. bot. II, 97. China (ins. Hainan).

II. *Hendecandra* Eschsch.

(ἑνδεκα, undecim, eilf et δνρη, vir, hoc loco: stamen, Staubgefaess.)

1. *h* procumbens Eschsch. in mém. de l'ac. de Petersb. X, 287. California.

L. *Rottlera* Rxb.

(*Rottler missus*, qui doctrinam Christianam apud gentes Indiae orientalis propaget, ineunte hoc saeculo multas plantas collegit et cum Willdenowio et Roxburghio communicavit.)

1. *h* cochinchinensis C. Koch. Cochinchina, China.
Mallotus cochinchinensis Lour. fl. coch. 781.
Trewia tricuspidata W. sp. pl. IV, 835.
 2. *h* cantoniensis Spr. syst. veg. III, 878. China (Canton).
Ricinus Apelta Lour. fl. coch. 718.
 3. *h* chinensis Adr. Juss. in Spr. syst. veg. III, 878. China.
Croton chinensis Geis. Prot. monogr. 25.
 4. *h* paniculata Adr. Juss. in Spr. syst. veg. III, 877. China, Java, Ceylon.
Croton paniculatus Lam. enc. méth. II, 207.
 5. *h* aurantiaca H. et Arn. bot. of Beech. voy. 270. China (ins. Lutschu).

LI. *Phyllaëra* Lour.

(nomen a foliis aureo colore discretis, a v. φλλον, folium, Blatt et aureus, golden.)

1. *h* 5 *Codiaeum* Lour. fl. coch. 705. India orientalis, China.
Codiaeum chrysosticton Spr. syst. veg. III, 866. Rumph.
 herb. amb. VI, t. 25—27.
 - *pictum* Hook.
 - *variegatum* Blume bijdr. 606. Juss. de Euph. gen. tent. t. 9. f. 30.
Croton pictus Hort.
 - *variegatus* L. cod. Nro. 7266.

LII. *Elaeococca* Commers. (nec *Elaeococcus* Spr.).

(ἐλαιον, oleum, Oel et κοκκον, nucleus, bacca, hoc loco: mericarpium, Theilfrucht.)

1. *h* 3 *verrucosa* Adr. Juss. de Euph. gen. tent. 112. t. IX. f. 35. Japonia.
cordata Blume bijdr. 618.
Aleurites cordata R. Br. (ubi?)
Driandra cordata Thunb. fl. jap. 267. Kaempf. ic. sel. t. 23.
Dryandra oleifera Lam. enc. méth. II, 329.
 2. *h* 3 *Vernicia* Adr. Juss. in Spr. syst. veg. III, 884. Cochinchina, China.
Driandra Vernicea Corr. in ann. du Mus. VIII, 69. t. 32.
Vernicia montana Lour. fl. coch. 721.

LIII. *Manihot* Pohl.

(Maniot, nomen brasiliense *Manihot utilisimi* Pohl.)

1. *h* 5 *Loureirol* Pohl pl. Bras. ic. et descr. I, 55. China.
Jatropha Janipha Lour. fl. coch. 718.
 - *Loureirol* Steud. nom. bot. I, 799.

LIV. *Adenoróptum* Pohl.

(ἀδην, glandula, Druese et ρωπιον, virgultum, Gestraeuch.)

1. *h* 3 *multifidum* Pohl pl. Bras. ic. et descr. I, 16. China, Java, America
Jatropha multifida L. cod. Nro. 7293. et Africa tropica.

LV. *Claoxylon* (nec *Claoxylon*) Adr. Juss.

(κλαειν, frangere, brechen et ξυλον, lignum, Holz.)

1. *h* 5 *parviflorum* Adr. Juss. de Euph. gen. tent. 114. t. 14. f. 43.
Acályphá spiciflóra Burm. fl. ind. 303. t. 61. f.

Trib. 4. *Acalyphae* (Flor. apetalis, exinvol., glomerato-spicati; Germ. 1-ovul.).

LVI. *Mercurialis* L.

(*Mercurialis* sc. herba, i. e. *Mercuris-Kraut*, apud Pflinium sine dubio *Bingelkraut*.)

1. *h* 5 *elliptica* Lam. enc. méth. IV, 119. Lusitania, ins. Balear.
 2. *h* 5 *tomentosa* L. cod. Nro. 7472. Hispania, Gallia austr.

Trib. 5. Hippomaneae (Flor. apetalī, exinvol., spicati; Germen 1-ovulatum).

LVII. *Stillingia* Gard.

(Benjamin Stillingfleet Londini a. 1759 miscellaneous tracts, relating to natural history husbandry and physick, in lucem edidit.)

1. 5 fruticosa Mich. fl. bor. amer. II, 213. *America foederata.*
frutescens Bosc.
2. 5 ligustrina Mich. fl. bor. amer. II, 213. *America foederata.*
3. 5 sebifera Mich. fl. bor. amer. II, 213. Adr. Juss. de Euph.
gen. tent. t. 16. f. 52. *America foederata.*
Croton sebiferum L. cod. Nro. 7275.
Sapium sebiferum Rxb. fl. ind. III, 693.
Triadica (nec Triodica) sinensis. Lour. fl. coch. 749. (teste H. et Arn.).
- chinensis Steud. nom. bot. II, 698.
4. 5 japonica S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 145. *Japan.*

LVIII. *Excoecaria* L.

(e v. caecare, blenden, quia lignum carbonibus impositum emittit fumum oculis novicium.)

1. 5 cochinchinensis Lour. fl. coch. 750. *China, Cochinchina.*

Trib. 6. Euphorbiae (Flores apetalī, involucratī).

LIX. *Euphorbia* L.(δένδρον εὐφορβίου, teste Sprengel *Euphorbia officinarum* L.)

1. 5 heterophylla L. cod. Nro. 3504. *America foederata.*
Tithymalus heterophyllus Haw. syn. pl. succ. 155.
2. ♀ spinosa L. cod. Nro. 3531. S. et Sm. fl. gr. V, 463. *Italia, Turcia, Asia minor, Pontus.*
pungens Lam. enc. méth. bot. II, 427.
Galarrhoeus spinosus Haw. syn. pl. succ. 164.
Tithymalus diffusus Lam. fl. franç. III, 101.
3. 5 osyridea Boiss. diagn. pl. nov. orient. VII, 87. *Persia.*
lateriflora Jaub. et Sp. ill. pl. orient. II, t. 130.
4. 5 dendroides L. cod. Nro. 3553. S. et Sm. fl. gr. V, t. 470. *Terrae mar. medit.*
divaricata Jeq. icon. pl. rar. II, 9. t. 87,
laeta Ait. hort. Kew. ed. 1. II, 547.
Esula dendroides Haw. syn. pl. succ. 168.
Tithymalus arboreus Lam. fl. franç. III, 94.
- laetus Haw. syn. pl. succ. 153.
5. ♀ fruticosa Biv. Bern. sic. pl. cent. I, 35. *Italia, Africa borealis.*
spinosa Desf. fl. atl. I, 390. t. 101.
Bivonae Steud. nom. bot. ed. 2. I, 610.
β) papillaris Jan. el. pl. hort. bot. Parm. 7.
6. ♀ orientalis L. cod. Nro. 3546. *Italia inferior, Oriens.*
ceratocarpa Ten. fl. Napl. I, 268.
Galarrhoeus orientalis Haw. syn. pl. succ. 163.
7. ♀ Pithyusa L. cod. Nro. 3534. *Europa australis.*
Galarrhoeus Pithyusa Haw. syn. pl. succ. 162.
Tithymalus acutifolius Lam. fl. franç. III, 90.
8. ♀ thyrsiiflora Gris. spic. fl. Rum. et Bith. I, 143. *Rumelia.*
9. ♀ Characias L. cod. Nro. 3556. *Europa australis.*
Esula Characias Haw. syn. pl. succ. 168.
Tithymalus purpureus Lam. fl. franç. III, 98.
β) eriocarpa Bert. comm. de itin. neap. 22. t. 3. Jeq. pl. rar. t. 89.
γ) Veneta W. hort. Berol. I, 507.
Wulfenii Koch syn. ed. 2. 727.
- 10 ♀ melapétala Gasp. in ind. sem hort. in Boccad. 1830. p. 3. *Graecia, Sicilia.*
Characias S. et Sm. fl. prodr. I, 332.
β) capsulis granulatis Guss. fl. sic. syn. I, 545.

Fam. 49. *Empetreae*.LI. *Ceréna* Don.

(χορημα, purgamenta, Kehricht.)

1. album Don in Edinb. new. phil. journ. II, 63. *Lusitania.*
Empetrum album L. cod. Nro. 7368.

LXI. *Empetrum* L.

(α v. ἐν et πετρα, saxum; ἐντερον, apud Graecos planta saxicola.)

1. *η* *nigrum* L. cod. Nro. 7399. engl. bot. t. 526. Europa, Sibiria, isthm. caucasicus.
 β) *scoticum* Hort. in Hook. brit. fl. 434.
 γ) *japonicum* S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 146.

LXII. *Ceratōla* Mich.

(κεραc, cornu, Horn, ob lacinias stigmati saepe geminatas et inde quasi bicornes.)

1. 5 *ericoides* Mich. fl. bor. amer. II, 221. Pursh. fl. Amer. sept. I. t. 15. America foederata.

INDEX.

Acalypha spiciflora Burm. LV, 1.*Acer* L. V.

- acuminatum* Don 37.
aetnense Hort. 15 β.
affine Op. 15 γ.
 - Hffinggg 52.
austriacum Tr. 15 δ.
barbatum Dougl. 48.
 - Mich. 50.
Boscii Spach 21.
campestre L. 15.
canadense Duh. 20.
carolinianum Walt. 53.
carpinifolium S. et Z. 6.
cassiaefolium Bl. 4.
caudatum Wall. 9.
caucasicum Hort. Gelt. ad fin.
cinerascens Boiss. 31.
circinatum Pursh 45.
coccineum Mich. 53 β.
colehicum Hort. Gelt. ad fin.
collinum Willr. 15 ε.
commutatum Presl. 30 β.
cordifolium Mnch. 14.
coriaceum Bosc 29.
 - Lodd. 32 γ.
crataegifolium S. et Z. 11.
creticum Hort. Vind. 27.
 - L. 26.
 - Spach 25.
 - W. 26 β.
 - γ. *sublobatum* Spach 28.
crispum Lauth 43 δ.
cultratum Wall. 36.
dasy carpum Ehrh. 52.
denticulatum Hort. 30 γ.
dissectum Thb. 39 β.
distylum S. et Z. 5.
Douglasii Hook. 48.
eriocarpum Mich. 52.
 - Opiz 15 ζ.
floridanum Hort. 52.
fraxinifolium Nutt. VI, 1.
glabrum Torr. 48.
glaucum Marsh. 53 β.
granadense Boiss. 32.
grandidentatum Nutt. 48.

- Acer heteropyllum* W. 25.
hispanicum Pourr. 32 γ.
hybridum Bosc 19.
 - Hort. 33.
hyrcanum F. et M. 35.
japonicum Thb. 38.
javanicum Jungh. 3.
 - Vitm. 7.
ibericum Bieb. 30 δ.
illyricum Jeq. fl. 30 ε.
italum Lauth. 32.
laciniatum Ait. 43 δ.
laetescens Hort. 43.
laetum C. A. Mey. 40. 42.
laevigatum Wall. 2.
laurifolium Don 1.
laurinum Hassk. 3.
leiocarpum Opiz 15 ε.
lobatum Bosc 21.
 - Hort. 43 δ.
Lobellii Ten. 42.
macrocarpum Opiz 15 ε.
macrophyllum Pursh 23.
marsicum Guss. 15.
marucum Walp. 15.
micranthum S. et Z. 13.
microcarpum Massn. 15 x.
microphyllum Opiz 15 λ.
molle Opiz 15 μ.
monspessulanum L. 30.
montanum Ait. 22.
 - Lam. 17.
nanum Hort. 15 γ.
neapolitanum Ten. 33. 34.
neglectum Hffinggg 54.
Negundo L. VI, 1.
nigrum Mich. 51.
niveum Blume 3.
oblongum Wall. 1.
obtusatum W. et K. 33.
obtusifolium S. et Sm. 28.
Opalus Ait. 32 γ.
opulifolium Vill. 32.
 - β. *tomentosum* Kch 33.
orthopterum Massn. 15 ε.
palmatum Thb. 39 γ.
palmifolium Borkh. 17 x.

- Acer palmifolium* Thunb. 49.
parviflorum Ehrh. 22.
parvifolium Tsch 27.
Pavia Hort. Gelt. ad fin.
pectinatum Wall. 9.
pensylvanicum Dur. 22.
 - L. 20.
pictum Thb. 40.
pinnatum Lour. VI, 4.
platanoides L. 43.
 - Scop. 17.
 - β . *integrilobum* Tsch 42.
 - 2. *Lobellii* Loud. 42.
Platanus Vitm. 44.
polycarpum Opiz 15 π .
polymorphum S. et Z. 39.
 - α . *majus* Spch 29.
 - β . *minus* Spch 27.
 - γ . *obtusifolium* Spch 24.
Pseudo-Platanus L. 17.
 - Seb. et Maur. 32.
pulverulentum Hort. Gelt. ad fin.
quinquelobatum Wagn. 15 ρ .
quinquelobum Gil. 27.
rotundifolium Lam. 32.
rubrum L. 53.
 - Lam. 52.
 - γ . *pallidum* Ait. 52.
rufinerve S. et Z. 12.
sacharinum L. 52.
 - Mich. 49.
 - 2. *nigrum* Loud. 51.
saccharophorum C. Koch 49.
sanguineum Spach 53 β .
sempervirens L. 25.
 - Tsch 26.
 - δ . *nanum* Tsch 25.
 - γ . *obtusifolium* Tsch 28.
septemlobum Thb. 39 δ .
sessilifolium S. et Z. 56.
spicatum Lam. 22.
sterculeaceum Wall. 8.
striatum Lam. 20.
sylvestre Wend. 16.
suberosum Dumort. 15 σ .
tataricum L. 14.
ternatum Moc. VI, 3.
tomentosum Dsf. 53 γ .
 - Hort. Par. 52.
trifidum Thb. 24.
trifolium Duh. 30.
trilobatum Lam. 30.
trilobum Mnch 30.
 - Gil. 51.
tripartitum Nutt. 47.
truncatum Bge 40. 41.
velutinum Boiss. 18.
vernum Reyn. 32 γ .
villosum Wall. 10.
 - Presl. 17 ξ .
virginianum Mill. 52.
vitifolium Opiz 17 σ .
Wagneri Hort. Gelt. ad fin.
Adenoropium Pohl LIV.
multifidum Pohl 1.
Agyneia L. XLV.
- Agyneia impubes* L. 1.
pubera L. 2.
tetrandra Ham. 3.
Ailantus Dsf. XXI.
plandulosa Dsf. 1.
gracilis Salisb. XXV, 2 β .
procera Salisb. 1.
Aleurites cordata R. Br. LII, 1.
laccifera W. XLIII, 5 β .
Andrachne XLIV.
chinensis Bge 2.
fruticosa L. 3.
fruticulosa Boiss. 1.
Aspicarpa A. Juss. X.
hyssopifolia A. Gr. 1.
Aspidopterys A. Juss. IX.
nutans A. Juss. 1.
Banisteria bengalensis L. VIII, 1.
tetraptera Sonn. VIII, 1.
unicapsularis Lam. VIII, 1.
Boenninghausenia Rehb. XXVII.
albiflora Rehb. 1.
Boymia A. Juss. XIV.
rufaearpa A. Juss. 1.
Bradleja impuber Rxb. XLV, 1.
pubera Rxb. XLV, 2.
sinica Grtn. XXXVIII, 2.
Bridelia W. XLIII.
Loureiroi H. et Arn. 1.
Brucea Mill. XXV.
 ? *arbor* Wall. XXIII, 1.
gracilis DC. 2 β .
sumatrana Rxb. 2.
virginica Horn. 1.
Bumaldia trifolia Thb. II, 3.
Buxus L. XXXIV.
angustifolia Mill. 1 β .
arborescens Lam. 1.
balearica L. 2.
chinensis Lk. 3.
coriacea Spr. XXVI, 1.
marginata Hort. 1 α .
microphylla S. et Z. 4.
myrtifolia Lam. 1 δ .
saligna Don XXXVI, 1 β .
sempervirens L. 1.
suffruticosa Lam. 1 γ .
Castela Turp. XXII.
Nicholsoni Hk. 1.
Celastrus nepalensis Steud. I, 2.
verticillatus Roxb. I, 2.
Ceratiola Mich. LXII.
ericoides Mich. 1.
Chamaelea tricoeca Grtn. XXXII, 1.
Cicca L. XXXVII.
flexuosa S. et Z. 1.
Claoxylon Adr. Juss. LV.
parviflorum A. Juss. 1.
Clusia androgyna Lour. XLIV. 3 β .
Cluytia monogyna Lour. LXIII. 1.
Cneorum L. XXXII.
tricoecum L. 1.
Codiaeum chrysosticton Spr. LI, 1.
pictum Hk. LI, 1.
variegatum Blume LI, 1.
Corema Don LX.

- Corema album** Don 1.
Coriaria L. XXXIII.
 myrtifolia L. 1.
 nepalensis Wall. 2.
Croton L. XLVIII.
 argyranthemus Mich. 2.
 aromaticus L. 5.
 chinensis Geis. L. 3.
 congestus Lour. 3.
 crassifolius Geis. 4.
 disjunctiflorus Mich. 1.
 lacciferus L. 5 β.
 laevigatus Vahl 6.
 maritimus Walt. 1.
 paniculatus Lam. L. 4.
 punctatus Jcq. 2.
 sebiferus Mirb. LVII, 3.
 Tigium L. XLVII, 1.
Cyminosma chinensis Spr. XX. 1.
Dalrymplea pomifera Rxb. III, 2.
Dichelactina Hance XXXIX.
 nodicaulis Hance 1.
Dobinea Ham. VII.
 vulgaris Ham. 1.
Driandra cordata Thb. LH, 1.
 - *Vernicea* Corr. Lil. 2.
Dryandra oleifera Lam. LII, 1.
Elaeococca Commers. LH.
 cordata Blume 1.
 Vernicia Adr. Juss. 2.
 verrucosa Adr. Juss. 1.
Emblica Grtn. XLII.
 officinalis Grtn. 1.
Empetrum L. LXI.
 album L. LX, 1.
 japonicum S. et Z. 1 γ.
 nigrum L. 1.
 scoticum Hort. 1 β.
Esula Characias Haw. LIX, 9.
 dendroides LIX, 4.
Euphorbia L. LIX.
 Bivonae Steud. 5.
 ceratocarpa Ten. 6.
 Characias L. 9.
 - S. et Sm. 10.
 dendroides L. 4.
 divaricata Jcq. 4.
 eriocarpa Bert. 9 β.
 fruticosa Biv. 5.
 heterophylla L. 1.
 laeta Ait. 4.
 lateriflora J. et Sp. 3.
 melapetala Gasp. 10.
 orientalis L. 6.
 osyridea Boiss. 3.
 papillaris Jan. 5 β.
 Pithyusa L. 7.
 pungens Lam. 2.
 spinosa L. 2.
 - Dsf. 5.
 thyrsiflora Gris. 8.
 Veneta W. 9 γ.
 Wulfenii Kch 9 γ.
Euscaphis S. et Z. IV.
 simplicifolia S. et Z. 2.
 staphyleoides S. et Z. 1.
- Eutraphis Walp. v. Euscaphis** S. et Z.
Excoecaria L. LVIII.
 cochinchinensis Lour. 1.
Fagara Avicennae Lam. XII, 8.
 fraxinifolia Lam. XII, 9.
 horrida Thb. XII, 12.
 lenticifolia W. XII, 13.
 nitida Rxb. XII, 2.
 Piperita L. XII, 6.
 - H. et Arn. XII, 7.
 - Lour. XII, 2.
 Pterota L. XII, 13.
Gaertnera obtusifolia Rxb. VIII, 1.
 racemosa Rxb. VIII, 2.
Galarrhoeus Myrsinites Haw. LIX, 9.
 orientalis Haw. LIX, 6.
 Pithyusa Haw. LIX, 7.
 spinosa Haw. LIX, 2.
Geblera F. et M. XXXV.
 suffruticosa F. et M. 1.
Glochidion Forst. XXXVIII.
 dasyphyllum C. Koch. 3.
 molle H. et Arn. 3.
 obovatum S. et Z. 1.
 sinicum H. et Arn. 2.
Gonua amarissimum Lour. XXV, 2.
Haplophyllum Adr. Juss. XXIX.
 fruticulosum G. Don 2.
 obtusifolium Led. 4.
 perforatum Kar. et Kir. 6.
 Sieversii Fisch. 6.
 sulphureum Boiss. 1.
 villosum G. Don 3.
 virgatum Jaub. et Sp. 5.
Hendecandra Eschs. II, 7.
 procumbens Eschsch. 1.
Hiptage Grtn. VIII.
 Madablota Grtn. 2.
 obtusifolia DC. 1.
Hiraea nutans Rxb. IX, 1.
Jambolifera L. XX.
 pedunculata Lour. 1.
Janusia A. Juss. XI.
 californica Benth. 1.
Jatropha Janipha Lour. LIII, 1.
 Loureiroyi Steud. LIII, 1.
 multifida L. LIV, 1.
Mallotus cochinchinensis Lour. L, 1.
Manihot Pohl LIII.
 Loureiroyi Pohl 1.
Megabotrya Hance XV.
 meliaefolia Hance 1.
Melanthesa Blume XL.
 chinensis Blume 1.
Mercurialis LVI.
 elliptica Lam. 1.
 tomentosa L. 2.
Molina racemosa Cav. VIII, 2.
Negundium fraxineum Raf. VI, 1.
Negundo Mch VI.
 aceroides Mch 1.
 californicum H. et Arn. 2.
 cissifolium S. et Z. 5.
 cochinchinense DC. 4.
 fraxinifolium Nutt. 1.
 mexicanum DC. 3.

- Nymphaeanthus chinensis* Lour. XXXVIII, 2.
rubra Lour. XL, 1.
Ochna Schreb. XXIV.
collina Edgew. 1.
nana Ham. 1.
pumila Buchan. 1.
Ochranthe Ldl. 1.
arguta Ldl. 1.
Pachysandria coriacea Hk. XXXVI, 1.
Paullinia asiatica Lam. XIII, 2.
Peganum Retz XXVI.
crithimifolium Retz 1.
Harmala β . *crithimifolium* DC. 1.
Pharnaceum suffruticosum Pall. XXXV, 1.
Philagonia Bl. XVIII.
fraxinifolia Hk. 1.
Phyllanthus L. XLI.
chinensis Hort. XXXVIII, 2.
cinerascens H. et Arn. 1.
Emblica L. XLII, 1.
introducatus Steud. XL, 1.
lucens Poir XL, 1.
parvifolius Don 2.
ramiflorus Pers. XXXV, 1.
taxifolius Don 3.
turbimatus Sims. XL, 1.
villosus Poir. XXXVIII, 2.
Phyllaurea Lour. LI.
Codiaeum Lour. 1.
Picrasma Bl. XXIII.
ailantoides Planch 3.
nepalensis Horsf. et B. 2.
quassioides Horsf. et R. 1.
Pitavia Moll. XVII.
dumosa Nutt. 1.
Ptelea L. XVI.
Baldwini T. et Gr. 2.
monophylla Lam. 4.
mollis Curt. 3.
pentaphylla Mneh 1 γ .
pubescens Pursh 1 δ .
trifoliata L. 1.
- *mollis* T. et Gr. 3.
Rhus *ailantoides* Bge XXIII, 3.
Cacodendron Ehrh. XXI, 1.
fraxinifolium Don XVIII, 1.
Hypsolodendron Mneh XXI, 1.
sinense Ell. XXI, 1.
succedaneum Dum. C. XXI. 1.
Ricinus *Apelta* Lour. L, 2.
Rottlera Rxb. L.
aurantiaca H. et Arn. 5.
cantoniensis Spr. 2.
chinensis Adr. Juss. 3.
cochinchinensis C. Koch 1.
paniculata Adr. Juss. 4.
Ruta L. XXVIII.
albiflora Hk. XXVII, 1.
angustifolia Pers. 4.
- Ten. 1.
bracteosa DC. 1.
chalepensis L. 2.
- β . L. 4.
- Ten. 1.
- VIII. 4.
- *bracteosa* Mor. 1.
Ruta *chalepensis tenuifolia* d'Urv. 1.
corsica DC. 9.
crithimifolia Moric. 8.
divaricata Salzm. 9.
- Ten. 8.
Fernandesia Colla 5.
fruticulosa Labill. XXIX, 2.
fumariaefolia B. et Heidr. 3.
graveolens All. 1.
- L. 7. 8.
- *minor*. All. 4.
hortensis Lam. 7.
legitima Jcq. 6.
macrophylla Mor. 1.
- Sol. 2.
montana W. 6.
obtusifolia Led. XXIX. 4.
parviflora Desf. XXIX, 3.
sylvestris Mill. 6.
tenuifolia Bsf. 6.
villosa Bieb. XXIX, 3.
Sambucus japonica Thb. IV, 1.
Sapium sebiferum Rxb. LVII, 3.
Sarcococca Ldl. XXXVI.
coriacea Sweet 1.
pruniformis Ldl. 1.
Sarcozygium Bge XXXI.
xanthoxylum Bge 1.
Schinus Fagara L. XII, 13.
Scopolia aculeata Sm. XIII, 1.
Simaba quassioides Don XXIII, 1.
Staphylea L. II.
Bumalda DC. 3.
colchica Stev. 5.
Emodi Wall. 2.
pinnata L. 6.
simplicifolia Grdn. et Ch. 1.
trifolia L. 4.
Staphylodendron pinnatum Scop. H, 6.
trifoliatum Mneh 4.
Stillingia L. LVII.
frutescens Bose 1.
fruticosa Mich. 1.
ligustrina Mich. 2.
japonica S. et Z. 4.
sebifera Mich. 3.
Succowia fimbriata Dennst. VIII, 2.
Thamnosma T. et Frem. XIX.
montanum Torr. et Frem. 1.
Tigilium Klotzsch XLVII, 4.
officinale Klotzsch 1.
Tithymalus acutifolius Lam. LIX, 7.
arboreus Lam. LIX, 4.
diffusus Lam. LIX, 2.
heterophyllus Lam. LIX, 1.
laetus Haw. LIX, 4.
purpureus Lam. LIX. 9.
Toddalia Juss. XIII.
aculeata Pers. 2.
asiatica Lam. 2.
floribunda Wall. 1.
nitida Lam. 2 β .
rubicaulis W. 2 γ .
Trewia tricuspidata W. L. 1.
Triadica chinensis Steud. XVII, 3.
sinensis Lour. LVII, 3.

Tridesmis Lour. XLVI.
 hispida Lour. 1.
 tomentosa Lour. 2.
Turpinia Vent. III.
 pomifera DC. 2.
 nepalensis Wall. 1.
Vernicia montana Lour. LII, 2.
Xanthoxylum v. *Zanthoxylum*.
Xylophylla ramiflora Ait. XXXV, 1.
Zanthoxylum L. XII.
 acanthopodium DC. 10 β.
 ailantoides S. et Z. 4.
 alatum Rxb. 10.
 americanum Wangenh. 1.
 armatum DC. 10.
 Avicennae DC. 8.
 Beecheyanum C. Koch. 7.
 caribaeum Grtn. 1.
 carolinianum Lam. 9.
 cauliflorum Mich. 14.

Zanthoxylum Clava Herculis L. 1.
 Clava Herculis Lour. 8.
 floribundum Wall. XIII, 1.
 fraxineum W. 1.
 fraxinifolium Bieb. 14.
 - Walt. 9.
 hastile Wall. 11.
 horridum DC. 12.
 mite W. 2 β.
 nitidum DC. 2.
 Piperita DC. 6.
 planispinum S. et Z. 5.
 Pterota H. B. K. 13.
 ramiflorum Mich. 1.
 schinifolium S. et Z. 3.
 tricarpum Hook. 1.
 - Mich. 9.
Zwingera quassoides Spr. XXIII, 1.
Zygophyllum L. XXX.
 atriplicoides F. et M. 1.

ORDO VIII.

Cyrtembryae.

Fam. 50. Amarantaceae.

I. Deeringia R. Br.

(Dr. Car. Deering (Deering), Saxo, medicus, a catalogue of plants growing in divers parts of England a 1738. et Nottinghamia vetus et nova a. 1751 scripsit; † 1749.)

1. *h* *baccata* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 236. Nepal, India orient. et insul, Nova-Hollandia.
- celosioides* R. Br. prodr. fl. N. Holl. I, 403.
- indica* Bl. bijdr. 542.
- Celosia baccata* Retz obs. bot. V, 23.
- β) *leptostachys* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 236.

II. Achyranthes L.

(ἀχυρον, stramentum, Stroh et ἀνθος, flos, Bluethe.)

1. *h* *argentea* Lam. enc. méth. I, 545. S. et Sm. fl. gr. t. 244. Sardinia, Sicilia, ins. canar., Africa bor. et austr., Senegamb., Arab.
- aspera* α. *sicula* L. cod. Nro. 1654.
- sicula* Rth. cat. bot. I, 39.

III. Celosia L.

(a celando dicta, qui herba in stictilibus super fenestras asservatur, et cancellorum vices praebet, alios celando. Ambros.)

1. *h* *exstipulata* Horn. in syll. pl. nov. Ratisb. I, 202. Nepal.

Fam. 51. Chenopodiaceae.

Trib. 1. Chenopodieae (Fol. membranacea, latiuscula; Embryon annulare).

IV. Chenopodium L.

(χῆν, anser, Gans et πους, pes, Fuss.)

1. *h* *frutescens* C. A. Mey. in Led. fl. alt. I, 408. ic. pl. nov. fl. ross. t. 10. Altai.
2. *h* *virgatum* Thunb. nov. act. Ups. VII, 1815. 143. Japonia.

V. Atriplex L. (generis neutr. nec, ut L. aliique dicunt, fem.)

(Atriplex jam apud Latinos „Melde“ significat.)

1. *h* *californicum* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 98. California.
2. *h* *canum* C. A. Mey. in Led. fl. alt. IV, 306. ic. pl. nov. fl. ross. t. 46, Sibiria.
glaucum Pall. Reis. d. versch. Prov. d. russ. R. I, 246. app. 494.
Hálimus Pall. Reis. d. versch. Prov. d. russ. R. II, 477.
3. *h* *Hálimus* L. cod. Nro. 7612. Europa merid., Oriens,
Chenopodium Hálimus Thunb. prodr. pl. cap. 48. Afr. bor. et austr., Chili.

VI. Obióna Grtn.

(derivatio mihi ignota.)

1. *h* *graeca* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 108. Archipel. ins.,
- Atriplex graecum* W. sp. pl. IV, 958. Aegyptus, Corsica.
2. *h* *Belangéri* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 108. Persia.

3. *h* *glauca* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 109. Hispania, Gallia, Africa
Chenopodium vestitum Thunb. prodr. fl. cap. 48. bor. et austr., Arabia.
Atriplex glaucum L. cod. Nro. 7614.
4. *h* *leucophylla* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 109. California.
5. *h* *verrucifera* Moq. Chen. enum 76. Led. ic. pl. fl. ross. t. 144. Rossia, isthm. caucas.,
Atriplex portulacoides Pall. Reis. d. versch. Prov. d. Sibiria.
 russ. R. I, 216.
- *verruciferum* Bieb. fl. taur. cauc, II, 441.
6. *h* *portulacoides* Moq. Chen. enum 75. Europa, Africa bor. et
Atriplex portulacoides L. cod. Nro. 7613. engl. bot. t. 261. merid. oriens, America
 Chenopodium portulacoides Thunb. fl. cap. 245 borealis.
Halimus portulacoides Dumort. fl. belg. 20. Sturm
 Deutschl. Fl. H. 80.
7. *h* *canescens* Moq. Chen. enum 74. Missuri.
Atriplex canescens Nutt. gen. of. N. Amer. pl. I, 197.
Calligonum canescens Pursh. Am. sept. II, 370.
8. *h* *tetráptera* Benth. bot. of Belch. voy. 48. California.
occidentalis Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 113.
Pterochiton occidentale Torr. in Frém. rep. of the expl.
 exp. to the rocky m. 318.
9. *h* *Coultéri* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 113. California.
10. *h* *Barclayana* Benth. bot. of Belch. voy. 48. California.
11. *h* *microcarpa* Benth. bot. of Belch. voy. 48. California.
12. *h* *confertiflora* Torr. in Frém. rep. of the expl. exp. to the rocky m. 318. California.

Trib. 2. Camphorosmeae (Fol. crassiuscula aut rigida, angusta; Embr. annulare).

VII. Grayia H. et Arn.

(Asa Gray, professor botanices in universitate reipublicae Michigan.)

1. *h* *polygaloides* H. and Arn. bot. of Beech. voy. 388. California.
spinosa Moq. in DC. prodr. XIII, 119.
Chenopodium (?) *spinosum* Hk. fl. bor. am. II, 127.

VIII. Euretia Ad.

(derivatio mihi ignota.)

1. *h* *ferruginea* Boiss. in Kotschy pl. Pers. Nro. 556. DC. prodr. XIII, 120. Rossia, Persia, Afghan.
 2. *h* *lanata* Moq. Chen. enum. 81. Missuri.
Diótis lanata Pursch. fl. Am. sept. II, 602.

IX. Kochia Rth. (neo Kooekia Bel.).

(ad honorem W. D. J. Koch, professoris nuperrime Erlangae defuncti, auctoris operis
 omni laude digni: synopsis florum germanicæ et helveticæ.)

1. *h* *stellaris* Moq. Chen. enum. 93. Persia, India oriental.

Trib. 3. Salicornicæ (Fol. carnosa, brevia aut nulla; Embryon annulare).

X. Salicornia L.

(derivatio dubia; an a v. sal, Salz et cornu, Horn?)

1. *h* *anceps* Lag. mem. sobre l. pl. Barill. 52. Hispania.
 2. *h* *mucronata* Lag. mem. sobre l. pl. Barill. 52. Hispania.

XI. Kaldium Moq.

(Kali et ἰδός, visus, Ansehen.)

1. *h* *gracile* Fenzl in Led. fl. ross. III, 769. Mongolia.
 2. *h* *arabicum* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 147. Arabia, Transcaucasia.
Halocnemum arabicum Spr. syst. veg. I, 19.
Salicornia arabica L. cod. Nro. 27.
 - *Pallasii* C. A. Mey. enum. plant. Talysch. 125.
3. *h* *foliatum* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 147. Tataria, Sibiria,
Salicornia foliosa R. et S. syst. veget. I, 41. Astrachan, Hispania.
 - *foliata* Pall. Reis. d. versch. Pov. d. rass. R. 422.
 app. 482. t. C. f. I. 2.
 - *strobilacea* Grnt. de fr. et sem. II, 210. t. 127. f. 8.

XII. Halóstachys C. A. Mey.

(άλς, mare et sal, Meer und Salz et σπικος, spica, Aehre.)

1. *h* nodulosa C. A. Mey. in bull. de la cl. phys. math. de
l'ac. de St. Pét. 1, 361. Africa borealis,
Sicilia, Hispania.
perfoliata Moq. in DC. prodr. XIII, 2, 148.
Salicornia amplexicaulis Vahl symb. bot. II, 1.
- nodulosa (nec nodosa) Del. fl. d'Égypt. 147.
- perfoliata Forsk. fl. aeg. ar. 3. t. I.
- strobilacea Del. fl. d'Égypt. t. 3. f. 2.

XIII. Haloénemum

(άλς, mare et sal, Meer und Salz et σνημη, crus, Schenkel.)

1. *h* caspicum Bieb. fl. taur. cauc. III, 3. Transcaucasia,
Arthrocnémum caspicum Moq. in DC. prodr. XIII, 2, 150. Soongaria, Persia.
Halóstachys caspia C. A. Mey. in Hohenack. enum. pl. Tal. 125.
Salicornia caspica L. cod. Nro. 28.
β) Belangerianum Moq. in DC. prodr. XIII, 2, 149.
Arthrocnémum Belangerianum Moq. enum. Chen. 112.
2. *h* strobilácea Bieb. fl. taur. cauc. III, 3. Littora maris medit.,
Salicornia strobilácea Pall. Reis. d. versch. Prov. d. nigri et casp., Aegyptus.
russ. R. I, 412. app. 481. t. B. f. 1. 2.
β) cruciatum Moq. in DC. prodr. XIII, 2, 149.
Salicornia cruciata Forsk. fl. aeg. ar. 2.

XIV. Arthrocnémum Moq.

(άρθρον, artus, Gelenk et σνημη, crus, Schenkel.)

1. *h* fruticosum Moq. Chen. enum. 111. Littora maris medit.,
Salicornia Alpini Lag. mem. sobre l. pl. Barill. 48. California, ? Senegalia,
- europaea β. perennis Gouan Hort. Monsp. 5. ? ins. Timor.
- fruticosa L. cod. Nro. 25.
- sempervirens Sauv. meth. fol. 7.
β) californicum Moq. Chen. enum. 11.
2. *h* radicans C. Koch. Sicilia.
Salicornia radicans Guss. suppl. ad fl. sic. prodr. 111.
- fruticulosa Tin. cat. hort. Panorm. a. 1827. 280.
3. *h* macrostáchyum C. Koch. Italia, Dalmatia,
Salicornia macrostachya Moric. fl. Ven. I, 2. Hispania.
- fruticosa β. polystachya Koch syn. 693.
- fruticosa Alsch. fl. Jadr. 1.
4. *h* ambiguum Moq. Chen. enum. 112. Carolina.
Salicornia ambigua Mich. fl. bor. Am. I, 5.

Trib. 3. Suaeadae (Fol. vermiculata, saepe succulenta; Embr. plano-spirale).

XV. Schanginia C. A. Mey.

(Peter Schangin Sibiriam australem permigr. et suas plantas cum Pallasio commun.)

1. *h* arbúscula Kar. et Kir. bull. de la soc. d. nat. de Mosc. 1841. 733. Songaria.

XVI. Suaeda Forsk.

(Swaed, i. e. grau, nomen arabicum Suaedae verae Forsk., Chenopodinae verae Moq.)

1. 5 fruticosa Forsk. fl. aeg. ar. 70. Terrae maris medit.
laxifolia Lowe fl. Mad. 11. et caspii, Anglia,
Chenopodium fruticosum Mnch. meth. suppl. 115. ins. canarienses,
Cochliospermum fruticosum Lag. mem. sobre l. pl. Barill. 59. Senegalia, California,
Salsola annularis Poir. enc. méth. VII, 298. Bolivia, Persia, China.
- fruticosa L. cod. Nro. 1830. engl. bot. t. 635. S. et
Sm. fr. gr. t. 255.
Schoberia fruticosa C. A. Mey. in Led. fl. alt. I, 402.
β) brevifolia Moq. Chen. enum. 122.
γ) crassifolia Moq. Chen. enum. 122.
δ) Hostii Tratt. Arch. d. Gew. K. I, Nr. 69. (sub Salsola.)
Chenopodina Hostii Moq. in DC. prodr. XIII, 2, 165.
ε) purpurascens Moq. Chen. enum. 122.
2. *h* pubérula Moq. Chen. enum. 122. Patria ignota.
3. *h* grácillis Moq. Chen. enum. 123. Transcaucasia.

4. *h foetida* Moq. Chen. enum. 132. Patria ignota.
Salsola foetida Vest. in R. et S. syst. VI, 238.
 5. *h longifolia* C. Koch in Linn. XXII, 188.
fruticosa β . *longifolia* Fenzl in Led. fl. ross. III, 778.

XVII. *Chenopodina* Moq.(a. v. „*Chenopodium*“ derivandum, ob specierum similitudinem.)

1. 5 *Biebersteiniana* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 163. Transcaucasia,
Chenopodium Biebersteinianum Schult. in R. et S. syst. VI, 267. Songaria.
 - *crassifolium* Bieb. fl. taur. cauc. III, 176.
 - *villosum* Spr. syst. veg. I, 922.
Schoberia Biebersteiniana C. A. Mey. in Led. fl. alt. I, 402.
 - *microphylla* C. A. Mey. Verz. kauk. Pfl. 159.
Suaeda Biebersteiniana C. Koch in Linn. XVII, 312.
 - *microphylla* Pall. illustr. pl. 52. t. 44.
 2. *h vera* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 163. Aegyptus, Ciscaucasia.
Salsola farinosa Poir. enc. méth. VII, 298.
 - *Suaeda* Mart. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. VI, 174.
 - *vera* R. et S. syst. veget. VI, 242.
Suaeda vera Forsk. fl. aeg. arab. 60.
 3. 5 *dendroides* Moq. in DC. prodr. XIII, 164. Russia australi-orient.,
Chenopodium fruticosum Bieb. fl. taur. cauc. III, 175. isthm. caucas., Sibiria.
 - *microphyllum* Bieb. fl. taur. cauc. III, 175.
 - *parvifolium* Schult. in R. et S. syst. VI, 266.
Salsola fruticosa Bieb. Besch. d. Laend. am kasp. M. 149. app. Nro. 22.
Schoberia dendroides C. A. Mey. Verz. kauk. Pfl. 159.
Suaeda dendroides Moq. Chen. enum. 126.
 β) *decumbens*.
Chenopodina microphylla Moq. in DC. prodr. XIII, 163. (excl. syn.)
Suaeda microphylla C. Koch in Linn. XVII, 312. (nec Pall.)
 4. *h physophora* Moq. in DC. prodr. XIII, 164. Ciscaucasia, Songaria,
Enchylaena physophora Spr. syst. veg. I, 923. Ural.
Salsola physophora Schrd. neu. Journ. 1809. 86.
Schoberia physophora C. A. Mey. in Led. fl. alt. I, 396.
Suaeda physophora Pall. ill. pl. 51. t. 43.
 5. *h fruticulosa* Moq. in DC. prodr. XIII, 165. Montes uralenses.
Schoberia fruticulosa Less. in Linn. VIII, 200.
Suaeda fruticulosa Moq. Chen. enum. 132.
 6. *h heterocarpa* C. Koch. Transcaucasia.
Suaeda heterocarpa Fenzl in Led. fl. ross. III, 781.
 7. *h linearis* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 164. Canada, Carolina,
Salsola linearis Ell. sketsch of the bot. of Car. and Georg. I, 332. Cuba.
 - *salsa* Mich. fl. bor. Am. I, 74.
Suaeda linearis Moq. Chen. enum. 130.
 8. *h depressa* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 164. Missouri, Altai?
Chenopodium americanum Spr. syst. veg. I, 922.
Salsola depressa Pursh fl. Am. sept. I, 197.
Schoberia americana C. A. Mey. in Led. fl. alt. I, 402.

XVIII. *Belowia* Moq.

(J. F. Below a. 1700 opus de vegetabilibus in genere Londini Goth. in lucem edidit.)

1. *h baccifera* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 168. Transcaucasia.
 Trib. 5. *Salsoleae* (Fol. succ., crassa, raro dura aut sub nulla; Embr. conico-spirale).

XIX. *Salsola* L.

(salsus, salzig.)

1. *h Auricula* Moq. Chen. enum. 135. Persia, Affghania.
Moquiniana J. et Sp. illustr. pl. orient. t. 137.
Caroxylon Auricula Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 172.
 2. *h decurrens* J. et Sp. ill. pl. or. II, 53. t. 138. Persiae deserta.
Auricula β . *acutifolia* Moq. Chen. enum. 135.
Caroxylon acutifolium Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 173.
 3. *h glauca* Bieb. fl. taur. cauc. I, 185. Transcaucasia, Persia,
spicata Pall. illustr. pl. 27. t. 19. Armenia.
Caroxylon glaucum Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 173.

4. *h* *Salsola subaphylla* C. A. Mey. in Eichw. pl. nov. casp. cauc. 34. t. 24. Litt. orient. mar. caspii.
Caróxylon subaphyllum Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 173.
5. *h* *genistoides* Juss. in enc. méth. VII, 294. Webb ot. hisp. t. 5. Hispania.
tamariscifolia Lag. gen. et sp. 12.
Anabasis tamariscifolia L. cod. Nro. 1834. Cav. ic. et descr. III, t. 283.
Caróxylon tamariscifolium Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 174.
Halogéton tamariscifolia C. A. Mey. in Led. fl. alt. I, 378.
6. *h* *articulata* Cav. ic. et descr. pl. III, 43. t. 284. Hispania, Aegyptus.
Caróxylon articulatum Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 175.
7. *h* (teste Moq. ☉ teste Pall.) *lanata* Pall. Reis. d. versch. Asia media, Sib. austr.
Prov. d. russ. R. II, 736. illustr. pl. 29. t. 21.
laniflóra L. fl. suppl. 172.
8. *h* *foétida* Del. fl. d'Egypt. 57. Persia, Arabia,
Caróxylon foetidum Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 177. Aegyptus, ? Afr. austr.
Chenopodium Baryosmon Schult. in R. et S. syst. VI, 269.
9. *h* *gemmascens* Pall. ill. plant. 24. t. 16. Transcauc., Mongolia,
verrucosa C. A. Mey. Verz. kauk. Pf. 160. Sibiria.
Caróxylon imbricatum Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 177.
10. 5 *verrucosa* Bieb. mém. de la soc. d. nat. de Mosc. I, 141. Terrae maris caspii,
ericoides C. A. Mey. Verz. kauk. Pf. 160. Persiae deserta.
dendroides Pall. ill. pl. 22. t. 14.
11. 5 *georgica* Bge in Led. fl. ross. III, 814. Transcaucasia.
? *Halogéton georgica* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 205.
12. 5 *inermis* Forsk. fl. aeg. arab. 57. t. 8. B. Aegyptus, Persia,
Syria, Creta.
13. 5 *longifolia* Forsk. fl. aeg. arab. 55. Ins. canar., Hispania,
fruticosa Cav. ic. et descr. pl. III, 44. t. 285. Sicilia, Africa borealis,
divaricata Mass. in Buch Besch. d. can. Ins. 141. Aegyptus.
oppositifolia Dsf. fl. atl. I, 219.
14. 5 *verticillata* Schousb. Jagtt. over Vextr. i Marokko I, 109. Hispania.
15. 5 *papillosa* Willk. Strand- u. Steppengeb. d. iber. Halbins. 146. Hispania.
vermiculata L. cod. Nro. 1829. Rossia orientalis,
flavescens Cav. ic. et descr. pl. III, 45. t. 288. Terrae maris medit.,
Ennaea Jan. el. pl. hort. Parm. 1826. 4. Persia, Sibiria,
Chenopodium flavescens Schult. in R. et S. syst. VI, 269. ins. canarienses.
β) *glabrescens* Moq. Chen. enum. 141.
microphylla Cav. ic. et descr. pl. III, 45. t. 287.
brevifolia Dsf. fl. atl. I, 218.
Agrigentina Guss. fl. sic. I, 303.
γ) *villosa* Del. fl. d'Egypt. 57.
16. 5 *Arbuscula* Pall. Reis. d. versch. Prov. d. russ. R. I, 412. app. 487. Ciscaucasia, Astrachan,
arborescens L. fl. suppl. 173. Tataria, Mongolia.
β) *angustifolia* Fenzl in Led. flor. ross. III, 817.
γ) *exasperata* C. A. Mey. in Eichw. plant. nov. casp. cauc. 7.
17. 5 *cana* C. Koch in Linn. XXII, 190. Armenia rossica.
18. 5 *Webbii* Moq. Chen. enum. 139. Hispania.
Anabasis tamariscifolia Webb it. hispan. 17.
19. 5 *laricina* Pall. illustr. pl. 21. t. 13. Rossia australis,
β) *villosa* Fenzl in Led. fl. ross. III, 812. isthm. cauc., Astrachan,
prostrata Pall. Reis. d. versch. Prov. d. russ. R. I, Songaria, Tataria.
app. 490. t. G. f. e—n.
vermiculata γ. *laricina* Moq. Chen. enum. 141.
20. 5 *rigida* Pall. illustr. pl. 20. t. 12. Ciscaucas., Astrachan,
vermiculata Pall. Reis. d. versch. Prov. d. russ. R. app. I, 488. Songaria, Tataria.
β) *vestita* Fenzl in Led. fl. ross. III, 810.
21. *h* *incanescens* C. A. Mey. in Eichw. pl. nov. casp. cauc. 35. t. 26. Litt. maris caspii.
22. *h* *carinata* C. A. Mey. in Eichw. pl. nov. casp. cauc. 36. t. 28. Litt. maris caspii.
23. *h* *sclerantha* C. A. Mey. in Eichw. pl. nov. casp. cauc. 35. t. 27. Litt. maris caspii.
24. *h* *ericoides* Bieb. mém. de la soc. de nat. de Mosc. I, 141. Isthmus caucas. orient.,
β) *leucóxylon* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 183. Affghania, ? Hispania.
γ) *foliolosa* Fenzl in Led. fl. ross. III, 813.
caesia F. et Mey. in Hoh. enum. pl. Tal. 121.
glauca C. A. Mey. Verz. kauk. Pf. 160.
ericaeifolia Ad. in Hftm. hort. Mosq. 1908. Nro. 2764.

25. *h passerina* Bge in Linn. XVII, 4 in adn.
 26. *h Jacquemontii* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 148.

Mongolia.
 Kashmir, Lahor.

XX. Arthrophytum Schrenk.

(άρθρον, artus, Gelenk et φυτόν, planta, Pflanze.)

1. *h subulifolium* Schrenk in bull. phys. math. de l'ac. de St. Pétersb. III, 211.

Songaria, Kirgisia.

XXI. Halóxyion Bge.

(άλς, mare et sal, Meer et Salz et ξύλον, lignum, Holz.)

1. 5 *Ammodendron* Bge in Led. fl. ross. III, 820.
Anábasis Ammodendron C. A. Mey. in Led. fl. alt. I, 375. ic. pl. ross. t. 47.
Pinus orientalis Falk topogr. Beitr. II, 260.

Altai, Songaria,
 Tataria, Persia.

XXII. Halimocnémis C. A. Mey.

(άλμα, planta salina, Salzpflanze et κνημη, crus, Schenkel.)

1. *h Belangéri* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 196.

Persia.

XXIII. Nanóphyton Less.

(νανός, pumilis, Zwerg et φυτόν, planta, Pflanze.)

1. *h macranthum* F. et M. in bull. phys. math. de l'ac. de St. Pétr. II, 134.

Tataria, Songaria,
 Astrachan.

Halimocnémis macrantha Kar. in bull. de la soc. d. nat. de Mosc. 1839. 168.

2. *h caspicum* Less. in Linn. IX, 197.

Astrachan, Sibiria,
 Tataria, Songaria.

Anábasis Sieversii W. in R. et S. syst. veg. VI, 223.

? *Camphorosma acuta* Poir. enc. méth. I, 592.

Halimocnémis caspica Moq. Chen. enum. 156.

- *junipérina* C. A. Mey. in Led. fl. alt. I, 386.

junipérinum C. A. Mey. in bull. ph. math. de l'ac. de Pétr. II, 133.

Polycnémum junipérinum Bieb. in mém. de la soc. d. nat. de Mosc. I, 154.

- *erináceum* Pall. illustr. pl. 58. t. 48.

XXIV. Halogéton C. A. Mey.)

(άλς, mare et sal, Meer et Salz et γειτών, accola, Nachbar.)

1. *h Olivérii* Moq. Chen. enum. 159. J. et Sp. ill. pl. orient. II, t. 134.
 2. *h oppositiflora* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 204. (nec C. A. Mey.)

Persia.
 Sibiria.

XXV. Noœa (nec Noœa Fenzl.) Moq.

(a Noë Labiatas Africae sept. pluresque florae canariensis sedulo elaboravit.)

1. *h Auchéri* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 207.

Persiae deserta.

2. *h tomentosa* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 208.

Persia, Affghania.

Halimocnémis tomentosa Moq. Chen. enum. 151.

β) *glabrescens* Moq. Chen. enum. 151.

3. *h canescens* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 208.

Syria, Mesopotamia,

β) *glabriuscula* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 208.

Carduchia, Persia.

4. *h Tournefortii* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 206.

Armenia, Assyria.

Anábasis Tournefortii J. et Sp. ill. pl. or. II, 43. t. 132.

5. *h spinosissima* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 209.

Africa bor., Aegyptus,

Anábasis spinosissima L. fl. suppl. 173.

ins. Archipelagi, Oriens,

- *Echinus* Bieb. Besch. d. Länd. am kasp. M. 152.

Persia, Tataria.

Halogéton spinosissima C. A. Mey. Verz. kauk. Pfl. 159.

Salsola mucronata Forsk. fl. aeg. arab. 56.

- *Spinifex* Pall. illustr. pl. 32. t. 24.

- *Echinus* Lab. rar. pl. Syr. icon. II, 10. t. 5.

β) *camphorosmoides* Dsf. fl. atl. I, 218. (sub *Salsola*.)

XXVI. Anábasis L.

(apud Plinium *Equiseti* species; derivatio a verbo ἀναβαίνειν, adscendere, aufsteigen, maxime dubia.)

1. *h aphylla* L. cod. Nro. 1832.

tatarica Pall. illustr. pl. 13. t. 8.

cretácea β. Pall. Reis. d. versch. Prov. d. russ. R. I. app. 493.

Rossia merid., Tataria,

isthmus caucas. orient.,

Sibiria austr., ? Tripolis.

2. *h brevifolia* C. A. Mey. in Led. fl. alt. I, 377. Led. ill. pl. ross. t. 39.

Astrachan, Songaria,

3. *h* *articulata* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 212.
crassa Moq. Chen. enum. 166.
Salsola articulata Forsk. fl. aeg. arab. 55. t. 8. f. A.
4. *h* *cinerea* Moq. in DC. prodr. XIII, 2. 214.
5. *h* *setifera* Moq. Chen. enum. 164.
6. *h* *lutea* Moq. in DC. prodr. XIII, 215.
- Hispania, Algeria,
 Aegyptus, Arabia.
- Persia.
 Persia.
 Persia, Aegyptus.

XXVII. Brachylepis C. A. Mey.

- (βραχυσ, brevis, kurz et λεπς, squama, hoc loco: folium brevissimum, verkümmertes Blatt)
1. *h* *elatior* C. A. Mey. in bull. de l'ac. de St. Pé. VIII, 341.
 Soongaria, Tataria.
2. *h* *salsa* C. A. Mey. in Led. fl. alt. I, 372. ic pl. ross. t. 48.
 Astrachan, Songaria,
 Kirgisia, Tataria.
- humilis* Less. in Linn. IX, 198.
- Micrôlepis salsa* Eichw. pl. nov. casp. cauc. 2.
- Anábasis Brachylepis* Dietr. syn. pl. II, 995.
- β) *glauca* Kar. et Kir. Bull. de la soc. d. nat. de Mosq. 1841. 731.
- γ) *foliata* Moq. Chen. enum. 168.

Fam. 52. Caryophylleae.

Trib. 1. Illecebreae (Petala nulla).

XXVIII. Herniaria L.

(hernia, Bruch, ob usum medicum Herniariae glabrae L.)

1. *h* *polygonoides* Cav. ic. et descr. pl. II, t. 137.
 erecta Dsf. fl. atl. I, 215.
 Joanneana Schult. in R. et S. syst. veg. VI, 297.
 suffruticosa Dsf. tabl. de l'éc. de bot. du Mus. d'hist. nat. 45.
 Illecebrum suffruticosum L. cod. Nro. 1675.
 Paronychia fruticosa Lam. fl. franç. III, 230.
2. *h* *fruticosa* L. cod. Nro. 1796. Barr. icon. t. 713.
- Hispania, Africa bor.
 Hispania, Africa bor.

XXIX. Polycarpha Lam.

(πολυς, multus, viel et καρπος, fructus, Frucht; nomen ineptum.)

1. *h* *minuartioides* DC. prodr. III, 375.
 Lahaya minuartioides Schult. in R. et S. syst. veg. V, 406.
 Mollia minuartioides Spreng. mant. (teste G. Don.)

Trib. 2. Sileneae (Petala longe unguiculata).

XXX. Acanthophyllum C. A. Mey.

(ἀκανθα, spina, Dorn et φλλον, folium, Blatt.)

1. *h* *microcephalum* Boiss. diagn. pl. nov. orient. I, 43.
 Persia borealis.
2. *h* *bracteatum* Boiss. diagn. pl. nov. orient. I, 43.
 Persia australis.
3. *h* *crassifolium* Boiss. diagn. pl. nov. orient. I, 43.
 Persia.
4. *h* *Tournefortii* Fenzl in Led. fl. ross. I, 334.
 Armenia.
- mucronatum* Fenzl in Ann. d. Wien. Mus. I, 37. t. 5.
5. *h* *mucronatum* C. A. Mey. Verz. kauk. Pfl. 210.
 Transcauc. (Talysh).
6. *h* *versicolor* F. et M. ind. sem. hort. Petrop. IV, 31.
 Armenia rossica.
7. *h* *spinosum* C. A. Mey. Verz. kauk. Pfl. 210.
 Persia, Armenia,
 Afghanistan, Songaria.
- Fontanesii* Boiss. diagn. pl. orient. nov. I, 41.
Dianthus spinosus Dsf. in mém. du Mus. I, 198. t. 16. f. 1.
- Saponaria pungens* Bge in Led. fl. alt. II, 133. icon. pl. fl. ross. t. 4.
8. *h* *verticillatum* C. A. Mey. (teste Fenzl.)
 Armenia.
- Arenaria verticillata* Willd. sp. pl. II, 725.

XXXI. Silene.

(Injure Linnaeus perhibet, sese nomen hocce accepisse a Theophrasto; vox origine dubia.)

1. *h* *stentoria* Fenzl pugill. pl. nov. Syr. 29.
 Asia minor (Taurus).
2. *h* *cretacea* Fisch. in Spreng. syst. veg. II, 405.
 Rossia austro-orient.
3. *h* *caspica* Pers. syn. pl. I, 497.
 Caucasus.
- suffrutescens* Bieb. fl. taur. cauc. I, 340.
4. *h* *fruticosa* L. cod. Nro. 3248. S. et Sm. fl. gr. t. 428.
 Graecia, Sicilia.

XXXII. *Dianthus* L.

(Διος, Gen. v. „Zeus, i. e. Jupiter“ et ἀνθος, flos, Bluethe.)

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. <i>h</i> <i>arbusculus</i> Lindl. bot. reg. t. 1086. | China. |
| 2. <i>h</i> <i>actinopetalus</i> Fenzl pug. pl. nov. Syr. 36. | Asia minor (Taurus). |
| 3. <i>h</i> <i>zonatus</i> Fenzl pug. pl. nov. Syr. 35. | Asia minor (Taurus). |
| 4. <i>h</i> <i>arboreus</i> L. cod. Nro. 3220. S. et Sm. fl. gr. 406. | Creta. |
| 5. <i>h</i> <i>fruticosus</i> L. cod. Nro. 3221. S. et Sm. fl. gr. t. 407. | Creta. |
| 6. <i>h</i> <i>suffruticosus</i> Willd. hort. Berol. 466. | Patria ignota. |
| 7. <i>h</i> <i>Bisignani</i> Ten. fl. napl. I, 228. t. 39. | Italia inferior, Sicilia. |
| <i>rupicolus</i> Biv. Bern. sic. pl. cent. I, 33. t. 1. | |
| <i>involucratus</i> Poir. enc. méth. suppl. IV, 132. | |
| β) <i>albiflorus</i> Presl fl. sic. I, 145. | |
| 8. <i>h</i> <i>juniperinus</i> Sm. in transact. of the Linn. soc. II, 303. S. et Sm. fl. gr. t. 407. | Graecia. |
| <i>aciphyllus</i> Sieb. in DC. prodr. I, 358. | |
| 9. <i>h</i> <i>laricifolius</i> Boiss. et Reut. diagn. pl. nov. Hisp. 7. | Hispania. |

INDEX.

Acanthophyllum C. A. Mey. XXX.

- bracteatum* Boiss. 2.
- crassifolium* Boiss. 3.
- Fontanesii* Boiss. 7.
- microcephalum* Boiss. 1.
- mucronatum* C. A. Mey. 5.
- Fenzl 4.
- spinosum* C. A. Mey. 7.
- Tournefortii* Fenzl 4.
- versicolor* F. et M. 6.
- verticillatum* C. A. Mey. 8.

Achyranthes L. II.

- argentea* Lam. 1.
- aspera* α. *sicula* L. 1.
- sicula* Rth. 1.

Anabasis L. XXVI.

- Ammodendron* C. A. Mey. XXI, 1.
- aphylla* L. 1.
- articulata* Moq. 3.
- Brachylepis* Dietr. XXVII, 1.
- brevifolia* C. A. Mey. 2.
- cinerea* Moq. 4.
- crassa* Moq. 3.
- cretacea* β. Pall. 1.
- Echinus* Bieb. XXV, 5.
- lutea* Moq. 6.
- setifera* Moq. 5.
- Sieversii* W. XXIII, 2.
- spinosissima* L. fil. XXV, 5.
- tamariscifolia* L. XIX, 5.
- Lag. XXIII, 4.
- Webb. XIX, 18.
- tatarica* Pall. 1.
- Tournefortii* J. et Sp. XXV, 4.

Arenaria verticillata W. XXX, 8.**Arthrocnemum** Moq. XIV.

- ambiguum* Moq. 4.
- Belangerianum* XIII, 1 β,

Arthrocnemum caspicum Moq. XIII, 1.

- fruticosum* Moq. 1.
- macrostachyum* C. Koch 3.
- radicans* C. Koch 2.

Arthrophytum Schrenk XX.

- subulifolium* Schrenk 1.

Atriplex L. V.

- californicum* Moq. 1.
- canum* C. A. Mey. 2.
- canescens* Nutt. VI, 7.
- glaucum* L. VI, 3.
- Pall. 2.

- graecum* W. VI, 1.

- Halimus* L. 3.
- Pall. 2.

- portulacoides* L. VI, 6.

- Pall. VI, 5.

- verruciferum* Bieb. VI, 5.

Belowia Moq. XVIII.

- baccifera* Moq. 1.

Brachylepis C. A. Mey. XXVII.

- elatior* C. A. Mey. 1.

- humilis* Less. 2.

- salsa* C. A. Mey. 2.

Calligonum canescens Pursh VI, 7.**Camphorosma acuta** Poir. XXIII, 2.**Caroxylon acutifolium** Moq. XIX, 2.

- articulatum* Moq. XIX, 6.

- Auricula* Moq. XIX, 1.

- foetidum* Moq. XIX, 8.

- glaucum* Moq. XIX, 3.

- imbricatum* Moq. XIX, 9.

- nodulosum* Moq. XIX, 9 β.

- subaphyllum* Moq. XIX, 4.

- tamariscifolium* Moq. XIX, 5.

Celosia L. III.

- baccata* Retz I, 1.

- exstipulata* Horn. 1.

- Chenopodina** Moq. XVII.
Biebersteiniana Moq. 1.
dendroides Moq. 3.
depressa Moq. 8.
fruticulosa Moq. 5.
heterocarpa C. Koch 6.
Hostii Moq. XVI, 1 &.
linearis Moq. 7.
microphylla Moq. 3 β.
physophora Moq. 4.
vera Moq. 2.
- Chenopodium** L. IV.
americanum Spr. XVII, 8.
Baryosmon Schult. XIX, 8.
Biebersteinianum Schult. XVII, 1.
crassifolium Bieb. XVII, 1.
flavescens Schult. XIX, 15.
frutescens C. A. Mey. 1.
fruticosum Munch XVI, 1.
 - Bieb. XVII, 3.
Halimus Thunb. V, 3.
microphyllum Bieb. XVII, 3.
parvifolium Schult. XVII, 3.
portulacoides Thb. VI, 6.
spinosum Hk. VII, 1.
vestitum Thb. VI, 3.
villosum Spr. XVII, 1.
virgatum Thb. 2.
- Cochlospermum fruticosum** Lag. XVI, 1.
- Deeringia** R. Br. I.
baccata Moq. 1.
celosioides R. Br. 1.
indica Bl. 1.
- Dianthus** L. XXXII.
aciphyllus Sieb. 8.
actinopetalus Fenzl 2.
arborescens Hort. 6.
arboreus L. 4.
arbusculus Ldl. 1.
Bisignani Ten. 7.
fruticosus L. 5.
involutus Poir. 7.
juniperinus Sm. 8.
laricifolius Sm. 9.
rupicolus Biv. 7.
spinosus Dsf. XXX, 7.
suffruticosus W. 6.
zonatus Fenzl 3.
- Diotis lanata** Pnrsch VIII, 2.
- Enchylaena physophora** Spr. XVII, 4.
- Eurotia** Adans. VIII.
ferruginea Boiss. 1.
lanata Moq. 2.
- Grayia** H. et Arn. VII.
polygaloides H. et Arn. 1.
spinosa Moq. 1.
- Halimocnemis** C. A. Mey. XXII.
Belangerii Moq. 1.
caspiaca Moq. XXIII, 2.
juniperina C. A. Mey. XXIII, 2.
macrantha Kar. XXIII, 1.
tomentosa Moq. XXV, 2.
- Halimus portulacoides** Dumort. VI, 6.
- Haloenemum** Bieb. XIII.
arabicum Spr. XI, 2.
caspicum Bieb. 1.
- Haloenemum strobilaceum** Bieb. 2.
- Halogeton** C. A. Mey. XXIV.
georgica Moq. XIX, 11.
Olivieri Moq. 1.
oppositiflora Moq. 2.
spiniosissima C. A. Mey. XXV, 5.
tamariscifolia C. A. Mey. XIX, 5.
- Halostachys** C. A. Mey. XII.
caspia C. A. Mey. XIII, 1.
nodulosa C. A. Mey. 1.
perfoliata Moq. 1.
- Haloxylon** Bge XXI.
Ammodendron Bge 1.
- Herniaria** L. XXVIII.
erecta Dsf. 1.
fruticosa L. 2.
Joanneana Schult. 1.
polygonoides Cav. 1.
suffruticosa Dsf. 1.
- Illecebrum suffruticosum** L. XXVIII, 1.
- Kalidium** Moq. XI.
arabicum Moq. 2.
foliatum Moq. 3.
gracile Moq. 1.
- Kochia** Rth. IX.
stellaris Moq. 1.
- Lahaya minuartioides** R. et S. XXIX, 1.
- Microlepis salsa** Eichw. XXVII, 2.
- Mollia minuartioides** Spr. XXIX, 1.
- Nanophyton** Less. XXIII.
caspicum Less. 2.
juniperinum C. A. Mey. 2.
macranthum F. et M. 1.
- Noaea (Noea)** Moq. XXV.
Aucheri Moq. 1.
canescens Moq. 3.
spiniosissima Moq. 5.
tomentosa Moq. 2.
Tournefortii Moq. 4.
- Obione** Grtn. VI.
Barclayana Benth. 10.
Belangeri Moq. 2.
canescens Moq. 7.
confertiflora Torr. 12.
Coulteri Moq. 9.
glauca Moq. 3.
graeca Moq. 1.
leucophylla Moq. 4.
microcarpa Benth. 11.
portulacoides Moq. 6.
tetraptera Benth. 8.
- Paronychia fruticosa** Lam. XXVIII, 1.
- Pinus orientalis** Falk XXI, 1.
- Polycarpha** Lam. XXIX.
minuartioides DC. 1.
- Polycnemum erinaceum** Pall. XXIII, 2.
juniperinum Bieb. XXIII, 2.
- Pterochiton occidentalis** Torr. VI, 8.
- Salicornia** L. X.
Alpini Lag. XIV, 1.
ambigua Mich. XIV, 4.
amplexicaulis Vahl XII, 1.
anceps Lag. 1.
arabica L. XI, 2.
caspiaca L. XIII, 1.
cruciata Forsk. XIII, 2 β.

- Salicornia europaea** β . *perennis* Gouan XIV, 1.
foliata Pall. XI, 3.
foliosa R. et S. XI, 3.
fruticosa Alsch XIV, 3.
 - L. XIV, 1.
 β) *polystachya* Koch XIV, 3.
fruticulosa Tin. XIV, 2.
macrostachya Mor. XIV, 3.
mucronata Lag. 2.
nodulosa Del. XII, 1.
Pallasii C. A. Mey. XI, 2.
perfoliata Forsk. XII, 2.
radicans Guss. XIV, 2.
sempervireus Sauv. XIV, 1.
strobilacea Del. XII, 2.
 - Grtn. XI, 3.
 - Pall. XIII, 2.
- Salsola** L. XIX.
Agrigentina Guss. 15 β .
annularis Poir. XVI, 1.
arborescens L. fl. 16.
Arbuscula Pall. 16.
articulata Cav. 6.
 - Forsk. XXVI, 3.
Auricula Moq. 1.
 - β . *acutifolia* Moq. 2.
brevifolia 15 β .
caesia F. et M. 24 γ .
camphorosmoides Dsf. XXV, 5 β .
cana C. Koch 17.
carinata C. A. Mey. 22.
decurrens J. et Sp. 2.
dendroides Pall. 10.
depressa Pursh XVII, 8.
divaricata Mass. 13.
Echinus Lab. XXV, 5.
Ennaea Jan. 15.
ericaeifolia Ad. 24 γ .
ericoides Bieb. 24.
exasperata C. A. Mey. 16 γ .
farinosa Poir. XVII, 2.
flavescens Cav. 15.
foetida Del. 8.
 - Vest. XVI, 4.
fruticosa Bieb. XVII, 3.
 - Cav. 13.
 - L. XVI, 1.
gemmascens Pall. 9.
genistoides Juss. 5.
georgica Bge 11.
glauca Bieb. 3.
 - C. A. Mey. 24 γ .
Jacquemontii Moq. 28.
Hostii Tr. XVI, 1 δ .
incanescens C. A. Mey. 21.
inermis Forsk. 12.
lanata Pall. 7.
laniflora L. fl. 7.
laricina Pall. 19.
linearis Ell. XVII, 7.
- Salsola longifolia** Forsk. 13.
microphylla Cav. 15 β .
Moquiniana J. et Sp. 1.
mucronata Forsk. XXV, 5.
oppositifolia Dsf. 13.
papillosa Willk. 14.
passerina Bge 25.
physophora Schrad. XVII, 4.
prostrata Pall. 19 β .
rigida Pall. 20.
salsa Mich. XVII, 7.
sclerantha C. A. Mey. 23.
spicata Pall. 3.
Spinifex Pall. XXV, 5.
Suaeda Mart. XVII, 2.
subaphylla C. A. Mey. 4.
tamariscifera Lag. 5.
vera R. et S. XVII, 2.
vermiculata L. 15.
 - Pall. 20.
 - γ . *laricina* Moq. 19.
verrucosa Bieb. 10.
 - C. A. Mey. 9.
verticillata Schousb. 13 β .
villosa Del. 15 γ .
Webbii Moq. 18.
- Saponaria pungens** Bge XXX, 7.
Schanginia C. A. Mey. XV.
arbuscula Kar. et Kir. 1.
- Schoberia americana** C. A. Mey. XVII, 8.
Biebersteiniana C. A. Mey. XVII, 1.
dendroides C. A. Mey. XVII, 3.
fruticosa C. A. Mey. XVI, 1.
fruticulosa Less. XVII, 5.
microphylla C. A. Mey. XVII, 1.
physophora C. A. Mey. XVII, 4.
- Silene** L. XXXI.
caspica Pers. 3.
cretacea Fisch. 2.
fruticosa L. 4.
stentoria Fenzl 1.
suffrutescens Bieb. 3.
- Suaeda** Forsk. XVI.
Biebersteiniana C. Koch XVII, 1.
dendroides Moq. XVII, 3.
foetida Moq. 4.
fruticosa Forsk. 1.
 - β . *longifolia* Fenzl 5.
fruticulosa Moq. XVII, 5.
gracilis Moq. 3.
heterocarpa Fenzl XVII, 6.
laxifolia Lowe 1.
linearis Moq. XVII, 7.
longifolia C. Koch 5.
microphylla C. Koch XVII, 3 β .
microphylla Pall. XVII, 1.
physophora Pall. XVII, 4.
puberula Moq. 2.
vera Forsk. XVII, 2.

ORDO IX.

Pleiocarpae.

Fam. 53. Surianaceae.

I. Suriana Plum.

(Don. Surian a Ludovico XIV. a. 1690 in insulam Cubam missus, Plumierum secum abduxit. Sequenti anno redux Massiliae mortuus est.)

1. *h* maritima L. cod. Nro. 3366. Florida, India occid.,
Amer. merid., N. Caed.

Fam. 54. Crassulaceae.

II. Crassula L. (crassus, dick.)

- * 1. *h* Agardhiana R. et S. syst. veget. VI, 716. Hispania australis.

III. Kalanchoë Ad. (Kalanchoë DC. Kalenchoë Haw.) (nomen chinense.)

1. *h* spathulata DC. pl. hist. succul. t. 65. China.
Cotylédon spathulata Poir. enc. méth. bot. suppl. II, 373.
Veréa spathulata D. Dietr. syn. pl. II, 1327.
2. *h* varians Haw. in phil. mag. and ann. IX, 302. Ind. orient., Himalaya.
subamplectens Wall. pl. asiat. rar. II, t. 167.
3. *h* acutiflora Haw. syn. pl. succul. 109. ic. pl. in China nasc. China, India orient.
e bibl. Braam. t. 7. f. dextra.
Veréa acutiflora Kenn. in Andr. bot. repos. t. 560.
4. *h* ceratophylla Haw. rev. pl. succ. 23. ic. pl. in China nasc. China.
e bibl. Braam. t. 9.
Veréa ceratophylla D. Dietr. syn. pl. II, 1328.

IV. Sedum L.

(Jam apud Veteres Sempervivi species, i. e. Hauswurz.)

- * 1. *h* populifolium L. fl. suppl. 242. bot. mag. t. 211. Siberia australis.
Anacampseros populifolia Haw. syn. pl. succ. 123.
2. *h* linearifolium Royle ill. of the him. mount. 222. t. 48. f. 1. Himalaya.
3. *h* Notarjanni Ten. fl. napl. I, 245. t. 40. Italia inferior.
Nolarjanni Ten. hort. Neap. 1819. t. 43.
4. *h* Salontanum Tin. in Guss. fl. sic. syn. II, 2. 827. Sicilia.

V. Sempervivum L.

(semper, immer et vivere, leben.)

- * 1. *h* arbóreum L. cod. Nro. 3559. S. et Sm. fl. gr. t. 473. Africa bor., Lusitania,
Sardinia, Graecia,
Creta.
β) atropurpureum Hort.
γ) variegatum Hort.

Fam. 55. Saxifrageae.

Trib. 1. Eufraxifrageae (Fol. alterna; Flor. 10—polyandri).

VI. Neillia Don.

(Patr. Neill, secretarius societatis Wernerianae Edinensis.)

1. 5 thyrsiflora Don prodr. fl. nep. 228. Nepal.
 2. 5 rubiflora Don prodr. fl. nep. 228. Nepal.

Trib. 2. Escallonieae (Fol. alterna; Flor. 5—6 andri).

VII. Itca L.

(Itca, apud Graecos Salicis species, Weide, ob similitudinem J. virginicae.)

- * 1. 5 virginica L. cod. Nro. 1621. bot. mag. t. 2409. America foederata.
 2. 5 rosmarinifolia Poir. enc. méth. suppl. III, 190. China, Cochinchina.
 Rosmarinus Schult. in R. et S. syst. veg. V, 408.
 Cédrela Rosmarinus Lour. fl. coch. 190.
 3. 5 chinensis Hook. and Arn. bot. of Beech. voy. 189. t. 39. China (Makao).
 Polyosma chinensis Walp. rept. bot. II, 937.
 4. 5 fragrans Wall. in Roxb. fl. ind. II, 420. ed. Seramp. 1824. Nepal, India orientalis.
 ? Polyosma fragrans Horsf. et Benn. pl. jav. rar. II, 196.
 5. 5 macrophylla Wall. in Roxb. fl. ind. II, 419. ed. Seramp. 1824. Himalaya.
 Kurrimia macrophylla Wall. num. list.
 6. 5 nutans Royle ill. of the him. mount. 226. Himalaya.

Trib. 2. Hydrangeae (Fol. saepissime opposita; Flores 10 andri).

VIII. Hydrangea L.

(ὕδωρ, aqua, Wasser et ἄγρος, vas, Gefaess, ob capsulae Hydrangeae et vasis simil.)

- * 1. 5 arborescens L. cod. Nro. 3132. bot. mag. t. 437. America foederata.
 frutescens Mch meth. I, 106.
 vulgaris Mich. fl. bor. amer. I, 268.
 β) cordata Pursh fl. Amer. sept. I, 309. Wats. dendr. brit. t. 42.
 γ) discolor Ser. in DC. prodr. IV, 14.
 δ) oblonga Torr. and Gr. fl. of N. Amer. I, 591.
 ε) stérilis Torr. and Gr. fl. of N. Amer. I, 591.
 * 2. 5 radiata Walt. fl. carol. 251. America foederata
 nivea Mich. fl. bor. amer. I, 268. Lam. ill. d. genr. t. 307. f. 2. media et australis.
 glauca Hort.
 β) glabella Ser. in DC. prodr. IV, 14.
 γ) pubescens N. v. E. in syll. Ratisb. II, 45.
 Neesiana Steud. nom. bot. ed. 2. I, 780.
 * 3. 5 quercifolia Bartr. trav. tr. Car. Georg. 366. t. 7. bot. mag. t. 975. America foed. austr.
 radiata Sm. icon. pict. pl. rar. 12.
 β) angulata Tausch in Flora XVII, 494. nouv. Duh. VI, t. 78.
 4. ♀ Azisai Sieb. in nov. act. ac. Leop. Carol. XIV, 2. 689. S. et Z. fl.
 jap. I, t. 51. Japonia.
 5. 5 Otaksa S. et Z. fl. jap. I, 105. t. 52. Japonia.
 * 6. 5 japonica Sieb. in nov. act. Leop. Carol. XIV, 2. 689. fl. jap. I, t. 53. Japonia.
 β) coerúlea Hook. bot. mag. t. 4253.
 7. 5 petiolaris S. et Z. fl. jap. I, 108. t. 54. Japonia.
 8. 5 Belzonii S. et Z. fl. jap. I, 109. t. 55. Japonia.
 9. 5 acuminata S. et Z. fl. jap. I, 110. t. 56. 57. Japonia.
 10. ♀ Thunbergii Siebd. in nov. act. ac. Leop. Carol. XIV, 2. 690.
 S. et Z. fl. jap. t. 58. Japonia.
 serrata DC. prodr. IV, 15.
 Viburnum serratum Thunb. fl. jap. 124.
 11. 5 stellata S. et Z. fl. jap. I, 112. t. 59. Japonia.
 Sitsitan Sieb. in nov. act. ac. Leop. Carol. XIV, 2. 692.
 12. 5 virens Siebd. in nov. act. ac. Leop. Carol. XIV, 2. 690. fl. jap. I, t. 60. Japonia.
 scandens DC. prodr. IV, 666.
 Viburnum scandens L. fl. suppl. 184.
 - virens Thunb. fl. jap. 123.

13. 5 cordifolia S. et Z. fl. jap. I, 113. t. 59. Japonia.
 14. 5 bracteata S. et Z. fl. jap. I. t. 92. Japonia.
 15. 5 paniculata Sieb. nov. act. ac. Leop. Car. XIV, 2. 691. fl. jap. I, t. 61. Japonia.
 16. 5 hirta S. et Z. fl. jap. I, 117. t. 62. Japonia.
 Viburnum hirtum Thunb. fl. jap. 124.
 17. η et 2 involucrata Siebd. nov. act. ac. Leop. Car. XIV, 2. 691. fl. jap. I, t. 61, Japonia.
 β) flava G. Don dichl. pl. III, 234.
 18. η macrophylla Ser. in DC. prodr. IV, 15. Japonia.
 Viburnum macrophyllum Thunb. fl. jap. 125.
 * 19. 5 rubescens Dne in fl. d. serr. IV. t. 378. 379. Japonia.
 * 20. 5 Hortensia DC. prodr. IV, 15. Japonia, China.
 hortensis Sm. ic. pict. pl. rar. I, t. 12, bot mag. t. 438.
 opuloides Hort.
 mutabilis Hort.
 Hortensia opuloides Lam. enc. méth. III, 136. ill. d. genr. t. 380.
 - rósea Dsf. tabl. de l'éc. de Mus. d'hist. nat. 115.
 - speciosa Pers. syn. pl. I, 505.
 Primula mutabilis Lour. fl. coch. I, 127.
 * β) coerulea.
 * γ) flore pleno.
 * δ) maculata Blume bijdr. 920.
 * ε) ramis atropurpureis.
 21. 5 altissima Wall. tent. fl. nep. II, t. 50. Nepal.
 22. 5 vestita Wall. tent. fl. nep. II, t. 49. Nepal.
 áspera Ham. in Don prodr. fl. nep. 211.
 β) fimbriata. Wall. tent. fl. nep. II, 49.
 23. 5 heteromalla Don prodr. fl. nep. 211. Nepal.
 24. 5 anómala Don prodr. fl. nep. 211. Nepal.
 * 25. 5 laevigata Hort. Cels. Patria ignota.
 * 26. 5 oblongifolia Bl. bijdr. 920. Peru.
 27. 5 peruviana Mor. in DC. prodr. IV, 14. Peru.
 - Not. Praeterea in horto nostro dendrologico: 1) altissima Hort.

VIII. *Cardiandra* Sieb. et Zucc.

(καρδια, cor, Herz et άνθη, vir, hoc loco: stamen, Staubgefaess.)

1. η alternifolia S. et Z. fl. jap. I, 121. t. 60. 65. Japonia.
 Hydrangea alternifolia Sieb. nov. act. ac. Leop. Car. nat. cur. IV, 2. 692.

IX. *Platyterator* Sieb. et Zucc.

(πλατος, amplius, gross et κρατηρ, vas, Gefaess, ob flor. ster. calyces ampliatis.)

1. 5 argutus S. et Z. fl. jap. I, 64. t. 27. Japonia.

X. *Schizophragma* Sieb. et Zucc.

(σχίζειν, descindere, spalten et φραγμα, septum, Scheidewand, ob dissepimenta e fibris transversis fasciolatis facta.)

1. 5 hydrangeoides S. et Z. fl. jap. I, 60. t. 26. Japonia.

XI. *Adamia* Wall.

(John Adam, praefectus summus Indiae orientalis ineunte saeculo nostro.)

1. 5 versicolor Fort. in Lindl. journ. of the hort. soc. I, 298. China (Hongkong).
 2. 5 chinensis Grdn. et Ch. in journ. de bot. and Kew Gard. misc. I, 311. China (Hongkong).
 3. 5 cyanea Wall. tent. fl. nep. 46. t. 36. bot. mag. t. 3046.

Fam. 56. *Philadelphaeae*.

XII. *Philadelphus* L.

(φλαδελφον, frutex parthicus ab Apollodoro commemoratus; derivatio dubia.)

A. Flores racemosi.

- * 1. 5 coronarius L. cod. Nro. 3592. bot. map. t. 391. Europa austr., Japonia.
 Syringa suaveolens Mnch meth. 678.
 * β) aromaticus Hort. Par.
 * γ) multiplex.
 * δ) nanus Mill. dict. Nro. 2.
 * ε) variegatus.

- * 2. 5 *tomentosus* Wall. num. list. Nro. 3653. Royle III. bot. of the him. mount. 216. t. 46. f. 1. Nepal, Himalaya.
nepalensis (nipaulensis) Loud. hort. brit. 196.
- β) *triflorus* Wall. in bot. reg. misc. XXIV, 35.
- 3. 5 *verrucosus* Schrad. in DC. prodr. III, 205. Linn. XII, 392. America foederata.
grandiflorus Lindl. bot. reg. t. 570.
- * 4. 5 *latifolius* Schrad. in DC. prodr. III, 206. Linn. XII, 394. America foederata.
pubescens Lois. herb. gén. de l'amat t. 208.
- * 5. 5 *Zeyheri* Schrad. in DC. prodr. III, 205. Linn. XII, 390. America foederata.
- 6. 5 *affinis* Schlecht. in Linn. XIII, 419. Mexico.
- 7. 5 *californicus* Benth. pl. Hartw. 309. California.

B. Flores solitariae aut terni.

- * 8. 5 *grandiflorus* W. hort. Ber. I, 511. Gu. et H. Abb. fremd. America foedera.
Holzart t. 44.
inodorus Mich. fl. bor. amer. I, 283.
 - β) *laxus* Schrad. in DC. prodr. III, 206. bot. reg. XXV, t. 39.
humilis Hort.
 - * γ) *floribundus* Schrad. in DC. prodr. III, 205. Linn. XII, 391.
 - δ) *speciosus* Schrad. in DC. prodr. III, 206. bot. reg. t. 2003.
laxus Lodd.
 - * 9. 5 *inodorus* L. cod. Nro. 3593. bot. mag. t. 1478. America foederata.
Syringa inodora Mch meth. 678.
 - * 10. 5 *hirsutus* Nutt. gen. of N. Amer. pl. I, 301. bot. reg. XXIV, t. 14. America foed. media.
trinervis Schrad. in Linn. XII, 399.
 - * β) *gracilis* Lodd. in Loud. hort. brit. 196.
 - * 11. 5 *Lewisii* Pursh fl. Amer. sept. I, 329. America boreali-occid.
 - * 12. 5 *Gordonianus* Lindl. bot. reg. XXIV, misc. 23. XXV, t. 32. America boreali-occid.
 - * 13. 5 *mexicanus* Schlecht. in Linn. XIII, 418. bot. reg. XXVI, misc. 70. XXVIII, t. 38. Mexico.
 - 14. 5 *Satsumi* Siehd. in Paxt. fl. gard. 102. t. 186. ? Japonia.
 - 15. 5 *microphyllus* A. Gr. pl. Fendl. 54. Nova Mexico.
- Not. Praeterea in horto nostro dendrologico species aut varietates sequentes, nobis non satis notae, coluntur: 1) Colombianus, 2) chinensis, 3) cordatus, 4) dubius, 5) edulis, 6) Grahami, 7) Ledebourii, 8) nivalis.

XIII. *Deutzia* Thunb.

(van der Deutz, senator Amstelodamensis, Thunbergii fautor.)

- * 1. 5 *scabra* Thunb. fl. jap. 185. t. 24. bot. reg. t. 1718. Japonia.
 - 2. 5 *grandiflora* Bge in mém. d. sav. étr. de St. Pé. II, 104. Mongolia, China bor.
 - * 3. 5 *parviflora* Bge in mém. d. sav. étr. de St. Pé. II, 105. Mongolia, China bor.
 - * 4. 5 *crenata* S. et Z. fl. jap. I, 19. t. 6. Japonia.
 - * 5. 5 *gracilis* S. et Z. fl. jap. I, 19. t. 8. Fl. d. serr. VI, 243. t. 611. Japonia.
 - * 6. 5 *staminea* R. Br. in Wall. pl. asiat. rar. II, 82. t. 191. Nepal, Himalaya.
 - 7. 5 *corymbosa* R. B. in Wall. numer. list. Nro. 3652. bot. reg. XXV, misc. 37. XXVI, t. 5. Nepal, Himalaya.
 - 8. 5 *Brunoniana* R. Br. in Wall. num. list. Nro. 3650. Nepal, Himalaya.
- Not. Praeterea in horto nostro dendrologico species aut varietates sequentes, nobis non satis notae, coluntur: 1) alarioides, 2) japonica, 3) ignea, 4) nepalensis, 5) pulchella, 6) undulata.

XIV. *Decumaria* L.

(decumarius, die Zehn betreffend, ob 10 sepala, 10 petala et stigma 10-radiatum.)

- * 1. 5 *barbara* L. cod. Nro. 3445. Carolina, Florida,
radicans Mch. meth. 17. Louisiana.
- Forsythia* Mich. fl. bor. amer. I, 282.
- * β) *sarmentosa* Bosc. in act. hist. nat de Par. I, 76. t. 13. (in Journ. et Mém. de la soc. d'hist. nat. frustra quae.)
Forsythia scandens Walt. fl. carol. 154.

XV. *Jamesia* Torr. et Gr.

(Dr. Edwin James, botanicus et historicus expeditionis praefecti Longii ad scrutandos montes petrosos [Rocky mountains].)

- 1. 5 *americana* Torr. and. Gr. fl. of N. Amer. I, 593. America boreali-occid.

XVI. *Pterostémon* Schauer.

(πηρρον, ala, Fluegel et στήμα, filamentum, hoc loco: Staubfaden.)

- 1. 5 *mexicanus* S. Schauer in Linn. XX, 736. Mexico, Nova Mexico.

Fam. 57. Salicariaceae.

XVII. *Fatioa* DC.

(Fatio de Duillier, Basileae natus, mathematicus insignis, Genevae plerumque vixit, †1735.)

1. 5 nepalensis (napaulensis) DC. prodr. III, 89. Denkschr. d. schweiz. Ges. f. Naturw. I, 1. 99. t. 1. Nepal.

XVIII. *Grislea* Loeffl.

(G. Grisley, lusitanicus, a. 1661 viridarium lusitanicum in lucem edidit.)

1. 5 tomentosa Roxb. pl. of Corom. I, 29. t. 31. India orientalis c. ins.,
Lytrum fruticosum L. cod. Nro. 3468. China.
Woodfordia floribunda Salisb. par. Lond. t. 42.

XIX. *Lagerstroemia* L.

(Magnus Lagerstroem, Gothenburgensis, plura Chinae cimelea publico consecravat.)

1. 5 indica L. cod. Nro. 3881. bot. mag. t. 405. Cochinchina, China,
chinensis Lam. enc. méth. III, 375. Japonia.
Velaga globosa Gaertn. de fr. et sem. II, 246. t. 133.
2. ♂ speciosa Pers. syn. pl. II, 72. China.
Muenchhausia W. sp. pl. II, 1179.
Munchhausia speciosa L. cod. Nro. 5731. Muenchh. Hausv. V. t. 356.
3. ♂ Reginae Rxb. pl. of Corom. I, 46. t. 65. China, India orientalis.
flos regina Retz obs. bot. I, 20 et V, 25.
Adambea glabra Lam. enc. méth. I, 39.

Fam. 58. Rosaceae.

Trib. 1. Spiraeaceae (Folliculi pleiospermi).

XX. *Spiraea*.

(Spiraea apud Latinos jam Spiraeae species significat.)

A. Sorbaria (Folliculi basi coaliti, non inflati; Folia pinnata).

- * 1. 5 sorbifolia L. cod. Nro. 3725. Sibiria, Mongolia,
pinnata Munch méth. 663. China borealis.
Schizonotus sorbifolius Lindl. (ubi?)
β) alpina Pall. fl. ross. I, 34. et 89. t. 25.
grandiflora Sweet., Lodd.
Pallasii G. Don dichl. pl. II, 520.
γ) floribunda Hort.
δ) Lindleyana Wall. num list. Nro. 703. bot. reg. XXVI. misc. 71.
Schizonotus tomentosus Lindl. in bot. reg. XXVI. misc. 71.

B. Physocarpus (Folliculi basi connati inflati; Folia simplicia).

- * 2. 5 opulifolia L. cod. Nro. 3724. America borealis.
β) ferruginea Nutt. in Torr. et Gr. fl. of N. Amer. I, 414.
γ) mollis Hook. fl. bor. amer. I, 171.
capitata Pursh fl. Amer. sept. I, 342.
δ) pauciflora Hook. fl. bor. amer. I, 171.
monógyna Torr. in Ann. of Lyc. of New-Y. II, 194.
Icoturus montanus Raf.
ε) tomentella Ser. in DC. prodr. II, 543.

C. Spiraeanthus (Folliculi basi connati, lineares, 1—2 spermi).

3. 5 Schrenkiana C. A. Mey. ind. sem. h. bot. Petrop. IX, 96. Songarei.

D. Ulmaria (Follic. liberi, dispermi; Discus obsoletus).

- * 4. 5 Reevesiana Lindl. bot. reg. XXX. t. 10. China, Nepal.
chamaedryfolia Thb. fl. jap. 210. (teste S. et Z. var. Sp. chamaedryfoliae L.)
corymbosa Roxb. fl. ind. II, 512.
? expansa Wall.
nepalensis Lodd. cat.

E. Chamaedryon (Folliculi liberi; Discus; Flores umbellati aut corymbosi).

- * 5. 5 ulmifolia Scop. fl. carn. I, 349. t. 22a. Illyria.
chamaedryfolia Jacq. hort. Vindob. t. 140.
β) foliosa Poir in méth. VII, 353.

- * 6. 5 *chamaedryfolia* L. cod. Nro. 3721. bot. reg. t. 1222. Imp. austriacum,
Rossia, Sibiria.
incisa Hort.
media Host. fl. austr. II, 15.
 β) *austriaca* (floribus majoribus, forte species genuina?).
 γ) *media* Pursh fl. bor. amer. I, 342.
 δ) *subracemosa* Ser. in DC. prodr. II, 542.
- * 7. 5 *oblongifolia* W. et K. pl. rar. Hung. III, 261. t. 235. Istria, Hungaria,
Volhynia, ? Altai.
chamaedryfolia γ. *oblongifolia* Camb. in ann. d. sc. nat. I, 363.
hypericifolia β. *longifolia* Led. fl. alt. II, 215. icon. pl. fl. ross. t. 429.
- * 8. 5 *ambigua* Hort. Gelt. Patria ignota.
alpina Willd. in Gu. et H. Abb. fr. Holzart. 8. t. 8.
- * 9. 5 *flexuosa* Fisch. in Camb. monogr. du g. Spir. 31. t. 26. Sibiria.
alpina Hort. Paris.
- * 10. 5 *pubescens* Turcz. dec. pl. Chin. 11. Lindl. bot. reg. XXXIII. t. 38. China borealis.
 11. 5 *dasyantha* Bge in mém. d. sav. étr. de St. Pé. II, 97. China borealis.
 12. 5 *flabellata* Bert. in Guss. pl. rar. 205. t. 40. Italia inferior.
chamaedryfolia Ten. fl. nap. fl. prodr. app. IV. fl. napl. III, 9.
- * 13. 5 *sericea* Turcz. in Bull. de l'acad. de Mosc. XVI, 591. Sibiria austr.
- * 14. 5 *thalictroides* Pall. fl. ross. I, 34. t. 18. Sibiria.
aquilegifolia Pall. Reise d. versch. Prov. d. russ. R. III, App. 834. t. P. f. 3.
- * 15. 5 *trilobata* L. cod. Nro. 3723. Sibiria, Mongolia.
- * 16. 5 *adiantoides* Hort. Patria ignota.
- * 17. 5 *crenata* L. cod. Nro. 3722. (excl. syn. Barr.) Oriens, Sibiria.
hypericifolia Claus in Goeb. Reise in d. Stepp. d. südl. Russl. II, 271.
 - α. *latifolia* Led. fl. alt. II, 215.
 - β. *crenata* Ser. in DC. prodr. II, 543.
 γ) *Besseriana* Ser. in DC. prodr. II, 543.
 δ) *Sawranica* Bess. in DC. prodr. II, 543.
 ε) *subintegra*; *inflexa* Hort.
 ζ) *uralensis* Fisch. in DC. prodr. II, 543.
- * 18. 5 *Nicoudiertii* Hort. Gelt. Barr. ic. t. 564. Pyrenaeus.
- * 19. 5 *hypericifolia* L. cod. Nro. 3720. Europa austr.-oriental.,
Oriens, Sibiria.
hypericifolia β. *Plukenetiana* Ser. in DC. prodr. II, 543.
 β) *acutifolia* W. hort. Berol. 540.
hypericifolia γ. *acuta* Ser. in DC. prodr. II, 543.
sibirica Hort.
- * 20. 5 *alpina* Pall. fl. ross. I, 35. t. 20. Sibiria.
 γ) *microphylla* Led. fl. ross. II, 12.
hypericifolia γ. *brevifolia* Led. fl. alt. II, 215. icon. pl. ross. t. 430.
- * 21. 5 *obovata* W. et K. in W. hort. Berol. 541. Gallia australis.
crenata Gouan illustr. et observ. bot. 31.
- * 22. 5 *Bethlehemensis* Hort. Patria ignota.
- * 23. 5 *belgica* Dum. fl. belg. 98.
- * 24. 5 *Pikowiensis* Bess. enum. pl. Pod. 46. Podolia.
- * 25. 5 *cana* W. et K. pl. rar. Hung. III, 252. t. 227. Hungar., Croat., Dalm.
- * 26. 5 *japonica* Blume bijdr. 1114. Japonia.
 27. 5 *magellanica* Poir. enc. méth. VII, 350. Patagonia.
- * 28. 5 *prunifolia* (nec *pinnifolia* Walp.) S. et Z. fl. jap. I, 130. t. 130. Japonia.
crenata var. Thunb. fl. jap. 210. (teste S. et Z.)
 β) *flore pleno*.
- * 29. 5 *Thunbergii* S. et Z. fl. jap. I, 136. t. 69. Japonia.
crenata Thunb. fl. jap. 210.
- * 30. 5 *decumbens* Koch in Sturm Deutschl. Flora Heft 62. Illyria, Italia superior.
flexuosa Rehb. fl. germ. exc. 672.
ulmifolia Suffren in Poll. fl. Veron. II, 139.
- * 31. 5 *incisa* Thunb. fl. jap. 213. Japonia.
- * 32. 5 *lanceolata* Poir. enc. méth. VII, 354. China, Indiae orientalis
reg. boreales.
cantonensis Lour. fl. coch. I, 194. Cmb. in ann. d. sc. nat. I, 366. t. 25.
 ? *corymbosa* Rxb. fl. ind. II, 512. (teste H. and Arn.)
Humanni Hort. Turic.
- * 33. 5 *bella* Sims. bot. mag. t. 2426. China, Himalaya, Nepal,
Japonia,
callosa Thunb. fl. jap. 209. (teste H. and Arn.)
expansa Wall. (teste Loud.)
japonica L. fl. suppl. 262.
stellata Wall.

- * 34. 5 *venustula* Kth et B. *ipd. sem. hort. bot. Berol. 16.*
 * 35. 5 *pulchella* Kze in Linn. XX, 60.
 * 36. 5 *cuneifolia* Wall. cat. 699. Jacquem. voy. 47. t. 57. Nepal.
 canescens Don *prodr. fl. nep. 227.* ? Nepal.
 * 37. 5 *vaccinifolia* Don *prodr. fl. nep. 227.* Kashmir, Lahor, Nepal.
 38. 5 *fastigiata* Wall. *num. list.* Nepal.
 ? *callosa* Blume *bijdr. 1114.* India orientalis.
 39. 5 *glauca* Wall. *num. list.*
 40. 5 *laxiflora* Lindl. in *bot. reg. XXV. misc. 60. Paxt. fl. gard. f. 183.* India orientalis.
 41. 5 *Blumei* G. Don *dichlam. pl. II, 518.* Japonia.
 chamaedryfolia Blume *bijdr. 1114.*
 * 42. 5 *betulaefolia* Pall. *fl. ross. I, 33. t. 16.* Sibiria orient., America.
 chamaedryfolia Ch. et Schlecht. in Linn. II, 2.
 β) *angustifolia.*
 chamaedryfolia β. Hook et Arn. *bot. of Beech. voy. 123.*
 γ) *sororia* Penny.
 * 43. 5 *corymbosa* Raf. in *Desv. journ. de bot. 1814. p. 168.* America borealis.
 bot. cab. t. 671.
 betulaefolia Wats. *dendr. t. 67.*
 chamaedryfolia Pursh *fl. bor. amer. I, 342.*
 crataegifolia Lk. *en. pl. hort. Ber. II, 40.*
 44. 5 *ceanothifolia* Horn. *hort. Hafn. II, 466.*
 * 45. 5 *amoena* Morr. in *ann. de la soc. d'hort. de Gand, II, 281. t. 72.* Patria ignota.
 46. 5 *parvifolia* (nec *parviflora* Steud.) Benth. *pl. Hartw. 284.* Patria ignota.
 47. 5 *argentea* Mut. in *L. fil. suppl. 261. H. B. K. nov. gen. et* Mexico.
 sp. amer. VI, 235. t. 562. Nova Granada.
- F. *Spiraria* (Folliculi libri; Flores paniculati).
- * 48. 5 *laevigata* L. *cod. Nro. 3717.* Sibiria.
 altaica Pall. *Reise d. versch. Prov. d. russ. R. II, App. 739.*
 t. T. fl. ross. I, 37. t. 23.
 altaicensis Laxm. in *nov. comm. acad. Petrop. XV, 554. t. 29. f. 2.*
 * 49. 5 *salicifolia* L. *cod. Nro. 3718. engl. bot. 1468.* Britannia, imp. austr.,
 β) *alpestris* Pall. *fl. ross. I, 36. t. 22. Don dichl. pl. II, 519.* Rossia, Sibiria,
 γ) *cárnea* Ait. *hort. Kew. ed. 1. II, 197. engl. bot. t. 1458.* America borealis.
 δ) *lanceolata* Torr. et Gr. *fl. of N. Amer. I, 413.*
 ε) *latifolia* Ait. *hort. Kew. ed. 1. II, 198.*
 alba Big. *fl. Bost. ed. 2. 197.*
 ζ) *paniculata* Ait. *hort. Kew. ed. 1. II, 198. Willd. sp. pl. II, 1055.*
 alba Ehrh. *Beitr. z. Naturk. VII, 137.*
 * 50. 5 *carpinifolia* Willd. *hort. Berol. 540. Wats. dendrol. brit. t. 66.* Amer. bor., ? Germ. bor.
 51. 5 *angustifolia* Otto et Dietr. *allg. Gart. Zeit. XIII, 249.*
 lancifolia Hort.
 * 52. 5 *lancifolia* Hfmsgg *Preisverz. v. Pfl. VIII. Nachtr. 44.*
 * 53. 5 *Douglasii* Hook *fl. bor. Amer. I, 172. van Hutte fl. d. serr. II, 1. t. 2.* Amer. boreali-occid.
 * 54. 5 *tomentosa* L. *cod. Nro. 3719.* America borealis.
 55. 5 *Menziesii* Hook. *fl. bor. Amer. I, 173.* America boreali-occid.
 * 56. 5 *ariaefolia* Sm. in *Rees cycl. XXXIII. bot. reg. t. 1365.* California, America
 β) *discolor* Pursh *fl. bor. amer. I, 342.* boreali-occid.
 57. 5 *coerulescens* Poir. *enc. méth. VII, 350.* Nepal, India orient.
 * 58. 5 *fissa* Lindl. *bot. reg. XXVIII, pl. misc. 1.* Nova Grauda.
 argentea Benth. *pl. Hartw. Nro. 575.*

G. *Species incertae sedis, nobis penitus incognitae.*

- * 59. 5 *nutans* Royle (teste Steud., sed ubi? nec in illustr.
 of the himal. mount.) Himalaya.
 argentea Loud.
 60. 5 *rhamnifolia* Wall. India orientalis.
 61. 5 *Tobolskia* Lodd. Sibiria.
 62. 5 *dahurica* (daurica) Hort. angl. Sibiria austr.
 63. 5 *oblongifolia* Wender. *Bmrk. ueb. versch. Pfl. d. bot. Gart. zu Marb.* Patria ignota.
 64. 5 *cuneifolia* Wender. *Bemerk. ueb. versch. Pfl. d. bot. Gart. zu Marb.* Patria ignota.
 Not. Praeterea in horto nostro dendrologico species aut varietates. nobis non
 satis cognitae, coluntur sequentes: 1) *chinensis*, 2) *coccinea*, 3) *longifolia*, 4) *nana*,
 5) *ovata*, 6) *rotundifolia*, 7) *ruberrima*.

XXI. Kerria.

(W. Kerr ineunte hoc saeculo Chinam permigr. et multas plantas introduxit.)

- * 1. 5 japonica DC. in transcript. of the Linn. soc. XII, 156. bot. reg. t. 1873. Japonia, China.
 Rubus japonicus L. mant. 245. cod. Nro. 3764.
 Corchorus japonicus Thunb. fl. jap. 227. bot. rep. t. 527. bot. mag. 1296.
 Spiraea japonica Camb. in ann. d. sc. nat. I, 389.
 β) flore pleno.

XXII. Stephanandra.

(στειφανος, corona, Krone et ἀνθη, hoc loco: stamen, Staubgefaess.)

1. 5 flexuosa S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. III, 739. t. 4. f. 2. Japonia.

XXIII. Rhodótypus.

(ῥοδον, rosa, Rose et τυπος, Gestalt.)

1. 5 kerrioides S. et Z. fl. jap. I, 195. t. 90. Japonia.

XXIV. Nuttallia Torr. et Gr.

(Thomas Nuttall, academiae hist. nat. Philadelphiae socius et autor plurium operum, floram boreali-americanam illustrantium.)

1. 5 cerasiformis T. et Gr. fl. of N. Am. I, 412. H. et Arn. bot. Oregon, California bor.
 of. Beech. voy. t. 82.

Trib. 2. Dryadeae (Nuculae monospermae).**XXV. Dryas L.**

(δρυς, quercus, Eiche, ob foliorum formam.)

- * 1. ♀ octopétala L. cod. Nro. 3810. engl. bot. 451. Alpes, Europa boreal.,
 chamaedryfolia Hort. Sibiria, Groenland,
 Geum chamaedryfolium Crantz stirp. austr. II, 7. America britannica.
 2. ♀ integrifolia Vahl in act. soc. Hafn. IV, 2. p. 151. fl. dan. t. 1216. America britannica,
 octopétala Var. Cham. et Schlecht. in Linn. II, 3. Groenland.
 tenella Pursh fl. bor. amer. I, 350.
 * 3. ♀ Drummondii Hook. bot. mag. t. 2972. America britannica.
 chamaedryfolia Richards. in Frankl. journ. app. 740.
 octopétala Pursh fl. Amer. sept. I, 350.

XXVI. Sieversia W.

(Joa. Sievers a. 1790—95 montes Sibiriae, Mongoliae finitimos, transmigravit.)

1. ♀ dryadoides S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 125. Japonia.

XXVII. Cowania Don.

(James Cowan, mercator, pluries Mexico et Peruviam permigravit et multas plantas introduxit.)

1. ♀ plicata Don in transcript. of the hort. soc. XIV, 574. t. 22. f. 1. Mexico, California.
 mexicana Spr. syst. veg. IV, 2. 197.
 Geum dryadoides DC. prodr. II, 554.

XXVIII. Cercoarpus H. B. K.

(κερκος, cauda, Schwanz et καρπος, fructus, Frucht.)

1. ♀ parvifolius Hk. ic. pl. t. 323. H. et Arn. bot. of Beech. voy. 337. California,
 fothergilloides Torr. in ann. of the Lyc. New-Y. II, 198.
 2. 5 betuloides Nutt. in Torr. et Gr. fl. of N. Amer. I, 427. California.
 betulaeifolius Nutt. in Hook icon. pl. t. 322.
 3. ♀ ledifolius Nutt. in Torr. et Gr. fl. of N. Amer. I, 427. California.
 Hook. icon. pl. t. 324.

XXIX. Chamaebatia Benth.

(χαματ, humi, auf der Erde et βατος, sentis, hoc loco: rubus, Brombeerstrauch.)

1. ♀ foliosa Benth. pl. Hartw. Nro. 1712. California.

XXX. Purshia DC.

(Fred. Porsch (Pursh.) Saxo, fl. Americae meritissimus, † in Canada 1825.)

1. 5 tridentata DC. in transcript. of the Linn. soc. XII, 157. Oregon,
 Kunzia tridentata Spr. syst. veget. II, 475. America boreal.-occid.
 Tigarea tridentata Pursh. fl. bor. amer. I, 33. t. 15.

XXXI. Poterium L.

(ποτηριον, apud Graecos teste Spr. Astragalus Poterium L.; derivatio dubia.)

1. 5 *ancistroides* Dsf. fl. atl. II, 346 t. 251. Hispania, Africa bor.,
 α) Fontanesianum Spach. in ann. d. sc. nat. 3. sér. V, 42. Syria ?
 β) medium Spach in ann. d. sc. nat. 3 sér. V, 42.
 γ) Tournefortianum Spach. in ann. d. sc. nat. 3. sér. V, 42.
 2. 5 *compactum* Boiss. diagn. pl. or. nov. X, 7. Libanon.

XXXII. Sarcopoterium Spach.

(σαρξ, caro, Fleisch et ποτηριον, Poterium hoc loco: Biebernelle.)

- * 1. 5 *spinusum* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. V, 43. S. et Sm. Sicilia, Bospori littora,
 fl. gr. t. 943. Oriens.
Poterium spinosum L. cod. Nro. 7209.
Pimpinella spinosa Grtn. de fruct et sem. I, 162.
Sanguisorba spinosa Bert. fl. it. II, 191.
 β) *crispum* DC. prodr. II, 584.
 γ) *inermis* DC. prodr. II, 594.

XXXIII. Adenostoma H. et Arn.

(ἀδρυ, glandula, Druese et στομα, os, Mund.)

1. 5 *fasciculatum* Hook. et Arn. in bot. of Beech. voy. 139. t. 30. California.

XXXIV. Chamaerhodes

(χαμα, humi, auf der Erde et ροδον, Rosa, Rose.)

1. ♀ *grandiflora* Led. fl. alt. I, 431 in adn. icon. pl. fl. ross. t. 271. Sibiria orientalis.
Sibbaldia grandiflora Pall. in R. et S. syst. veget. VI, 770.
 2. ♀ *altaica* Bge in Led. fl. alt. I, 429. Sibiria.
Sibbaldia altaica Laxm. in nov. comm. acad. Petrop. XVIII, 527. t. 6. f. 2.
 3. ♀ *sabulosa* Bge in Led. fl. alt. 431. ic. pl. fl. ross. III, t. 257. Sibiria (Altai).
Sibbaldia sabulosa Steud. nom. bot. ed. 2. II, 575.

XXIV. Potentilla

(ita dicta, teste Lobelii, medio aevo a potentia vel viribus, quibus eximiis pollet ad frangendum calculum, interiora vulnera et ulcera.)

A. Folia pinnata.

1. 5 *Salessowii* Steph. in mém. de la soc. d. nat. de Mosc. II, 6. t. 3. Sibiria (Altai),
discolor Jacquem. voy. dans l'Inde IV, 53. t. 65. Himalaya.
Cómarum Salessowii Bunge ind. sem. hort. Dorp. 1839.
 2. ♀ *xyloirrhiza* Boiss. et Heldr. in Boiss. diagn. pl. nov. or. X, 5. Persia (Gilan).
 * 3. 5 *dahurica* (daurica) Nestl. mon. Potent. 31. t. 1. Sibiria, Mongolia.
fruticosa β. *daurica* Lehm. monogr. Potent. 32.
glabra Lodd. bot. cab. X, 914.
glabrata W. in Mag. d. Ges. naturf. Fr. zu Berl. VII, 285.
 * 4. 5 *fruticosa* L. cod. Nro. 3773. Pyrenaeus, Anglia,
prostrata Lapeyr. hist. abr. d. pl. d. Pyren. suppl. 67. ? Belgia, Austria,
 β) *grandiflora* Lehm. pug. IX, 31. ? Pedemontanum,
 γ) *ochreate* Lindl. in Wall. numer. list. Nro. 1027. Paxt. Rossia, Oriens,
 fl. gard. 1850. 143. t. 96. Himalaya, China bor.,
 * δ) *tenuifolia* W. in Mag. d. Ges. naturf. Fr. zu Berl. VII, 285. Mongolia, Sibiria,
floribunda Pursh fl. Amer. sept. I, 355. America britannica et
fruticosa Lour. fl. coch. I, 355. foederata.
Loureironis Tratt. mon. Ros. IV, 4.
 5. 5 *rigida* Wall. numer. list. Nro. 1009. Lehm. pug. III, p. 3.
 6. 5 *Inglesii* Royle illustr. of the himal. mount. I, 207. II, t. 41. f. 3.

B. Folia omnia ternata.

7. 5 *arbuscula* Don prodr. fl. nep. 256. in add. Wall. pl. asiat. Nepal.
 rar. III, 16. t. 228.
nepalensis Don prodr. fl. nep. 229,
 8. ♀ *parvifolia* Fisch. in Lehm. pug. III, 6. Songaria.
 9. ♀ *biflora* Willd. in Mag. naturf. Fr. zu Berl. VII, 297. Lehm. Sibiria, Amer. britann.
 monogr. Potent. 192. t. 20. borealis, ? Armenia.
 10. ♀ *ambigua* Jacquem. voy. dans l'Inde IV, 51. t. 62. India orient., Kashmir.
 11. ♀ *ericarpa* Wall. numer. list. 28. Nro. 1012. Lehm. pug. III, 35. India orient., Himalaya.

Trib. 3. Dalibardeae (drupae monospermae, connatae).

XXXVI. Rubus L.

(Rubus jam apud Latinos: Brombeerstrauch; an a v. rubere, roth sein, derivandus?)

A. Foliis simplicibus.

1. 5 *róridus* Lindl. in bot. reg. t. 1607. Madagascar.
2. 5 *rugósus* Smith in Rees cycl. XXX. Wall. pl. as. rar. III, t. 234. India or. c. ins. Nepal,
alceaefolius Poir. enc. méth. VI, 247. China.
- β) *reflexus* Lindl. in bot. reg. t. 461.
 Hamiltonianus Ser. in DC. prodr. II, 566.
 ? *moluccanus* Lour. fl. coch. 396. Roxb. fl. ind. II, 518.
3. 5 *acerifolius* Wall. num. list. India orientalis.
 moluccanus Wall. (teste Heynh.)
4. 5 *moluccanus* L. cod. Nro. 3763. Rumph. herb. amb. V, t. 44. f. 2. Cochinchina,
 β) *ochrascens* Blume bijdr. 1109. Amboina, Japonia.
5. 5 *elongatus* Smith. pl. icon. hort. ined. III, t. 62. Java.
6. 5 *glomeratus* Blume bijdr. 1111. Java.
7. 5 *sundáicus* Blume bijdr. 1111. Java.
 β) *discolor* Blume bijdr. 1111.
8. 5 *pyrifolius* Sm. pl. icon. haet. ined. III, t. 61. Java.
9. 5 *hexágynus* Rxb. fl. ind. II, 516. India orientalis.
 indicus Lesch. in DC. prodr. II, 568.
10. 5 *Lobbianus* Hk. icon. pl. t. 741. 742. Java.
11. 5 *betúlinus* Don prodr. fl. nep. 233. Nepal.
12. 5 *tiliáceus* Sm. in Rees Cycl. XXX. Nepal.
 ? *cordifolius* Don prodr. fl. nep. 233.
13. 5 *paniculatus* Sm. in Rees cyclop. XXX. Nepal.
14. 5 *acuminatus* Sm. in Rees cyclop. XXX. Nepal.
15. 5 *pungens* Camb. in Jacquem. voy. dans l'Inde IV, 48. t. 59. India or., Kashmir.
16. 5 *macilentus* Camb. in Jacq. voy. dans l'Inde IV, 49. t. 60. India or., Kashmir.
17. 5 *Lambertianus* Ser. in DC. prodr. II, 567. China.
18. 5 *glabriósculus* Hassk. cat. alt. pl. hort. Bogor. 267. Japonia.
19. 5 *corchorifólius* L. fl. suppl. 263. Japonia.
 villosus Thunb. fl. jap. 218.
20. 5 *microphyllus* L. fl. suppl. 263. Japonia.
21. 5 *Sieboldii* Blume bijdr. 1110. Japonia.
22. 5 *pubinervis* Blume bijdr. 1110. Japonia.
23. 5 *incisus* Thunb. fl. jap. 217. Japonia.
 ? *ribifolius* S. et Z. Abh. d. baier. Acad. phys. Kl. IV, 2. 127.
24. 5 *crataegifolius* Bge in mém. d. sav. étrang. de St. Pé. II, 96. Mongolia, China bor.
25. 5 *humulifolius* C. A. Mey. Beitr. z. Pflanzenk. Russl. V, 57. t. 1. Rossia (Wjatka).
- * 26. 5 *odoratus* L. cod. Nro. 3762. bot. mag. t. 323. America borealis.
- * 27. 5 *Nutkanus* Moç. in DC. prodr. II, 566. bot. reg. t. 1368. California, Amer. brit.
 bot. mag. t. 3453.
 odoratus Hort. nonn.
 β) *Nuttallii* Torr. et Gr. fl. of N. Amer. I, 450.
 parvifórus Nutt. gen. of N. Amer. pl. I, 309.
28. 5 *deliciósus* Torr. in ann. lyc. New-Y. II, 196. America boreali-occid.
29. 5 *velútinus* H. et Arn. in bot. of Beech. voy. 140. California.
30. 5 *vitifolius* Cham. et Schlicht in Linn. II, 10. California.
31. 5 *nivalis* Dougl. in Hook. fl. bor. Amer. I, 183. America boreali-occid.
32. 5 *trilobus* (nec *trifidus* Steud.) Moç. in DC. prodr. II, 566. Mexico.

B. Folia pinnata, interdum ternata.

- * 33. 5 *idaeus* L. cod. Nro. 3754. engl. bot. 2442. Europa, Asia minor,
 Frambaesianus (nec *Franbaesianus* Lej. et Court.) Lam. isthm. caucasicus,
 fl. franç. III, 135. Sibiria.
- β) *albus* Ait. hort. Kew. ed. III, 267.
- γ) *anómalus* Arrh. mon. Rub. suc. 14.
- δ) *inermis* fl. bat.
- ε) *laevigatus* Ait. hort. Kew. ed. 2. III, 268. ? *Hffm*sgg.
 2 u. 3. Nachtr. zu d. Verz. d. Pfl. Luit. 201.
 glaber Mill. dict.

- γ) *maritimus* Arrh. mon. Rub. succ. 13.
 η) *microphyllus* Waltr. sched. crit. 226.
34. 5 *Leesii* Bab. man. of brit. bot. 3. ed. 92. Britannia.
 35. 5 *uniflorus* C. Koch. Japonia.
 Thunbergii S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 126.
 idaeus Thb. fl. jap. 216.
- * 36. 5 *strigosus* Mich. fl. bor. amer. 1, 297. America britannica et
 pensylvanicus Poir. enc. méth. VI, 246. foederata borealis.
 idaeus Nutt. gen. of n. amer. pl. I, 308.
 idaeus β. *canadensis* Richards. append. Frankl. journ. ed. 1. p. 19.
- * 37. 5 *occidentalis* L. cod. Nro. 3755. America britannica et
 idaeus β. *americanus* Torr. in ann. lyc. New-Y. II, 196. foederata borealis.
 38. 5 *mexicanus* C. Koch. Mexico.
 occidentalis Schlicht. in Linn. XIII, 271. et ? fl. Flumin. V, t. 82.
 β) *incisus* Schlecht. in Linn. XIII, 271,
39. 5 *chinensis* Ser. in DC. prodr. II, 557. China.
 40. 5 *concolor* Royle ill. of the him. mount. 203. Himalaya.
 41. 5 *micranthus* Don prodr. fl. nep. 235. Nepal.
 pauciflorus Wall. in bot. reg. t. 854.
 42. 5 *distans* Don prodr. fl. nep. 256 (in addendis). Nepal.
 pinnatus Don prodr. fl. nep. 234.
 43. 5 *biflorus* Buch. in Rees. cycl. XXX. Nepal.
 pedunculatus (nec *pedunculatus* Steud.) Don prodr. fl. nep. 234.
 44. 5 *asper* Don prodr. fl. nep. 234. Nepal.
 45. 5 *Roxburghianus* Wall. num. list. Ins. mofucoanae.
 paniculatus Rxb. fl. ind. II, 518.
- * 46. 5 *lasiocarpus* Sm. in Rees cycl. XXX. Wight icon. pl. I. t. 232. Ceylon, India orient.,
 racemosus Roxb. fl. ind. II, 519. Himalaya.
 mysorensis Heyne in Roth nov. sp. pl. 235.
 parvifolius Moon cat. zeyl. pl. 40.
 β) *albescens* Rxb. fl. ind. II, 519.
47. 5 *Finlaysonianus* Wall. numer. list. India orientalis.
 48. 5 *gacilis* Rxb. in DC. prodr. II, 519. Nepal.
 49. 5 *rosaeflorus* Rxb. fl. ind. II, 519. India orientalis.
 50. 5 *acuminatissimus* Hassk. cat. alt. pl. hort. Bogor, 266. China, Cochinch., Java.
 51. 5 *parvifolius* L. cod. Nro. 3757. bot. reg. t. 496. India, Japonia, China.
 triphyllus Thunb. fl. jap. 215.
52. 5 *pruinósus* Zoll. in Flora XXX, 665. Java.
 53. 5 *fraxinifolius* Poir. enc. méth. VI, 242. Java.
 54. 5 *javanicus* Blume bijdr. 1108. Java.
 55. 5 *leucocarpus* Arn. nov. act. XVIII, 334. Ceylon.
 56. 5 *celébius* Blume bijdr. 1107. Ins. Celebes.
 57. 5 *Tagallus* Cham. et Schl. in Linn. II, 9. Rumph. herb.
 amboin. V. t. 47. f. 1.
58. 5 *Eglanteria* Tratt. Ros. monogr. III, 9. Ins. philippinae.
 59. 5 *macrópodus* Ser. in DC. prodr. II, 557. Nova Hollandia.
 60. 5 *australis* Forst. prodr. fl. ins. austr. 40. Nova Hollandia.
 * 61. 5 *rosaefolius* Sm. ic. pl. haet. incogn. III, 60. t. 60. Nova Seelandia.
 β) *coronarius* Sims. bot. mag. t. 1783. Ins. mascarenicae.
 Commersonii Poir. enc. méth. VI, 240.
- * γ) *flore pleno.*
62. 5 *apétalus* Poir. enc. méth. VI, 242. Ins. mascarenicae.
 borbonicus Pers. syn. pl. II, 51.
 tomentosus Bory de St. Vinc. voy. d. les 4. il. d. mers d'Afr. II, 378.
63. 5 *rigidus* Sm. in Rees cycl. XXX. Africa australis.
 64. 5 *pinnatus* Willd. sp. pl. II, 1081. Africa austr.,
 ins. St. Helenae, Madeira.
65. 5 *Ludwigii* Eckl. et Zeyh. enum. pl. Afr. extratr. 1710. Africa australis.
 66. 5 *Pappi* Eckl. et Zeyh. enum. pl. Afr. extratr. 1706. Africa australis.
 67. 5 *Quartitanus* A. Rich. tent. fl. Abyss. I, 257. Abyssinia.

C. Foliis 3-, 5-, 7-natis.

a. *Species extraeuropaeae.*

68. 5 *Hochstetterorum* Seub. fl. azor. 48. Ins. azoricae.
 69. 5 *grandifolius* Lowe prim. fl. et faun. Mader. Ins. Madeira.

70. 5 compar R. Br. in Salt voy. to Abyss. App. IV, 64.
 71. 5 exsuccus Steud. in A. Rich. tent. fl. Abyss. I, 256.
 72. 5 Petitionus A. Rich. tent. fl. Abyss. I, 256.
 73. 5 Bergii Cham. et Schlecht. Linn. II, 16.
 74. 5 chrysocharpus Mundt in Linn. II, 17.
 75. 5 Mundtii Cham. et Schlecht. in Linn. II, 18.
 76. 5 sanguinolentus Lk. enum. pl. hort. Ber. II, 61.
 77. 5 Gunnianus Hook. icon. pl. t. 291.
 78. 5 schmidelioides A. Cunn. in ann. of nat. hist. II, 245.
 79. 5 cissoïdes A. Cunn. in ann. of nat. hist. II, 245.
 80. 5 oleifluus Steud. nomencl. bot. ed. 2. 479.
 81. 5 bonariensis Steud. nom. bot. ed. 2. 477.
 82. 5 loxensis Benth. pl. Hartw. 128.
 83. 5 compactus Benth. pl. Hartw. 129.
 84. 5 macrocarpus Benth. pl. Hartw. 129.
 85. 5 stipularis Benth. pl. Hartw. 173.
 86. 5 glaucus Benth. pl. Hartw. 173.
 87. 5 Sellowii Cham. et Schlecht. in Linn. II, 15.
 Selloi Steud. nom. bot. ed. 2. 479.
 88. 5 imperialis Cham. et Schlecht. in Linn. II, 13.
 89. 5 Organensis Gardn. in Hook. Lond. Journ. of bot. II, 342.
 90. 5 jamaicensis L. cod. Nro. 3758.
 91. 5 Hookeri C. Koch.
 rosaeiflorus Hook. icon. pl. t. 46.
 92. 5 ferrugineus Wikstr. in Linn. V. Lit. Ber. 90.
 93. 5 radicans Cav. ic. et deser. pl. V, 7. p. 413.
 94. 5 sagifolius Cham. et Schlecht. in Linn. V, 571.
 95. 5 dumetorum Schlecht. in Linn. XIII, 267.
 Schiedeanus Steud. nomencl. bot. ed. 2. 479.
 96. 5 adenotrichus Schlecht. in Linn. XIII, 267.
 97. 5 trichomallus Schlecht. XIII, 268.
 98. 5 sapidus Schlecht. in Linn. XIII, 269.
 99. 5 humifusus Schlecht. in Linn. XIII, 270.
 humistratus Steud. nom. bot. ed. 2. 478.
 100. 5 Bogotensis H. B. et K. nov. gen. et sp. amer. VI, 220.
 101. 5 floribundus H. B. et K. nov. gen. et sp. amer. VI, 219. t. 559.
 idaeus Arrab. fl. Flumin. V, t. 81.
 102. 5 nubigenus H. B. et K. nov. gen. et sp. amer. VI, 220.
 103. 5 roseus Poir. enc. méth. VI, 245.
 104. 5 coriaceus Poir. enc. méth. VI, 237.
 105. 5 urticaefolius Poir. enc. méth. VI, 246.
 106. 5 glabratus H. B. et K. nov. gen. et sp. amer. VI, 221. t. 558.
 107. 5 leucodermis (nec leucostachys Steud.) Dougl. in Torr. et
 Gr. fl. of N. Amer. I, 454.
 occidentalis β . Hook. fl. bor. Amer. I, 178.
 Douglasii Steud. nom. bot. ed. 2. 477.
 108. 5 spectabilis Pursh fl. Amer. sept. I, 348. t. 16.
 109. 5 villosus Ait. hort. Kew. ed. 1. II, 210.
 fruticosus Walt. fl. carol. 149.
 β) frondosus Torr; villosus Bigel. med. bot. 160. t. 38.
 ? suberectus Hook. fl. bor. amer. I, 178.
 inermis W. hort. Berol. I, 548. (teste T. et Gr.)
 fruticosus δ . inermis Ait. hort. Kew. ed. 2. III, 289.
 γ) humifusus Torr. et Gr. fl. of N. Amer. I, 455.
 ? Ensenii Tratt. Ros. monogr. II, 63.
 floridus Tratt. Ros. monogr. II, 73.
 110. 5 canadensis L. cod. Nro. 3761.
 procumbens Muehl. cat. pl. Amer. sept. 50.
 trivialis Pursh fl. amer. sept. ed. 2. I, 347.
 flagellaris W. hort. Ber. I, 549.
 argutus Lk. enum. pl. hort. Berol. II, 60.
 inermis W. hort. Ber. suppl. I, 548. (teste Lk.)
 111. 5 hispidus L. cod. Nro. 3756.
 obovalis Mich. fl. bor. amer. I, 226.
 obovatus Tratt. Rosac. monogr. III, 94.
 trivialis Torr. fl. of the n. and m. sect. of the Un. stat. I, 39.

Abyssinia.
 Abyssinia.
 Abyssinia.
 Africa australis.
 Africa australis.
 Africa australis.
 Ins. mascarenicae.
 Terra Vandiemœ.
 Nova-Seelandia.
 Nova-Seelandia.
 Resp. argentina.
 Resp. argentina.
 Columbia.
 Columbia.
 Columbia (Ecuador).
 Columbia.
 Columbia.
 Brasilia australis,
 Resp. cispatina.
 Brasilia.
 Brasilia.
 Jamaica.
 America tropica.
 Antillæ minores.
 Chili.
 Mexico.
 Mexico.
 Mexico.
 Mexico.
 Mexico.
 Mexico.
 Nova Granada.
 Columbia (Ecuador).
 Columbia (Ecuador).
 Peruvia.
 Peruvia.
 Peruvia.
 Columbia.
 America boreali-occid.
 America boreali-occid.
 America borealis.
 America britannica et
 foederata borealis.
 America britannica et
 foederata borealis
 mediaque.

- sempervirens* Bigel. fl. Bost. ed. 2. 201.
 β) *setosus* Bigel. fl. Bost. ed. 2. p. 198.
112. 5 *cuneifolius* Pursh fl. Amer. sept. I, 347. America foederata.
parvifolius Walt. fl. carol. 149.
113. 5 *trivialis* Mich. flor. bor. amer. I, 296. America foederata.
flagellaris Hook. et Arn. in Hook. comp. to bot. mag. I, 25.
hispidus W. sp. pl. II, 1083.
114. 5 *heterophyllus* (nec *tetraphyllus* Lk) W. hort. Ber. suppl. 38. ? America borealis.
 Berl. Baumz. 413. California.
115. 5 *ursinus* Cham. et Schlecht. in Linn. II, 11.
Menziesii Hook. fl. bor. amer. I, 141.
116. 5 *macropetalus* (nec *longipetalus* Steud.) Dougl. in Hk. fl. Calif. Amer. bor.-occid.
 bor. am. I, 178. t. 59. Cochinchina.
117. 5 *cochinchinensis* Tratt. Rosac. monogr. III, 97.
fruticosus Lour. fl. coch. I, 398.
118. 5 *pulcherrimus* Hk. icon. pl. t. 729. 730. Java.
 119. 5 *alpestris* Blume bijdr. 1108. Java.
 120. 5 *lineatus* Reinw. in Blume bijdr. 1108. Java.
 121. 5 *Gowreepful* Roxb. fl. ind. II, 517. India orient., Ceylon,
rotundifolius Wall. numer. list. 730. (teste Walk. Arn.) Himalaya.
paniculatus Moon cat. zeyl. pl. 40.
122. 5 *niveus* Wall. numer. list. India orientalis.
 123. 5 *uncatus* Wall. numer. list. India orientalis.
 124. 5 *furfuraceus* Wall. numer. list. India orientalis.
 125. 5 *oxyphyllus* Wall. numer. list. India orientalis.
126. 5 *Wallichianus* W. et Arn. prodr. fl. pen. Ind. or. I, 298. India orientalis.
 Wight icon. pl. I, t. 231.
hirtus Roxb. fl. ind. II, 518.
- * 127. 5 *Hoffmeisterianus* Kth et Bouch. ind. sem. hort. Ber. 1847, 14. Lahor, Kashmir.
 128. 5 *hypargyrus* Edgew. in transact. of the Linn. soc. XX, 45. Himalaya.
 129. 5 *nutans* Edgew. in transact. of the Linn. soc. XX, 45. Himalaya.
 130. 5 *foliolosus* Don prodr. fl. nep. 256 (in addendis). Nepal.
microphyllus Don prodr. fl. nep. 234.
Donianus Spreng. ind. plant. qu. in hort. bot. Hal. vig.
- * 131. 5 *ellipticus* Smith in Rees cycl. XXX. Nepal, Himalaya.
rotundifolius Wall. numer. list. 730.
flavus Ham. in Don prodr. fl. nep. 256.
132. 5 *Thunbergii* Blume bijdr. 1109. Japonia.
 133. 5 *purpureus* Bge in mém. d. sav. étr. de St. Pétersb. II, 98. China borealis.
 134. 5 *leucanthus* Hance pl. nov. Chin. diagn. 11. Walp. ann. China (Hongkong).
 bot. II, 468.
- b) Species praesertim europaeae.*
135. 5 *suberectus* Anders. in transact. of the Linn. soc. XI, 218. t. 16. Europa.
corylifolio-idaeus Mey. chlor. hannov. 47.
corylifolius α. *sylvaticus* Fries novit. fl. suec. 53.
fruticosus α. *viridis* Maly enum. pl. imp. austr. 338.
nessensis W. Hall. in transact. of the roy. soc. of Edinb. III, 20.
nitidus Bl. et Fing. comp. fl. Germ. I, 667. W. et N. Rub. germ. t. 4.
viridis Presl in Flora XVIII, 488.
 β) *albiflorus* Bl. et Fing. comp. fl. Germ. I, 667.
corylifolius DC. hort. Monsp. 139.
 γ) *Decloëtii* Ortm. in Flora XVIII, 489.
 δ) *fastigiatus* W. et N. Rub. germ. t. 2.
 ε) *heterocaulon* Ortm. in Opiz nom. bot. 14.
 ζ) *rosiflorus* Bl. et Fing. comp. fl. Germ. I, 667.
corylifolius Hayne Arnz. Gew. III, t. 11.
136. 5 *subinermis* Rupr. Beitr. z. Pfl. K. Russl. IV, 66. Rossia.
 ? *suberectus* β. *mitis* Arrh. monogr. Rub. suec. 23.
137. 5 *fissus* Lindl. in Bab. man. of brit. fl. 3. ed. 93. Anglia.
 138. 5 *erectus* Koehl. in Wimm. et Gr. fl. sil. II, 52. Germania (Silesia).
 * 139. 5 *laciniatus* W. hort. Berol. t. 82. Patria ignota.
 140. 5 *digitatus* Spr. pl. min. cogn. pug. I, 34. Patria ignota.
 141. 5 *Linkianus* Ser. in DC. prodr. II, 560. Guss. fl. sic. prodr. suppl. 157. Sicilia.
paniculatus Schlicht. in Lk. enum. pl. hort. Berol. II, 61.
 β) *flore pleno.*

- * 142. 5 fruticosus L. cod. Nro. 3760. Arrh. mon. Rub. suec. 23. Europa bor. et media,
 carpiniifolius Presl del. Prag. I, 220. ? Oriens, ? Himalaya.
 corylifolius Presl fl. cech. 104.
 maritimus L. it. Scand. 272.
 plicatus W. et N. Rub. germ. t. 1.
 Preslii Weitenw. in Opiz Natur. Tausch. 346.
 β) avellanaefolius Koehl. in Wimm. et Gr. fl. Siles. II, 52.
 γ) carinatus Bab. man. of brit. fl. 3. ed. 93.
 δ) hirsutus Lej. rev. de la fl. d. env. de Spa. 238.
- Not. Sub nomine Rubi polymorphi in Spenneri flora Friburgensi omnes Rubi
 species germanicae (Rubo idaeo excepto) in una specie conjunctae.
143. 5 nitidus W. et N. Rub. germ. t. 4. Lej. et Court. comp.
 fl. belg. II, 167. Belgia, Germania.
 β) flore albo Lej. et Court. comp. fl. belg. II, 167. Belgia.
 144. 5 axillaris Weihe in Lej. et Court. comp. fl. belg. II, 166. Helvetia.
 145. 5 glabratus Cust. in Hegetschw. Fl. d. Schw. 487. Germania (Silesia).
 146. 5 sulcatus Koehl. in Wimm. et Gr. fl. sil. II, 52. Italia inferior.
 147. 5 dissectus Ten. adn. ad ind. sem. hort. Neap. 1830. 13. Hispania.
 148. 5 ulmifolius Schott in Isis 1818. 821. Austria.
 149. 5 longifolius Host. fl. austr. II, 30. Austria.
 150. 5 polymorphus Host. fl. austr. II, 29.
 151. 5 sanctus Schreb. ic. et descr. pl. dec. 15. t. 8. Dsf. choix
 d. pl. de Tourn. t. 61. Oriens, Turcia, Graecia.
 fruticosus γ. Bieb. fl. taur. cauc. I, 401.
 obtusifolius W. hort. Berol. 38. (teste Lk.)
 152. 5 lanuginosus Stev. in DC. prodr. II, 564. Caucasus orientalis.
 153. 5 Crippsii Clarke trav. in var. countr. I, 166. c. ic. Krim, Turcia, Dalmatia,
 amoenus Portenschl. in Pett. bot. Wegw. Nro. 785. Sicilia, ins. canarienses,
 dalmaticus Tratt. Ros. monogr. III, 33. ? Brasilia.
 fruticosus Guss. prodr. fl. sic. I, 795.
 - β. amoenus Vis. fl. dalm. III, 248.
 tomentosus β. amoenus Gris. spic. fl. Rum. et Bith. I, 103.
 β) flore pleno; fruticosus flore rubro pleno Hort.
 γ) leucocarpus Guss. fl. sic. syn. I, 566.
154. 5 Francipáni Tin. in Guss. fl. sic. prodr. suppl. 157.
 155. 5 rhamnifolius W. et N. Rub. germ. t. 6. Sm. engl. bot. t. 2604. Europa media.
 fruticosus Rth. tent. fl. Germ. II, 564.
 Thuilliéri Poir. enc. méth. suppl. IV, 694.
 ulmifolius Presl del. Prag. 223.
 tomentosus Thuill. fl. d. env. de Par. 253.
 eordifolius Bab. syn. of the brit. Rub. 13.
- * 156. 5 tomentosus Borkh. in Roem. mag. 151. W. et N. Rub. g. t. 8. Europa.
 canescens DC. hort. Monsp. 139.
 argenteus Gmel. bad. alsat. II, 434.
 fruticosus β. tomentosus Maly enum. pl. imp. austr. 338.
 mollis Presl del. Prag. I, 218.
 rubricaulis Weihe in Spr. syst. veget. II, 528.
 Weitenwebéri Ortm. in Flor. XVIII, 491.
 β) cordifolius W. et N. Rub. germ. t. 5.
 γ) flore albo pleno.
 δ) flore rubro pleno.
 ε) foliis elegantissimis.
 ζ) fructibus nigris.
 η) grandiflorus Bl. et Fingerh. compend. fl. Germ. I, 670.
 fruticosus Hayne Arzn. Gew. III, t. 12.
 θ) hypoleucus Guss. fl. sic. prodr. I, 579.
 ι) inermis Ait. hort. Kew. 2. edit. III, 269.
 κ) leucocarpus Hort.
 λ) micans Weihe in Lej. et Court. comp. fl. belg. II, 168.
 μ) pubescens Vest in Tratt. Ros. monogr. III, 34.
 silesiacus Koehl. in Wimm. et Gr. fl. sil. II, 53.
157. 5 Godroni Lec. et Lam. cat. pl. d'Auv. 151. Gallia.
 Wahlbergii Godr. monogr. d. Rub. 16.
 fruticosus β. intermedius Hol. fl. de la Mos. suppl. 58.
158. 5 thyrsoideus Wimm. Fl. v. Schles. 204. Arrh. monogr.
 Rub. suec. 28. Europa media et bor.

- cándicans* Weihe in *Rchb. fl. exc.* 601.
fruticosus W. et N. Rub. germ. t. 7.
 β) *apricus* Wimm. Fl. v. Schles. 204.
 Grabowskii Wimm. et Grab. fl. siles. II, 34.
 γ) *cordifolius* Wimm. Fl. v. Schles. 204.
 fruticosus β. *silesiacus* Wimm. et Grab. fl. sil. II, 32.
159. 5 *Panormitanus* Tin. pl. rar. Sic. pug. 24. Sicilia.
 160. 5 *appendiculatus* Traut. Ros. monogr. III, 31. Hungaria.
 161. 5 *albicans* Kit. in Schult. oesterr. Fl. II, 80. Hungaria.
 162. 5 *velutinus* Vest in Tr. Ros. monogr. III, 47. Styria.
 163. 5 *sulcatus* Vest in Flora VII, 236. Styria, Silesia.
 164. 5 *cordatus* Bl. et Fingerh. comp. fl. Germ. I, 671. Bohemia.
 cordifolius Presl del. Prag. 219.
 165. 5 *Weihei* Koehl. in Wimm. et Grab. fl. sil. II, 31. Silesia.
 166. 5 *affinis* W. et N. Rub. germ. t. 3. Europa media,
 caesius Wib. prim. fl. Werth. 266. Scandinavia.
 β) *senticosus* Lees in Bab. man. of br. bot. 84. Anglia.
 167. 5 *incurvatus* Bab. man. of br. bot. 95. Scotia.
 168. 5 *latifolius* Bab. man. of br. bot. 94. Anglia.
 169. 5 *imbricatus* Bab. man. of br. bot. 94. Anglia.
 170. 5 *senticosus* Koehl. in Wimm. et Grab. fl. sil. II, 51. Silesia.
 171. 5 *nitidus* Sm. engl. fl. II, 404. Bell. Salt. in Bab. man.
 of br. bot. 93. Anglia.
 β) *confertus* Bab. man. of br. bot. 93. Anglia.
 172. 5 *Saltéri* Bab. in ann. of nat. hist. XVII, 172. Anglia.
 173. 5 § *vulgaris* W. et N. Rub. germ. t. 14. Arrh. mon. Rub. suec. 31. Europa media.
 villicaulis Wimm. et Gr. fl. sil. II, 27.
 Wimmeri Weihe in Wimm. et Gr. fl. sil. II, 53.
 β) *bracteosus* Rchb. fl. exc. 602.
 γ) *canus* Rchb. fl. exc. 602.
 δ) *carpinifolius* W. et N. Rub. germ. t. 13. engl. bot. t. 2664.
 ε) *flore roseo* Lej. et Court. comp. fl. helg. II, 170.
 ζ) *glabratus* Rchb. fl. exc. 602.
 η) *mollis* Rchb. fl. exc. 602.
 θ) *rhombifolius* Rchb. fl. exc. 602.
 ι) *umbrosus* Fries summ. veg. Scand. 166.
174. 5 § *villicaulis* Koehl. in W. et N. Rub. germ. t. 17. Europa media.
 vestitus Hegetschw. Fl. d. Schw. 486.
 175. 5 § *Trevirani* Koehl. in Wimm. et Gr. fl. sil. II, 53. Germania (Silesia).
 176. 5 § *Balfoureanus* Blox. in Bab. man. of brit. bot. 3. ed. 98. Anglia.
 177. 5 § *macrophyllus* W. et N. Rub. germ. t. 12. engl. bot. t. 2625. Germania, Belgia,
 Britannia.
 β) *amplificatus* Lees in ann. of nat. hist. XVII, 242.
 γ) *Schlechtendalii* W. et N. Rub. germ. t. 11.
 δ) *velutinus* Lej. et Court. comp. fl. belg. II, 165.
178. § § *platyphyllus* C. Koch in Linn. XVI, 348. Caucas., mont. pontici.
 179. 5 § *sylvaticus* W. et N. Rub. germ. t. 15. Europa media.
 180. 5 § *Libertianus* Weihe in Lej. rev. de la fl. d. env. de Spa 101. Belgia.
 181. 5 § *asper* Presl del. Prag. 222. ? Weihe in Lej. rev. de la
 fl. d. env. de Spa 101. Bohemia, Belgia.
182. 5 § *diversifolius* Tin. pl. sic. rar. pug. 41. Sicilia.
 183. 5 § *calvatus* Blox. in Kirby fl. of Leic. 42. Anglia.
 184. 5 § *mucronatus* Blox. in Kirby fl. of Leic. 43. Anglia.
 185. 5 § *ferox* Vest in Tratt. Ros. monogr. III, 40. Styria.
 186. 5 § *discolor* W. et N. Rub. germ. t. 20. Europa media et bor.
 abruptus Lindl. syn. of the brit. fl. 92.
 bicolor Lej. rev. de la fl. d. env. de Spa 100.
 cándicans Fries fl. scan. 114.
 fruticosus Sm. in engl. bot. t. 715.
 - γ. *discolor* Maly enum. pl. imp. austr. 338.
 rhannifolius Lej. rev. de la fl. d. env. de Spa 100.
 β) *argenteus* W. et N. Rub. germ. t. 19.
 γ) *foliis quercinis* Lej. rev. de la fl. de Spa 240.
 δ) *macrocanthos* W. et N. Rub. germ. t. 18.
187. 5 § *leucostachys* Schleich. in Sm. engl. fl. II, 402. engl.
 bot. t. 2631. Britannia, Germania,
 Leightonianus Bab. in ann. of nat. hist. XVII, 240. Gallia.

188. 5 § *collinus* DC. hort. Monsp. 139. Gallia, Belgia.
arduennensis Lib. in Lej. d. env. de Spa II, 317.
fruticosus β. *arduennensis* Lej. rev. de la fl. d. env. de Spa 100.
 β) *flora pleno* Lej. et Court. comp. fl. belg. II, 167.
 γ) *panicula basi ramosa*; *montanus* Lej. fl. d. env. de Spa II, 317.
189. 5 § *siculus* Presl fl. sic. I. p. XXIV. Italia.
 β) *tomentosus* Bert. fl. ital. V, 221.
triphyllus Bell. app. in aood. de Tur. a. 1790. 91. V, 235.
 γ) *collinus* Nacc. et Balb. fl. Ticin. I, 238. t. 9.
190. 5 § *candicans* Guss. fl. sic. syn. I, 560.
 β) *ovalifolius* Guss. fl. sic. syn. I, 569.
191. 5 § *incanescens* Bert. fl. ital. V, 223. Suecia, Gallia, Italia.
glandulosus γ. *incanescens* DC. fl. franç. V, 544.
hórridus Hartm. scand. fl. ed. 2. 139.
infestus Hartm. scand. fl. ed. 3. 120.
192. 5 § *piletóstachys* G. et Gr. fl. de France I, 548. Gallia.
vulgaris β. *glandulosus* Godr. monogr. de Rub. 34.
193. 5 § *pyramidalis* Bab. man. of brit. bot. 3. ed. 101. Anglia.
 194. 5 § *Lejeunii* W. et N. Rub. germ. t. 34. Gallia, German., Belgia.
 195. 5 § *Guentheri* W. et N. Rub. germ. t. 21. Gallia, Germania, Britannia.
hirtus β. *pubescens* Wimm. et Grab. fl. Sil. II, 41.
 - δ. *cinereus* Godr. et Gr. fl. de Fr. I, 544.
 β) *thyrsifórus* W. et N. Rub. germ. t. 34.
hirtus β. *thyrsifórus* Godr. monogr. d. Rub. 22.
 γ) *humifúsus* W. et N. Rub. germ. t. 35.
196. 5 § *vestitus* W. et N. Rub. germ. 81. t. 33. Gallia, Germania, Belgia, Britannia.
vinetórum Hol. fl. de la Mos. 1. ed. 267.
Courtoisianus Lej. et Court. comp. fl. belg. II, 170.
197. 5 § *parvifórus* Hegetschw. Fl. d. Schw. 490. Helvetia.
 198. 5 § *scaber* W. et N. v. E. Rub. germ. t. 32. Europa media.
 199. 5 § *Schleichéri* W. et N. v. E. Rub. germ. t. 23. Germania.
glandulosus Gu. et H. deutsche Holzart. t. 99.
hórridus Koehl. in Rehb. fl. exc. 604.
200. 5 § *Cupanianus* Guss. fl. sic. syn. I, 570. Sicilia.
glandulosus β. Bert. fl. it. V, 225.
hirtus Guss. fl. sic. prodr. I, 580.
201. 5 § *cóncolor* Ley in Rabenh. bot. Centr. Bl. I, 434. Germania.
 202. 5 § *floribundus* Ley in Rabenh. bot. Centr. Bl. I, 435. Germania.
 203. 5 § *hirsutus* Presl del. Prag 221. Germania (Bohemia)
 204. 5 § *glandulosus* Bell. app. in fl. pedem. 24. engl. bot. t. 2883. Scandinavia, Britannia,
aeicutatissimus Hegetschw. Fl. d. Schw. 490. Germania, Gallia,
Bellardi W. et N. Rub. germ. t. 44. Helvetia, Italia super.,
hybridus Vill. hist. d. pl. du Dauph. III, 559. Hungaria.
villosus α. *glandulosus* Ser. in DC. prodr. II, 503.
 β) *apiculatus* W. et N. Rub. germ. t. 24.
 γ) *heterophyllus* Host. fl. austr. II, 32.
 δ) *monophyllus* Wallr. sched. crit. 230.
 ε) *umbrosus* Godr. monogr. d. Rub. 21.
205. 5 § *hirtus* W. et K. pl. Hung. rar. t. 141. Europa media et austr.
glandulosus β. *hirtus* Maly enum. pl. imp. austr. 338.
 β) *foliosus* W. et K. Rub. germ. t. 28.
 γ) *Ménkei* W. et N. Rub. germ. t. 22.
206. 5 § *flexuósus* Lej. rev. de la fl. d. env. de Spa 239.
serpens Weihe in Lej. et Court. comp. fl. belg. II, 173.
207. 5 § *rosáceus* W. et N. Rub. germ. t. 36. Lej. et Court. comp. fl. belg. II, 172. Germania, Gallia, Belgia.
heteracanthus Weihe in Lej. et Court. rev. de la fl. d. env. de Spa 101.
rubescens Lej. flor. d. env. de Spa. in indice II, 340.
thyrsóideus Lej. rev. de la fl. d. env. de Spa 101.
208. 5 § *cinerascens* Weihe in Lej. et Court. comp. fl. belg. II, 171. Belgia.
Vervianus Lej. rev. de la fl. d. env. de Spa 179.
209. 5 § *viscosus* Weihe in Lej. et Court. comp. fl. belg. II, 171. Belgia.
 210. 5 § *carpinifolius* Gr. et G. fl. de Fr. I, 547. ? W. et N. Gallia, Belgia, Gallia.
 Rub. germ. t. 13.
211. 5 § *micans* Gr. et G. fl. de Fr. I, 546.

212. 5 § *Rádula* W. et N. Rub. germ. t. 39. Bab. in ann. of nat. hist. XVII, 245. Europa.
fruticosus s. *glandulosus* Wallr. sched. crit. 233.
villicaulis c. *glandulosus* Wimm. et Grab fl. sil. II, 31.
213. 5 § *Lingua* W. et N. Rub. germ. t. 33. Germania.
214. 5 § *cóncolor* Hegetschw. Fl. d. Schw. 488. Helvetia.
215. 5 § *rudis* W. et N. Rub. germ. t. 40. Bab. man. of brit. bot. 100. Britannia, Germania,
 β) *attenuatus* Bab. man. of brit. bot. 100. Belgia.
 γ) *denticulatus* Bab. man. of brit. bot. 100.
 δ) *foliis utrinque pilosis* Lej. et Court. comp. fl. belg. II, 174.
 ε) *Leightoni* Lees in Bab. man. of brit. bot. 100.
 ζ) *Reichenbachii* Koehl. in W. et N. Rub. germ. t. 37.
216. 5 § *Hystrix* Guenth. enum. pl. siles. 86. W. et N. Rub. germ. t. 41. Germania.
217. 5 § *aculeatus* Spreng. (ubi?) Patria ignota.
218. 5 § *Babingtonii* Bell. Salt. in Bab. man. of brit. bot. 99.
 Bloxami Lees in Bab. man. of brit. bot. 99.
219. 5 § *pygmaeus* Guenth. enum. pl. siles. 86. W. et N. Rub. germ. t. 46. Germania.
 petraeus Koehl. in Wimm. et Grab. fl. siles. II, 55.
220. 5 § *fusco-ater* W. et N. Rub. germ. t. 26. Bab. in ann. of nat. hist. XVII, 314. Britannia, Germania.
 β) *cándicans* Bab. in ann. of nat. hist. XVII, 314.
 γ) *Colemanni* Blox. in Kirby fl. of Leic. 38.
 δ) *echinatus* Bab. in ann. of nat. hist. XVII, 314.
221. 5 § *Koehléri* W. et N. Rub. germ. t. 25. engl. bot. 2605. Britannia, Germania.
 β) *cuspidatus* Bab. in ann. of nat. hist. XVII, 315.
222. 5 § *Weigeli* Koehl. in Wimm. et Gr. fl. siles. II, 55. Germania (Silesia).
223. 5 § *pállidus* W. et N. Rub. germ. t. 29. Bab. man. of brit. bot. 100. Britannia, Germania.
 rosáceus Lees in Bab. man. of brit. bot. 100.
 β) *infestus* W. et N. Rub. germ. t. 30.
224. 5 § *fuscus* W. et N. Rub. germ. t. 27. Bab. man. of brit. bot. 98. Hungaria, Germania,
 cinéreus Rchb. fl. exc. II, 607. Britannia.
 Mikani Koehl. in Wimm. et Grab. fl. siles. II, 56.
 Schummelii Weihe in Wimm. et Grab. fl. siles. II, 56.
225. 5 § *amoenus* Koehl. in Wimm. et Grab. fl. siles. II, 54.
226. 5 § *serpens* Gr. et G. fl. de France I, 538. Gallia, Germania.
 caésius e. *hispidus* W. et N. Rub. germ. t. 46 C.
 corylifolius s. *glandulosus* Wallr. sched. crit. 231.
 dumetorum β. *glandulosus* Godr. monogr. d. Rub. 13.
227. 5 § *nemorosus* W. Berl. Baumz. 412. Gu. et H. Abb. d. Europa.
 Holzart. I, t. 101.
 corylifolius Rchb. fl. exc. 607.
 dumetorum W. et N. Rub. germ. t. 45.
 Fiebéri Ort. in Opiz nomencl. 15.
 fruticosus β. *velútinus* Maly enum. pl. imp. austr. 338.
 ? *nutans* Vest in Flora VII, 238.
 ? *polymorphus* Host fl. austr. II, 29.
 β) *althaeaeifolius* Weihe in Spr. syst. veg. II, 529.
 ? *grácilis* Paesl del. Prag. I, 220.
 hypoleucus Vest. in Flora VII, 235.
 rugosus Hegetschw. Fl. d. Schw. 490.
 γ) *appendiculatus* Weihe in Rchb. fl. exc. 608.
 δ) *bifrons* Vest in Tratt. Ros. monogr. III, 28. (teste Rchb.)
 ε) *diffusus* Lej. rev. de la fl. d. env. de Spa 100.
 ζ) *ferox* Weihe in Boenningh. prodr. fl. Monast. 153.
 hórridus Schultz fl. Stargard. prodr. suppl. 30.
 η) *glabratus* Arrh. mon. Rub. succ. 46.
 θ) *intermedius* Ort. in Flora XVIII, 496.
 ι) *montanus* Ort. in Opiz nomencl. bot. 13.
 κ) *pilosus* Lej. rev. de la fl. d. env. de Spa 100.
 λ) *tiliaefolius* Weihe in Spr. syst. veget. II, 529.
 collinus Hegetschw. Fl. d. Schw. 490.
 holosericeus Vest in Flora VII, 240 (teste Bl. et Fingerh.)
228. 5 § *Wahlbergii* Arrh. mon. Rub. succ. 43. Scandinavia, Germania,
 corylifolius Hartm. Scand. fl. ed. 3. 120. Gallia.
 - β. *intermedius* Wahlb. fl. Gothob. 57.

- dumetorum L. vulgaris W. et N. Rub. germ. t. 45A. f. 1.
 fruticosus β . intermedius Wahlenb. fl. suec. ed. 2. I, 390.
 plicatus Hol. fl. de la Mos. ed. 1. 265.
229. 5 § corylifolius Sm. fl. brit. II, 542. engl. bot. t. 827. Europa,
 corylifolius sublittoralis Fries fl. Hall. 67. isthmus caucasicus.
 dumetorum Hegetschw. Fl. d. Schw. 491.
 máximus L. Westgoeth. Res. 135.
 β) conjungens Bab. man. of brit. bot. 103.
 γ) eriocarpa Arrh. mon. Rub. suec. 17.
 δ) flore pleno.
 ϵ) sublustris Lees in Bab. man. of brit. bot. 103.
230. 5 § pruinósus Arrh. mon. Rub. suec. 15. Suecia.
 231. 5 § brateosus Weihe in Lej. et Court. comp. fl. belg. II, 162. Belgia.
 tiliaefolius Lej. rev. de la fl. d. env. de Spa 239.
232. 5 § Sprengelii Weihe in Flora II, 2. 18. Rub. germ. t. 10. Hungaria, Germania,
 caesius β . Sprengelii Fic. fl. Dresd. I, 340.
 villosus γ . vulpinus Ser. in DC. prodr. II, 564.
 β) Borréri Bell. Salt in ann. of nat. hist. XVII, 239.
233. 5 § Acheruntinus Ten. ad flor. neap. syll. app. III, 603. Italia inferior, Sicilia.
 agrestis var. Acheruntinus Ten. fl. neap. syll. 537.
 caésius Guss. fl. sic. prodr. I, 578.
234. 5 § agrestis W. et K. pl. rar. Hung. III, 297. t. 268. Hungaria, Polonia.
 caésius β . agrestis Maly enum. pl. imp. austr. 339.
235. 5 § caésius L. cod. Nro. 5759. Gu. et. Abb. d. Holzart. t. 100.
 β) agrestis W. et N. Rub. germ. 102.
 arvensis Wallr. sched. crit. 228.
 nemórosus Presl fl. cech. 103. (teste Ortm.)
 γ) grandiflorus Schleich. in DC. prodr. II, 559.
 δ) holosericeus Vest. in Flora VII, 240. (teste Maly).
 ϵ) palustris Boenn. prodr. fl. Monast. 151.
 ζ) paniculatus Wahlb. fl. Gothob. 58.
 η) parviflorus Wallr. sched. crit. 228.
 θ) pseudo-caesius W. et N. Rub. germ. t. 46B. f. 1.
 ι) pseudo-idaeus W. et N. Rub. germ. t. 46B. f. 2.
 κ) umbrosus Wallr. sched. crit. 227.

Not. Praeterea in horto nostro dendrologico species aut varietates, nobis non satis notae, coluntur sequentes: 1) bellidiflorus; 2) nepalensis, 3) nobiliss, 4) smilacifolius van Houtte, 5) variegatus. Species Wallichianae, sed nondum descriptae, sunt: 6) lanatus, 7) pentagonus, 8) reticulatus. In Rochellii pl. Ban. rar. p. 20 est commemoratus: *Rubus canus* Kit.

Trib. 4. Roseae (Achenia in receptaculo scyphiformi inclusa).

XXXVII. Rosa.

(родовъ apud Graecos, et Rosa apud Latinos: Rose.)

- A. *Banksianae* (Fol. nitida, semperv.; Stip. subliberae, saepe deciduae; Sep. deflexa).
1. 5 *Hystrix* Lindl. Rosac. mon. 129. t. 17. China, Japonia.
 sinica β . cyanocéphalus Wallr. Ros. hist. succ. 97.
2. 5 *cucumérina* Tratt. Rosac. monogr. II, 181. China.
 sinica δ . cerato- s. polystyla Wallr. Ros. hist. succ. 97.
3. 5 *nivea* DC. hort. Monsp. 137. Red. et Th. Ros. II, 81. c. ic. China.
 caninae var. fl. albis Thunb. fl. jap. 214.
 Cherokeensis Donn hort. Cantabr. ed. 8. 137. (nec in edit. 12.)
 laevigata Mich. fl. bor. amer. I, 295.
 Macartnea (Macarthnea Pers.) Dum. Cours. bot. cult. 1. ed. III.
 sinica Ait. hort. Kew. ed. 2. III, 261. bot. mag. t. 2487. bot. reg. t. 1922.
 sinica α . nivea Wallr. Ros. hist. succ. 96.
 ternata Poir. enc. méth. VI, 258.
 trifoliata Bosc. dict. d'agric.
- β) *Fortuniana* Paxt. and Lindl. flow. gard. II. f. 171.
 γ) *setifera* Ser. in DC. prodr. II, 600.
4. 5 *Serrae* Dehnh. rivist. Napol. I, 3. 163. China.
 β) *subuniflora* Dehnh. rivist. Napol. I, 3. 163.
 γ) *hispida* Dehnh. rivist. Napol. I, 3. 163.
5. 5 *Linkii* Denh. rivista Napol. I, 3. 164. China.

6. 5 pseudo-indica Lindl. Ros. mon. 132. ic. pl. chin. e bib. Braam. t. 9. China.
 sinica b. pseudo-indica Wallr. Ros. hist. succ. 97.
7. 5 microcarpa Lindl. Ros. mon. t. 18. ic. pl. chin. e bibl. Braam t. 8. China.
 Banksiae α . microcarpa Wallr. Ros. hist. succ. 94.
 cymosa Tratt. Rosac. monogr. I, 87.
8. § triphylla Rxb. fl. ind. II, 515. China.
- * 9. 5 indica L. cod. Nro. 3745. Red. et Th. Ros. mon. I, 51. China, Cochinchina,
 chinensis Rxb. fl. ind. II, 513.
 a) acuminata Tratt. Ros. mon. I, 104. Red. et Th. Ros. I, 53. c. ic.
 Laurentiae Tratt. Ros. mon. I, 105.
 Lawranceana Lindl. Ros. mon. 110.
 semperflorans minima bot. mag. t. 1762.
 * **β) Borbonica Hort.**
 * **γ) chinensis Jacq. obs. bot. III, 7. t. 55.**
 bengalensis β . chinensis Pers. syn. pl. II, 50.
 * **δ) fragrans Red. et Th. Ros. III, 101. c. ic.**
 bengalensis Theat Deutsch. Gart. Mag. 1818. t. 5. f. 2. p. 53.
 odorata Sweet hort. brit. 180.
 Thea Hort.
 e) Fraseriana Loud. hort. brit. 211.
 c) L'Heritierana Red. et Th. Ros. III, 21. c. ic.
 fraxinifolia γ . Heritierana Ser. in DC. prodr. II, 607.
 * **η) longifolia Poir. enc. méth. VI, 296. Red. et Th. Ros. II, 27. c. ic.**
 * **θ) Noisettiana Red. et Th. Ros. II, 77. c. ic.**
 paniculata Hort.
 i) ochroleuca G. Don dichl. pl. II, 582.
 x) pumila Lindl. Ros. mon. 106. Red. et Th. Ros. II, 25.
 bengalensis micrantha deutsch. Gart. Mag. 1818. 53. t. 5. f. 2.
 λ) reclinata Red. et Th. Ros. III, 79. c. ic.
 * **μ) Ruga Lindl. bot. reg. t. 1369.**
 * **ν) bengalensis Pers. syn. pl. II, 50.**
 diversifolia Vent. Jard. Cels t. 35.
 semperflorans Rxb. fl. ind. II, 514. bot. mag. t. 284.
 sinica L. syst. veget. ed. 13. 308.
 e) Ternauxiana Ser. in DC. prodr. II, 600.
 sinica Ternótea Tratt. Ros. mon. I, 94.
10. 5 § atropurpurea Brot. fl. lusit. II, 488. Patria ignota.
 indica c. atropurpurea Wallbr. Ros. hist. succ. 106.
 subscandens Hask. cat. alt. pl. hort. Bogor. 265.
- * 11. 5 § Banksiae R. Br. in hort. Kew. ed. 2. III, 256. bot. mag. 1954. China, Japonia.
 inermis Roxb. fl. ind. II, 516.
 β) lutea Lindl. in bot. reg. t. 1105.
12. 5 fragariaeflora Ser. in DC. prodr. II, 601. icon. pl. chin. e China.
 bibl. Braam t. 28.
13. 5 amygdalifolia Ser. in DC. prodr. II, 601. ic. pl. chin. e China.
 bibl. Braam t. 19.
- * 14. 5 Banksiae a. amygdalifolia Wallr. Ros. hist. succ. 95. China.
 bracteata Wendl. bot. Beob. 50. hort. Herrenh. t. 22. bot. mag. t. 1377.
 lucida Lawr. Ros. t. 84.
 Lyellii e. bracteata Wallr. Ros. hist. succ. 92.
 ? Macartnea Dum. Cours. bot. cult. 1. ed. III,
 β) scabriuoseula Lindl. Ros. mon. 10. bot. mag. t. 1377.
15. 5 § involucreta Rxb. fl. ind. II, 513. bot. reg. t. 739. Nepal, India orientalis.
 bracteata Red. et Th. Ros. I, 35. c. ic.
 Lindleyana Tratt. Ros. monogr. II, 190.
 Lyellii c. involucreta 93. Wallr. Ros. hist. succ. 91.
16. 5 § recurva Rxb. fl. ind. II, 514. Nepal.
 sinica γ . polyzyga Wallr. Ros. hist. succ. 97.
17. η microphylla Rxb. fl. ind. II, 515. China (Canton),
 Roxburghii Tratt. Ros. mon. II, 233. Japonia.
 Lyellii Roxburghii Wallr. Ros. hist. succ. 90.
18. § Loureiroana G. Don dichl. pl. II, 585. China et Cochinchina
 cinnamomea Lour. fl. coch. 395. (sed culta).
19. 5 5 cochinchinensis G. Don dichl. pl. II, 585. Cochinchina.
 spinosissima Lour. fl. coch. 395.
20. 5 pentaphylla Schrank in syll. pl. nov. I, 215. China.

- B. *Systylae* (Folia saepe semperv.; Stipul. adnatae; Styli in columnam cohaer.).
21. *diffusa* Rxb. fl. ind. II, 515. ? China (Canton).
- * 22. § *multiflora* Thunb. fl. jap. 214. Red. et Th. Ros. II, 70. c. ic. China, Japonia.
floribunda Hort.
 β) *Boursaulti* G. Don dichl. pl. II, 583.
 γ) *carnea* Red. et Th. Ros. II, 67. c. ic. bot. mag. t. 1059. bot. reg. t. 425.
 florida Poir. enc. méth. suppl. IV, 715.
 japonica Waitz (ubi?)
 δ) *platyphylla* Red. et Th. Ros. II, 69. c. ic. bot. reg. t. 1372.
 Grevillei Hort. in Sweet hort. brit. 181.
 Roxburghii Hort. in Sweet hort. brit. 181.
 Thoryi Tratt. Ros. monogr. I, 83.
 e) *Russelliana* Loud. arb. et frut. brit. II, 775.
23. § *polyantha* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 128.
24. § 5 *abyssinica* R. Br. in Salt's Abyss. app. IV, 64. Lindl. Ros. monogr. 63. t. 13.
moschata a. abyssinica Wallr. Ros. hist. succ. 178.
- * 25. 5 *Brunonii* Lindl. Ros. monogr. 120. t. 14. Fl. d. serr. IV, t. 366. 367. Nepal, Himalaya.
Brownii Spreng. syst. veg. II, 556. Tratt. monogr. II, 96.
moschata h. Brownii Wallr. Ros. hist. succ. 182.
 β) *arborea* Pers. syn. pl. II, 50.
moschata e. arborea Wallr. Ros. hist. succ. 179.
- * 26. 5 § *moschata* Mill. dict. Nro. 13. Red. ed. Th. Ros. I, 33. c. ic. Nepal, Himalaya,
glandulifera Rxb. fl. ind. II, 514. India orientalis,
 Lindleyi Wall. Afghanistan, ? Africa bor.,
moschata f. Opsostemma Wallr. Ros. hist. succ. 180. ? Madeira.
Opsostemma Ehrh. Beitr. z. Naturk. II, 72.
sempervirens Dup. ch. d, Ros. 5.
 β) fl. pleno.
 γ) *nepalensis* Lindl. in bot. reg. t. 829.
 δ) *nudiuscula* Lindl. Ros. mon. 122.
 e) *rosea* Ser. in DC. prodr. II, 598.
moschata nivea bot. reg. t. 861.
27. ? *pubescens* Rxb. fl. ind. II, 514. India orientalis.
- * 28. § 5 *sempervirens* L. cod. Nro. 3740. Europa australis,
alba All. fl. pedem II, 139. Aegyptus, Himalaya,
atrovirens Viv. fl. ital. fragm. I, 4. t. 6. India orientalis
balearica Pers. syn. pl. II, 49.
cretica b. balearica Wallr. Ros. hist. succ. 144.
moschata DC. hort. Monsp. 138.
scandens Mill. dict.
 - *g. sempervirens* Wallr. Ros. hist. succ. 195.
 β) *aegyptiaca* Ser. in DC. prodr. II, 614 (sub *canina*).
 indica Forsk. fl. aeg. arab. p. CXIII.
 moschata c. aegyptiaca Wallr. Ros. hist. succ. 179.
 γ) *bifida* Gerb. et Tar. in Guss. fl. sic. syn. II, 2. 831.
 δ) *Clarei* Lindl. in bot. reg. t. 1438.
 e) *floribunda* Guss. fl. sic. prodr. I, 561.
 ζ) *fraxinellaefolia* (nec *fraxinifolia* G. Don) Andr. Ros. fasc. 33.
 η) *glabrifolia* Viv. fl. datm. III, 242.
 θ) *humifusa* Tratt. Ros. mongr. II, 102.
 arvensis Condolleana Tratt. Ros. monogr. II, 104.
 canina variegata Andr. Ros. fasc. 12.
 sempervirens lejustyla Koch syn. ed. 2. 255.
 ι) *latifolia* Red. et Th. Ros. II, 16 et 49. c. ic.
 Broteroi Tratt. Ros. monogr. II, 58.
 scandens Brot. fl. Insit. II, 341.
 κ) *Leschenaultiana* Red. et Th. Ros. III, 87. c. ic.
 moschata h. Leschenaultiana Wallr. Ros. hist. succ. 179.
 Wallichii Sabini in Wall. numer. list. Nro. 685.
 λ) *microphylla* DC. hort. Monspel. 136.
 sempervirens minor Guss. fl. sic. syn. I, 561.
 μ) *minor* Guss. fl. sic. prodr. I, 561.
 ν) *pilosula* Ser. in DC. prodr. II, 598.

- e) prostrata DC. hort. Monsp. 138.
 scandens f. prostrata Wallr. Ros. hist. succ. 195.
- * 29. § 5 arvensis L. cod. Nro. 3734. engl. bot. t. 188. Gallia, Helvetia,
Germania,
? montes uralenses.
 alba Reitt. et Ab. d. 100 deutsch. wild. Holzarz. t. 62.
 canina β. sylvestris Rth tent. fl. germ. II, 560.
 glauca Dierb. fl. Heidelb. II, 140.
 Halléri Krock. fl. siles. II, 150.
 scandens Mneh Verz. ausl. B. u. Str. Weiss. 118.
 - a. arvensis Wallr. Ros. hist. succ. 188.
 sempervirens Roess. Ros. t. 32.
 sylvestris Herrm. diss. de Rosa 11. Rth. catal. bot. I, 59.
 β) Andersonii Sm. in engl. fl. II, 398.
 γ) dibracteata (bibracteata R. et Th.) Bast. in DC. fl. franç. V, 537.
 scandens b. dibracteata Wallr. Ros. hist. succ. 190.
 δ) ? capreolata Neill in Edinb. philos. journ. III, 102.
 ε) lasiostyla; Herpórrhodon Ehrh. Beitr. z. Naturk. II, 71.
 ζ) obtusata Ser. in DC. prodr. II, 597.
 η) odósa Gris. spic. fl. Rum. et Bith. I, 106.
 θ) repens Scop. fl. carn. 610. Jeq. fragm. bot. 69. t. 104.
 dumetorum Guss. fl. sic. prodr. I, 566. (teste Bert.)
 fusca Moench meth. 688.
 ovata Lej. fl. d. env. de Spa II, 312.
 serpens Wib. prim. fl. Werth. 265.
 β) sylvestris Schrank baier. Fl. II, 35.
 Tuguriorum Willd. hort. Berol. I, 544.
30. § 5 Beggeriana Schrenk enum. pl. nov. 73. Siberia alt., Songaria.
- * 31. § 5 systyla Bast. suppl. d. l. fl. d. Maine et Loir. 31. R. et
 Th. Ros. I, 91. Germania, Gallia,
Britannia.
 alba Bast. ess. s. la fl. du dep. de Maine et Loire 189.
 collina Sm. engl. bot. t. 1895.
 Hystrix Lem. Lis. not. gén. et rem. part. 10.
 ? leucantha Loisel. not. s. l. plant. à ajout. à la fl. de Fr. 83.
 ? obtusifolia Dsv. journ. de bot. 2. 137.
 rustica Lem. Lis. not. gén. et rem. part. 11.
 scandens d. leucóchroa Wallr. Ros. hist. succ. 193.
 stylosa Dsv. journ. de bot. II, 317. 336. IV, 113. t. 14.
 β) glandulosa Ser. mél. bot. I, 50. (sub brevistyla.)
 γ) lanceolata Lindl. Ros. mon. 111.
 δ) leucóchroa Dsv. journ. de bot. 1809. II, 316. 1813. IV, 113. t. 15.
 brevistyla α. DC. fl. franç. VI, 537.
 ε) Monsoniae Lindl. Ros. monogr. 111.
 collina Monsoniana Red. et Th. Ros. III, 67. c. ic.
32. § 5 arvina Schwenkf. in Krock. fl. sil. II, 150. Gr. et G. fl. de Fr. I, 554. Germania, Gallia.
 Axmanni Gmel. fl. bad. als. IV, 367.
- * 33. § 5 setigera Mich. fl. bor. amer. I, 295. America foed. media
et australis.
 β) fenestralis Lindl. Ros. mon. 123. t. 15.
 fenestrata Donn hort. Cant. ed. 8. p. 170.
 γ) tomentosa Torr. et Gr. fl. of N. Amer. I, 458.
- * 34. § 5 hyacinthina Sweet hort. brit. 181. Certe planta hybrida.
- C. Nóbiles (Fol. deciduae; Stip. connatae; Stylis liberi; Ovar. sessilia.)
- * 35. § 5 Damascéna Mill. dict. Nro. 15. Sýria.
 calendarum Borkh. forstbot. Beschr. d. in d. H. Darmst.
 Land. wachs. Holzarz. 330.
 Celsii Lem. Lis. not. gen. et rem. part. 11. .
 Centifolia bífera Poir. enc. méth. VI, 276.
 Chamaérrhodon d. damascéna Wallr. Ros. hist. succ. 284.
 multiflóra Roess. oek. bot. Beschr. d. Ros. I, 68.
 myropolarum nouv. Duh.
 polyanthos Roess. Ros. t. 35.
 β) alba Roess. oek. bot. Beschr. d. Ros. I, 84.
 γ) belgica Mill. dict. Nro. 17.
 alba Var. damascéna Poir. enc. méth. VI, 24.
 gallica β. belgica Pers. syn. pl. II, 49.
 δ) bífera Dup. Ch. d. Ros.

Centifolia bifera Poir. enc. méth. VI, 276.

lépida Waitz in Tratt. Ros. monogr. I, 22.

menstrua Andr. Ros. fasc. 5.

semperflorens Dsf. tabl. de l'éc. de bot. 175.

c) *coccinea* Tratt. Ros. mon. I, 25.

Portlandica Hort.

sessiliflora Waitz in Tratt. Ros. mon. I, 25.

ç) *laxiflora* Ser. in DC. prodr. II, 621.

η) *verecunda* Waitz in Tratt. Ros. monogr. I, 21.

36. 5 *phoenicea* Boiss. diagn. pl. nov. or. X, 4.

* 37. 5 *Centifolia* L. cod. Nro. 3741. Red. et Th. Ros. I, 77. c. ic.

Chamaerhodon c. caucasica Wallr. Ros. hist. succ. 274.

β) *alba* (nivea) Hort.

γ) *apétala* Lois. in Nouv. Duham. Red. et Th. Ros. I, 78.

δ) *bélgica* Poir. enc. méth. VI, 276. Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 478.

ε) *hipinnata* Dum. Cours. bot. cult. 1. éd. III, 351. Red. et Th. Ros. II, 11. c. ic.

apifolia Delaun. bon jard. Willd. hort. Ber. suppl. 38.

crispa Hort.

ζ) *bullata* Ser. in mus. helv. I, 18. Red. et Th. Ros. I, 37. c. ic.

η) *cárnea* Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 477.

Vilmorina Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 476.

θ) *caryophýllea* Poir. enc. méth. VI, 78. Red. et Th. I, 113. c. ic.

unguiculata Dsf. tabl. de l'éc. de bot. du mus. d'hist. nat. 175.

ι) *crenata* Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 476. Red. et Th. Ros. I, 65. c. ic.

κ) *Dijoniensis* Roess. oek. bot. Besch. d. Ros. I, 93.

λ) *elongata* Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 488.

multiflora Dum. Cours. bot. cult. 1. éd. III.

μ) *Kingstonia* Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 476.

ν) *maxima* Dsf. tabl. de l'éc. de bot. du mus. d'hist. nat. 175.

Centifolia β. hollandica Pers. syn. pl. II, 48.

pictorum Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 476.

Regina Roess. oek. bot. Besch. d. Ros. I, 47.

ξ) *mucosa* Ait. hort. Kew. ed. 1. II, 207. bot. mag. t. 69.

ο) *mutábilis* Pers. syn. pl. II, 48. Red. et Th. Ros. I, 111.

única Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 476.

π) *normannica* Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 476.

ρ) *Pomponia major* Ser. mél. bot. I, 24. et 26.

anglica Borkh. (ubi? nec in d. Forstbot.)

Centifolia minor Red. et Th. Ros. III, 33.

húmilis Meldensis Tratt. Ros. monogr. I, 44.

provincialis α. Willd. sp. pl. II, 1070.

σ) *Pomponia minor* Ser. mél. bot. I, 25.

burgundica Dsf. tabl. de l'éc. de bot. 175. Pers. syn. pl. II, 48.

Pomponia DC. fl. franç. IV, 433. Red. et Th. Ros. I, 65. c. ic. II, 57. c. ic.

provincialis Ait. hort. Kew. ed. 1. II, 204.

τ) *simplicifolia* Tratt. Ros. mon. I. p. LXXXIV.

monophylla Dup. in bon jard. 755.

υ) *tatarica* Roess. oek. bot. Besch. d. Ros. II, 52.

φ) *ulmifolia* Pronv. monogr. du genre Ros. 164.

Centifolia grandidentata Tratt. Ros. mon. I, 11.

38. 5 *germanica* Maerkl. in Flora IV, 191.

* 39. 5 *gállica* L. cod. Nro. 3742. Red. et Th. Ros. I, 73. c. ic.

bélgica Brot. fl. lusit. I, 338.

Centifolia holosericea Andr. Ros. fasc. 19.

Chamaerhodon b. gallica Wallr. Ros. hist. succ. 267. (ex p.)

cordifolia Host. fl. austr. II, 23.

rubra Lam. fl. franç. III, 130.

β) *Agatha* Red. et Th. Ros. III, 35. c. ic.

pumila praecox et regalis Tratt. Ros. monogr. I, 51. et 50.

γ) *blanda* Brot. fl. lusit. I, 337.

δ) *Borbonia* Roess. oek. bot. Besch. d. Ros. II, 28. Red. et Th. Ros. I, 74.

formosa Roess. Ros. 50.

ε) *cardinalis* Lawr. Ros. t. 59.

ζ) *coerúlea* Tratt. Ros. monogr. I, 37.

basilica Roess. Ros. t. 14.

η) *Delphiniana* Tratt. Ros. monogr. I, 38. Red. et Th. Ros. III, 39.

Germania.

Patria ignota, an Oriens?
nec in isthmo cauc-
casico spontanea.

- θ) holosericea Ser. méf. bot. I, 29.
 cúprea Jacq. fragm. bot. t. 34. f. 4.
 episcopalis Roess. oek. bot. Besch. d. Ros. II, 44.
 gallica Maheka Red. et Th. Ros. III, 78. c. ic.
 mutábilis Dum. Cours. bot. cult. ed. 2. V, 475.
 violácea Roess. oek. bot. Besch. d. Ros. I, 200.
- ι) inaperta Ser. méf. bot. I, 86.
 Vilmorina Hort.
- ζ) inermis Ser. in DC. prodr. II, 604.
- λ) papavérina Mneh Besch. ausl. B. u. Str. v. Weiss. 123. Roess. Ros. t. 31.
- μ) parvifolia Ehrh. Beitr. z. Naturk. VI, 97.
 burgundensis West. bot. univ. I, 248.
 burgundica Roess. Ros. t. 4. Durande fl. de Bourg. I, 196.
 Ehrhartiana Tratt. Ros. monogr. I, 68.
 Meldensis Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 474.
 Rhemensis (Remensis DC.) Roess. oek. bot. Besch. d. Ros. II, 64.
- ν) versicolor Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 475. Red. et Th. Ros. I, 135. c. ic.
 gallica marmórea Red. et Th. Ros. III, 49. c. ic.
 Prænestina Mill. dict. Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 475.
40. 5 Reichenbachiana Waitz in Flora VII, 417. Germania.
- * 41. 5 púmila L. fl. suppl. 282.
 austriaca Crntz stirp. austr. II, 33. Jcq. fl. austr. t. 196.
 calycina Moench Verz. ausl. B. u. Str. v. Weiss. 124.
 Chamaerhodon a. austriaca Wallr. Ros. hist. succ. 257. (ex p.)
 gallica γ. hispida Ser. in DC. prodr. II, 603.
 - γ. pumila Lk. enum. pl. hort. Berol. II, 58.
 humilis Tausch in Flora II, 2. 465.
 macrocarpa Roch. in Schult. Oestr. Fl. 70.
 olympica Donn hort. Cantabr. ed. 8. 170.
 Polliniana Poll. hort. et prov. Veron. pl. nov. 13. (ex p.)
 Pollini Poll. viag. al lag. di Garda 128. (ex p.)
 repens Muenchh. Hausv. V, 231.
 varia a. púmila Schimp. et Sp. in Spenn. fl. Friburg. III, 775.
 β) hispida Schrank baier. Fl. II, 41.
 sylvatica Tausch in Flora II, 464.
- * 7) pygmaea Bieb. fl. taur. cauc. I, 397. cent. pl. ross. I, t. 2.
 ? depauperata Schrank baier. Fl. II, 32.
 livescens Bess. cat. pl. hort. Crem. a. 1811.
- δ) varians Pohl tent. fl. Bohem. II, 71.
 ε) Waitziana Tratt. Ros. monogr. I, 57.
 ζ) Wolfgangiana Bess. enum. pl. Volh. et Pod. 61.
42. 5 flavescens Hort. in Hassk. cat. alt. pl. hort. Bogor. 265. planta certe hybrida.
 híbrida Steud. nomencl. bot. II, 469. (teste Hassk.)
43. 5 macrantha Desp. fl. de la Sarth. et de la May. 77. Gallia.
 canina grandiflora Red. et Th. Ros. II, 75. c. ic. (teste Gr. et G.)
44. 5 híbrida Gaud. in méf. bot. I, 39. Gr. et G. fl. de Fr. I, 553. Gallia, Germania,
Podolia.
 Czackiana (nec Czarkiana Lk.) Bess. enum. pl. Volh. et Pod. 66.
 gallica β. et γ. Koch syn. ed. 2. 255. (teste Gr. et G.)
 glandulosa Bor. fl. de la centre de la Fr. 139.
 sylvestris Gater. descr. d. pl. de Montaub. 94.
45. 5 pulchella W. hort. Berol. I, 545. Patria ignota.
 gallica β. pulchella Lk. enum. pl. hort. Berol. II, 58.
 Willdenowii Tratt. Ros. monogr. I, 81. (nec Spr.)
46. 5 tortuosa Wierb. in Rchb. fl. Germ. exsicc. Nro. 1271. Banatus.
- D. Cinnamomeae (Flor. corymb.; Stip. in ramulis flor. latiores, connatae; Styli liberi; Ovaria brevistipitata).
- * 47. 5 carolina L. cod. Nro. 3737.
 caroliniana Bigel. florula Bost. 121.
 corallina Willd. hort. Berol. suppl. 38.
 Euratica (Evratina alior.) Bosc. in nouv. cours d'agric. II, 256.
 Hudsoniana Red. et Th. Ros. I, 95. c. ic.
 orthosépala δ. carolina Schimp. et Sp. in Spenn. fl. Friburg. III, 768.
 palustris Marsh. arbust. amer. 135.
 pensylvanica Mich. fl. bor. amer. I, 296.
 virginiana Dur. Harbk. Baumz. II, 353.

- β) *florida* Donn cat. hort. Cant. ed. 8. 160.
enneaphylla Raf. in Dsv. journa. de bot. 1813. II, 268.
- γ) *laevis* Ser. méf. bot. I, 21. in adn.
 ? *balearica* Desf. tabl. de l'éc. de bot. du Mus. d'hist. nat. 175.
corymbosa Ehrh. Beitr. z. Naturk. IV, 21.
- δ) *salicifolia* Ser. mus. helvet. I, 29. Red. et Th. I, 95. c. ic.
- * 48. 5 *lucida* Ehrh. Beitr. z. Naturk. IV, 11. Jacq. fragm. bot. t. 107. f. 3.
carolina Dur. Harbk. Baumz. II, 354.
caroliniana Mich. fl. bor. amer. I, 295.
fraxinea Willd. hort. Berol. suppl. 37.
fraxinifolia Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 490.
humilis b. *lucida* et c. Rapa Wallr. Ros. hist. succ. 155. 156.
parviflora Torr. fl. of the north. a. middle sect. of the Un. stat. I, 484.
Rapa Bosc. nouv. cours d'agric. XI, 247.
turgida Pers. syn. pl. II, 49.
- β) *flore pleno*; *pensylvanica* fl. pl. Wangenh. Beitr. z. Forstwiss. nordam. Geh. 113.
- γ) *Lyonii* Pursh fl. Am. sept. I, 345.
humilis g. *Lyonii* Wallr. Ros. hist. succ. 159.
 ? *parviflora* Ell. sketsch of the bot. of S. Car. and Georg. I, 563.
- δ) *parviflora* Ehrh. Beitr. z. Naturk. IV, 11.
humilis Marsh. arbust. amer. 285.
 - f. *parviflora* Wallr. Ros. hist. succ. 158.
49. 5 *californica* Ch. et Schlecht. in Linn. II, 35. California.
 β) *Petersiana* C. A. Mey. Zimmtr 19.
- * 50. 5 *nitida* Willd. hort. Berol. I, 554. Nova terra, America
anglica et foeder. bor.
blanda Pursh fl. Amer. sept. I, 344. II, 749.
humilis a. *nitida* Wallr. Ros. hist. succ. 154.
rubripina Bosc. dict. d'agric. 246.
Redoutea Thor. monogr. huj. spec. Tratt. Rosac. monogr. II, 176.
 - *rubescens* Red. et Th. Ros. I, 103. t. 36.
- * 51. 5 *blanda* Ait. hort. Kew. ed. 1. II, 202. Jacq. fragm. bot. t. 105.
alpina β. Ait. hort. Kew. ed. 2. III, 265.
 - *laevis* Red. et Th. Ros. I, 57. t. 19.
 ? *californica* var. Cham. et Schlecht. in Linn. II, 35. (teste H. et Arn.)
cinnamomea ζ. *blanda* Red. et Th. Ros. I, 134.
 ? *corymbosa* Bosc. dict. d'agric. 246.
fraxinifolia Lindl. Rosac. mon. 25.
 - α. *blanda* Ser. in DC. prodr. II, 606.
gemella Willd. hort. Berol. I, 544. (ex p., teste Torr. and Gr.)
orthosépala β. *fraxinifolia* Schimp. et Sp. in Spenn. fl. Frib. III, 768.
Tourneps Hort. gall.
virginiana Mill. dict. Nro. 10.
 β) *pléiophylla*; *Woodsii* var. Borr. in Hk. fl. bor. amer. I, 199.
 γ) *variegata*; *alpina flore variegata* Red. et Th. Ros. II, 55. c. ic. (teste DC.)
- * 52. 5 *Lindleyi* Spr. syst. veget. II, 647. America britannica et
foederata borealis.
carelina Tratt. Rosac. monogr. II, 155.
humilis e. *pensylvanica* Wallr. Ros. hist. succ. 157.
laxa Lindl. Rosac. mon. 18. t. 3.
pseudo-lucida Bess. in DC. prodr. II, 604.
53. 5 *fraxinifolia* Borkh. Vers. ein. forstw. Besch. v. Holz. 301. America bor.-occident.
 bot. reg. t. 458.
Solandri Tratt. Rosac. mon. II, 150.
blanda Lindl. Ros. monogr. 25.
 - β. *infesta* Wallr. Ros. hist. succ. 176.
54. 5 *Woodsii* Lindl. Ros. mon. 21. bot. reg. t. 976. Amer. foeder. media.
lutea nigra Pronv. nomencl. rais. d. esp. du g. ros. 24.
55. 5 *foliolosa* Nutt. in Torr. and Gr. fl. of N. Amer. I, 461. America foed. austr.
et boreali-occid.
 β) *leiocarpa* Torr. et Frém. rep. of the expl. exp. to the
 rocky mount. 97.
56. 5 *ruficaulis* Ehrh. Beitr. z. Naturk. VII, 138.
Portlandica Ludw. neu. wild. Baumz. 45.
57. 5 *kentuckensis* Raf. in ann. scienc. phys. Par. V, 213. America foederata.
58. 5 *trifoliolata* Raf. in ann. scienc. phys. Par. V, 213. America foederata.
59. 5 *elegans* Raf. in ann. scienc. phys. Par. V, 214. America foederata.
60. 5 *globosa* Raf. in ann. scienc. phys. Par. V, 214. America foederata.
61. 5 *Cursor* Raf. in ann. scienc. phys. Par. V, 215. America foederata.

62. 5 obovata Raf. in ann. scienc. phys. Par. V, 217. America foederata.
 63. 5 serrulata Raf. in ann. scienc. phys. Par. V, 218. America foederata.
 64. 5 Rafinesquii DC. prodr. II, 611.
 nivea Raf. in ann. scienc. phys. Par. V, 218.
 65. 5 pusilla Raf. in ann. scienc. phys. Par. V, 218.
 66. 5 flexuosa Raf. prec. d. découv. et trav. somiol. entre
 1800—1814. p. 37. America foederata.
 Rafinesqueiana Tratt. Ros. mon. II, 234.
 67. 5 acuminata Raf. in ann. scienc. phys. Par. V, 216. America foederata.
 68. 5 pratensis Raf. in ann. scienc. phys. Par. V, 215. America foederata.
 69. 5 riparia Raf. in ann. scienc. phys. Par. V, 216. America foederata.
 70. 5 dasystème Raf. in ann. scienc. phys. Par. V, 219. America foederata.
 * 71. 5 americana Waitz in hort. Breiter. 416. Lk. enum. pl. hort.
 Berol. II, 56. ? America borealis.
 cinnamómea b. americana Ser. in DC. prodr. II, 606.
 suavis b. americana Wallr. Ros. hist. succ. 129.
 72. 5 Sprengeliana Tratt. Rosac. mon. II, 163.
 palustris b. virginica Wallr. Ros. hist. succ. 150.
 virginica Curt. ex Spreng. nov. prov. hort. Hal. et Berol. 36.
 73. 5 glabra Andr. Ros. fasc. 21. Tratt. Rosac. monogr. II, 164.
 74. 5 ambigua Waitz in Spreng. syst. II, 548.
 * 75. 5 rugosa Thunb. fl. japon. 213. S. et Z. fl. jap. I, 66. t. 28. Japonia, China bor.,
 Lyellii b. rugosa Wallr. Ros. hist. succ. 91. Mongolia, Camtschatka.
 majalis n. camtschatica Wallr. Ros. hist. succ. 173.
 β) Chamissoniana C. A. Mey. Zimmtr. 34.
 camtschatica Cham. in Linn. II, 35.
 γ) ferox Andr. Ros. fasc. 22. bot. reg. t. 420.
 camtschatica β. ferox Ser. in DC. prodr. II, 607.
 δ) inermis C. A. Mey. Zimmtr. 36.
 ε) Lindleyana C. A. Mey. Zimmtr. 34.
 camtschatica Lindl. Ros. mon. 6. bot. reg. t. 419.
 ζ) Ventenatiana C. A. Mey. Zimmtr. 35.
 camtschatica Vent. jard. du Cels t. 67. bot. mag. t. 3149.
 76. 5 Nankinensis Lour. fl. coch. 397. Chin. (Nanking, Canton).
 indica d. Nankinensis Wallr. Ros. hist. succ. 101.
 77. 5 Lyellii Lindl. Ros. monogr. 12. t. 1. Nepal, Himalaya.
 78. 5 amblyótis C. A. Mey. Zimmtr. 30. Camtschatka.
 camtschatica Erm. Verz. v. Th. u. Pfl. e. Reis. um d. Erde 63.
 79. 5 pauciflora Lindl. in Sweet hort. brit. 179. Sibiria.
 * 80. 5 acicularis Lindl. Rosac. mon. 44. t. 8. Sibiria, Rossia bor.,
 alpina Pall. fl. ross. II, 61. Suecia.
 carelica Fries summ. veget. Scand. 43. et 171.
 Gmelini Turcz. in bull. de la soc. d. nat. de Mosc. 1843. 638.
 β) fennica Hort.
 γ) Gmelini Bunge in Led. fl. alt. II, 228.
 81. 5 laxa Retz in Hoffm. phyt. Bl. 39. Sibiria australis.
 cinnamómea Kar. et Kir. bull. de la soc. imp. d. nat. de Mosc. 1841. 419.
 majalis a. sibirica Wallr. Ros. hist. succ. 161.
 β) glabra C. A. Mey. Zimmtr. 21.
 canina Siev. in Pall. neu. nord. Beitr. III, 323.
 oxyacantha Kar. et Kir. bull. de la soc. d. nat. de Mosc. 1841. 419.
 songarica Bge in Led. fl. alt. II, 226.
 * 82. 5 cinnamómea L. cod. Nro. 3733. engl. bot. t. 2388. Europa, Sibiria.
 aeuminata Swartz in Lk. Jahrb. d. Gew. K. I, 2. 82.
 amabilis Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1833.
 collincola Ehrh. Beitr. z. Naturk. II, 70.
 fastuosa Tratt. Rosac. mon. II, 168.
 fluvialis Muell. in fl. dan. t. 868.
 gemella W. enum. pl. hort. Ber. I, 544. (teste C. A. Mey.)
 majalis d. cinnamomea et e. foecundissima Wallr. Ros. hist. succ. 165.
 orthosépala γ. majalis Schimp. et Spenn. in Spenn. fl. Friburg. III, 768.
 praecox Wendl. hort. Herrenh. (?)
 spinosissima Wahlenb. fl. Ups. 171.
 β) americana Ser. in mus. helv. I, 20.
 γ) clinophylla Red. et Th. Ros. I, 43. c. ic.
 balúca Roth nov. pl. sp. praes. ind. orient. 234. (teste Rehb.)

- cinnamómea pállida Ser. in mus. helv. I, 19.
 Lyellii b. clinophylla Wallr. Ros. hist. succ. 91.
- 8) dahurica (davurica) Pall. fl. ross. II, 61.
 cinérea Swartz svensk bot. t. 553.
 cinnamómea lancifolia C. A. Mey. Zimmtr. 27.
- e) elliptica C. A. Mey. Zimmtr. 23.
 cinnamómea Schlicht. et Sch. Fl. v. Deutschl. IV. 5. t. 2.
- 9) foecundissima Dur. Harbk. Baumz. 1. Aufl. II, 343.
 Muenchh. Hausv. V, 279.
- 7) glabrifolia Rupr. stirp. fl. Petrop. diatr. 65.
- 8) glandulifolia C. A. Mey. Zimmtr. 23.
 Gorinkensis (Gorenkensis) Bess. in Spreng. syst. veg. II, 200.
 mútica Fries herb. norm. fasc. 7.
- i) intermedia C. A. Mey. Zimmtr. 26.
 cinnamómea Led. fl. alt. II, 227.
- x) Krockéri Tratt. Ros. mon. II, 31.
 pygmaea Krock. fl. sil. II, 154.
- λ) majalis Herrm. dissert. de Ros. 8.
 Mosquensis Spreng. syst. veget. IV, 2. 200.
 ? muricata Waitz in Lk. enum. pl. hort. Berol. II, 56.
 mútica Muell. in fl. dan. t. 688.
 spinosissima Gort. fl. ingr. 78.
- μ) microcarpa Retz in Hoffm. phytogr. Bl. 40.
 laxa β. incana Wickstr. in K. Vet. Acad. Handl. 2. H. 1820. Nro. 3.
- ν) microphylla Willd. herb. in Spreng. syst. veget. II, 547.
 majalis i. Fischeri Wallr. Ros. hist. succ. 171.
 Willdenowii Spreng. syst. veg. II, 547.
- ξ) pseudo-alpina C. A. Mey. Zimmtr. 24.
- o) turbinella Swartz in Spreng. syst. veget. II, 554. IV, 2. 199.
83. 5 Dicksóni (Dicksoniana Loud.) Lindl. engl. bot. t. 2707. Hibernia.
 Himalaya.
84. 5 macrophylla Lindl. Rosac. mon. 35. t. 6. India orientalis.
85. 5 latispina C. Koch.
 macrophylla Wall. pl. rar. asiat. II, 19. t. 117.
 β) minor Wall. pl. asiat. rar. II, 19.
86. 5 orientalis Dup. in DC. prodr. II, 607. Persia.
 cretica f. orientalis Wallr. Ros. hist. succ. 147.
 α) Oliveriana Ser. in DC. prodr. II, 607.
 β) Balbisiana Ser. in DC. prodr. II, 607.
87. 5 anserinaefolia Boiss. diagn. pl. nov. orient. VI, 51. Persia australis.
88. 5 Kotschyana Boiss. diagn. pl. nov. orient. X, 3. Persia australis.
89. 5 aristata Lapeyr. hist. arbr. d. pl. de Pyren. 285. Pyrenaeus.
90. 5 adenophylla Willd. hort. Ber. I, 546. Patria ignota.
- * 91. 5 turbinata Ait. hort. Kew. ed. 1. II, 206. Patria ignota, ? Alpes.
 alpina β. turbinata Dsv. in Journ. de bot. a. 1813. II, 119.
 Chamaerhodon γ. turbinata Wallr. Ros. hist. succ. 293.
 Francofurtana Gmel. fl. bad. II, 405.
 germanica Roess. oek. bot. Besch. d. Ros. II, 2.
 inermis Red. et Thor. Ros. II, 93.
 β) campanulata Ehrh. Beitr. z. Naturk. VI, 97. Red. et Th. Ros. II, 95.
 Francofurtensis Dsf. tabl. de l'éc. de bot. 175.
- γ) Orbessana Red. et Th. Ros. II, 21. c. ic.
 δ) Rosenberghiana Thor. prodr. d. g. Ros. 121. Red. et Th. Ros. II, 113. c. ic.
 Patria ignota.
92. 5 hemisphaerica Spr. syst. veget. IV, 2. 200. Patria ignota.
- * 93. 5 alpina L. cod. Nro. 4743. sp. pl. ed. 2. 703. Jacq. hort.
 Schoenbr. IV, t. 416. Helvetia, Germania,
 Gallia, Italia.
- cinnamómea L. sp. pl. ed. 1. 491.
 híbrida Vill. hist. d. pl. du Dauph. III, 554.
 inermis Mill. dict. Nro. 6.
 rupestris Crantz stirp. austr. II, 32.
 ? tenuis Beck. Fl. d. Geg. um Frankf. a. M. I, 285.
 Villarsii Tratt. Ros. mon. II, 207.
 β) adenophylla C. A. Mey. Zimmtr. 12.
 γ) biflora Krock. fl. siles. II, 151.
 δ) laevis Ser. mel. bot. I, 52. R. et Th. Ros. I, 59.
 Andrewsii Tratt. Ros. mon. II, 205.
 inermis Andr. Ros. fasc. 11.

- e) *lagenaria* Vill. hist. d. pl. du Dauph. III, 553.
coronata Hort.
odoratissima Scop. fl. carn. ed. 2 II, 354.
Portenschlagiana Tratt. Rosac. mon. II, 203.
pyrenaica Gouan ill. et obs. bot. 31. t. 19. f. 3.
- ç) *Monspeliaca* Gouan ill. et obs. bot. 31.
- 7) *pendulina* Ait. hort. Kew. ed. 1. II, 208.
alpina latifolia Ser. mel. bot. I, 30.
- 8) *pubescens* Koch syn. ed. 2. 248.
reversa Presl fl. cæch. 103.
- ç) *setosa* Ser. in DC. prodr. II, 612.
alpina hircina Desv. journ. de bot. 1813. 119.
hispida Krock. fl. siles. II, 152.
- z) *speciosa* Hort. (Drummondii Hort.)
- λ) *venusta* Waitz in Rechb. fl. exc. 613.
inermis Delaun. bon jard. 1808. 717, (teste DC.)
mixta Tratt. Ros. monogr. I, 136.
turbinata Vill. hist. d. pl. du Dauph. III, 550.
- μ) *Wulfenii* Tratt. Ros. mon. II, 200.
94. 5 *pendulina* L. cod. Nro. 3746.
pendulina β. *stricta* Rechb. fl. exc. II, 613.
polyphylla W. hort. Berol. suppl. 37. (teste Wallr.)
stricta Donn in Muehlenb. cat. pl. Am. sept. 50.
95. 5 *inermis* Wend. Bern. ueb. versch. Pfl. d. bot. Gart. in Marb. Patria ignota.
- * 96. 5 *rubrifolia* Vill. hist. d. pl. du Dauph. III, 549. German. austr., Gallia, Helvetia, Pedemontium.
canina β. Sut. helv. fl. I, 302.
ferruginea Hort.
glauca Dsf. tabl. de l'éc. de bot. 175.
glaucescens Wulf. in Roem. Arch. III, 376.
lurida Andr. Ros. 22.
majalis c. *glauca* Wallr. Ros. hist. succ. 164.
orthosépala z. *rubrifolia* Schimp. et Sp. in Spenn. fl. Frib. III, 768.
rubicunda Hall. fl. in Roem. Arch. I, 2. 6.
vestita Sternb. in Flora IX. Beil. 1. 77.
β) *hispidula* Ser. in mus. helv. I, 8. et 12. t. 1.
cinnamomea glauca Dsv. in journ. de bot. 1813. 120.
- 7) *livida* Host fl. austr. II, 25.
? *canina* Hegetschw. Fl. d. Schw. 474.
Guttensteiniensis cat. hort. Vindob.
rubrifolia Jacq. fragm. bot. 70. t. 108.
- δ) *pinnatifida* Ser. in mus. helv. I, 11. t. 2. f. 11.
? *canina globosa* Dsv. journ. de bot. 1813. 114. (teste Ser.)
- z) *pubescens* Koch syn. ed. 2. 250.
97. 5 *glauca* Hegetschw. Fl. d. Schw. 474. Helvetia.
98. 5 *glandulosa* Bell. mém. de l'ac. roy. d. sc. à Tur. 1790. 230.
alpina h. *glandulosa* Wallr. Ros. hist. succ. 137.
- *pimpinellifolia* Lindl. Ros. monogr. 37.
cretica a. *montana* Wallr. Ros. hist. succ. 144.
glabrata Vest in Tratt. Ros. monogr. II, 220.
montana Chaix in Vill. hist. d. pl. du Dauph. III, 547.
parviflora Lapeyr. hist. abr. d. pl. d. Pyren. suppl. 66.
pimpinellaefolia Vill. hist. d. pl. du Dauph. III, 553.
Reynieri Hall. fl. in Roem. Arch. I, 2. 7.
rubrifolia glandulosa Ser. in DC. prodr. II, 620.
- *montana* Gaud. fl. helv. III, 248.
β) *Pouzini* Tratt. Ros. mon. II, 112.
99. 5 *spinulifolia* Dematra ess. d'une monogr. d. ros. indig. 8. Gallia, Helvetia, Germania.
alpina i. *spinulifolia* Wallr. Ros. hist. succ. 137.
flexuosa Rau enum. Ros. 127. (teste Gr. et G.)
rubiginosa μ. *spinulifolia* Ser. in DC. prodr. II, 616.
trachyphylla Rau enum. Ros. 124. (teste Gr. et G.)
100. 5 *Silverbjelmii* Schrenk in bull. de la cl. phys. math. de l'ac. de St. Pét. II, 195. Songaria.

E. *Pimpinellifoliae* (Flor. solit.; Stip. subconformes, connatae; Styli liberi; Ovaria brevistipitata).

- * 101. 5 *lutea* Mill. dict. Nro. 11. bot. mag. t. 363. Patria ignota.
 ceréa Roess. Ros. t. 2.
 chlorophylla Ehrh. Beitr. z. Naturk. II, 69.
 cinnamómea Rth. fl. germ. tent. I, 217.
 Eglanteria L. cod. Nro. 3731. (excl. syn.)
 foétida All. fl. ped. II, 138.
 turcica lutea Roess. oek. bot. Besch. d. Ros. I, 173.
 vulpina Wallr. Ros. hist. succ. 201.
 β) bicolor Jacq. hort. Vindob. I, t. 1. et III, 1.
 aurantiaca Hort.
 Eglanteria punicea Red. et Th. Ros. III, 20. c. ic.
 punicea Mill. dict. Roess. Ros. t. 5. Red. et Th. Ros. I, 71. c. ic.
 tricolor Hort.
 γ) flore pleno.
 δ) lutéola Thor. prodr. 100. Red. et Th. Ros. III, 21. c. ic.
 ε) subrubra Red. et Thor. Ros. III, 73. c. ic.
- * 102. 5 *flava* Wickstr. in K. Vetensk. Acad. Handl. 1820. 273. Patria ignota.
 campestris β. echinophloea Wallr. Ros. hist. succ. 125.
- * 103. 5 *sulphúrea* Ait. hort. Kew. ed. 1. II, 201. bot. reg. t. 46. Oriens.
 campestris l. sulphurea Wallr. Ros. hist. succ. 124.
 glaucophylla Ehrh. Beitr. z. Naturk. II, 69.
 hemisphaerica Herrm. dissert. de Rosa 18.
 lutea Brot. fl. lusit. 345. (teste Rehb.)
 β) flore pleno Red. et Th. Ros. I, 29. c. ic.
104. 5 *lutescens* Pursh fl. Amer. sept. II, 735. Lindl. Ros. mon. 47. t. 9. ? Carolina.
105. 5 *xánthina* Lindl. Ros. mon. 132. ic. pl. sponte in Chin. nasc. e bibl. Braam. t. 9. China.
- * 106. 5 *ochroleuca* Waitz in deutsch. Gart. Mag., ? Wend. Bem. Patria ignota.
 ueb. versch. Pfl. d. bot. Gart. zu Marb.
107. 5 *ochroleuca* Wickstr. in patr. Sällsk. Journ. 1802. 97. Vet. ? Sibiria.
 Ac. Handl. 1820. 268. t. 3.
 campestris k. ochroleuca Wallr. Ros. hist. succ. 124.
 Candolleana flavescens Red. et Th. Ros. II, 46.
 hispida Sims in bot. mag. t. 1570.
 lútea Baumg. enum. stirp. magno Transs. princip. praepr. indig. II, 48.
 pállida Tratt. Rosac. monogr. II, 121.
 pimpinellifolia flavescens Ser. in DC. prodr. II, 608.
 spinosissima luteola Andr. Ros. fasc. 39.
- * 108. 5 *pimpinellifolia* L. cod. Nro. 3735. Europa, Oriens, Sibiria.
 campestris a. pimpinellifolia Wallr. Ros. hist. succ. 211.
 Chamaerhodon Vill. hist. d. pl. du Dauph. III, 155.
 Oederiana Tratt. Rosac. monogr. II, 133.
 scótea Mill. dict. Nro. 5.
 spinosissima Sm. in engl. bot. t. 187. Fl. dan. III, 398.
 β) aculeatissima Woods in transact. of the Linn. soc. XII, 179. (sub spinosiss.)
 γ) pusilla Woods in transact. of the Linn. soc. XII, 179. (sub spinosissima.)
 δ) velútina Clairv. man. d'herbor. en Suisse 163.
 campestris d. velutina Wallr. Ros. hist. succ. 119.
 ε) versicolor Hort.
- * 109. 5 *spinosissima* L. cod. Nro. 3736. Europa, Oriens, Sibiria.
 campestris c. spinosissima Wallr. Ros. hist. succ. 114.
 pimpinellifolia Tratt. Ros. monogr. II, 129.
 Villarsiana Sm. (teste Steud., sed ubi?)
 β) affinis Sternb. in Flora IX, Beil. I, 80.
 γ) macrophylla Ser. mel. bot. I, 46.
 campestris i. sanguisorbaefolia Wallr. Ros. hist. succ. 123.
 sanguisorbaefolia Donn hort. Cant. 8. ed. 169. Loud. arb.
 et frut. brit. II, 758.
 spinosissima sanguisorbaefolia Lindl. Ros. monogr. 51.
 δ) Mariaeburgensis Red. et Th. Ros. I, 83. c. ic.
 ε) mitíssima Gmel. fl. bad. IV, 358. Gu. et H. deutsche Holzart. I, 115. t. 87.
 ζ) parvifolia Tratt. Ros. mon. II, 127.
 Redoutea (Redutea) parvifolia Red. et Th. Ros. mon. I, 102.
 rubiginosa parvifolia Lindl. Ros. mon. add. 145.

- 7) *púmila* Red. et Th. Ros. II, 85. c. ic.
 spinosissima pusilla Woods in *transact. of the Linn. soc.* XII, 179.
- 8) *rosea* Koch syn. ed. 2. 247.
 borealis Tratt. Ros. mon. II, 141.
 spinosissima Jacq. fragm. bot. 79. t. 124.
 - *ciphiana* Sm. br. fl. II, 537.
110. 5 *adenóphora* Kit. in Schult. oesterr. Fl. ed. 2. II, 69. Transsylvania.
 111. 5 *Maukschii* Kit. in Schult. oesterr. Fl. ed. 2. 69. Transsylvania.
 112. 5 *Webbiana* Wall. in Royle ill. of the him. mount. 208. Himalaya.
 * 113. 5 *pisifera* C. Koch in Fl. d. noerdl. Orientes. Armenia.
 * 114. 5 *melanocarpa* Lk enum. pl. hort. Berol. II, 57. Sibiria, Oriens.
 microcarpa Bess. cat. hort. Crem. a. 1811. suppl. 4. p. 20.
 Besséri Tratt. Rosac. monogr. II, 125.
 pimpinellifolia z. *leiostyla* Koch syn. ed. 2. 247.
 campestris 8. *microcarpa* Wallr. Ros. hist. succ. 117.
 β) *poterifolia* Bess. enum. pl. Pod. et Volh. 62.
 campestris 8. *glaucophylla* Wallr. Ros. hist. succ. 117.
115. 5 *geminata* Rau enum Ros. 98. G. et Gr. fl. de Fr. I, 553.
 agrestis Gm. fl. bad. als. II, 416. Germania, Gallia.
- * 116. 5 *altaica* W. hort. Ber. I, 543. Sibiria.
 campestris h. *altaica* Wallr. Ros. hist. succ. 122.
 grandiflora Lindl. Rosac. monogr. 53. bot. reg. t. 888.
 pimpinellifolia Pall. fl. ross. 62. t. 75.
 - *Mariaeburgensis* Tratt. Rosac. monogr. II, 130.
 Pitcairnea Sabin im deutsch. Gart. Mag. 1824. 29.
 sibirica Tratt. Rosac. monogr. II, 230.
- * 117. 5 *myriacantha* Ser. mel. bot. I, 47. Lindl. Rosac. monogr. 55. t. 10. Gallia australis,
 campestris e. *myriacantha* Wallr. Ros. hist. succ. 119. Oriens borealis.
 villosa β. *myriacantha* Lapeyr. hist. abr. d. pl. d. Pyren. 283.
 pimpinellifolia 8. *adenophora* Gr. et G. fl. de Fr. I, 554.
 β) *magna* Dsv. journ. de bot. a. 1813. II, 118.
- * 118. 5 *rubella* Sm. engl. bot. t. 2521 et (fructus) t. 2601. Britannia.
 alpina 8. *rubella* Ser. in DC. prodr. II, 612.
 Candolleana Thor. Ros. prodr. 7. Red. et Th. II, 45.
 pendulina Roth. tent. fl. germ. I, 219. II, 2. 561.
 polyphylla Willd. enum. pl. hort. Ber. suppl. 37 (teste Rehb.).
 versicolor Tratt. Rosac. monogr. II, 124.
 β) *casta* Tratt. Ros. mon. II, 126.
 Redoutea glauca Red. Ros. I, 101. c. ic.
 suaveolens glauca Raf. in ann. d. sc. phys. V, 518.
 γ) *melanocarpa* Lindl. (teste Heynh. nom. bot. I, 698).
119. 5 *gentilis* Sternb. in Flora IX. Beil. 79. Littorale, Illyria.
 Candolleana élogans Red. et Th. II, 45. ed. 8vo t. 99.
120. 5 *Ventenatiana* Red. et Th. Ros. III, 83. Patria ignota.
- * 121. 5 *suavis* W. hort. Berol. suppl. 37. Gu. et H. fr. Holzart. t. 40. Patria ignota.
 alpina β. *suavis* Rehb. fl. exc. II, 613.
 dolosa Wendl. hort. Herrenh.
 muricata Waitz in Lk en. pl. hort. Ber. II, 56 (teste Wallr.)
 suavis a. *dolosa* Wallr. Ros. hist. succ. 128.
122. 5 *reversa* W. et K. pl. rar. Hung. III, 293. t. 264. Hungaria, Illyria,
 alpina e. *reversa* Wallr. Ros. hist. succ. 136. Patria ignota.
123. 5 *coruscans* Waitz in Lk enum. pl. hort. Berol. II, 57. Patria ignota.
 húmilis d. *coruscans* Wallr. Ros. hist. succ. 156.
124. *hibernica* Sm. in engl. bot. t. 2196. Woods in *transact. of the Linn. soc.* XII, 222. Hibernia.
125. 5 *Wilsoni* Borr. in engl. bot. t. 2723. Anglia.
126. 5 *involuta* Sm. br. fl. III, 1398. engl. bot. t. 2068 et (fructus) t. 2601. Scotia, ins. Hebridae.
 campestris b. *involuta* Wallr. Ros. hist. succ. 114.
 nivalis Donn hort. Cant. ed. 8. 170.
 pimpinellifolia involuta Ser. in DC. prodr. II, 609.
 Redoutea (*Redutea*) Red. et Th. Ros. I, 102. (teste Rehb.)
127. 5 *Sabini* Sm. in engl. bot. t. 2594. Woods in *transact. of the Linn. soc.* XII, 188. Scotia, Anglia.
- * β) *Doniana* Woods in *transact. of the Linn. soc.* XII, 185.
 Sm. in engl. bot. 2601.
 crética d. *Doniana* Wallr. Ros. hist. succ. 145.

- *) *γ*) *gracilis* Woods in *transact. of the Linn. soc. XII, 186.*
villosa Sm. *encl. bot. 583.*
128. 5 *viminea* Lindl. *Ros. monogr. 49.* Patria ignota.
campestris γ. viminea Wallr. *Ros. hist. succ. 121.*
horrída Lindl. in *Spreng. syst. veg. II, 549.*
- *) 129. 5 *oxycantha* Bieb. *fl. taur. cauc. III, 338.* Krim.
campestris ζ. infesta Wallr. *Ros. hist. succ. 117.*
x. macrocephala Wallr. *Ros. hist. succ. 118.*
130. 5 *pallens* Retz in *Spr. syst. veg. IV, 2. 200.* Suecia.
- F. *Caninae* (Fl. *corymb.*; *Stip. in ramulis flor. latiores*; *Styli liberi*; *Ov. in centro longestip.*).
- *) 131. 5 *alba* L. *cod. Nro. 3747.* ? China, Cochinchina.
Chamaerhodon β. alba (ex p.) Wallr. *Ros. hist. succ. 295.*
usitatissima Gater. *descr. d. pl. de Montaub. 94.*
canina var. *speciosa* Koch *syn. ed. 2.*
 *) *β)* *Boreykiana* Bess. *enum. pl. Pod. et Volh. 61. 65.*
γ) *campaniformis* Ser. in *DC. prodr. II, 622.*
Rosenbergiana Red. et Th. *Ros. II, 113. c. ic. (teste DC.)*
digitaria Bosc.
δ) *cymbaefolia* Delaun. *bon jard. Red. et Th. Ros. I, 96. c. ic.*
cannabina Pellet. (*ubi?*)
ε) *geminata* Red. et Th. *Ros. II, 83. (? Rau enum. Ros. 98.)*
alba β. humilis Red. *Ros. I, 97.*
ζ) *incarnata* Pers. *syn. pl. II, 49.*
carnea Dum. *Cours. cot. cult. 2. ed. V, 478.*
trichocarpa Waitz in *Tratt. Ros. monogr. II, 45.*
- *) 132. 5 *saxatilis* Stev. in *Bieb. fl. taur. cauc. III, 348.* Krim.
β) *laevis* Bess. *enum. pl. Volh. et Pod. 65.*
- *) 133. 5 *leucantha* Bieb. *fl. taur. cauc. III, 352.* Caucasus.
Biebersteiniana *Tratt. Rosac. monogr. II, 5.*
caucasica β. Lindleyana Ser. in *DC. prodr. II, 615.*
Chamaerhodon ζ. leucantha Wallr. *Ros. hist. succ. 27.*
134. 5 *collina* Jeq. *fl. austr. II. t. 197.* Europa, Oriens.
albiflora Steud. *nom. bot. ed. 2. II, 465 (nec Stev. abs quo nulla planta hujus nom. descr. aut indic.).*
? baltica Roth *tent. fl. germ. II, 464.*
Borkhausenii Gaud. (*ubi?*)
canina γ. collina Koch *syn. ed. 2. 250.*
Cynórrhodon b. dumetorum (exp.) Wallr. *Ros. hist. succ. 210.*
dumetorum Ten. *fl. Napl. IV, 286.*
montana Stev. in *Bieb. fl. taur. cauc. III, 353.*
puberula Dsv. (*ubi?*)
pubescens Lem. *Lis. not. gén. et rem. part. 15.*
taurica Bieb. *fl. taur. cauc. I, 394.*
villosa Hegetschw. *Fl. d. Schw. 475.*
β) *Andrzejowskii* Bieb. *fl. taur. cauc. III, 339.*
Andreiovii Stev. in *Bess. suppl. III, ad cat. pl. hort. Crem. 19.*
γ) *fastigiata* Bast. *suppl. à l'ess. s. la fl. du dép. de M. et Loire 30.*
canina fastigiata Dsv. *journal. de bot. 1813. II, 114.*
flexuosa Rau *enum. Ros. c. Wirceb. 127. (teste Rehb.)*
scandens ε. fastigiata Wallr. *Ros. hist. succ. 195.*
δ) *humilis* Bess. in *suppl. IV. ad cat. pl. hort. Crem. 19.*
Ratomsciana Bess. *enum. pl. Volh. Pod. 61.*
ε) *Kosinskiana (nec Kosciuskiana Lk)* Bess. *cat. pl. hort. Crem. 1819. (teste Led.)*
ζ) *Iundzilli (Iundzilliana Bess.)* Bieb. *fl. taur. cauc. III, 107.*
Chamaerhodon c. thuringiaca Wallr. *Ros. hist. succ. 208.*
glandulosa Bess. *suppl. III. ad cat. pl. hort. Crem. 20.*
nitidula Bess. *suppl. IV. ad cat. pl. hort. Crem. 20.*
γ) *palescens* Woods in *transact. of the Linn. soc. XII, 219.*
δ) *sempervirens* Rau *enum. Ros. circa Wirceb. 120.*
Rau *Tratt. Ros. monogr. II, 35.*
ι) *trachyphylla* Rau *enum. Ros. circa Wirceb. 124.*
biserrata Mér. *nouv. fl. d. env. de Par. 190.*

135. 5 *psilophylla* Rau en. Ros. c. Wirceb. 101. Gr. et G. fl. de Fr. I, 558. Gallia, Germania, Scandinavia.
Acharii Billb. Svensk bot. t. 517.
pratensis Swartz (sed ubi?).
136. 5 *dumetorum* Thuill. fl. d. env. de Par. ed. 2. 250. engl. bot. t. 2610. Europa, Oriens.
arvensis Wib. prim. fl. Werthem. 263.
campestris Swartz (teste Koch, sed ubi?).
canina γ. *dumetorum* Pers. syn. pl. II, 50.
collina DC. fl. franç. IV, 441.
coriacea Opiz in Flora V, 268.
corymbifera Borkh. (teste Koch, sed ubi?)
Cynórrhodon b. *collina* Wallr. Ros. hist. succ. 212.
Friedlaenderiana Bess. enum. pl. Volh. Pod. 46.
Hillebrandtii Weitenw. in Ortm. Beitr. z. Fl. v. Boehm.
laciniata Lej. (teste Rchb., sed ubi?)
pilosa Hegetschw. Fl. d. Schw. 475.
sepium Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1327.
sylvestris Luc. fl. Osil. 169.
umbellata Lib. in Lej. fl. d. env. de Spa II, 313.
β) *affinis* Rau enum. Ros. c. Wirceb. 79.
 canina Wib. prim. fl. Werthem. 264.
 lanceolata Opiz in Flora V, 268.
 urbica Lem. Lis. dis. not. gén. et rem. part. Nro. 5.
γ) *fastigiata* Lej. fl. d. env. de Spa II, 314. (teste Lej.)
δ) Forstéri Sm. in engl. bot. t. 2611.
ε) *frondosa* Stev. in Spr. syst. veget. II, 554.
ζ) *frutetorum* Bess. suppl. III. ad cat. pl. hort. Crem. 20.
η) *platyphylla* Rau enum. Ros. c. Wirceb. 82.
θ) *solstitialis* Bess. prim. fl. Galic. I, 324.
 sepium Rau enum. Ros. c. Wirceb. 90.
 sylvestris Rchb. fl. exc. 620.
ι) *uncinella* Bess. suppl. IV. ad cat. pl. hort. Crem. 20.
137. 5 *mollis* Wender. Bem. ueb. versch. Pfl. d. bot. G. zu Marb. Germania (Hassia).
138. 5 *acuta* Fisch. in Sweet hort. brit. 180. Patria ignota.
139. 5 *purpurascens* Fisch. in Sweet hort. brit. 180. Patria ignota.
140. 5 *rupincola* (*rupicola* Steud.) Fisch. in Sweet hort. brit. 180. Patria ignota.
141. 5 *Bronneri* Dierb. syst. Ueb. d. um Heidelb. wildw. Gew. 175. Germania austro-occid.
142. 5 *Nebrodensis* Guss. fl. sic. syn. I, 563. Sicilia.
143. 5 *caucasica* (*caucasea* Lindl.) Bieb. fl. taur. cauc. I, 400. Transcaucasia.
144. 5 *microcarpa* Thunb. in Hoffm. phytogr. Bl. I, 40. Sibiria.
145. 5 *campestris* Dumort. fl. belg. prodr. 93. Belgia.
146. 5 *cinerascens* Dumort. fl. belg. prodr. 93. Belgia.
147. 5 *canina* L. cod. Nro. 3744. engl. bot. t. 992. Europa, ? Oriens.
Cynórrhodon c. *bifrons* et d. *canina* Wallr. Ros. hist. succ. 221.
dumalis Bechst. Forstbot. 214 et 939.
serpens Gilib. fl. lith. V, 238.
stipularis Mér. nouv. fl. d. env. de Par. 192.
Swartzii Fries in svensk. bot. VIII. t. 541. (teste Bert.)
Teneriffensis Donn hort. Cantabr. ed. 8. 169.
α) *aciphylla* Rau enum. Ros. c. Wirceb. 69. Red. et Th. Ros. II, 31. c. ic.
 Acharii Billb. in svensk bot. t. 517 (teste Fries).
β) *Arnidae* B. Webb et Berth. phytogr. canar. II, 16.
γ) *balsamica* Willd. hort. Berol. suppl. 38.
 alpina m. *balsamica* Wallr. Ros. hist. succ. 139.
 canina glandulifera Woods in transact. of the Linn. soc. XII, 225.
 Malmundariensis Red. et Th. Ros. II, 33. Lej. fl. d. env. de Spa I, 231.
δ) *Bourboniana* Dsv. (teste G. Don dichl. pl. II, 579.)
 gallica borbonica Red. et Th. Ros. I, 74.
ε) *calýcina* Bieb. fl. taur. cauc. III, 349.
ζ) *cérea* Woods in transact. of the Linn. soc. XII, 224.
η) *flore pleno*.
θ) *glaucescens* Lej. fl. d. env. de Spa II, 313.
 glaucifolia Opiz in Flora V, 268.
ι) *grandiflora* Red. et Th. Ros. III, 76. c. ic.
κ) *hirtella* Gr. et G. fl. de Fr. I, 558.
 ambigua Lej. rev. de la fl. d. env. de Spa 98.
 Andegavensis Bast. ess. s. la fl. du dép. de Maine et Loire 189.

- λ) *leucantha* Lej. rev. de la fl. d. env. de Spa II, 347. (teste Lej. et Court.)
 μ) *mitis* Wirtg. in Flora XX, 251.
 ν) *nitens* Dev. in MÉR. nouv. fl. d. env. de Par. 192.
 ξ) *nuda* Woods in transact. of the Linn. soc. XII, 205.
 ο) *pilosa* Opiz in Flora V, 263.
 π) *pilosiuscula* Opiz in Flora V, 268.
 ρ) *rubiflora* Ser. in DC. prodr. II, 614.
 ο) *sarmentacea* Woods in transact. of the Linn. soc. XII, 213. engl. bot. t. 2595.
 canina Roth tent. fl. germ. I, 118 (teste Woods).
 Cynorrhodon g. cinerascens Wallr. Ros. hist. succ. 231.
 τ) *simpliciuscula* Woods in transact. of the Linn. soc. XII, 226.
 υ) *surculosa* Woods in transact. of the Linn. soc. XII, 228.
 φ) *sylvatica* Wirtg. in Flora XX, 251.
 χ) *umbellata* Poir. enc. méth. VI, 288. Lej. fl. d. env. de Spa II, 313.

Not. Sub nomine *R. polymorphae* in Spenneri flora Friburgensis (III, 769—775)

- omnes species germanicae hujus sectionis in una specie conjunctae sunt.
 148. 5 *bractescens* Woods in transact. of the Linn. soc. XII, 216. Anglia.
 149. 5 *erubescens* Andr. Ros. fasc. 30. Tratt. Ros. mon. II, 6. Patria ignota.
 150. 5 *sancta* A. Rich. tent. fl. Abyss. I, 262. Abyssinia.
 151. 5 *glaberrima* Dumort. fl. belg. prodr. I, 94. Belgia.
 152. 5 *caesia* Sm. in engl. bot. t. 2367. Europa media et borealis.
 Afzeliana Fries fl. Halland. 86.
 Cynorrhodon e. venosa et *h. squarrosa* Wallr. Ros. hist. succ. 226. 232. 236.
 glauca Schott in Bess. enum. pl. Ped. et Volh. 60. et
 Lej. rev. de la fl. d. env. de Spa II, 99.
 glaucescens Bess. enum. pl. Pod. et Volh. 19.
 Lutetiana Lem. Lis. not. gén. et rem. partic. 11.
 neglecta Tratt. Ros. monogr. II, 162.
 podolica Tratt. Ros. monogr. II, 71.
 senticosa Achar. in Vet. ac. Handl. 1812. 91. t. 3. svensk. bot. t. 475.
 venosa Swartz in Spr. syst. veget. II, 554.
 153. 5 *sepium* Thuill. fl. d. env. de Par. ed. 2. 252. engl. bot. t. 2653. Europa.
 canina β. *sepium* Koch syn. ed. 2. 252.
 Cynorrhodon o. sepium Wallr. Ros. hist. succ. 239.
 helvetica Hall. fl. in Roem. Arch. I, 2. 6.
 macrocarpa Mérat nouv. fl. d. env. de Par. 190.
 rubiginosa glabra Rau enum. Ros. circa Wirecb.
 - *sepium* DC. prodr. II, 617.
 β) *balsamica* Bess. suppl. IV, ad cat. hort. Crem. 18.
 Kluckii Bess. enum. pl. Volh. et Pod. 46.
 glutinosa Schultz prodr. fl. Stargard. suppl. I.
 grandiflora Wallr. ann. bot. 66.
 stylosa glandulosa Ser. in DC. prodr. II, 599.
 γ) *intermedia* Dsv. journ. de bot. a. 1813. II, 117.
 δ) *lanceifolia* Dsv. journ. de bot. a. 1813. II, 116.
 ε) *microcarpa* Dsv. journ. de bot. a. 1813. II, 116.
 ζ) *myrtifolia* Hall. fl. in Red. et Th. Ros. III, 51.
 agrestis Sav. fl. Pis. 745.
 ? *albiflora* Opiz in Flora V, 168.
 rubiginosa β. Guss. prodr. fl. sic. I, 565.
 154. 5 *heterocarpa* Opiz in Flora VII, 525. Bohemia.
 155. 5 *hispanica* Boiss. et Reut. png. pl. nov. Afr. bor. et Hisp. 44.
 canina Boiss. voy. d. le mid. de l'Esp. II, 207.
 156. 5 *armata* Stev. in Bess. enum. pl. Volh. et Pad. 62. Ros. mon. II, 224. Podolia.
 157. 5 *inodora* Fries nov. fl. suec. ed. 1. 9. Europa media et bor.
 Borreri Woods in transact. of Linn. soc. XII, 210.
 Cynorrhodon b. γ. inodora Wllr. Ross. hist. succ. 214.
 dumetorum Sm. in engl. bot. t. 2579.
 grandiflora Wallr. ann. bot. 66. (teste Rehb.)
 rubiginosa inodora Lindl. Ros. monogr. 88.
 tomentella Lem. Lis. not. gén. et rem. part. Nro. 14.
 158. 5 *mierantha* Sm. in engl. bot. t. 2490. Gallia, Britannia, Italia.
 rubiginosa mierantha Lindl. Ros. monogr. 87.
 - *parvifolia* Willd. hort. Ber. 546.
 β) *gravéolens* Gr. et G. fl. de Fr. I, 560.
 γ) *Seraphini* (nec *Serafinii*). Viv. app. ad fl. Lib. 67.

- cretica* c. *Seraphinii* Willr. Ros. hist. succ. 145.
graveolens β. *corsica* Gr. et G. fl. de Fr. I, 561.
rubiginosa Mor. stirp. sard. el. I, 18.
sicula Tratt. Ros. mon. II, 86.
159. 5 *viscosa* Jan. cat. rer. natur. in mus. exst. 8. Sicilia, Hispania.
 * 160. 5 *rubiginosa* L. cod. Nro. 3732. engl. bot. t. 991. Europa, Oriens.
Cynorrhodon δ. *Aiglanteria* Wall. Ros. hist. succ. 216.
Eglañteria Mill. dict. Woods in transact. of the Linn. soc. XII, 206.
suavifolia Lightf. fl. scot. 262. fl. dan. t. 870.
- β) *aculeatissima* Dum. Cours. bot. cult. 1. éd. III.
áspera Hegetschw. Fl. d. Schw. 477.
- γ) *elliptica* Tausch in Tratt. Ros. mon. II, 69.
rubiginosa Gu. et H. deutsche Holzarzt. I, 121. t. 91.
- * δ) *foribunda* Stev. in Bieb. fl. taur. cauc. III, 343.
- ε) *inermis* Dsv. journ. de bot. a. 1813. II, 118.
sepium Hegetschw. Fl. d. Schw. 477.
- ζ) *microcarpa* Dsv. journ. de bot. a. 1813. II, 118.
- η) *olivina* Dsv. journ. de bot. a. 1813. II, 118.
- θ) *ovariis nudis* Lej. rev. de la fl. d. env. de Spa 96.
- ι) *plena*; *rubiginosa* Zabeth Hort. et Red. et Thor. Ros. II, 5. c. ic.
concaevifolia Waitz in Tratt. Ros. monogr. II, 66.
rubiginosa anemonaeflora Thor. prodr. Ros. 110.
- κ) *pseudo-rubiginosa* Lej. fl. d. env. de Spa I, 229.
cuspidata Rchb. fl. exc. II, 616. (teste Rchb.)
- λ) *resinosa* Lej. rev. de la fl. d. env. de Spa 96.
- * μ) *rotundifolia* Rau enum. Ros. 136.
- ν) *sphaerocarpa* Dsv. journ. de bot. a. 1813. II, 118.
- * ξ) *umbellata* Leers fl. Herb. 119.
Eglañteria Andr. Rosc. fasc. 28.
Evratina Poir. enc. méth. bot. IV, 714. (teste Rchb.)
rubiginosa Jcq. fl. austr. I, 31. t. 50.
sempervirens Roth tent. fl. Germ. I, 218.
tenuiglandulosa Mér. nouv. fl. d. env. de Par. 189.
villosa Evrathina Red. et Thor. Ros. t. 48. (teste Rchb.)
- ο) *Vaillantiana* Red. et Th. Ros. III, 95. c. ic.
161. 5 *Maerklini* Dierb. syst. Uebers. d. Gew. v. Heidelb. 173. Germania austr.-occid
 162. 5 *caryophyllácea* Bess. suppl. IV. ad cat. hort. Crem. 18. Podolia, Belgia, Gallia.
Libertiana Tratt. Ros. monogr. II, 80.
memoralis Lem. Lis. not. gén. et rem. part. 12.
memorosa Lej. fl. d. env. de Spa II, 311.
rubiginosa β. *memoralis* Red. et Th. Ros. II, 23. c. ic.
163. 5 *Libanótica* Boiss. diagn. pl. nov. orient. X, 4. Syria.
 164. 5 *iberica* Stev. in Bieb. fl. taur. cauc. III, 345. Transcaucasia,
cretica e. *Sabinae* Wallr. Ros. hist. succ. 146. Asia minor.
Isaurae Tratt. Ros. mon. II, 72.
- rubiginosa* ζ. *Isaureae* Red. et Th. Ros. I, 94.
- * 165. 5 *pulverulenta* Bieb. fl. taur. cauc. I, 399. ic. cent. rar. ross. t. 62. Transcaucasia,
majalis x. *pulverulenta* et *Biebersteiniana* Wallr. hist. Ros. succ. 127. Armenia.
praecox Lodd. cat. (teste Wallr.)
- * 166. 5 *hórrida* Fisch. catal. pl. hort. Gorink. 66. Transcaucasia.
Biebersteinii Lindl. in transact. of the hort. soc. VI, 89.
ferox Bieb. fl. taur. cauc. III, 339. cent. pl. rar. ross. I, t. 37.
provincialis Bieb. fl. taur. cauc. I, 396.
167. 5 *glutinosa* S. et Sm. prodr. fl. gr. I, 348. fl. gr. t. 482. Italia inf., Sicilia,
cretica Tratt. Rosac. monogr. II, 83. Red. et Th. Ros. I, 124. Graecia, ins. Archipel.
orientalis Wallr. Ros. hist. succ. 147.
 ? *ferox* Hort. angl. in Dum. Cours. bot. cult. V, 488.
rubiginosa cretica Red. et Th. Ros. I, 93. 125. c. ic.
168. 5 *sericea* Lindl. Rosac. mon. 105. t. 12. Himalaya.
tetrapétala Royle ill. of the him. mount. 23.
Wallichii Tratt. Ros. monogr. II, 193.
169. 5 *gymnocarpa* Nutt. in Torr. and Gr. fl. of N. Amer. I, 461. America bor.-occid.
 * 170. 5 *suavéolens* Pursh fl. Amer. sept. I, 346. America foederata.
Eglañteria americana Andr. Ros. fasc. 18.
rubiginosa T. and Gr. fl. of N. Amer. 461.
suavis c. *suaveolens* Wallr. Ros. hist. succ. 129.

171. 5 *Montezumae* H. B. et K. nov. gen. et sp. amer. VI, 222. Red. Mexico.
et Th. Ros. I, 55. c. ic.
canina *Montezumae* Ser. mus. helv. I, 22.
172. 5 *Heckeliana* Tratt. Ros. monogr. II, 85. (nec *Heckeliana* Guss.) Sicilia.
brachycarpa Jan. el. pl. hort. Parm. (nec *bradycarpa* Guss.)
173. 5 *pustulosa* Bert. fl. ital. V, 195. Italia inferior, Sicilia.
pulverulenta Ten. fl. napl. IV, 287.
- * 174. 5 *lanceolata* Munch. Verz. ausl. B. u. Str. d. Lustschl. Weiss. 181. Europa.
alba Fl. d. Welt II, 232.
montana DC. fl. franç. V, 532.
pomifera sylvestris Herrm. diss. de Ros. 16.
scabriuscula Sm. in engl. bot. t. 1869. Fries nov. fl. suec. mant. III, 199.
syvestris Lindl. syn. of the brit. fl. 101.
tomentosa Koch syn. ed. 2. 253.
umbelliflora Swartz (ubi?).
villosa a. mollissima et d. *villosa* Wallr. Ros. hist. succ. 247, 250.
β) *canescens* Woods in transact. of the Linn. soc. XII, 202.
γ) *Clusiana* Waitz in Tratt. Ros. monogr. II, 119.
 alpina n. Clusiana Wallr. Ros. hist. succ. 140.
δ) *farinosa* Bechst. Forstb. 243 et 1046. Red. Ros. III, 63. c. ic.
ε) *heterophylla* Woods in transact. of the Linn. soc. XII, 195.
ζ) *hispida* Borkh. Forstb. II, 1332.
 Borkhausenii Tratt. Rosac. mon. II, 114.
 villosa c. hispida Willr. Ros. hist. succ. 249.
η) *hybrida* Woods in transact. of the Linn. soc. XII, 201.
θ) *incana* Woods in transact. of the Linn. soc. XII, 202.
ι) *marginata* Wallr. ann. bot. 68.
 villosa g. marginata Wallr. Ros. hist. succ. 253.
κ) *mollissima* Willd. prodr. fl. Berol. 437.
 cuspidata Rchb. fl. exc. II, 616. (teste Rth.)
 dubia Wib. prim. fl. Werthem. 263 et 350.
 villosa DC. fl. franç. IV, 440.
 - *mollissima* Pers. syn. pl. II, 48.
λ) *pulchella* Woods in transact. of the Linn. soc. XII, 196.
μ) *syvestris* Woods in transact. of the Linn. soc. XII, 202.
ν) *terebinthinacea* (*terebinthina* Tratt.) Bess. en. pl. Volh. Pod. 21.
 villosa terebinthina Red. et Th. Ros. II, 71. c. ic.
 ε) *tomentosa* Sm. br. fl. II, 539. engl. bot. 990. Red. et Th. Ros. 39. c. ic.
175. 5 *foetida* Bast. suppl. Ft. de M. et L. 29. Gr. et G. f. de Fr. I, 559. Gallia.
rubiginosa A. foetida Dsv. obs. s. l. pl. d. env. d'Ang. 156.
Red. et Th. Ros. I, 130.
scandens c. foetida Wallr. Ros. hist. succ. 192.
- * 176. 5 *cuspidata* Bieb. fl. taur. cauc. I, 396. Transcaucasia.
dimorpha Bess. suppl. III. ad cat. pl. hort. Crem. 1811. 19.
177. 5 *Sherardi* Dav. welsh botan. 49. Anglia.
subglobosa Sm. engl. fl. II, 384.
tomentosa α et γ Woods in transact. of the Linn. soc. XII, 201.
- * 178. 5 *ciliato-pétala* Bess. enum. pl. Volh. Pod. 66. Koch syn. 253. Rossia austro-occid.,
? *crética* Tratt. Rosac. mon. II, 83. Scandinavia, Germania.
mollissima Fries nov. fl. succ. ed. 2. 151.
resinosa Sternb. in Flora IX, 1. Beil. 1. 76.
villosa h. ciliata Wallr. Ros. hist. succ. 254.
- * 179. 5 *villosa* L. cod. Nro. 3738. engl. bot. t. 2459. Germania australis,
hispanica Mill. dict. Gallia, Helvetia,
hispida Poir. enc. méth. bot. VI, 286. Italia superior.
mollis Sm. engl. bot. t. 2459.
pomifera Koch syn. ed. 2. 253.
- *domestica* Herrm. diss. de Rosa 17.
villosa i. pomifera Wallr. Ros. hist. succ. 254.
β) *coerulea* Woods in transact. of the Linn. soc. XII, 192.
γ) *concaevifolia* Woods in transact. of the Linn. soc. XII, 192.
δ) *suberecta* Woods in transact. of the Linn. soc. XII, 192.
180. 5 *collina* Lej. fl. d. env. de Spa II, 313 (nec Jeq.) Belgia.
181. 5 *mollis* Led. in mém. de l'ac. de Pétersb. V, 541. Isthm. caucasicus.
182. 5 *coriifolia* Fries novit. fl. succ. 33. Scandinavia.

- canina grandiflora* Red. et Th. Ros. mon. III, 76. (teste Rehb.)
collina γ. *coriifolia* Wahlenb. fl. succ. I, 315.
crassifolia Wallm. in Liljebl. sw. fl. 189.
Cynorrhodon a. *coriifolia* Wallr. Ros. hist. succ. 208.
sepium Swartz in summ. veg. scand. 18.
 183. 5 *incana* Kit. in Schult. oesterr. Fl. II, 70.
 184. 5 *Arduennensis* Lej. fl. d. env. de Spa II, 340, in ind.

G. Species minus cognitae.

185. 5 *acantha* Waitz in Lk enum. pl. hort. Berol. II, 60. (s. descr.) Patria ignota.
 186. 5 *amoena* Waitz in Lk enum. pl. hort. Berol. II, 60. (s. descr.) Patria ignota.
 187. 5 *arborea* Pers. syn. pl. II, 50. (nec, teste Steud., *bracteatae* var.) Persia.
 * 188. 5 *baicalensis* Turcz. (teste Steud., sed ubi?)
 189. 5 *echinata* Waitz in Lk enum. pl. hort. Berol. II, 60. (s. descr.) Patria ignota.
 190. 5 *Fischeriana* Bess. in Lk enum. pl. hort. Berol. II, 60. (s. descr.) Patria ignota.
 191. 5 *glabra* Meyen Reise um d. Erde II, 302. (frustra quaes.)
 Meyeniana Steud. nom. bot. ed. 2. 470.
 192. 5 *Hookeriana* Wall. (teste Steud.) India orientalis.
 193. 5 *Leeana* Sweet (teste Steud.) Patria ignota.
 194. 5 *Moorcroftii* Wall. (teste Steud.) India orientalis.
 195. 5 *oblongifolia*, Dum. Cours. bot. cult. ed. 2. V, 488.
 nova Dum. Cours. bot. cult. ed. 1. III, 351. Patria ignota.
 196. 5 *pruinosa* Lindl. (teste Steud.) Sibiria.
 197. 5 *pubescens* Fisch. (teste Steud.) Patria ignota.
 198. 5 *Redowskiana* Bess. in Sweet. Patria ignota.
 199. 5 *rubripétala* Roem. in hort. Turic. Patria ignota.
 200. 5 *setosa* Bess. in Lk enum. pl. hort. Berol. II, 60. (s. descr.) Patria ignota.
 201. 5 *simplex* Scop. fl. carn. ed. 2. I, 353.
 Scopoliana Tratt. Ros. monogr. II, 229.
 202. 5 *sylvestris* Crantz stirp. austr. hist. II. Austria.
 203. 5 *viscida* Tausch (teste Steud.) Bohemia.
 Not. Praeterea in horto nostro dendrologico species aut varietates, nobis non satis notae, coluntur sequentes: 1) *botryóphora* Hort., 2) *platyacantha*, 3) *platyacantha* e monte Alatau, 4) *tenuifolia* Hort.

XXXVIII. *Hulthemia* Dumort.

(van Hulthem, bibliophilus et curator universitatis belgicae Gent, † 1842.)

1. 5 *berberifolia* Dumort. not. sur un nouv. g. d. pl. 13. Tataria, Sibiria austral.
Rosa berberifolia Pall. in nov. act. acad. Petrop. X, 379. t. 10. f. 5.
 - *monophylla* Dum. Cours. bot. cult. ed. 1. III, 351
 - *persica* Michaut (nec Michaux) in Juss. gen. pl. 452. (ed. Ust. 327.)
 - *simplicifolia* Salisb. parad. Londin. t. 101.
Lówea berberifolia Lindl. in bot. reg. t. 1261.
 β) *velútina* Ser. in DC. prodr. II, 602.

Fam. 59. *Amygdaleae*.XXXIX. *Amygdalus*.

(ἀμυγδαλή apud Theophrastum, amygdala, Mandel; amygdalus apud Latinos: Mandelbaum.)

A. *Spartioides* (Stam. 20—40; Fol. floribus seriora; Ramuli stricti erecti; Calyx. campanulatus.)

1. 5 *arabica* Oliv. voy. d. l'emp. othom. III, 460. t. 47. Jaub. et Sp. illustr. pl. or. III. t. 226. Arabia, Mesopot.
 2. 5 *spartioides* Spach in ann. d. sc. nat. XIX, 107. Syria, Mesop., Persia.
 3. 5 *agrestis* Boiss. diagn. pl. orient. nov. X, 1. Coelesyria.
 4. 5 *scoparia* Sp. in ann. d. sc. nat. XIX, 109. Laristan (Persia.).

B. *Chamaemygdalus* (Stam. 20—40; Fol. floribus coaet. vel vix seriora; Cal. cylindraceus.)

- * 5 5 *nana* L. cod. Nro. 3621. Pall. fl. ross. I. t. 6. bot. mag. t. 161. Rossia (prov. bor. exceptis), isthmus caucasicus, Sibiria.
Persica nana Mill. dict.
Prunus inermis Gmel. (teste Loud.)
 β) *biserrata* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. XIX, 110.
 γ) *flore albo*.

- * δ) flore purpureo.
 ε) latifolia Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. XIX, 110.
 ζ) sibirica Tausch in Flora XVII, 490. et ? Lodd. cat.
- * 6. 5 campestris Bess. enum. pl. Volh. Pod. 46. Volhynia, Hungaria.
 nana β. campestris Ser. in DC. prodr. II, 530.
 - β. latifolia Led. fl. alt. II, 209.
 Bessariana Schott in cat. pl. hort. Vindob. 1818.
- * 7. 5 georgica Dsf. hist. d. arbr. et arbriss. II, 221. St. Hil. fl. Transcaucasia.
 et pom. fr. t. 364.
- nana γ. georgica Ser. in DC. prodr. II, 530.
- * 8. 5 humilis Edgew. in transact. of the Linn. soc. XX, 44. Himalaya.
- C. Euamýgdalus** (Stam. 20—40; Fol. flor. seriora; Rami divar. vel patentés, nec virgati).
- * 9. 5 communis L. cod. Nro. 3619. Oriens, Africa borealis.
- β) amara Hayne Arzn. IV, t. 39. f. 1.
 γ) Amygdalo-pérsica nouv. Duh. IV, 112.
 persicoides Ser. in DC. prodr. II, 531.
 compressa Hort.
 hybrida Dierb. syst. Uebers. d. u. Heid. wildw. cult. Gew. 129.
 Persico-Amýgdala Rechb. fl. exc. 647.
- δ) dulcis DC. fl. franç. IV, 486.
 microcarpa in nouv. Duh. IV, 112.
- ε) flore pleno.
 ζ) foliis variegatis.
- η) fragilis Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1377.
 dulcis Mill. dict.
- θ) lanceaefolia Hort.
- ι) macrocarpa nouv. Duh. IV, 112. bot. reg. t. 1160.
 sativa Mill. dict.
10. 3 cochinchinensis Lour. fl. coch. 387. Cochinchina.
11. 5 Tournefortii Bosc in nouv. cours d'agric. Asia minor, Persia.
12. 5 Kotschyi Hohenack. in ann. d. sc. nat. 2. sér. XIX, 117. Carduchia.
13. 5 Webbii Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. XIX, 117. Asia minor.
14. 5 orientalis Mill. dict. Ait. hort. Kew. ed. 1. II, 162. Syria.
 argentea Lam. in encycl. méth. I, 102.
 β) discolor Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. XIX, 117.
15. 5 eleagnifolia Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. XIX, 120. Persia.
16. 5 leiocarpa Boiss. diagn. pl. orient. nov. VI, 52. Persia.
- D. Léptopus** (Stam. 20—40; Fol. floribus coaetanea; Cal. campanulatus).
17. 5 pedunculata Pall. in nov. act. acad. Petrop. VII, 355. t. 8. 9. Sibiria.
 β) multiplex Bge in mém. d. étr. de St. Pétersb. II, 96.
 γ) polygyna Bge in mém. d. étr. de St. Pétersb. II, 96.
18. 5 pilosa Turcz. dec. pl. Chin. 10. Mongolia.
19. 5 microphylla H. B. et K. nov. gen. et spec. amer. VI, 245. t. 564. Mexico.
- * 20. 5 glandulosa Hook. icon. pl. t. 288. Texas.
 Prunus glandulosa T. and Gr. fl. of N. Amer. I, 408.
- E. Lycioides** (Stamina 10—20; Folia tenuia, plana).
21. 5 lycioides Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. XIX, 120. Syria, Asia minor.
22. 5 hórrida Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. XIX, 121. Persia.
- F. Scorpius** (Stam. 10—20; Folia crassa, coriacea).
23. 5 Scorpius Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. XIX, 122. Persia australis.
24. 5 eburnea Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. XIX, 123. Persia australis.
25. 5 furcata Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. XIX, 124. Persia australis.
26. 5 spathulata Boiss. diagn. pl. orient. nov. VI, 53. Persia australis.
- G. Species minus cognitae.**
27. 5 Fischeriana Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. XIX, 125. Patria ignota.
28. 5 Bovei Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. XIX, 124. Syria.
29. 5 collina Wall. num. list. India orientalis.
30. 5 sinensis Hort. China.
31. 5 frutescens (nec frutescens Spach) Wender. Bem. ueb. versch. Patria ignota.
 Pfl. d. bot. Gart. zu Marb. Africa.
32. 5 pumila L. cod. Nro. 3620. (nec autor., quae Cerasus japon. Lois.)

- * 33. 5 tomentósula Hort. Spach in ann. d. sc. nat. 2. ser. XIX, 125. Patria ignota.
Not. Praeterea in horto nostro dendr. colitur, nobis non satis nota: *A. laurifolia* Hort.

XL. *Pérsica* Tourn.

(*persica malus* s. *persicus* apud Plinium: Pfirsichbaum, e Persia translata.)

- * 1. 3 5 vulgaris Mill. dict. ? Persia, ? China.
Amygdalus Pérsica L. cod. Nro. 3618. Nois. jard. fruit.
t. 1—26. 22—35.
- * α) *Aganopersica* Rehb. fl. exc. 647.
β) *compressa* Hort. in transact. of the hort. soc. IV, t. 19.
γ) *flore albo* Ldl. in bot. reg. t. 1586.
δ) *flore pleno* Hort.
ε) *foliis variegatis*.
- * ζ) *pumila* Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1387.
nana Dsf. tabl. de l'éc. de bot. 180.
- * η) *Scleropersica* s. *durácina* Rehb. fl. exc. 647.
- * 2. 3 5 laevis DC. fl. franc. IV, 487. Persia.
Ispahamensis Thouin (ubi?).
Amygdalus Pérsica Lam. enc. méth. I, 100.
- *Pérsica* β. *nectarina* Ait. hort. Kew. ed. 2 III, 194.
- *Nucipersica* Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. I, 1394.
β) *nucleo adhaerente*; *sympyrena* Mor. fl. sard. II, 7.
3. 5 *saligna* Royle ill. of the him. mount. 204. Himalaya, Cashmir.
4. 3 *cordifolia* C. Koch. India orientalis.
Amygdalus cordifolia Rxb. fl. ind. II, 500.

XLI. *Pygéum* Gaertn.

(πυγη, nates, der Hintere, ob drupam in gibbam rotunditatem pulvinatam.)

1. 3 *acuminatum* Colebr. transact. of the Linn. soc. XII, 360. t. 18. India orientalis, Java.
? *Polyodontia arbórea* Blume bijdr. 1104.
2. 3 *zeylanicum* Grtn. de sem. et fruct. I, 218. t. 46. f. 4. Ceylon.

XLII. *Armeniaca* Tourn.

(*armeniaca* sc. arbor apud Latinos: Apricosenbaum, quae ex Armenia in Italia introducta dicitur.)

- * 1. 3 vulgaris Lam. enc. méth. I, 2. Nois. jard. fruit. t. 1. f. 1. 2.
t. 2. f. 1. 2. Oriens, China
Epirotica Fl. d. Wett. II, 167. (teste Rxb.) et forte
Prunus Armeniaca L. cod. Nro. 3628. Asia centralis.
β) *cordifolia* Ser. in DC. prodr. II, 532.
γ) *flore pleno*.
δ) *foliis variegatis*.
ε) *lusitana* Dum. Cours. bot. cult. ed. 2 V, 544.
ζ) *macrocarpa* Dsf. tabl. de l'éc. de bot. 179.
persicoides Pers. syn. pl. II, 36.
η) *praecox* Pers. syn. pl. II, 36.
θ) *semine amaro, nucleo adhaerente*.
ι) *semine amaro, nucleo secedente*.
κ) *semine dulci, nucleo adhaerente*.
λ) *semine dulci, nucleo secedente*.
- * 2. 3 *dasycarpa* Pers. syn. pl. II, 36. ? Oriens, ? China.
atropurpúrea Lois. in nouv. Duh. V, 172. t. 551. f. 1.
Prunus dasycarpa Ehrh. Beitr. VI, 90. bot. reg. t. 1243.
- *Armeniaca nigra* Dsf. tabl. de l'éc. de bot. 179.
β) *persicifolia* Lois. in nouv. Duh. V, 172. t. 552. f. 1. (nec DC.)
3. 3 *durácina* Dierb. syst. Uebers. d. u. Heid. widw. cult. Gew. 133. Patria ignota.
Prunus Amarella Rehb. fl. exc. II, 646.
Armeniaca vulgaris α. *ovalifolia* Ser. in DC. prodr. II, 532.
- * 4. 5 *sibírica* Pers. syn. pl. II, 36. Sibiria.
Prunus sibirica L. cod. Nro. 3629. Pall. fl. ross. I, 15. t. 8.
- * 5. 3 *Brigantiaca* Pers. syn. pl. II, 36. nouv. Duh. V, t. 59. Gallia meridionalis,
Prunus Brigantiaca Vill. hist. d. pl. de Dauph. III, 535. Italia,
Texas.
6. 5 *minutiiflóra* C. Koch. Japania.
Prunus minutiiflóra Engelm. in Bost. journ. of nat. hist. VI, 185.
7. 5 *Mume* (Mumme) C. Koch.

Amygdalus nana Thunb. fl. jap. 199.
Prunus Mume S. et Z. fl. jap. I, 29. t. 11.

XLIII. *Prunus* L.

(προυνός s. προυνή, prunus, Pflaumenbaum; derivatio a. v. πρῖνος, igneus, ob prunorum colorem, dubia.)

- * 1. 5 *spinosa* L. cod. Nro. 3635. engl. bot. 842. Europa, isthm. caucas.
Acacia Crntz stirp. austr. II, 58.
Druparia spinosa Clairv. man. d'herb. en Suisse 160.
sylvestris Mill. dict.
 β) *arborescens* Dierb. syst. Uebers. d. u. Heidelb. wildw. cult. Gew. I, 135.
 γ) *candicans* Bess. enum. pl. Volh. Pod. 58.
 δ) *coactanea* Wimm. et Grab. fl. sil. II, 1. 10.
 ε) *flore pleno*.
 ζ) *foliis variegatis*.
 η) *fructu albo; leucocarpa* Bechst. Forstbot. 658.
 θ) - *dulci*.
 ι) - *viridi*.
 κ) *ovata* Ser. in DC. prodr. II, 533.
 λ) *subinermis* Mor. fl. sard. II, 11.
 insititia Mor. stirp. sard. elench. I, 18.
2. 5 *fruticans* Weihe in Flora IX, 2. 748. Gr. et G. fl. de Fr. I, 514. Germania, Gallia.
 ? *sphaerica* Willd. Berl. Baumz. 2. Aufl. 315. (teste Rehb.)
spinosa macrocarpa Wallr. in DC. prodr. II, 532.
3. 5 *amygdalina* B. Webb iter hisp. 47. Hispania.
Ramburei Boiss. el. pl. nov. hisp. 29.
- * 4. 35 *insititia* L. cod. Nro. 3634. engl. bot. 841. Europa; isthm. caucas.
Druparia insititia Clairv. man. d'herb. en Suisse 160.
 β) *augustana* L. cod. Nro. 3633. ι. (sub domestica.)
 γ) *cereola* L. cod. Nro. 3633. λ. (sub domestica.) Rehb. fl. exc. II, 645.
 Prunus lutea Bechst. Forstbot. 5. Aufl. 425.
 δ) *exigua* Bechst. Forstbot. 5. Aufl. 426.
 ε) *praecox* L. cod. Nro. 3633. κ. (sub domestica.)
 ζ) *vinaria* Bechst. Forstbot. 5. Aufl. 427.
 floribunda Weihe in Flora IX, 2. 747.
 Sub nomine *P. insititiae* in Schuebl. u. Mart. Fl. v. Wuertemb. Nro. 3—5 in una specie conjunctae sunt.
- * 5. 3 *italica* Borkh. Handb. d. Forstb. u. Forsttechn. II, 1409. Patria ignota.
domestica ε. *pernigona* (nec *pertigona* Rehb.) L. cod. Nro. 3633.
 - *regia* Poir. enc. méth. V, 678.
 - ε. *Turonensis* Ser. in DC. prodr. II, 533.
nigra Rehb. fl. exc. 645.
 β) *Claudiana* Pers. syn. pl. II, 35.
- * 6. 3 *syriaca* Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1406. Patria ignota, an Syria?
domestica Rehb. fl. exc. 645.
 - β. *damascena* L. cod. Nro. 3633.
 - ζ. *Juliana* Ser. in DC. prodr. II, 534. (nec L.)
 ρ) *acinaria* L. cod. Nro. 3633. η. (sub domestica.) Dum.
 Cours. bot. cult. éd. 2. V, 539.
 γ) *Brignola* L. cod. Nro. 3633. ο. (sub domestica.) Rehb.
 fl. exc. II, 645.
 subrotunda Bechst. Forstbot. 5. Aufl. 426.
 δ) *cerea* L. cod. Nro. 3633. ζ. (sub domestica.)
 domestica η. *Catharinaea* Ser. in DC. prodr. II, 534.
 ε) *Damascena* Ser. in DC. prodr. II, 533.
 ζ) *enucleata* Poir. in enc. méth. V, 678.
 η) *flore pleno*.
 θ) *foliis variegatis*.
 ι) *maliformis* L. cod. Nro. 3633. θ. (sub domestica.)
 domestica α. *armenioides* Ser. in DC. prodr. II, 533.
 rubella (nec *rubelia*) Bechst. Forstbot. 5. Aufl. 428.
- * 7. 3 *oconomica* Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1401. Patria ignota,
Damascena Dierb. syst. Uebers. d. u. Heidelb. wildw. ? Oriens, Asia central.
 cult. Gew. 136.
domestica Schuebl. u. Mart. Fl. v. Wuertemb. 309.
 - δ. *Juliana* L. cod. Nro. 3633. (nec Ser.)

- domestica ι Pruneauliana Ser. in DC. prodr. II, 534.
 pyramidalis Gaud. fl. helv. III, 311.
 β) diapræa Dum. Cours. bot. cult. 6d. 2. V, 538.
 γ) galatensis L. cod. Nro. 3633. v. (sub domestica.)
 domestica θ . Aubertiana Ser. in DC. prodr. II, 534.
 - δ . indica Schuebl. u. Mart. Fl. v. Wuertemb. 309.
 δ) hungarica L. cod. Nro. 3633. γ . (sub domestica.)
 oxycarpa Bechst. Forstbot. 5. Aufl. 424.
 ϵ) imperialis Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 538.
 ζ) mamillaris Schuebl. u. Mart. Fl. v. Wuertemb. 309.
 η) pyramidalis DC. fl. franç. IV, 485.
 Not. Sub nomine P. communis in Huds. flora angl. I, 213. et sub nomine P. domesticae in enc. méth. V, 536. Nro. 3—6 in una specie conjunctae sunt.
8. 5 divaricata Led. ind. sem. hort. Dorpat. 1824. 6. ic. pl. fl. ross. t. 13. Isthmus caucasicus.
 ? America borealis.
9. 5 δ cerasifera Ehrh. Beitr. z. Naturk. IV, 17. domestica ξ . myrobálana L. cod. Nro. 3633.
 myrobálana Dsf. tabl. de l'éc. de bot. 179.
 β) foliis variegatis.
10. 5 δ Cocumilia (Cocomilia, Cocumillo) Ten. att. d. reale istit. d'incoragg. VI, 443. e. ic. fl. napl. t. 144. Italia inferior.
11. 5 cándicans Balb. cat. pl. hort. Taur. 1813. 62. bot. reg. t. 1135. Patria ignota, ?Ucrania.
12. 5 tomentosa Thunb. fl. jap. 203. S. et Z. fl. jap. I, 51. t. 22. Japonia, China bor.
 β) fructu oblongo; Prunus trichocarpa Bunge in mém. d. sav. étr. de St. Pét. II, 96.
- γ) Wallichii; Prunus tomentosa Wall. numer. list. Nro. 715. China.
13. 5 triflora (nec trifolia) Rxb. fl. ind. II, 501. China borealis.
14. 5 pauciflora Bunge in mém. d. sav. étrang. de St. Pét. II, 97. Bochara, Cashmir.
15. 5 Bochariensis Royle illustr. of the him. mount. 205. Himalaya.
16. 5 Aloocho Royle illustr. of the him. mount. 205. Japonia.
17. 5 spinulosa S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 122. Japonia.
18. 5 macrophylla S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 122. Japonia.
19. 5 salicina Lindl. in transact. of the hort. soc. VII, 238. China.
- Cérasus salicina Sweet hort. brit. 174.
20. ? laurifolia Dne in nouv. ann. du Mus. III, 458. Ins. sundaicae min.
21. 5 maritima Wangenh. Beitr. zur Forstwiss. nordam. Holzart. 103. America foederata
 littoralis Bigel. fl. Bost. II, 193. borealis et media.
 pubescens Poir. enc. méth. IV, 584.
 pubigera Steud. nom. bot. II, 404.
 Poirétiana Heynh. nomencl. bot. I, 661.
 sphaerica Willd. Berl. Baumz. 315.
 sphaerocarpa Mich. fl. am. bor. I, 284.
 Cérasus pubescens Ser. in DC. prodr. II, 538.
 β) folia denique glabra; acuminata Mich. fl. bor. amer. I, 284.
 cándicans W. hort. Berol. suppl. 32. (teste Lk.)
 declinata (nec reclinata Bosc) Marsh. arbust. amer. 110.
 pygmaea Willd. sp. pl. II, 993.
 Cérasus pygmaea Loisel. in nouv. Duh. V, 32. et 21.
22. 5 Chicasa (Chicasaw Bartr.) Mich. fl. bor. amer. I, 284. America foederata
 angustifolia Marsh. arbust. amer. 111. australis et ? media.
 insititia Walt. fl. carol. 146.
 Cérasus Chicasa Loisel. in nouv. Duh. V, 183.
23. 5 grácilis Engelm. in Bost. journ. V, 243. Texas.
 Chicasa β . normalis Torr. and Gr. fl. of N. Amer. 407.
24. 5 rivularis Scheele in Linn. XXI, 594. Texas.
25. 5 texana Scheele in Linn. XXI, 593. Texas.
26. 5 americana Marsh. arbust. amer. 111. America borealis.
 ? canadensis L. cod. Nro. 3624. excl. syn. Pluk. (teste T. and Gr.)
 hyemalis Ell. sk. of the bot. of S. Car. and Georg. I, 542.
 Mississippi Marsh. arb. amer. 110.
 nigra Ait. hort. Kew. ed. 1. II, 165. bot. mag. t. 1117.
 triflora Raf. ann. nat. (teste T. and Gr.)
 Cérasus nigra Lois. in nouv. Duham. V, 32.
 β) flore pleno.
 γ) mollis Torr. fl. of the n. and m. seot. of the Un. stat. I, 470.
 acinaria Dsf. tabl. de l'éc. de bot. 179.

hyemalis Mich. fl. bor. am. I, 284.

Cerasus americana Hook et Arn. in comp. to bot. mag. I, 24.

- hyemalis Lois. in nouv. Duham. V, 470.

27. 5 subcordata Benth. pl. Hartweg. 308.

28. ? pedunculata Hort. Heynh. nom. bot. I, 660.

29. ? pendula Dsf. (teste Steud.)

Not. Praeterea in horto nostro dendrologico species aut varietates, nobis non satis notae, coluntur sequentes: 1) grandiflora, 2) padifolia, 3) sp. e Persia.

California.

Patria ignota.

Patria ignota.

XLIV. Cerasus Juss.

(*κρᾶσος*, cerasus, Kirschbaum. origine forte armena, adhuc kiras in Armenia appell.)

A. Microcerasus (Flor. later., solit., gem. aut fascic. e gemmis aphyllis).

1. 5 incana Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. XIX, 126.

Transcaucasia,

Amygdalus incana Pall. fl. ross. I, 13. t. 7.

Asia minor.

- nana 4. incana Loud. arb. et frut. brit. II, 679.

Prunus incana Stev. in mém. de la soc. d. nat. de Mosc. III, 263.

β) angustifolia Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. XIX, 126.

γ) latifolia Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. XIX, 126.

Pall. fl. ross. I. t. 7. fig. sin.

δ) viridis Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. XIX, 126.

2. 5 prostrata Loisel. in nouv. Duham. V. t. 53. f. 2.

Oriens, Creta, Graecia,

Prunus prostrata Labill. dec. pl. Syr. IV. t. 6. bot. reg. t. 136.

Dalmatia, Sardinia,

Amygdalus prostrata Sweet hort. brit. 173. Kth syn. pl.

Hispania australis.

Humb. et Bonpl. III, 462.

β) angustifolia Spach in ann. d. nat. 2. sér. XIX, 126.

γ) cóncolor Boiss. et Heldr. in Boiss. diagn. pl. orient. nov. X, 2.

δ) glabrifolia; Cerasus humilis Mor. stirp. sard. elench. I, 17.

Prunus humilis Colla herb. pedem. II, 297.

3. 5 pectinata Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. XIX, 127.

Kashmir.

4. 5 braehypétala Boiss. diagn. pl. nov. orient. VI, 52.

Persia australis.

5. 5 orientalis Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. XIX, 127.

Persia australis.

B. Cerasóphora (Florus laterales umbellati aut corymbosi, e gemmis aphyllis).

* 6. ♂ avium Moench meth. 672.

Druparia avium Clav. man. d'herbor. en Suisse 159.

Pontus, Asia minor;
in Europa introducta.

dulcis Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1414.

nigra Mill. dict.

sylvestris Loud. arb. et frut. brit. II, 693.

Prunus avium L. cod. Nro. 3632. engl. bot. 706.

- Cerasus Scop. fl. carn. I, Nro. 587. Sut. fl. helv. I, 292.

- γ. avium Huds. fl. angl. I, 213.

- nigricans Ehrh. Beitr. z. Naturk. VII, 128.

β) flore pleno.

γ) foliis variegatis.

δ) macrocarpa Ser. in DC. prodr. II, 535. nouv. Duh. I, 12. t. 4. f. D.

Prunus Cerasus ζ. actiana L. cod. Nro. 3631.

e) pállida Ser. in DC. prodr. II, 535. nouv. Duh. V, 12. t. 4.

rubicunda Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn., II, 1414.

Prunus rubicunda Bechst. Forstbot. 227. 5. Auf. 333.

- varia Ehrh. Beitr. z. Naturk. VII, 128.

* 7. ♂ durácina DC. fl. franç. IV, 483.

Oriens.

sylvestris 4. durácina Loud. arbor. et frut. brit. II, 693.

Prunus avium γ. durácina Pers. syn. pl. II, 35.

- Cerasus λ. L. cod. Nro. 3631.

- durácina Rehb. fl. exc. II, 643.

a) cordígera Ser. in DC. prodr. II, 555. nouv. Duh. V, 15. 10. t. 18. f. C. D.

Prunus avium γ. Bigarella Pers. syn. pl. II, 35. Poir. enc. méth. V, 672.

- Cerasus x. Bigarella L. cod. Nro. 3631.

β) chinensis Thomps. in transact. of the hort. soc. 2. ser. I, 273.

γ) foliis elegantissimis.

δ) mamillaris Ser. in DC. prodr. II, 536. nouv. Duh. V, 13.

decumana Delaun. bon jardin.

nicotianaeifolia Thomps. in transact. of the hort. soc. 2. ser. I, 273.

Prunus macrophylla Poir. in enc. méth. suppl. V, 584.

e) obtusata Ser. in DC. prodr. II, 535. nouv. Duh. V, 17. t. 18. A. B.

- * 8. ♀ *Juliana* DC. fl. franç. IV, 482. nouv. Duh. V, 12. t. 15. f. A. et D. Oriens (Pontus).
Prunus avium β. *Juliana* Koch syn. ed. 2. 229.
 - *Juliana* Rchb. fl. exc. II, 643.
sylvestris 2. Loud. arb. et frut. brit. II, 693.
- * β) *dulcis* Pers. syn. pl. II, 35. (sub *Pruno Ceraso.*) Duh.
 arbr. fruit. I, 161. t. 1. f. 3.
- * γ) *Heaumiana* Ser. in DC. prodr. II, 536. nouv. Duh. V, 17. t. 19. A. B.
sylvestris 3. *Heaumiana* Loud. arb. et frut. brit. II, 693.
- * δ) *péndula* Ser. in DC. prodr. II, 536.
- * 9. ♀ *caproniana* L. cod. Nro. 3631. α. (sub *Pruno Ceraso.*) Oriens, Persia
ácida Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1419. (ex p.) (teste Rxb.)
vulgaris Mill. dict. Munch meth. 672. (ex p.)
Prunus ácida Ehrh. Beitr. z. Naturk. VII, 130.
- * β) *asplenifolia* Hort. (heterophylla Hort.)
- * γ) *balsaminaefolia* Hort. Dum. Cours. bot. cult. 2. ed. V,
 529. Duh. arbr. fruit. I, 184. t. 10.
hollandica Hort.
- * δ) *cucullata* Hort.
- * e) *flore pleno*; *multiplex* Ser. in DC. prodr. II, 537.
- * ζ) *foliis variegatis*; *variegata* Ser. in DC. prodr. II, 537.
- * η) *Gobetta* Ser. in DC. prodr. II, 536. nouv. Duh. V, t. 12. f. A.
- * θ) *Montmorencyana* Ser. in DC. prodr. II, 536. nouv. Duh. V, 23. t. 7.
aproniana Schuebl. et Mart. Fl. v. Wuert. 313.
ruberrima Dsf. tabl. de l'éc. botan. 179. Dum. Cours.
 bot. cult. 2. éd. V, 529.
- * ι) *palescens* Ser. in DC. prodr. II, 536. Duh. arbr. fruit. I, 185. t. 11.
- * κ) *persiciflora* Ser. in DC. prodr. II, 537.
- * λ) *polygyna* Ser. in DC. prodr. II, 537.
- * μ) *racemosa* Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 528.
- * 10. ♀ *austera* L. cod. Nro. 3631. γ. (sub *Pruno Ceraso.*) nouv. Oriens.
 Duh. 26. t. 13.
ácida Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1419. (ex p.)
caproniana δ. *Griotta* Ser. in DC. prodr. II, 537.
vulgaris Mill. dict. Munch meth. 672. (ex p.)
Prunus austera Ehrh. Beitr. zur Naturk. VII, 129.
 - *Cerasus* Aut. (ex p.)
- * β) *cordigera* Ser. in DC. prodr. II, 537. Duh. arb. fruit. I, 195. t. 16. f. 1.
- * γ) *suavissima* Dsf. tabl. de l'éc. de bot. 179. Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 528.
- Not. Sub nomine P. Cerasi in Lam. fl. franç. III, 105. Nro. 7—11 in una specie
conjunctae sunt; sub eodem nomine contra in Schuebl. u. Mart. Fl. v. Wuert. et in
Clairv. man. d'herb. en Suisse 159. sub *Druparia Cerasus* Nro. 10—12.
- * 11. ♀ *fruticosa* Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1421. Patria ignota.
ácida Dumort. flor. belg. prodr. 91.
collina Lej. et Court. comp. fl. belg. II, 130.
Prunus Chamaecerasus Bechst. Forstbot. 887. (nec alior.)
 - *Chamaecerasus* β. *sativa* Rchb. fl. exc. 643.
 - *Cerasus* Poll. hist. pl. in Palat. sponte nasc. 467.
 - *fruticosa* Borehm. Deutschl. Baumz. 358.
- * 12. ♀ *Marasca* Host fl. austr. II, 6. Dalmatia.
Prunus Cerasus Var. Koch syn. ed. 2. 229.
 - *Cerasus* γ. *austera* Vis. stirp. dalmat. 44.
 - *Marasca* Rchb. fl. exc. 644.
 β) *bisflorens* Host. (teste Rchb., sed ubi?)
- * 13. ♀ *semperflorens* DC. fl. franç. IV, 481. nouv. Duh. V, 30. t. 5. f. A. Patria ignota.
Prunus semperflorens Ehrh. Beitr. z. Naturk. VII, 132.
 - *serótina* Rth cat. bot. I, 58.
 - *Cerasus* δ. *semperflorens* Koch syn. ed. 2. 229.
- * β) *sessiliflora* Ser. in DC. prodr. II, 537.
- * 14. ♀ *intermedia* Host fl. austr. II, 6. Austria.
Prunus intermedia Rchb. fl. exc. II, 643.
 - *Cerasus* var. Koch syn. ed. 2. 229.
- * 15. ♀ *effusa* Host fl. austr. II, 6. Austria.
Prunus Cerasus var. Koch. syn. ed. 2. 229.
- * 16. ♀ *Chamaecerasus* Loisel. in nouv. Duh. V, 29. t. 5. f. A. (nec Bechst.) Germania australis,
pumila Pall. Reis. d. versch. Prov. d. russ. R. I, 153. Moldavia, Ungaria,
Prunus Chamaecerasus Jacq. collect. I, 133. ic. rar. t. 90. Rossia, Sibiria.

- Prunus Chamaecerasus* β *fruticosa* Willd. sp. pl. II, 990.
 - *fruticosa* Pall. fl. ross. I, 19. t. 8. B.
 - *pumila* Baumg. Lumn. fl. Poson. 201.
 β) *foliis variegatis*.
 γ) *humilis* Host fl. austr. II, 7.
 δ) *intermedia* Lois. in nouv. Duh. V, 30.
Prunus intermedia Poir. in enc. méth. V, 674.
 ϵ) *macrocarpa* Pall. fl. ross. I, 19.
 ζ) *péndula* Hort.
17. 5 *microcarpa* C. Koch. Caucasus orientalis.
- Prunus microcarpa* C. A. Mey. Verz. kauk. Pf. 166.
- * 18. δ *persicifolia* DC. prodr. II, 537. Patria ignota.
Prunus persicifolia Dsf. hist. d. arbr. et d. arbriss. II, 205.
19. δ *chinensis* Blume bijdr. 1104. (sub *Pruno*.) China.
- * 20. δ *serrulata* Sweet hort. brit. 174. China.
Prunus serrulata Lindl. in transact. of the hort. soc. VII, 239.
21. δ *Phoshia* Ham. in Don. fl. nep. 239. Nepal.
Prunus cerasoides Don prodr. fl. nep. 239.
22. δ *Puddum* Roxb. in DC. prodr. II, 537. Nepal, Himalaya.
Prunus Puddum Roxb. in Wall. pl. asiat. rar. II, 37. t. 143.
 - *sylvatica* Roxb. hort. beng. 92. fl. ind. II, 501.
23. 5 *japonica* Loisel. in nouv. Duh. V, 33. Japonia, China.
 ? *Prunus humilis* Bge in mém. d. sav. étr. de St. Pét. II, 97.
Prunus japonica Thunb. fl. jap. 201. S. et Z. fl. jap. I, 172. t. 90.
 β) *múltiplex*; *Prunus chinensis* fl. pleno Hort.
Amygdalus pumila Sims bot. mag. 2176. et aut.
Cerasus chinensis G. Don dichl. II, pl. 514.
 - *japonica* Ker bot. reg. t. 27. et 1801. et Tom. VI, append.
Prunus Kerii Steud. nom. bot. II, 463.
 - *sinensis* Pers. syn. pl. II, 36.
24. 5 *cornuta* Wall. num. list. 716. Royle illustr. of Him. pl. 207. t. 38. f. 2. Himalaya.
Prunus cornuta Steud. nomencl. bot. II, 403.
25. 5 *glandulosa* Lois. in nouv. Duh. V, 33. Japonia.
Prunus glandulosa Thunb. fl. jap. 202.
26. δ *áspera* Loisel. in nouv. Duh. V, 33. Japonia.
Prunus áspera Thunb. fl. jap. 201.
27. δ *incisa* Lois. in nouv. Duh. V, 33. Japonia.
Prunus incisa Thunb. fl. jap. 202.
- * 28. 5 *glauca* Mnth meth. 672. America britannica et foederata borealis, mediaque.
canadensis Lois. in nouv. Duh. V, 3. (teste T. et Gr.)
pumila Mich. fl. bor. amer. I, 286.
Prunus cuneata Raf. ann. nat. II. (teste T. and Gr.)
 - *pumila* L. cod. Nro. 6630.
 β) *flore pleno*.
 γ) *Susquehanae* Sweet hort. brit.
Prunus depressa Pursh fl. Amer. sept. I, 332.
 - *Susquehanae* W. (nec *Susquehannae*) hort. Berol. 519.
- * 29. δ *pensylvanica* Hook. fl. bor. am. I, 168. ?Lois. in nouv. Duh. V, 9. America britannica et borealis Mich. fl. bor. am. I, 286. foederata borealis, montes petrosi, Terra nova.
Prunus borealis Poir. enc. méth. V, 674.
 - *lanceolata* Willd. Baumz. 1. Aufl. t. 3. f. 3. (nec in 2. Aufl.)
 - *pensylvanica* L. fl. suppl. 252.
30. 5 *latifolia* Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1845. America borealis.
Prunus latifolia Borchm. Deutschl. Baumz. 358.
31. δ *umbellata* Torr. et Gr. fl. N. Amer. I, 409. America foederata australis.
Prunus umbellata Ell. sk. of the bot. of S. Car. Georg. I, 541.
32. 5 *emarginata* Dougl. in Hook. fl. bor. am. I, 169. America boreali-occid.
33. 5 *mollis* Dougl. in Hook. fl. bor. am. I, 169. America boreali-occid.
- C. *Padus* (Flores racemosi, terminales; Folia decidua).
- * 34. 5 *Máhaleb* Mill. dict. Nro. 4. DC. fl. franç. IV, 480. Europa australi-orient. ? Gallia, Oriens.
Druparia Máhaleb Clairv. man. 159.
Padus Máhaleb Borkh. Handb. d. Forstb. u. Forsttechn. II, 1434.
Prunus Máhaleb L. cod. Nro. 3627. Jacq. fl. austr. III, t. 227.
 - *odorata* Lam. fl. franç. III, 108.

- β) *Cupaniana* Guss. prodr. fl. sic. I, 553. (sub *Pruno.*)
 γ) *foliis variegatis.*
 δ) *fructu flava.*
 ε) *latifolia* Loud. arb. et frut. brit. II, 707.
 ζ) *pubescens* DC. jun. cat. VI pl. hort. Genev.
 34b. δ *paniculata* Loisel. in nouv. Duh. V, 9. Japonia.
Prunus paniculata Thunb. fl. jap. 200.
 * 35. β *Padus* DC. fl. franc. IV, 590. Europa oriens.
Padus avium Mill. dict. Mnch meth. 671.
 - *racemosa* Gil. fl. lith. V, 213.
 - *Theoprasti* Erndt virid. Warsaw. 87.
 - *vulgaris* Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1426.
Prunus Padus L. cod. Nro. 3622.
 - *racemosa* Lam. fl. franc. III, 107.
 * β) *aucubaeifolia.*
 γ) *bracteata* Ser. in DC. prodr. II, 539.
 * δ) *caucasica* Gueldenst. in Pall. fl. ross. I, 17. (sub *Pruno.*)
 * ε) *foliis variegatis.*
 ζ) *fructu albescente.*
 * η) *heterophylla.*
 θ) *nana* Wend. Bem. ueb. versch. Pfl. d. bot. Gart. zu Marb.
 ι) *oxyphyrena* Spach hist. d. végét. phan. II.
 * κ) *parviflora* Ser. in DC. prodr. II, 539. Fl. dan. t. 205.
 λ) *pendula.*
 μ) *petraea* Tausch in Flora.
 * 36. 5 *rubra* Willd. Berlin. Baumz. 1. Aufl. 237. t. 4. f. 2. (sub *Pruno.*) Patria ignota.
Padus rubra Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1846.
Prunus Padus β. *rubra* Ait. hort. Kew. ed. 1. II, 163.
 37. 5 *Pseudo-Cerasus* G. Don in Loud. hort. brit. 200. dichl. pl. II, 514. China, Japonia.
Prunus paniculata Edw. in bot. reg. t. 800.
 - *Pseudo-Cerasus* Lindl. in transact. of the hort. soc. VI, 90.
 β) *floribus plenis* Thunb. fl. jap. 370.
 γ) - *roseis* Zucc. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 123.
 38. δ *elliptica* Lois. in nouv. Duh. V, 4. Japonia.
Prunus elliptica Thunb. fl. jap. 199.
 39. δ *acuminata* C. Koch. India orientalis.
Prunus acuminata Wall. pl. as. rar. II, 78. t. 181.
 - *Wallichii* Steud. nom. bot. ed. 2. p. 404.
 * 40. 5 *nepalensis* (*napaulensis*, *nipaulensis*) Ser. in DC. prodr. II, 540. Nepal.
Prunus glaucifolia Wall. in Verh. d. baier. Ac. phys. Kl. II, 347.
Prunus glaucifolia Steud. nom. bot. ed. 2. 403.
 - *nepaulensis* Steud. nom. bot. ed. 2. 403.
 41. ? *Lindleyana* Wall. num. list. Himalaya.
 42. 5 *undulata* Ser. in DC. prodr. II, 540. Nepal, Himalaya.
capricida G. Don dichl. pl. II, 515.
Prunus adenophylla Wall. herb. Steud. nom. bot. ed. 2. 402.
 - *undulata* Ham. in Don prodr. fl. nep. 239.
 * 43. β *virginiana* Ser. in DC. prodr. II, 539. America borealis.
obovata Beck bot. of the north. and midl. stat. 97.
serótina Hook. fl. bor. am. I, 169.
Padus oblonga Moench meth. 671.
 - *virginiana* Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1429.
Prunus obovata Bigel fl. Bost. ed. 2. 192.
 - *serótina* Pursh fl. bor. amer.
 - *virginiana* L. cod. Nro. 3623. Willd. Berlin. Baumz. 1. Aufl. t. 5. f. 1.
 * β) *densiflora* Spach hist. d. végét. phaner.
Prunus densiflora Steud. nomencl. bot. ed. 2. II, 403.
 * γ) *fimbriata* Spach hist. d. végét. phan. II.
Prunus fimbriata Steud. nomencl. bot. ed. 2. II, 403.
 * δ) *hirsuta* Spach hist. d. végét. phaner. II.
Prunus hirsuta Ell. sketsch of the cot. of S. Car. Georg. I, 541.
 * ε) *nana* Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1848. (sub *Pado.*)
micrantha Spach hist. d. végét. phaner.
Prunus micrantha Steud. nomencl. bot. ed. 2. II, 403.
 - *nana* Duroi Harbk. Baum. II, 194.
 * ζ) *pendula.*

44. 5 canadensis Lois in nuov. Duh. V, 3. ? Canada.
Padus canadensis Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II,
Prunus canadensis Borchm. Deutschl. Baumz. 361. (nec L., nec Willd.)
45. 5 δ serótina Lois. nouv. Duh. V, 3. DC. prodr. II, 540. America borealis.
sylvestris Gron. fl. virgin. 75.
virginiana Mich. fl. bor. amer. I, 283.
Padus serótina Borkh. Handr. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1432.
Prunus serótina Ehrh. Beitr. III, 20.
- virginiana Dur. Harb. Baumz. II, 191. Wagenh. Verz.
ausl. B. u. Str. v. Weiss. t. 14. f. 33.
 β) cartilaginea Lehm. ind. sem. hort. Hamb. 1833. (sub Pruno.)
 γ) retusa Ser. in DC. prodr. II, 540.
46. 5 demissa Nutt. in T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 411. America foederata
Prunus demissa Walp. report. bot. II, 10. media et australis.
47. δ Duerinckii Mart. not. sur quelqu. nouv. esp. 4. America borealis.
48. 5 Capollin DC. prodr. II, 539. Torr. et Gr. fl. N. Amer. I, 412. Mexico,
Capuli Ser. in DC. prodr. II, 541. in California culta.
Prunus Capollin Zucc. in Verh. d. baier. Ac. phys. Kl. II, 348. t. 8.
- Capuli Cav. in Spr. syst. veg. II, 477.
49. δ reflexa Gardn. in Hook. lond. journ. of bot. II, 342. Brasilia.
E. Laurocérasmus (Flores axillares, racemosi; Folia persistentia).
- * 50. 5 ilicifolia Nutt. in H. et Arn. bot. of Beech. voy. 340. t. 83. Carolina, California.
51. δ occidentalis Lois. in nouv. Duham. V, 4. India occidentalis,
Prunus occidentalis Swartz fl. Ind. occ. II, 925. Catesb. ? Carolina.
nat. hist. of Car. Flor. t. 94.
52. δ caroliniana Mich. fl. bor. amer. I, 285. America foed. austr.
Bumelia serrata Pursh fl. bor. amer. I, 155.
Padus caroliniana Mill. dict. Borkh. Handb. d. Forstbot.
u. Forsttechn. II, 1851.
Prunus caroliniana Ait. hort. Kew. ed. 1. II, 540.
? - Laurocérasmus Bartr. Reis. d. Car. 53.
- lusitanica Walt. fl. carol. 167.
- sempervirens Willd. hort. Berol. suppl. 33.
53. ? samydoides C. Koch. Mexico.
Prunus samydoides Schlecht in Linn. XIII, 92. Hook. icon. pl. t. 371.
54. ? brachybótrya C. Koch. Mexico.
Prunus brachybótrya Zucc. in Verh. d. baier. Ac. phys. Kl. II, 348.
55. 5 ferruginea DC. prodr. II, 540. Mexico.
Prunus ferruginea Steud. nom. bot. ed. 2. p. 403.
56. 5 sphaerocarpa Lois. in nouv. Duham. V, 4. Antillae majores,
Prunus sphaerocarpa Swartz fl. Ind. occ. II, 927. bot. ? Brasilia.
mag. t. 3141.
- brasiliensis Schott (sed ubi?).
57. δ brasiliensis Ch. et Schlecht. in Linn. I, 542. Brasilia.
Prunus brasiliensis Steud. nom. bot. ed. 2. p. 402.
58. 5 Schiedeana C. Koch. Mexico.
Prunus laurifolia Ch. et Schlecht. in Linn. XIII, 404.
- Schiedeana Steud. nom. bot. ed. 2. II, 404.
59. δ salicifolia Ser. in DC. prodr. II, 540. Nova Granada.
Prunus salicifolia H. B. et K. nov. gen. et sp. amer. IV, 241. t. 563.
- * 60. ? ? opaca Benth. pl. Hartw. 172. Nova Granada.
* 61. 5 Laurocérasmus Lois. in nouv. Duh. V, 6. Oriens; in Europa
Padus Laurocérasmus Mill. dict. Moench meth. 672. australi introducta.
Prunus Laurocérasmus L. cod. Nro. 3626.
 α) angustifolia Loud. arb. et frut. brit. II, 716.
* β) capensis Hort.
* γ) colchica Hort.
* δ) variegata Hort.
- * 62. δ 5 lusitanica Lois. in nouv. Duham. V, 5. Lusitania, Hispania,
Padus eglandulosa Moench meth. 672. ins. canarienses.
- lusitanica Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1850.
Prunus lusitanica L. cod. Nro. 3625. Dill. Elth. 193. t. 159. f. 193.
 β) Hixa Ser. in DC. prodr. II, 540. Webb et Berth. phytogr. canar. t. 38.
Prunus Hixa Brouss. in Willd. hort. Berol. I, 517.
- multiglandulosa Cav. in ann. sc. nat. III. (1801.) 59.

- F. Species non satis cognitae.
- * 63. ? Fontanesiana Spach hist. d. végét. phan. II. ? Graecia.
Prunus graeca Dsf. (ubi?).
64. ? viminalis Wender. Bem. ueb. versch. Pfl. d. bot. Gart.
zu Marb. (sub Pruno.) Patria ignota.
India orientalis.
65. ? integerrima Wall. num. list.
Prunus integerrima Steud. nomencl. bot. ed. 2. II, 403. India orientalis.
66. ? Martabanica Wall. num. list.
Prunus Martabanica Steud. nomencl. bot. ed. 2. II, 403. India orientalis.
67. ? rufa Wall. num. list.
Prunus rufa Steud. nomencl. bot. ed. II, 404. Patria ignota.
68. ? affinis Sweet (teste Steud.)
Not. Practerea in horto nostro dendrologico species aut varietates, nobis non
satis cognitae, coluntur sequentes: 1) floribunda, 2) lucida, 3) montana, 4) Rhexii.

XLV. Cerasoides S. et Z.

- (κερακος, Cerasus, Kirschbaum et ειδος, visus, Ansehen.)
1. 55 apétala S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. III, 744. t. 5. f. 2. Japonia.

Fam. 60. Chrysohalanaceae.

XLVI. Chrysohalanus L.

- (χρυσος, aureum. Gold et βαλανος, glans, Eichel, ob drupas aureas.)
1. 5 obtongifolius Mich. fl. bor. amer. I, 283. America foed. austr.
2. 5 leaco L. cod. Nro. 1639. Jcq. stirp. amer. 154. t. 94. Florida austr., Am. trop.

XLVII. Prinsepia Royle.

- (Prinsep, Roylei amicus et societatis asiaticae bengalensis secretarius.)
1. 5 utilis Royle ill. of the him. mount. 206. t. 38. f. 1. Himalaya.

INDEX.

Adambea glabra Lam. XIX, 3.
Adamia Wall. XI.
 chinensis Grdn. et Ch. 2.
 cyanea Wall. 3.
 versicolor Fort. 1.
Adenostoma Hk. et Arn. XXXII.
 fasciculatum Hk. et Arn. 1.
Amygdalus L. XXXIX.
 agrestis Boiss. 3.
 amara Hay. 9 β.
 Amygdalo-Persica Duh. 9 γ.
 arabica Oliv. 1.
 argentea Lam. 14.
 Besseriiana Schott 6.
 Bovei Spach 28.
 campestris Bess. 6.
 cochinchinensis Lour. 10.
 collina Wall. 29.
 communis L. 9.
 compressa Hort. 9 γ.
 cordifolia Roxb. XL, 4.
 dulcis DC. 9 δ.
 - Mill. 9 η.
 eburnea Spach 24.
 elaegnifolia Spach 15.
 Fischeriana Spach 27.
 fragilis Borkh. 9 η.
 furcata Spach 25.
 fruticosa Wender. 31.
 glandulosa Hook. 20.
 georgica Dsf. 7.
 horrida Spach 22.

Amygdalus humilis Edgew. 8.
 hybrida Dierb. 9 γ.
 incana Pall. XLIV, 1.
 Kotschyi Hohenack. 12.
 lanceaefolia Hort. 9 δ.
 leiocarpa Boiss. 16.
 lycioides Spach 21.
 laurifolia Hort. ad fin.
 microphylla H. B. K. 19.
 nana L. 5.
 - incana Loud. XLIV, 1.
 - β. campestris Ser. 6.
 - β. latifolia Led. 6.
 - γ. georgica Ser. 7.
 Nucipersica Borkh. XL, 2.
 orientalis Mill. 14.
 pedunculata Pall. 17.
 Persica L. XL, 1.
 - Lam. XL, 2.
 Persico-Amygdala Rehb. 9 γ.
 persicoides Ser. 9 γ.
 pilosa Turcz. 18.
 prostrata Sweet XLIV, 2.
 pumila L. 32.
 - Sims XLIV, 23 β.
 sativa Mill. 9 ι.
 scoparia Spach 4.
 Scorpius Spach. 23.
 sibirica Tausch 5 ζ.
 sinensis Hort. 30.
 spartioides Spach 2.
 spathulata Boiss. 26.

- Amygdalus tomentosula* Hort. 33.
 Tournefortii Bosc. 11.
 Webbii Spach 13.
Anacamperos populifolia Haw. IV, 1.
Armeniaca Tourn. XLII.
 atropurpurea Loisel. 2.
 Brigantiaea Pers. 5.
 dasycarpa Pers. 5.
 duracina Dierb. 3.
 Epirotica Fl. d. W. 1.
 minutiflora C. Koch 6.
 Mume C. Koch 7.
 persicifolia Lois. 2 β .
 sibirica Pers. 4.
 vulgaris Lam. 1.
 - α . *ovalifolia* Ser. 3.
Bumelia serrata Pursh. XLIV, 52.
Calanchoë Ad. III.
 acutiflora Haw. 3.
 ceratophylla Haw. 4.
 spathulata DC. 1.
 subamplectens Wall. 2.
 varians Haw. 2.
Cardiandra S. et Z. VIIIb.
 alternifolia S. et Z. 1.
Cedrela Rosmarinus Lour. VII, 2.
Ceraseides S. et Z. XLV.
 apetala S. et Z. 1.
Cerasus Juss. XLIV.
 acida Borkh. 9. 10.
 - Dumort. 11.
 acuminata C. Koch 39.
 adenophylla Wall. 42.
 affinis Sweet 68.
 americana Hook. et Arn. XLIII, 26 γ .
 aspera Lois 26.
 asplenifolia Hort. 9 β .
 avium Mneh 6.
 austera Hort. 10.
 balsaminaefolia Hort. 9 γ .
 bisfloreus Host. 12 β .
 borealis Mich. 29.
 brachybotrya C. Koch 54.
 brachypetala Boiss. 4.
 brasiliensis Ch. et Schlecht. 57.
 canadensis Lois. 28. 44.
 Capollin DC. 48.
 Capuli Ser. 48.
 capricida G. Don 42.
 caproniana DC. 9. 10.
 caroliniana Mich. 52.
Chamaecerasus Lois. 16.
 - *macrocarpa* Pall. 16 ϵ .
 - *pendula* Hort. 16 ζ .
Chicasa Lois. XLIII, 22.
 - β . *normalis* T. et Gr. XLIII, 23.
chinensis Bl. 19.
 - G. Don. 23 β .
collina Lej. et Court. 11.
cornuta Wall. 24.
Cupaniana Guss. 34 β .
demissa Nutt. 46.
densiflora Spach 43 β .
depressa Ser. 28 γ .
Duerinckii Mart. 47.
dulcis Borkh. 6.
Cerasus duracina DC. 7.
 effusa Host 15.
 elliptica Lois. 38.
 emarginata Dougl. 32.
 ferruginea DC. 55.
 flimbriata Spach 43 γ .
 Fontanesiana Sp. 63.
 floribunda Hort. ad fin.
 fruticosa Borkh. 11.
 glandulosa Lois. 25.
 glauca Mneh 28.
 glaucifolia Wall. 40.
 Gobetta Hort. 9 η .
 Griotta Hort. 10.
 hirsuta Spach 43 δ .
 Hixa Ser. 62 β .
 humilis Host. 16 γ .
 - Mor. 2 δ .
 hyemalis Lois. XLIII, 26 γ .
 japonica Ker 23 β .
 ilicifolia Nutt. 50.
 incana Spach 1.
 incisa Lois. 27.
 integerrima Wall. 65.
 intermedia Host. 14.
 Juliana DC. 8.
 latifolia Borkh. 30.
 Laurocerasus Lois. 61.
 Lindleyana Wall. 41.
 lucida Hort. ad fin.
 lusitanica Lois. 62.
 - *Hixa* Ser. 58 β .
 Mahaleb Mill. 34.
 Marasca Host. 12.
 Martabanica Wall. 66.
 micrantha Spach 43 ϵ .
 microcarpa C. Koch 17.
 mollis Dougl. 33.
 montana Hort. ad fin.
 nepalensis Ser. 40.
 nicotianaefolia Thomps. 7 δ .
 nigra Lois. XLIII, 26.
 - Gil. 7.
 - Mill. 6.
 obovata Beck. 43.
 occidentalis Lois. 51.
 opaca Benth. 60.
 orientalis Spach 5.
 Padus DC. 35.
 paniculata Lois. 34b.
 pectinata Spach 3.
 persicifolia Lois. 18.
 pennsylvanica Hook. 29.
 Phoshia Hamilt. 21.
 prostrata Lois. 2.
 Pseudo-Cerasus C. Don 37.
 Puddum Rxb. 22.
 pubescens Ser. XLIII, 21.
 pygmaea Lois. XLIII, 21 β .
 racemosa Dum. Cours. 9 μ .
 reflexa Grdn. 49.
 Rhexii Hort. ad fin.
 rubicunda Borkh. 6 ϵ .
 rufa Wall. 67.
 salicifolia Ser. 59.
 salicina Sweet. XLIII, 19.

- Cerasus salicina* Sweet XLIII, 19.
samydoides C. Koch 53.
semperflorens DC. 13.
scrotina Lois. 45.
- Hook. 43.
serrulata Sweet 20.
sphaerocarpa Lois. 56.
Susquehanae Sweet 28 γ.
sylvestris Gron. 45.
- Loud. 6—8.
nmbellata Torr. et Gr. 31.
undulata Ser. 42.
virginiana Mich. 45.
- Ser. 43.
vulgaris Mill. 9. 10.
- Bechst. 11 δ.
- Cercocarpus* H. B. K. XXVIII.
betulaefolius Nutt. 2.
betuloides Nutt. 2.
fothergilloides Torr. 1.
ledifolius Nutt. 3.
parvifolius Hook. 1.
- Chamaebatia* Benth. XXIX.
foliosa Benth. 1.
- Chamaerhodos* Bge XXXIV.
altaica Bge 2.
grandiflora Led. 1.
sabulosa Bge 3.
- Chrysobalanus* L. XLVI.
leaco L. 2.
oblongifolius Mich. 1.
- Comarum Salessowii* Bge XXXV, 1.
Corchorus japonicus Thunb. XXI, 1.
Cotyledon spatulata Poir. III, 1.
Cowania Don XXVII.
mexicana Spr. 1.
plicata Don 1.
- Crassula* L. II.
Agardhiana R. et S. 1.
- Decumaria* L. XIV.
barbara L. 1.
Forsythia Mich. 1.
radicans Mnch 1.
sarmentosa Bosc 1 β.
- Deutzia* Thunb. XIII.
alarioides Hort. ad fin.
Brunoniana R. Br. 8.
corymbosa R. Br. 7.
crenata S. et Z. 4.
gracilis S. et Z. 5.
grandiflora Bge 2.
japonica Hort. ad fin.
ignea Hort. ad fin.
nepalensis Hort. ad fin.
parviflora Bge 3.
pulchella Hort. ad fin.
scabra Thunb. 1.
staminea R. Br. 6.
undulata Hort. ad fin.
- Druparia avium* Clairv. XLIV, 6.
Cerasus Clairv. XLIV, 10, not.
insititia Clairv. XLIII, 4.
Mahaleb Clairv. XLIV, 34.
- Dryas* L. XXV.
chamaedrifolia Hort. 1.
- Richards. 3.
- Dryas Drummondii* Hook. 3.
integrifolia Vahl 2.
octopetala L. 1.
- Pursh 3.
tenella Pursh 2.
- Fatioa* DC. XVII.
nepalensis DC. 1.
- Forsythia scandens* Walt. XIV, 1 β.
Geum chamaedryfolium Crntz XXV, 1.
dryadoides DC. XXVII, 1.
- Grislea* Loeff. XVIII.
tomentosa Rxb. 1.
- Hortensia opuloides* Lam. VIII, 20.
rosea Dsf. VIII, 20.
speciosa Pers. VIII, 20.
- Hultemia* Dumort. XXXVIII.
berberifolia Dumort. 1.
- Hydrangea* L. VIII.
acuminata S. et Z. 9.
alternifolia Sieb. VIII b, 1.
altissima Wall. 21.
angulata Tausch 3 β.
anomala Don 24.
aspera Ham. 22.
arborescens L. 1.
Azisai Sieb. 4.
Belzoni S. et Z. 8.
bracteata S. et Z. 14.
coerulea Hook. 6 β.
cordata Pursh 1 β.
cordifolia S. et Z. 13.
fimbriata Wall. 22 β.
frutescens Mnch 1.
glauca Hort. 2.
heteromalla Wall. 23.
hirta S. et Z. 16.
Hortensia DC. 20.
hortensis Sm. 20.
japonica Sieb. 6.
involuta Sieb. 17.
laevigata Hort. Cels. 25.
macrophylla Ser. 18.
maculata Blume 20 δ.
mutabilis Hort. 20.
Neesiana Steud. 2 γ.
nivea Mich. 2.
oblongifolia Blume 26.
opuloides Hort. 20.
Otaksa S. et Z. 5.
paniculata Sieb. 15.
petiolaris S. et Z. 7.
peruviana Mor. 27.
pubescens (nec *rubescens*, ut in enum.
false dict.) Dne 19.
- N. v. E. 2 γ.
quercifolia Bartr. 3.
radiata Sm. 3.
- Walt. 2.
scandens DC. 12.
serrata DC. 10.
Sitsitan Sieb. 11.
stellata S. et Z. 11.
Thunbergii Sieb. 10.
vestita Wall. 22.
virens S. et Z. 12.
vulgaris Mich. 1.

- Jamesia* T. et Gr. XV.
americana T. et Gr. 1.
Icoturus montanus Raf. XX, 2 ♀.
Itea L. VII.
chinensis Hk. et Arn. 3.
fragrans Wall. 4.
macrophylla Wall. 5.
nutans Royle 6.
rosmarinifolia Poir. 2.
Rosmarinus Schult. 2.
virginica L. 1.
Kalanchoë DC. v. *Calanchoë*.
Kerria DC. XXI.
japonica DC. 1.
Kunzia tridentata Spr. XXX, 1.
Kurrimia macrophylla Wall. VII, 5.
Lagerstroemia L. XIX.
chinensis Lam. 1.
flos reginae Retz 3.
indica L. 1.
Muenchhausia W. 2.
Reginae Rxb. 3.
Lowea berberifolia Lindl. XXXVIII, 1.
Lytrum fruticosum L. XVIII, 1.
Neillia Don VI.
rubiflora Don 2.
thyrsiflora Don 1.
Nuttalia T. and Gr. XXIV.
cerasiformis T. and Gr. 1.
Padus avium Mill. XLIV, 35.
canadensis Borkh. XLIV, 44.
caroliniana Mill. XLIV, 52.
eglandulosa Moench XLIV, 62.
Laurocerasus Mill. XLIV, 61.
lusitana Borkh. XLIV, 62.
Mahaleb Borkh. 34.
nana Borkh. XLIV, 43 ε.
oblonga Mch XLIV, 43.
racemosa Gil. 35.
rubra Borkh. XLIV, 36.
serotina Borkh. XLIV, 45.
Theophrasti Erndt XLIV, 35.
virginiana Borkh. XLIV, 43.
vulgaris Borkh. XLIV, 35.
Persica Tourn. XL.
cordifolia C. Koch 4.
Ispahamensis Thouin 2.
laevis DC. 2.
nana Mill. 1, 5.
 - Dsf. 1 ζ.
nectarina Hort. 2.
saligna Royle 3.
vulgaris Mill. 1.
Philadelphus L. XII.
affinis Schlt. 6.
aromaticus Hort. Par. 1 β.
californicus Benth. 7.
chinensis Hort. ad fin.
Colombianus Hort. ad fin.
cordatus Hort. ad fin.
coronarius L. 1.
dubius Hort. ad fin.
edulis Hort. ad fin.
floribundus Schrd. 8 γ.
Gordonianus Ldl. 12.
gracilis Lodd. 10 β.
Philadelphus *Grahami* Hort. ad fin.
grandiflorus Ldl. 3.
 - W. 8.
hirsutus Nutt. 10.
humilis Hort. 8 β.
inodorus L. 9.
 - Mich. 8.
latifolius Schrd. 4.
laxus Lodd. 8 δ.
 - Schrd. 8 β.
Ledebourii Hort. ad fin.
Lewisii Pursh 11.
mexicanus Schlecht. 13.
microphyllus A. Gr. 15.
nanus Mill. 1 δ.
nepalensis Loud. 2.
nipaulensis Lound. 2.
nivalis Hort. ad fin.
pubescens Lois. 4.
Satsumi Sieb. 14.
speciosus Schrd. 8 δ.
tomentosus Wall. 2.
triflorus Wall. 2 β.
trinervius Schrd. 10.
verrucosus Schrd. 3.
Zeyheri Schrd. 5.
Pimpinella spinosa Grtn. XXXII, 1.
Platycrater S. et Z. IX.
argutus S. et Z. 1.
Polyodontia arborea Bl. XL.
Polyosma chinensis Walp. VII, 5.
fragrans Horsf. et Benn. VII, 4.
Potentilla L. XXXV.
ambigua Jacquem. 10.
arbuscula Don 7.
biflora Willd. 9.
dahurica Nestl. 3.
discolor Jacquem. 1.
eriocarpa Wall. 11.
floribunda Pursh 4 δ.
fruticosa L. 4.
 - Lour. 4 δ.
 - β. *dahurica* Lehm. 3.
glabra Lodd. 3.
glabrata Willd. 3.
Ingliesii Royle 6.
Loureironis Tratt. 4 δ.
nepalensis Don 7.
ochreatea Ldl. 4 γ.
parvifolia Fisch. 8.
prostrata Lapeyr. 4.
rigida Wall. 5.
Salessowii Steph. 1.
tenuifolia Willd. 4 δ.
xyloorrhiza Boiss. 2.
Poterium L. XXXI.
ancistroides Dsf. 1.
compactum Boiss. 2.
Fontanesianum Spach 1 α.
spinosum L. XXXII, 1.
Primula mutabilis Lour. VIII, 20.
Prinsepia Royle XLVII.
utilis Royle 1.
Prunus L. XLIII.
Acacia Crntz 1.
acida Ehrh. XLIV, 9.

- Prunus acinaria* Dsf. 26 γ .
acinaria Dum. Cours. 6 β .
acuminata Mich. 21 β .
 - Wall. XLIV, 39.
adenophylla Wall. XLIV, 42.
Aloocha Royle 16.
Amarella Rchb. XLII, 3.
americana Marsh. 26.
amygdalina B. Webb. 3.
angustifolia Marsh. 22.
Armeniaca L. XLII, 1.
 - *nigra* Dsf. XLII, 2.
aspera Thunb. XLIV, 26.
austera Ehrh. XLIV, 10.
avium L. XLIV, 6.
 - Pers. 6—8.
Bigarella Hort. XLIV, 7 α .
Bochariensis Royle 15.
borealis Poir. XLIV, 29.
brachybotrya Zucc. XLIV, 54.
Brasilensis Schott XLIV, 56.
 - Steud. XLIV, 57.
Brigantiaea Vill. XLII, 5.
Brignola Rchb. 6 γ .
canadensis Borchm. XLIV, 44.
 - L. 26.
candicans Balb. 11.
 - Bess. 1 γ .
 - Willd. 21 β .
Capollin DC. XLIV, 48.
caproniana Hort. XLIV, 9.
Capuli Cav. XLIV, 48.
caroliniana Ait. XLIV, 52.
cartilaginea Lehm. XLIV, 45 β .
caucasica Gueld. XLIV, 35 δ .
cerasifera Ehrh. 9.
cerasoides Don XLIV, 21.
Cerasus Lam. XLIV, 10, not.
 - L. XLIV, 7—9.
 - Poll. XLIV, 11.
 - Schuebl. u. Mart. XLIV, 10, not.
 - Scop. XLIV, 6.
 - *avium* Huds. XLIV, 6.
cerea L. 6 δ .
cereola L. 4 γ .
Chamaecerasus Bechst. XLIV, 11.
 - Jacq. XLIV, 16.
Chicasa Mich. 22.
 - β . *normalis* Torr. et Gr. 23.
chinensis Blume XLIV, 19.
 - *flore pleno* Hort. XLIV, 23 β .
Claudiana Pers. 5 β .
Cocumilia (rect. *Coccyamelia*) Ten. 10.
communis Huds. 7 not.
cornuta Steud. XLIV, 24.
cuneata Raf. XLIV, 28.
Cupaniana Guss. XLIV, 34 β .
Damascena Dierb. 7.
dasycarpa Ehrh. XLII, 2.
declinata Marsh. 21 β .
demissa Walp. XLIV, 46.
densiflora Steud. XLIV, 43 β .
depressa Pursh XLIV, 28 γ .
divaricata Led. 8.
domestica L. 4—7. 9.
 - Schuebl. u. Mart. 7.
- Prunus domestica* Lam. 7 not.
duracina Rchb. XLIV, 7.
elliptica Thunb. XLIV, 38.
exigua Bechst. 4 δ .
ferruginea Steud. XLIV, 55.
fimbriata Steud. XLIV, 43 γ .
floribunda Weihe 4 ζ .
fruticans Weihe 2.
fruticosa Borchm. XLIV, 11.
 - Pall. XLIV, 16.
glandulosa T. et Gr. XXXIX, 20.
 - Thunb. XLIV, 25.
glaucifolia Steud. XLIV, 40.
graeca Dsf. XLIV, 63.
gracilis Engelm. 23.
grandiflora Hort. ad fin.
hirsuta Ell. XLIV, 43 δ .
Hixa Brouss. XLIV, 62 β .
humilis Bge XLIV, 23.
 - Colla XLIV, 2 δ .
hungarica Hort. 7 δ .
hyemalis Ell. 26.
 - Mich. 26 γ .
japonica Thunb. XLIV, 23.
imperialis Dum. Cours. 7 ϵ .
incana Stev. XLIV, 1.
inermis Gmel. XXXIX, 5.
insititia L. 4.
 - Mor. 1 λ .
 - Schuebl. et Mart. 4, not.
 - Walt. 22.
incisa Thunb. XLIV, 27.
integerrima Steud. XLIV, 65.
intermedia Rchb. XLIV, 14.
 - Poir. XLIV, 16 δ .
italica Borkh. 5.
Juliana Rchb. XLIV, 8.
Kerii Steud. XLIV, 23 β .
lanceolata Willd. XLIV, 29.
laurifolia Dne 20.
 - Ch. et Schlecht. XLIV, 58 β .
latifolia Borchm. XLIV, 30.
Laurocerasus L. XLIV, 61.
 - Bartr. XLIV, 52.
littoralis Big. 21.
lusitanica L. XLIV, 62.
 - Walt. XLIV, 52.
lutea Bechst. 4 γ .
macrophylla Poir. XLIV, 7 δ .
 - S. et Z. 18.
Mahaleb L. XLIV, 34.
maliformis Hort. 6 ϵ .
mamillaris Sch. et Mart. 7 ζ .
Marasca Rchb. XLIV, 12.
maritima Wangeh. 21.
Martabanica Steud. XLIV, 66.
micrantha Steud. XLIV, 43 ϵ .
microcarpa C. A. Mey. XLIV, 17.
minutiflora Engelm. XLII, 6.
Mississippi Marsh. 26.
mollis Torr. 26 γ .
montana Hort. XLIV, ad fin.
Mume Sieb. et Zucc. XLII, 7.
multiglandulosa Cav. XLIV, 62 β .
myrobalana Dsf. 9.
nana Duroi XLIV, 43 ϵ .

- Prunus nepalensis* Steud. XLIV, 40.
nigra Ait. 26.
 - Rehb. 5.
nigricans Ehrh. XLIV, 6.
obovata Bigel. XLIV, 43.
occidentalis Swartz XLIV, 51.
odorata Lam. XLIV, 34.
oconomica Borkh. 7.
oxycarpa Bechst. 7 δ.
padifolia Hort. ad fin.
Padus L. XLIV, 35.
 - *rubra* Ait. XLIV, 36.
paniculata Edw. XLIV, 37.
 - Thunb. XLIV, 34b.
pauciflora Bge 14.
pendula Dsf. 29.
pennsylvanica L. fil. XLIV, 29.
persicifolia Dsf. XLIV, 18.
petraea Tausch XLIV, 35 μ.
Poiretiana Heynh. 21.
prostrata Labill. XLIV, 2.
Pruneauliana Hort. 7.
Pseudo-Cerasus Lindl. XLIV, 37.
pubescens Poir. 21.
pubigera Steud. 21.
Puddum Rxb. XLIV, 22.
pumila L. XLIV, 28.
 - Lumn. XLIV, 16.
pygmaea Willd. 21 β.
pyramidalis DC. 7 η.
 - Gaud. 7.
racemosa Lam. XLIV, 35.
Ramburei Boiss. 3.
reclinata Bosc. 21 β.
rivularis Scheele 24.
rubella Bechst. 6 ε.
rubicunda Bechst. XLIV, 6 ε.
rubra Ait. XLIV, 36.
rufa Steud. XLIV, 67.
salicifolia H. B. K. XLIV, 59.
salicina Lindl. 19.
samydoides Schlicht. XLIV, 53.
Schiedeana C. Koch. XLIV, 58.
semperflorens Ehrh. XLIV, 13.
sempervirens Willd. XLIV, 52.
serotina Ehrh. XLIV, 45.
 - Pursh XLIV, 43.
 - Rth XLIV, 13.
serrulata Lindl. XLIV, 20.
sibirica L. XLIV, 4.
sinensis Pers. 32. XLIV, 23 β.
sphaerica Willd. 2 et 21.
sphaerocarpa Mich. 21.
 - Swartz XLIV, 56.
spinosa L. 1.
 - *macrocarpa* Wallr. 2.
spinulosa S. et Z. 17.
subcordata Benth. 27.
subrotunda Bechst. 6 γ.
Susquehanae Willd. XLIV, 28 γ.
sylvatica Rxb. XLIV, 22.
sylvestris Mill. 1.
syriaca Borkh. 6.
texana Scheele 25.
tomentosa Thunb. 12.
 - Wall. 12 γ.

- Prunus trichocarpa* Bge 12 β.
triflora (nec trifolia) Rxb. 13.
 - Raf. 26.
umbellata Eil. XLIV, 31.
undulata Ham. XLIV, 42.
varia Ehrh. XLIV, 6 ε.
vinaria Bechst. 4 ζ.
virginalis Wender. XLIV, 64.
virginiana L. XLIV, 43.
 - Duroi XLIV, 45.
Wallichii Steud. XLIV, 39.
Pterostemon Schauer XVI.
mexicanus S. Sch. 1.
Purshia DC. XXX.
tridentata DC. 1.
Pygeum Gaertn. XLI.
acuminatum Colebr. 1.
zeylanicum Gaertn. 2.
Rhodotypus S. et Z. XXIII.
kerrioides S. et Z. 1.
Rosa L. XXXVII.
abyssinica R. Br. 24.
acantha Waitz 185.
Acharii Billb. 135. 147 α.
acicularis Lindl. 80.
aciphylla Rau 147 β.
aculeatissima Dum. Cours. 160 β.
acuminata Raf. 67.
 - Swartz 82.
 - Tratt. 9 α.
acuta Fisch. 138.
adenophora Kit. 110.
adenophylla W. 90.
affinis Rau 136 β.
 - Sternb. 109 β.
Azeliana Fries 152.
Agatha Red. et Th. 39 β.
agrestis Gmel. 115.
 - Savi 153 ζ.
alba All. 28.
 - Bast. 31.
 - Fl. d. W. 174.
 - L. 131.
 - Reitt. et Ab. 29.
 - β. *damascena* Poir. 35 γ.
albiflora Opiz 153 ζ.
 - Steud. 134.
alpina L. 93.
 - *flore* var. Red. et Th. 51 γ.
 - Pall. 80.
 - Wallr. 98. 99. 122. 147 γ 174 γ.
 - β. Ait. 51.
 - *laevis* R. et Th. 51.
 - *pimpinellifolia* Lindl. 98.
 - *rubella* Ser. 118.
 - β. *suavis* Rehb. 121.
 - *turbinata* Dsv. 91.
altaica Willd. 116.
amabilis Borkh. 82.
ambigua Lej. 147 x.
 - Waitz 74.
amblyotis C. A. Mey. 78.
americana Ser. 82 β.
 - Waitz 71.
amoena Waitz 186.
amygdalifolia Ser. 13.

Rosa Andegavensis Baat. 147 k.
Andersonii Sm. 29 β.
Andreiowii Stev. 134 β.
Andrewsii Tratt. 93 δ.
Andrzejowskii Bieb. 134 β.
anglica Borkh. 37 ρ.
anserinaefolia Boiss. 87.
apetala Lois. 37 γ.
apifolia Del. 37 α.
arborea Pers. 25 β. 187.
Arduennensis Lej. 184.
aristata Lap. 89.
armata Stev. 156.
arvensis L. 29.
 - Wib. 136.
 - *Candolleana* Tratt. 28 δ.
arvina Schwenkf. 32.
aspera Hegetschw. 160 β.
atropurpurea Brot. 10.
atrovirens Viv. 28.
aurantiaca Hort. 101 β.
austriaca Crntz 41.
Axmanni Gn. 32.
baicalensis Turcz. 188.
balearica Dsf. 28 γ.
 - Pers. 28.
balsamica Bess. 153.
 - Willd. 147 γ.
baltica Rth 82 γ. 134.
Banksiae R. Br. 11.
 - Wallr. 7. 13.
basilica Roess. 39 ζ.
Beggeriana Schrenk 30.
belgica Brot. 39.
 - Mill. 35 γ.
 - Poir 37 δ.
bengalensis Pers. 9 v.
 - β. *chinensis* Pers. 9 γ.
 - *micrantha* teutsch. G. M. 9 x.
 - *Thea* teutsch. G. M. 9 δ.
berberifolia Pall. XXXVIII, 1:
Besseri Tratt. 114.
bibracteata Bast. 29 γ.
bicolor Jacq. 101 β.
Bibersteiniana Tratt. 133.
Biebersteinii Ldl. 166.
bifera Dup. 35 δ.
biflora Krock. 93 γ.
bipinnata Dum. Cours. 37 α.
biserrata Mér. 134 α.
blanda Ait. 51.
 - Brot. 39 γ.
 - Lindl. 53.
 - Pursh 50.
 - Wallr. 53.
Borbonia Roess. 39 δ.
Borbonica Hort. 9 β.
borealis Tratt. 109 δ.
Boreykiana Bess. 131 β.
Borkhausenii Gaud. 134.
 - Tratt. 174 ζ.
Borreri Woods 157.
botryophora Hort. ad An.
Bourboniana Dsv. 147 δ.
Boursaultii G. Don 22 β.
brachycarpa Jan. 172.

Rosa bracteata R. et Th. 15.
bracteata Wendl. 14.
bractescens Woods 148.
brevistyla α. DC. 31 δ.
Bronneri Dierb. 141.
Broteroi Tr. 28 α.
Brownii Spr. 25.
Brunonii Ldl. 25.
burgundensis West 39 μ.
burgundiaca Dsf. 37 α.
burgundica Pers. 37 α.
 - Roess. 39 μ.
caesia Sm. 152.
calendarum Borkh. 35.
californica Ch. et Schlicht. 49. 51.
calycina Bieb. 147 α.
 - Mnch. 41.
campaniformis Ser. 131 γ.
campanulata Ehrh. 91 β.
campestris Dumort. 145.
 - Swartz 136.
 - Wallr. 102. 103. 107. 108. 109.
camtschatica Erm. 78.
 - Vent. 75 ζ.
Candolleana Thor. 118.
 - *elegans* R. et Th. 119.
 - *flavescens* R. et Th. 107.
caescens Woods 174 β.
canina Boiss. 155.
 - Hegetschw. 96 γ.
 - L. 147.
 - Siev. 81 β.
 - Wib. 136 β.
 - β. Sut. 96.
 - *aegyptiaca* Ser. 28 β.
 - *ambigua* Dsv. 77 δ.
 - *collina* Pers. 136.
 - *dumetorum* Pers. 134.
 - *fastigiata* Dsv. 134 γ.
 - *globosa* Dsv. 96 δ.
 - *grandiflora* R. et Th. 43 et 182.
 - *Montezumae* DC. 171.
 - *sepium* Koch 153.
 - *sylvestris* Rth 28.
 - *variegata* Andr. 29 δ.
 - var. *fl. albis* Thunb. 3.
 - *speciosa* Koch 131.
cannabina Pall. 131 δ.
capreolata Neill 29 δ.
cardinalis Lawr. 39 α.
carelica Fries 80.
carnea Dum. Cours. 131 ζ.
carolina Dur. 48.
 - L. 47.
 - Tratt. 52.
caroliniana Big. 47.
 - Mich. 48.
caryophyllacea Bess. 162.
caryophyllea Poir. 37 δ.
casta Tr. 118 β.
caucasica Lindl. 143.
caucasica Bieb. 143.
 - *Lindleyana* Ser. 133.
Celsii Lem. Lis. 35.
Centifolia L. 37.
 - *bifera* Poir 35.

Rosa Centifolia β . *hollandica* Pers. 37 v.
 - *holosericea* Andr. 39.
 - *minor* R. et Th. 37 ρ .
cerea Roess. 101.
 - Woods 147 ζ .
Chamaerhodon Vill. 108.
 - Wallr. 35. 37. 39. 41. 91. 131. 134 ζ .
Cherokeensis Donn 3.
chinensis Jacq. 9 γ .
 - Rxb. 9.
chlorophylla Ehrh. 101.
ciliato-petala Bess. 178.
cinerascens Dumort. 146.
cinerea Swartz 82 δ .
cinnamomea Kar. et Kir. 81.
 - L. 82. 93.
 - Led. fl. alt. 82 ι .
 - Lour. 18.
 - Rth 101.
 - Schlicht. et Sch. 82 ϵ .
 - *americana* Ser. 71.
 - ζ . *blanda* R. et Th. 51.
 - *glauca* Dsv. 96.
Clarei Lindl. 28 δ .
clinophylla Red. 82 γ .
Clusiana Waitz 174 γ .
cochinchinensis G. Don 19.
coerulea Tratt. 39 ζ .
 - Woods 179 β .
collina DC. 136.
 - Jcq. 134.
 - Lej. 180.
 - Sm. 31.
 - γ . *coriifolia* Whlbb. 182.
 - *Monsoniana* R. et Th. 31 ϵ .
collincola Ehrh. 82.
concaevifolia Waitz 160 ι .
 - Woods 179 γ .
corallina W. 47.
cordifolia Host. 39.
coriacea Opiz 136.
coriifolia Fries 182.
coronata Hort. 93 ϵ .
coruscans Waitz 123.
corymbifera Borkh. 136.
corymbosa Bosc. 51.
 - Ehrh. 47 γ .
crassifolia Wallm. 182.
cretica R. et Th. 167.
 - Tratt. 167. 178.
 - Wallr. 28. 86. 98. 127 β . 164. 167.
crispa Hort. 37 ϵ .
cucumerina Tratt. 2.
cuprea Jcq. 39 δ .
Cursor Raf. 61.
cuspidata Bieb. 176.
 - Rchb. 160 \times . 174 \times .
cymbaefolia Delaun. 131 δ .
cymosa Tratt. 7.
Cynorrhodon Wallr. 134. 136. 147. 152.
 153. 160. 182.
Czackiana Bess. 44.
Damascena Mill. 35.
dahurica Pall. 82 δ .
dasytema Raf. 70.
Delphiniana Tratt. 39 γ .

Rosa depauperata Schrk. 41 γ .
dibracteata DC. 29 γ .
Dicksoni Ldl. 83.
diffusa Rxb. 21.
digitaria Bosc. 131 γ .
Dijoniensis Roess. 37 k.
dimorpha Bess. 176.
diversifolia Vent. 9 v.
dolosa Wendl. 121.
Doniana Woods. 127 β .
Drummondii Hort. 93 \times .
dubia Wib. 174 \times .
dumalis Bechst. 147.
dumetorum Guss. 29 δ .
 - Sm. 157.
 - Ten. 134.
 - Thuill. 136.
echinata Waitz 189.
Eglanteria Andr. 160 ζ .
 - L. 101.
 - Mill. 160.
 - *americana* Andr. 170.
 - *punicea* Red. et Th. 101 β .
Ehrhartiana Tratt. 39 μ .
elegans Raf. 59.
elliptica Tausch 160 γ .
elongata Dum. Cours. 37 λ .
enneaphylla Raf. 47 β .
episcopalis Roess. 39 δ .
erubescens Andr. 149.
Euratiana (Evratina) Bosc 47.
 - Poir. 160 ϵ .
farinosa Bechst. 174 δ .
fastigiata Bast. 134 γ .
 - Lej. 136 γ .
fastuosa Tratt. 82.
fenestralis Ldl. 33 β .
fenestrata Don 33 β .
fennica Hort. 80 β .
ferox Andr. 75 γ .
 - Bieb. 166.
 - Hort. angl. 167.
ferruginea Hort. 96.
Fischeriana Bess. 190.
flava Wickstr. 102.
flavescens Hask. 42.
flexuosa Raf. 66.
 - Rau 99. 134 γ .
floribunda Hort. 22.
 - Stev. 160 δ .
florida Donn 47 β .
 - Poir. 22 γ .
fluvialis Muell. 82.
foecundissima Duroi 82 ζ .
foetida All. 101.
 - Bast. 175.
foliolosa Nutt. 55.
formosa Roess. 39 δ .
Forsteri Sm. 136 δ .
Fortuniana Paxt. et Ldl. 3 β .
fragariaefolia (nec flora) Ser. 12.
fragrans R. et Th. 9 δ .
Francofurtana Gmel. 91.
Francofurtensis Dsf. 91 β .
Fraseriana Loud. 9 ϵ .
fraxinellaefolia Andr. 28 ζ .

- Rosa fraxinea* Willd. 48.
fraxinifolia Borkh. 53.
 - Dum. Cours. 48.
 - Lindl. 51.
 - α . *blanda* Ser. 51.
 - γ . *Heritierana* Ser. 9 ζ .
Friedlaenderiana Bess. 136.
frondosa Stev. 136 ϵ .
frutetorum Bess. 136 ζ .
fusca Mneh 29 θ .
gallica L. 39.
 - β . et γ . Koch 44.
 - γ . *belgica* Pers. 35 γ .
 - *borbonica* Red. et Th. 147 δ .
 - γ . *hispida* Ser. 41.
 - β . *pulchella* Lk. 45.
 - γ . *pumila* Lk. 41.
 - *Maheka* Red. et Th. 39 θ .
 - *marmorea* Red. et Th. 39 ν .
gemella W. 51. 82.
geminata Rau 115. 131 ϵ .
gentilis Sternb. 119.
germanica Maerkl. 38.
 - Roess. 91.
glaberrima Dumort. 151.
glabra Andr. 73.
 - Meyen 191.
glabrata Vest. 98.
glandulifera Rxb. 26.
glandulosa Bell. 98.
 - Bess. 134 ζ .
 - Bor. 44.
glauca Dierb. 29.
 - Dsf. 96.
 - Hegetschw. 97.
 - Lej. 152.
 - Schott 152.
glaucofolia Opiz 147 θ .
glaucescens Bess. 152.
 - Lej. 147 θ .
 - Wulf 96.
glaucophylla Ehrh. 103.
globosa Raf. 60.
glutinosa Schultz 153 β .
 - S. et Sm. 167.
Gmelini Bge 80 γ .
 - Turcz. 80.
Gorinkensis Bess. 82 θ .
gracilis Woods 127 γ .
grandiflora Ldl. 116.
 - Willr. 153 β . 157.
graveolens Gr. et G. 158 β . et γ .
Grevillei Hort. 22 δ .
Guttensteinensis Jcq. fl. 96 γ .
gymnocarpa Nutt. 169.
Halleri Krock. 29.
Heckeliana Tratt. 172.
helvetica Hall. fl. 153.
hemisphaerica Herrm. 103.
 - Spr. 92.
Heriteriana Sed. et Th. 9 ζ .
Herporrhodon Ehrh. 29 ϵ .
heterocarpa Opiz 154.
heterophylla Woods 174 ϵ .
hibernica Sm. 124.
Hillebrandtii Weitenw. 136.
- Rosa hispanica* Boiss. et Reut. 155.
hispanica Mill. 179.
hispida Borkh. 174 γ .
 - Krock. 93 ζ .
 - Poir. 179.
 - Schrank 41 β .
 - Sims 107.
hollandica Pers. 37 ν .
holosericea Dur. 39 θ .
Hookeriana Wall. 192.
horrida Fisch. 166.
 - Lindl. 128.
Hudsoniana Red. 47.
humilis Bess. 134 δ .
 - Marsh. 48 δ .
 - Meldensis Tratt. 37 ρ .
 - Tausch 41.
 - Wallr. 48. 50. 52.
hyacinthina Hort. 34.
hybrida Gand. 44.
 - Steud. 42.
 - Vill. 93.
 - Woods 174 γ .
Hystrix Lém. 31.
 - Lindl. 1.
japonica Waitz 22 γ .
iberica Stev. 164.
incana Kit. 183.
incarnata Pers. 131 ζ .
indica Forsk. 28 β .
 - L. 9.
 - Wallr. 10. 76.
inermis Andr. 93 δ .
 - Delaun 93 λ .
 - Mill. 93.
 - Red. et Th. 91.
 - Roxb. 11.
 - Wender. 95.
inodora Fries 157.
involuta Rxb. 15.
involuta Sm. 126.
Isaurae Tratt. 164.
Jundzilli Bieb. 134 ζ .
Jundzilliana Bess. 134 ζ .
kamtschatka Vent. 75.
kentuckensis Raf. 57.
Kluckii Bess. 153 β .
Kingstonia Dum. Cours. 37 μ .
Kosciuskana Lk 134 ϵ .
Kosinskiana Bess. 134 ϵ .
Kotschyana Boiss. 88.
Krockeri Tratt. 82 α .
laciniata Lej. 136.
laevigata Mich. 3.
lagenaria Vill. 93 ϵ .
lanceolata Mneh 174.
 - Opiz 136 β .
latispina C. Koch 85.
Laurentiae Tratt. 9 α .
Lawrenceana Ldl. 9 α .
laxa Lindl. 52.
 - Retz 81.
 - β . *incana* Wickstr. 82 μ .
Ledebourii Spr. 181.
Lecana Sweet 193.
lepida Waitz 35 δ .

Rosa Leschenaultiana Red. et Th. 28 x.

- leucantha Bieb. 133.
 - Lej. 147 λ.
 - Lois. 31.
- leucochroa Dsv. 31 δ.
- L'Heritierana R. et Th. 9 ζ.
- Libanotica Boiss. 163.
- Libertiana Tratt. 162.
- Lindleyana Tratt. 15.
- Lindleyi Spr. 52.
 - Wall. 26.
- Linkii Dehnh. 5.
- livescens Bess. 41 γ.
- livida Host 96 γ.
- longifolia Poir. 9 γ.
- Loureiroana G. Don 18.
- lucida Ehrh. 48.
 - Lawr. 14.
- lurida Andr. 96.
- lutea Baumg. 107.
 - Brot. 103.
 - Lindl. 11 β.
 - Mill. 101.
 - nigra Pronv. 54.
- luteola Thory 101 δ.
- lutescens Pursh 104.
- Lutetiana Lem. 152.
- Lyellii Lindl. 77.
 - Wallr. 14. 15. 77. 75. 82 γ.
- Lyonii Pursh 48 γ.
- Macartnea Dum. Cours. 3. 14.
- macrantha Desp. 43.
- macrocarpa Mér. 153.
 - Roch. 41.
- macrophylla Lindl. 84.
 - Wall. 85.
- Maerklini Dierb. 161.
- Maheka Red. et Th. 39 θ.
- majalis Herrm. 82 λ.
 - Wallr. 75. 81. 82. 96. 165.
- Malmundariensis Lej. 147 γ.
- marginata Wallr. 174 ε.
- Mariaeburgensis R. et Th. 109 δ.
 - Tratt. 116.
- Maukschii Kit. 111.
- maxima Dsf. 37 v.
- melanocarpa Lindl. 118 γ.
 - Lk 114.
- Meldensis Dum. Cours. 39 μ.
- menstrua Andr. 35 δ.
- Meyeniana Steud. 191.
- micrantha Sm. 158.
- microcarpa Bess. 114.
 - Lindl. 7.
 - Retz 82 μ.
 - Thunb. 144.
- microphylla DC. 28 λ.
 - Rxb. 17.
 - Willd. 82 v.
- mitissima Gm. 109 ε.
- mixta Tratt. 93 λ.
- mollis Led. 181.
 - Sm. 179.
 - Wender. 137.
- mollissima Fries 178.
 - Willd. 174 x.

Rosa monophylla Dum. Cours. XXXVIII, 1.

- Dup. 37 τ.
- Monsoniae Lindl. 31 ε.
- Monspeliaca Gouan 93 ζ.
- montana Chaix 98.
 - DC. 174.
 - Stev. 134.
- Montezumae H. B. K. 171.
- Moorcroftii Wall. 194.
- moschata DC. 28.
 - Mill. 26.
 - Wallr. 24. 25. 26. 28.
 - nivea bot. reg. 26 ε.
- Mosquensis Spr. 82 λ.
- multiflora Dum. Cours. 37 λ.
 - Thunb. 22.
- muricata Waitz 82 λ. 121.
- muscosa Ait. 37 ε.
- mutabilis Dum. Cours. 39 θ.
 - Pers. 37 o.
- mutica Fries 82 θ.
 - Muell. 82 λ.
- myriacantha Ser. 117.
- myrobolarum Duh. 35.
- myrtifolia Hall. fil. 153 ζ.
- Nankinensis Lour. 76.
- Nebrodensis Guss. 142.
- neglecta Tratt. 52.
- nemoralis Lem. 162.
- nemorosa Lej. 162.
- nepalensis Ldl. 28 γ.
- nitens Dsv. 147 v.
- nitida Willd. 50.
- nitidula Bess. 134 ζ.
- nivalis Donn 126.
- nivea DC. 3.
 - Hort. 37 β.
 - Raf. 64.
- Noisettiana Red. et Th. 9 θ.
- normannica Dum. Cours. 37 π.
- nova Dum. Cours. 195.
- nuda Woods 147 ε.
- oblongifolia Dum. Cours. 195.
- obovata Raf. 62.
- obtusifolia Dsv. 31.
- ochroleuca Waitz et Wender. 106.
 - Wickstr. 107.
- odorata Sweet 9 δ.
- odoratissima Scop. 93 ε.
- Oederiana Tratt. 108.
- olympica Donn 41.
- Opsostemma Ehrh. 26.
- Orbessana Red. 91 γ.
- orientalis Dup. 86.
- orthosepala Schimp. et Sp. 47. 51. 82. 96.
- ovata Lej. 29 θ.
- oxyacantha Bieb. 129.
 - Kar. et Kir. 81 β.
- pallens Retz 130.
- pallida Tratt. 107.
- palustris Marsh. 47.
- paniculata Hort. 9 θ.
- papaverina Mnch 39 λ.
- parviflora Ehrh. 48 δ.
 - EH. 48 γ.
 - Lap. 98.

- Rosa parviflora* Torr. 48.
parvifolia Ehrh. 39 μ .
- Tratt. 109 ζ .
pauciflora Lindl. 79.
pendulina Ait. 93 η .
- L. 94.
- Rth 118.
- *stricta* Rehb. 94.
pensylvanica Mich. 47.
- fl. pl. Wangenh. 48 β .
pentaphylla Schrk 20.
persica Michaut XXXVIII, 1.
phoenicea Boiss. 36.
pictorum Dum. Cours. 37 ν .
pilosa Hegetschw. 136.
- Opiz 147 σ .
pilosiuscula Opiz 147 π .
pimpinellifolia L. 108.
- Pall. 116.
- Tratt. 109.
- Vill. 98.
- δ . *adenophora* Gr. et G. 117.
- *flavescens* Ser. 107.
- *involuta* Ser. 126.
- *leiostyla* Koch 114.
- *Mariaeburgensis* Tratt. 116.
pisifera C. Koch 113.
Pitcairnea Sab. 116.
platyacantha Hort. ad fin.
platyphylla Rau 136 η .
podolica Tr. 152.
Polliniana Spr. 41.
Pollinii Poll. 41.
polyantha S. et Z. 23.
polyanthos Roess. 35.
polymorpha Schimp. et Sp. 147 adn.
polyphylla W. 94. 118.
pomifera Koch 179.
- *domestica* Herrm. 179.
- *sylvestris* Herrm. 174.
Pomponia Ser. 37 ρ . σ .
Portenschlagiana Tratt. 93 ϵ .
portlandica Hort. 35 ϵ .
- Ludw. 56.
poteriifolia Bess. 114 β .
Pouzini Tratt. 98 β .
praecox Wendl. 82.
- Lodd. 165.
Praenestina Mill. 39 ν .
pratensis Raf. 68.
- Swartz 135.
prostrata DC. 28 ξ .
provincialis Ait. 37 ρ . σ .
- Bieb. 166.
pruinosa Lindl. 196.
pseudo-indica Ldl. 6.
pseudo-lucida Bess. 52.
pseudo-rubiginosa Lej. 160 α .
psilophylla Rau 135.
puberula Dsv. 134.
pubescens Fisch. 197.
- Lem. 134.
- Rxb. 27.
pulchella Willd. 45.
- Woods 174 λ .
pulverulenta Bieb. 165.
- Rosa pulverulenta* Ten. 173.
pumila L. fl. 41.
- *praecox* et *regalis* Tratt. 39 β .
punica Mill. 101 β .
purpurescens Fisch. 139.
pusilla Raf. 65.
pustulosa Bert. 173.
pygmaea Bieb. 41 γ .
- Krock. 82 α .
pyrenaica Gouan 93 ϵ .
Rafinesqueiana Tratt. 66.
Rafinesquii DC. 64.
Rapa Bosc 48.
Ratonskiana Bess. 134 δ .
Rau Tratt. 134 θ .
reclinata R. et Th. 9 λ .
recurva Roxb. 16.
Redoutea Thory 50. 126.
- *glauca* R. et Th. 118 β .
- *parvifolia* R. et Th. 109 ζ .
- *rubescens* R. et Th. 50.
Redowskiana Bess. 198.
Regina Roess. 37 ν .
Reichenbachiana Waitz 40.
Remensis DC. 39 μ .
repens Muenchh. 41.
- Scop. 29 θ .
resinosa Lej. 160 λ .
- Sternb. 178.
reversa Presl 93 θ .
- W. et K. 122.
Reynierii Hall. f. 98.
Rhemensis Roess. 39 μ .
riparia Raf. 69.
Rosenbergiana Red. 91 δ . 131 γ .
rotundifolia Rau 160 μ .
Roxburghii Sweet 22 δ .
- Tratt. 17.
rubella Sm. 118.
rubicunda Hall. fl. 96.
rubifolia R. Br. 33 γ .
rubiginosa Gu. et H. 160 γ .
- Jacq. 160 ξ .
- L. 160.
- Mor. 158 γ .
- T. et Gr. 170.
- β . Guss. 153 ζ .
- *anemoniflora* Thory 160 ι .
- *cretica* R. et Th. 167.
- *foetida* Dsv. 171.
- *glabra* Rau 153.
- *inodora* Lindl. 157.
- *Isaurae* R. et Th. 164.
- *micantha* Lindl. 158.
- *nemoralis* Red. et Th. 162.
- *parvifolia* Lindl. 109 ζ .
- - Willd. 158.
- *sepium* DC. 153.
- *spinulifolia* Ser. 99.
- *Zabeth* R. et Th. 160 ι .
rubra Lam. 39.
rubrifolia Jcq. 96 γ .
- Vill. 96.
- *glandulosa* Ser. 98.
- *montana* Gaud. 98.
rubripetala Roem. 199.

Rosa rubrispina Bosc 50.
rufoaulis Ehrh. 56.
Ruga Ldl. 9 μ .
rugosa Thunb. 75.
rupestris Crantz 93.
rustica Lem. 31.
rupicola Fisch. 140.
Russelliana Loud. 22 α .
Sabini Sm. 127.
sancta A. Rich. 150.
sanguisorbifolia Donn 109 γ .
sarmentacea Woods 147 α .
saxatilis Stev. 132.
scabriuscula Sm. 174.
scandens Brot. 28 α .
 - Mill. 28.
 - Moench 29.
 - Wallr. 28. 29. 31. 134 γ . 175.
Scopoliana Tratt. 201.
scotica Mill. 108.
semperflorens Dsf. 35 δ .
 - Rxb. 9 ν .
 - minima bot. mag. 9 α .
sempervirens Dup. 26.
 - L. 28.
 - Rau 134 δ .
 - Roess. 29.
 - Rth 180 ξ .
senticosa Ach. 152.
sepium Borkh. 136.
 - Rau 136 δ .
 - Swartz 182.
 - Thuill. 153.
Seraphinii (Seraphinii) 158 γ .
sericea Ldl. 168.
serpens Gil. 147.
 - Wib. 29 δ .
Serrae Dehnh. 4.
serrulata Raf. 63.
sessiliflora Waitz 35 α .
Sherardi Dav. 177.
setifera Mich. 33.
 - Ser. 3 γ .
setosa Bess. 200.
sibirica Tratt. 116.
sicula Tratt. 158 γ .
Silverhielmii Schrenk 100.
simplex Scop. 201.
simplicifolia Salisb. XXXVIII, 11.
 - Tratt. 37 α .
sinica Ait. 3.
 - L. 9 ν .
 - Wallr. 1. 2. 3. 6. 16.
 - Ternatea Tratt. 9 ξ .
solstitialis Bess. 136 δ .
Solandri Tratt. 53.
songarica Bge 81 β .
speciosa Hort. 93 α .
spinosissima Gort. 82 λ .
 - Jcq. 109 δ .
 - L. 109.
 - Lour. 19.
 - Sm. 108.
 - Whlhb. 82.
 - aculeatissima Woods 106 β .
 - luteola Andr. 107.

Rosa spinosissima parvifolia Tratt. 109 ζ .
 - pusilla Woods 108 γ . 109 η .
spinulifolia Demat. 99.
Sprengeliana Tratt. 72.
stipularis Mér. 147.
stricta Donn 94.
stylosa Dsv. 31.
 - glandulosa Ser. 153 β .
suaveolens Pursh 170.
 - glauca Raf. 118 β .
suavifolia Lightf. 160.
suavis Wallr. 71. 121. 170.
 - Willd. 121.
subglobosa Sm. 177.
subscandens Hask. 10.
sulphurea Ait. 103.
surculosa Woods 147 ν .
Swartzii Fries 147.
sylvatica Tausch 41 β .
sylvestris Crantz 202.
 - Gater 44.
 - Herrm. 29.
 - Lindl. 174.
 - Luc. 136.
 - Rchb. 136 δ .
 - Schrank 29 δ .
systyla Bast. 31.
 - Woods 174 μ .
taurica Bieb. 134.
tatarica Roess. 37 ν .
Teneriffensis Donn 147.
tenuifolia Hort. ad fin.
tenuiglandulosa Mer. 160 ξ .
tenuis Beck. 93.
terebinthinacea Bess. 174 ν .
terebinthina Tratt. 174 ν .
ternata Poir. 3.
Ternauxiana Ser. 9 ξ .
tetrapetala Royle 168.
Thea Hort. 9 δ .
Thoryi Tratt. 22 δ .
toментella Lem. 157.
tomentosa Koch 174.
 - Sm. 174 ξ .
 - α . et η . Woods 177.
tortuosa Wierb. 46.
Tourneps Hort. gall. 51.
trachyphylla Rau 99. 134 α .
trichocarpa Waitz 131 ζ .
tricolor Hort. 101 β .
trifoliata Bosc 3.
trifoliolata Raf. 58.
triphylia Rxb. 8.
Tuguriorum W. 29 θ .
turbinata Ait. 91.
 - Vill. 93 λ .
turbinella Swartz 82 α .
turcica lutea Roess. 101.
turgida Pers. 48.
ulmifolia Pronv. 37 φ .
umbellata Leers 160 ξ .
 - Lib. 136.
 - Poir. 147 χ .
umbelliflora Swartz 174.
uncinella Bess. 136 ι .
unguiculata Dsf. 37 θ .

- Rosa unica* Dum. Cours. 37 o.
 urbica Lem. Lis. 136 β.
 usitatissima Gater. 131.
 Vaillantiana Red. et Th. 160 o.
 varia Schimp. 41.
 varians Pohl 41 δ.
 velutina Clairv. 108 δ.
 venosa Swartz 152.
 Ventenatiana Red. et Th. 120.
 venusta Waitz 93 λ.
 verecunda Waitz 35 γ.
 versicolor Dum. Cours. 39 v.
 - Hort. 106 ε.
 - Tratt. 118.
 vestita Sternb. 96.
 Villarsiana Sm. 109.
 Villarsii Tratt. 93.
 villosa L. 179.
 - DC. 174 x.
 - Hegetschw. 134.
 - Sm. 127 γ.
 - Wallr. 174. 178. 179.
 - Evrathina R. et Th. 160 ε.
 - mollissima Pers. 174 x.
 - β. myriacantha Lap. 117.
 - terebinthina Red. et Th. 174 v.
Vilmorina Dum. Cours. 37 γ.
 - Hort. 39 ι.
 viminea Ldl. 128.
 violacea Roess. 39 θ.
 virginiana Dur. 47.
 - Mill. 51.
 virginica Curt. 72.
 viscida Tausch 203.
 viscosa Jan. 159.
 vulpina Wallr. 101.
 Waitziana Rehb. 41 ε.
 Wallichii Sabin. 28 x.
 - Tratt. 168.
 Webbiana Wall. 112.
 Willdenowii Spr. 82 v.
 - Tratt. 45.
 Wilsonii Don 125.
 Wolfgangiana Bess. 41 ζ.
 Woodsii Lindl. 54.
 - var. Borr. 51 β.
 Wulfenii Tratt. 93 μ.
 xanthina Ldl. 105.
 Zabeth Red. et Th. 160 ι.
Rubus L. XIX.
 sbruptus Ldl. 186.
 acerifolius Wall. 3.
 aculeatus Spr. 217.
 Acheruntinus Ten. 233.
 acicutatissimus Hegetschw. 201.
 acuminatissimus Hask. 50.
 acuminatus Sm. 14.
 adenótrichus Schlt. 96.
 affinis Weihe 166.
 agrestis W. et K. 234.
 - var. Acheruntinus 233.
 albescens Rxb. 46 β.
 albicans Kit. 161.
 alceaefolius Poir. 2.
 alpestris Blume 119.
 althaaefolius Weihe 227 β.
Rubus amoenus Koehl. 225.
 - Portenschl. 153.
 anomalus Arrh. 33 γ.
 apetalus Poir. 62.
 apiculatus W. et N. 204 β.
 appendicuiatus Weihe 227 γ.
 - Tratt. 160.
 apricus Wimm. et Grab. 158 β.
 Arduennensis Lib. 188.
 argenteus Gm. 156.
 - W. et N. 186 β.
 argutus Lk 110.
 arvensis Willr. 235.
 asper Don 44.
 - Presl 181.
 australis Forst. 60.
 avellanaefolius Koehl. 142 β.
 axillaris Weihe 144.
 Babingtonii Bell. Salt. 218.
 Balfoueanus Blox. 176.
 Bellardi Weihe 204.
 bellidiflorus Hort. ad fin.
 Bergii Ch. et Schlecht. 73.
 betulinus Don 11.
 bicolor Lej. 186.
 biflorus Buch. 43.
 bifrons Vest. 227 δ.
 Bloxami Lees 218.
 Bogotensis N. B. K. 100.
 bonariensis Steud. 81.
 borbonicus Pers. 62.
 Borreri Bell. Salt. 232 β.
 bracteosus Weihe 231.
 caesius Guss. 233.
 - L. 235.
 - Wib. 166.
 - β. agrestis Maly 234.
 - β. Sprengelii Fic. 232.
 - ε. hispidus W. et N. 226.
 calvatus Blox. 183.
 canadensis L. 110.
 candicans Fries 186.
 - Guss. 190.
 - Weihe 158.
 canescens DC. 156.
 canus Kit. ad fin.
 carpinifolius G. et Gr. 210.
 - Presl. 142.
 - W. et N. 173 δ.
 celebicus Bl. 56.
 chinensis Ser. 39.
 chrysocarpus Mund 74.
 cinerascens Weihe 208.
 cinereus Rehb. 224.
 cissoides A. Cunn. 79.
 cochinchinensis Tratt. 117.
 Colemanni Blox. 220 γ.
 collinus DC. 188.
 - Hegetschw. 227 λ.
 - Nocc. et Balb. 189 γ.
 Commersonii Poir 61 β.
 compactus Benth. 83.
 compar R. Br. 70.
 concolor Hegetschw. 214.
 - Ley 201.
 - Royle 40.

Rubus corchorifolius L. fl. 19.
cordatus Bl. et Fingerh. 164.
cordifolius Bah. 155.

- Don 12.
- Presl 164.
- W. et N. 156 β.
- Wimm. 158 γ.

coriaceus Poir. 104.
coronarius Sims 61 β.
corylifolio-idaeus Mey. 135.
corylifolius DC. 135 β.

- Hartm. 228.
- Hayne 135 ζ.
- Presl 142.
- Rchb. 227.
- Sm. 229.
- W. et N. 161.
- β. *sylvaticus* Fries 135.
- β. *intermedius* Whlhb. 228.
- ε. *glandulosus* Wallr. 226.
- *sublittoralis* Fries 229.

Courtoisianus Lej. 166.

crataegifolius Bge 24.

Crippsii Clark. 153.

cuneifolius Pursh 112.

Cupanianus Guss. 200.

dalmaticus Tratt. 153.

Decloëtii Ortm. 135 γ.

deliciosus Torr. 28.

diffusus Lej. 227 ε.

digitatus Spr. 140.

discolor W. et N. 186.

dissectus Ten. 147.

distans Don 42.

diversifolius Tin. 182.

Donianus Spr. 130.

Douglasii Steud. 107.

dumetorum Hegetschw. 229.

- Schlicht. 95.
- W. et N. 227.
- α. *vulgaris* W. et N. 228.
- β. *glandulosus* Godr. 226.

Eglanteria Tr. 58.

ellipticus Sm. 131.

elongatus Sm. 5.

Enslonii Tratt. 109 γ.

erectus Koehl. 138.

exsuccus Steud. 71.

fagifolius Ch. et Schlicht. 94.

fastigiatus W. et N. 135 δ.

ferox Vest 185.

- Weihe 227 ζ.

ferrugineus Wickstr. 92.

Fieberi Ortm. 227.

fissus Lindl. 137.

Finlaysonianus Wall. 47.

flagellaris H. et Arn. 113.

- Willd. 110.

flavus Ham. 131.

flexuosus Lej. 206.

floribundus H. B. K. 101.

- Ley 202.

floridus Tratt. 109 γ.

foliolosus Don 130.

foliosus W. et N. 205 β.

Frambaesianus Lam. 33.

Rubus Francipani Tin. 154.

fraxinifolius Poir. 53.

frondosus Torr. 109 β.

fruticosus Guss. 153.

- Hayne 156 γ.
- L. 142.
- Lour. 117.
- Roth 155.
- Sm. 186.
- Walt. 109.
- W. et N. 158.
- *flore rubro pleno* Hort. 153 β.
- α. *viridis* Maly 135.
- β. *amoenus* Vis. 153.
- β. *Arduennensis* Lej. 188.
- β. *intermedius* Hol. 157.
- β. - *Wahlenb.* 228.
- β. *silesiacus* Wimm. et Gr. 158 γ.
- β. *tomentosus* Maly 156.
- β. *velutinus* Maly 227.
- γ. *Bieb.* 151.
- γ. *discolor* Maly 186.
- δ. *inermis* Ait. 109 β.
- ε. *glandulosus* Wallr. 212.

furfuraceus Wall. 124.

fusco-ater W. et N. 220.

fuscus W. et N. 224.

glaber Mill. 33 ε.

glabratus Cust. 145.

- H. B. K. 106.

glabriusculus Hassk. 18.

glandulosus Bell. 204.

- Gu. et H. 199.
- β. *Bert.* 201.
- β. *hirtus* Maly 205.
- γ. *incanescens* DC. 191.

glaucus Benth. 86.

glomeratus Bl. 6.

Godroni Lec. et Lam. 157.

Gowreophul Rxb. 121.

Grabowskii Wimm. et Grab. 155 β.

gracilis Presl 227 β.

- Rxb. (nec *gacilis*) 48.

grandiflorus Bl. et Fing. 156 γ.

grandifolius Lowe 69.

Guentheri W. et N. 195.

Gunnianus Hk 77.

Hamiltonianus Ser. 2 β.

heteracanthus Weihe 207.

heterocaulon Ortm. 135 ε.

heterophyllus Host. 204 γ.

- Willd. 114.

hexagynus Rxb. 9.

hirsutus Lej. 142 δ.

- Presl 203.

hirtus Guss. 200.

- Rxb. 126.
- W. et K. 205.
- β. *pubescens* Wimm. et Grab. 195.
- β. *thyrsiflorus* Godr. 195 β.
- γ. *gracilis* G. et Gr. 167 γ.
- δ. *cinereus* G. et Gr. 195.

hispidus L. 111.

- W. 113.

Hochstetterorum Seub. 68.

holosericeus Vest. 227 λ. 235 δ.

Robus Hoffmeisterianus Kth et Bouché 127.

- Hookeri C. Koch 91.
 horridus Hartm. 191.
 - Koehl. 199.
 - Schultz 227 ζ.
 humifusus Schlicht. 99.
 - Weihe W. et N. 195 γ.
 humistratus Steud. 99.
 humilifolius C. A. Mey. 25.
 hybridus Vill. 204.
 hypargyrus Edgew. 128.
 hypoleucus Vest 227 β.
 Hystrix Guenth. 216.
 jamaicensis L. 90.
 japonicus L. XXI, 1.
 javanicus Blume 54.
 idaeus Arrab. 101.
 - L. 33.
 - Nutt. 36.
 - Thunb. 35.
 - Torr. 35 β.
 - β. americanus Torr. 37.
 - β. canadensis Rich. 36.
 imbricatus Bab. 169.
 imperialis Ch. et Schlicht. 88.
 inoanescens Bert. 191.
 incisus Thunb. 23.
 incurvatus Bab. 167.
 indicus Lesch. 9.
 inermis fl. bat. 33 δ.
 - Willd. 109 β. 110.
 infestus Hartm. 191.
 - W. et N. 223 β.
 intermedius Ortm. 227 &
 Koehleri W. et N. 221.
 laciniatus Willd. 139.
 laevigatus Hfsmgg 33 ε.
 Lambertianus Ser. 17.
 lanatus Wall. ad fin.
 lanuginosus Stev. 152.
 lasiocarpus Sm. 46.
 latifolius Bab. 168.
 Leesii Bab. 34.
 Leightonianus Bab. 187.
 Leightonii Lees 215 ε.
 Lejeunii W. et N. 194.
 leucanthus Hance 134.
 leucocarpus Arn. 55.
 leucodermis Dougl. 107.
 leucostachys Schlecht. 187.
 - Steud. 107.
 Libertianus Weihe 180.
 lineatus Reinw. 120.
 Lingua W. et N. 213.
 Linkianus Ser. 141.
 Lobbianus Hk 10.
 longifolius Host 149.
 longipetalus Steud. 116.
 loxensis Benth. 82.
 Ludwigii Eckl. et Zeyh. 65.
 macilentus Jacquem. 16.
 macrocarpus Benth. 84.
 macropetalus Dougl. 116.
 macrophyllus W. et N. 177.
 macropodus Ser. 59.
 maritimus Arrh. 33 ζ.

Robus maritimus L. 142.

- maximus L. 229.
 Menkei W. et N. 205 γ.
 Menziesii Hk. et Arn. 115.
 mexicanus C. Koch 38.
 micans G. et Gr. 211.
 - Weihe 156 λ.
 micranthus Don 41.
 microphyllus Don 130.
 - L. H. 20.
 Mikani Koehl. 224.
 mollis Presl 156.
 moluccanus L. 4.
 - Lour. 2 β.
 - Wall. 3.
 montanus Lej. 188 γ.
 - Ortm. 227 ε.
 mucronatus Blox. 184.
 Mundtii Schlicht. 75.
 mysorensis Heyne 46.
 nemorosus Presl 235.
 - Willd. 227.
 nepalensis Hort. ad fin.
 nessenensis Hall. 135.
 nitidus Bl. et Fingerh. 135.
 - Boenn. 189.
 - Sm. 171.
 - W. et N. 143.
 nivalis Dougl. 31.
 niveus Wall. 122.
 nobilis Hort. ad fin.
 nubigenus H. B. K. 102.
 nutans Vest 227.
 - Wall. 129.
 Nutkanus (Nookkanus) Mocq. 27.
 Nuttallii T. et Gr. 27 β.
 obovalis Mich. 111.
 obovatus Tratt. 111.
 obtusifolius Willd. 151.
 occidentalis L. 37.
 - Schlicht. 38.
 - β. Hook 107.
 ochrascens Blume 4 β.
 odoratus Hort. 27.
 - L. 26.
 oleifolius Steud. 80.
 Organensis Gardn. 89.
 oxyphyllus Wall. 125.
 pallidus W. et N. 223.
 palmatus Thunb. 20.
 paniculatus Moon 121.
 - Rxb. 45.
 - Schlicht. 141.
 - Sm. 13.
 Panormitanus Tin. 159.
 Pappi Eckl. et Z. 66.
 parviflorus Hegetschw. 197.
 - Nutt. 27 β.
 - Wall. 41.
 parvifolius L. 51.
 - Moon 46.
 - Walt. 112.
 pauciflorus Wall. 41.
 pedunculatus Steud. 43.
 pedunculolus Don 43.
 pensylvanicus Poir. 30.

Rubus pentagonus Wall. ad An.

- Petitianus* A. Rich. 72.
petraeus Koehl. 219.
 - Tausch 200.
piletostachys Gr. et G. 192.
pilosus Lej. 227 x.
pinnatus Don 42.
 - W. 64.
platyphyllus G. Koch. 178.
plicatus Hol. 228.
 - W. et N. 142.
Preslii Weitenw. 142.
polymorphus Host 150.
 - Schimp. et Sp. 142 not.
procumbens Mhlb. 110.
pruinosis Arrh. 230.
 - Zoll. 52.
pseudo-caesius Lej. 235 ♂.
pseudo-idaeus Lej. 235 u.
pubescens Vest. 156 μ.
pubinervis Bl. 22.
pulcherrimus Hk. 118.
pungens Camb. 15.
purpureus Bge 133.
pygmaeus Weihe 219.
pyramidalis Bab. 193.
pyrifolius Sm. 8.
Quartianus A. Rich. 67.
racemosus Rxb. 46.
radicans Cav. 93.
Radula W. et N. 212.
reflexus Lindl. 2 β.
Reichenbachii Koehl. 215 ζ.
reticulatus Wall. ad fin.
rhamifolius Lej. 186.
 - W. et N. 155.
rhombifolius Rehb. 173 ♂.
ribifolius S. et Z. 23.
rigidus Sm. 63.
roridus Ldl. 1.
rosaceus Lees 223.
 - W. et N. 207.
rosaeiflorus Hk. 91.
 - Rxb. 49.
rosaeifolius Sm. 61.
roseus Poir. 103.
rotundifolius Wall. 121. 131.
Roxburghianus Wall. 45.
rubescens Lej. 207.
rubricaulis Weihe 156.
 - W. et N. 215.
rudis W. et N. 215.
rugosus Hegetschw. 227 β.
 - Sm. 2.
Salteri Bab. 172.
sanctus Schreb. 151.
sanguinolentus Lk 76.
sapidus Schlecht. 96.
scaber W. et N. 198.
Schiedeanus Steud. 95.
Schlechtendalii W. et N. 177 γ.
schmideloides A. Cunn. 78.
Schleicheri W. et N. 199.
Schummelii Weihe 224.
Selloi Steud. 87.
Sellowii Ch. et Schlecht. 87.

Rubus sempervirens Big. 111.

- senticosus* Koehl. 170.
 - Lees 166.
serpens Gr. et G. 226.
 - W. et N. 206.
setosus Big. 111 β.
siculus Presl 169.
Sieboldii Bl. 21.
silesiacus Koehl. 156 μ.
sinensis Hort. 61 β.
smilacifolius van H. ad fin.
spectabilis Pursh 108.
Sprengelii Weihe 232.
stipularis Benth. 85.
strigosus Mich. 36.
suberectus Anders. 135.
 - Hk. 109 β.
 - β. *mitis* Arrh. 136.
subinermis Ruppr. 136.
sulcatus Koehl. 146.
 - Vest 163.
sundaicus Blume 7.
sylvaticus W. et N. 179.
Tagallus Cham. 57.
tetraphyllus Lk 114.
Thuillieri Poir. 155.
Thunbergii Blume 132.
 - S. et Z. 35.
thyrsiflorus W. et N. 195 β.
thyrsoides Lej. 207.
 - Wimm. 158.
tiliaceus Sm. 12.
tiliaefolius Lej. 231.
 - Weihe 227 λ.
tomentosus Bert. 189 β.
 - Borkh. 156.
 - Bory de St. Vinc. 62.
 - Thuill. 155.
 - β. *amoenus* Gris. 153.
Trevirani Koehl. 175.
trichomallus Schlecht. 97.
trifidus Steud. 32.
trilobus Moç. 32.
triphyllus Bell. 189 β.
 - Thunb. 51.
trivialis Mich. 113.
 - Pursh 110.
 - Torr. 111.
ulmifolius Presl 155.
 - Schott 148.
uncatus Wall. 123.
uniflorus C. Koch 35.
ursinus Ch. et Schlecht. 115.
urticaefolius Poir. 105.
variegatus Hort. ad fin.
velutinus Hk. et Arn. 29.
 - Lej. et Court. 177 δ.
 - Vest 162.
Vervianus Lej. 208.
vestitus Hegetschw. 174.
 - W. et N. 196.
villicaulis Koehl. 174.
 - Wimm. et Grab. 173.
 - c. *glandulosus* Wimm. et Grab. 212.
villosus Ait. 109.
 - Big. 109 β.

- Rubus villosus* Thunb. 19.
 - α . glandulosus Ser. 204.
 - γ . vulpinus Ser. 232.
vinetorum Holb. 196.
viridis Presl 135.
viscosus Weihe 209.
vitifolius Cham. et Schlecht. 30.
vulgaris W. et N. 173.
 - β . glandulosus Godr. 192.
Wahlbergii Arrh. 228.
 - Godr. 157.
Wallichianus W. et Arn. 126.
Weigeli Koehl. 222.
Weihei Koehl. 165.
Weitenweberi Ort. 156.
Wimmeri Weihe 173.
Sanguisorba spinosa Bert. XXXII, 1.
Sarcopoterium Spach XXXII.
spinosum Spach 1.
Schizonotus tomentosus Lindl. XX, 1 δ .
sorbifolius Lindl. XX, 1.
Schizophragma S. et Z. X.
hydrangeoides S. et Z. 1.
Sedum L. IV.
linearifolium Royle 2.
Notarjanni Ten. 3.
populifolium L. fl. 1.
Salonitanum Tin. 4.
Sempervivum L. V.
arborescens L. 1.
Sibbaldia altaica Bge XXXIV, 2.
grandiflora Pall. XXXIV, 1.
sabulosa Steud. XXXIV, 3.
Sieversia W. XXVI.
dryadoides S. et Z. 1.
Spiraea L. XX.
acutifolia W. 19 β .
adiantoides Hort. 16.
alba Big. 49 ϵ .
 - Ehrh. 49 ζ .
alpestris Don 49 β .
alpina Hort. Par. 9.
 - Pall. 20.
 - Willd. 8.
altaica Pall. 48.
altaiensis Laxm. 48.
ambigua Hort. Gelt. 8.
 - Pall. 19.
amoena Morr. 45.
angustifolia O. et Dietr. 51.
aquilegifolia Pall. 14.
argentea Benth. 58.
 - Loud. 59.
 - Mut. 47.
ariaefolia Sm. 56.
belgica Dumort. 23.
bella Sims 33.
Besseriana Ser. 17 β .
betulaefolia Pall. 42.
 - Wats. 43.
Bethlehemensis Hort. 22.
Blumei G. Don 41.
callosa Blume 38.
 - Thunb. 33.
cana W. et K. 25.
canescens Don 36.
Spiraea Cantonensis Lour. 32.
capitata Pursh 2 γ .
carnea Hort. 49 γ .
carpinifolia W. 50.
ceanothifolia Horn. 44.
chamaedryfolia Blume 41.
 - Ch. et Schlecht. 42.
 - Jacq. 5.
 - L. 6.
 - Pursh 43.
 - Ten. 12.
 - Thunb. 4.
 - β . Hook. et Arn. 42 β .
 - β . oblongifolia Camb. 7.
chinensis Hort. ad fin.
coccinia Hort. ad fin.
coerulescens Poir. 57.
corymbosa Raf. 43.
 - Rxb. 4. 32.
crataegifolia Lk 43.
crenata Gouan 21.
 - L. 17.
 - Thunb. 29.
 - var. Thunb. 28.
cuneifolia Wall. 36.
 - Wender. 64.
dahurica Hort. 61.
dasyantha Bge 11.
decumbens Koch 30.
Douglasii Hook. 53.
expansa Wall. 4. 33.
fastigiata Wall. 38.
fixa Ldl. 58.
flabellata Bert. 12.
flexuosa Fisch. 9.
 - Rchb. 30.
floribunda Hort. 1 γ .
foliosa Poir. 5 β .
glauca Wall. 39.
grandiflora Sweet 1 β .
Humanni Hort. Turic. 32.
hypericifolia Claus 17.
 - L. 19.
 - α . et δ . Led. 17.
 - brevifolia Led. 20.
 - β . longifolia Led. 7.
japonica L. fl. 33.
 - Blume 26.
 - Camb. XXI, 1.
incisa Thunb. 31.
 - Hort. 6.
inflexa Hort. 17 δ .
laevigata L. 48.
lanceolata Poir. 32.
lanceifolia Hfmsgg 52.
 - Hort. 51.
latifolia Ait. 49 ϵ .
laxiflora Lindl. 40.
Lindleyana 1 δ .
longifolia Hort. ad fin.
magellanica Poir 27.
media Host 6.
 - Pursh 6 γ .
Menziesii Hk 55.
monogyne Torr. 2 δ .
nana Hort. ad fin.

- Spiraea nepalensis* Lodd. 4.
Nicoudiertii Hort. Gelt. 18.
nutans Royle 59.
oblongifolia W. et K. 7.
 - Wender. 63.
obovata W. et K. 21.
opulifolia L. 2.
ovata Hort. ad fin.
Pallasii Don 1 β.
paniculata W. 49 ζ.
parvifolia Benth. 46.
parviflora Steud. 46.
Pikowiensis Bess. 24.
pinnata Mnch 2.
pinnifolia Walp. 28.
prunifolia S. et Z. 28.
pubescens Turcz. 10.
pulchella Kze 35.
Reevesiana Ldl. 4.
rhamnifolia Wall. 60.
rotundifolia Hort. ad fin.
ruberrima Hort ad fin.
salicifolia L. 49.
Sawranica Bess. 17 γ.
Schrenkiana C. A. Mey. 3.
sericea Turcz. 13.
sibirica Hort. 19 β.
sorbifolia L. 1.
- Spiraea sororia* Penny 42 γ.
stellata Wall. 33.
thalictroides Pall. 14.
Thunbergii S. et Z. 29.
Tobolskia Lodd. 61.
tomentosa L. 54.
trilobata L. 15.
ulmifolia Scop. 5.
 - Suffr. 30.
uralensis Fisch. 17 ε.
venustula Kth et Bouché 34.
vaccinifolia Don 37.
Stephanandra S. et Z. XXII.
flexuosa S. et Z. 1.
Suriana Plum. I.
 maritima L. 1.
Syringa inodora Mnch XII, 9.
 suaveolens Mnch XII, 1.
Tigarea tridentata Pursh XXX, 1.
Verea acutiflora Andr. III, 3.
 ceratophylla Dietr. III, 4.
 spathulata Colla III, 1.
Viburnum hirtum Thunb. VIII, 16.
 macrophyllum Thunb. VIII, 18.
 scandens L. fl. VIII, 12.
 serratum Thunb. VIII, 10.
 virens Thunb. VIII, 12.
Woodfordia floribunda Salisb. XVIII, 1.

ORDO X.

Melocarpae.

Fam. 61. Pomaceae.

I. Crataegus L.

(κρᾶταγος, crataegon apud Latinos, teste Spr. Crataegus Azarolus; a. v. κρᾶτος, firmus, fest, forte deriv.)

A. Stamina 10.

- 1. ? subserrata Benth. pl. Hartw. 10.
- * 2. 55 *Crus galli* L. cod. Nro. 3644. Mexico.
America borealis. --
angustifolia Borkh. (teste Steud., sed ubi?).
cuneifolia Lodd. cat.
lúcida Mill. dict. fig. t. 178.
pyracanthifolia Hort.
Méspilus Crus galli Poir. encycl. méth. IV, 441.
 - *cuneifolia* Mneh meth. 684.
 - *cuneiformis* Marsh. arbust. amer. 88.
 - *lúcida* Dum. Cours. ed. 2. V, 449.
 - *pyracanthifolia* Lodd. cat. Sweet hort. brit. 175.
 - β) *inermis* Hfmsgg 2. u. 3. Nachtr. zu d. Verz. 162.
 - γ) *nana* Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. VII, 286.
 - δ) *salicifolia* Ait. hort. Kew. ed. 1. II, 170.
 - badiata* Hort.
 - Bosciana* Steud. nom. bot. ed. 1. I, 431.
 - lancifolia* Wender. ind. sem. hort. Marb. 1825. Flora IX, 354.
 - Méspilus badiata* Bosc.
 - *Bosciana* Spach hist. d. végét. phan. II.
- * e) *splendens* Ait. hort. Kew. ed. 1. II, 170. Lodd. cat.
 - arbutifolia* Lodd. cat.
 - lúcida* Wangenh. Beitr. z. Forstwiss. nordam. Hoelz. 53. t. 17. f. 42.
 - Méspilus hyemális* Walt. fl. carol. 148.
 - ovalifolia* Hornem. hort. Hafn. suppl. 52. bot. reg. t. 1860.
- 3. 5 *Watsoniana* Steud. nom. bot. 2. ed. I, 434.
Crus galli Wats. dendr. brit. t. 37.
Méspilus Watsoniana Spach hist. d. végét. phanér. II.
- * 4. 5 *prunifolia* Pers. syn. pl. II, 37. nouv. Duh. IV, t. 40. bot. reg. t. 1868. Canada.
caroliniana Lodd. cat.
Méspilus prunifolia Poir. enc. méth. IV, 443.
 - β) *ingestria* Lodd. cat. Loud. arb. et frut. brit. II, 821.
- * 5. 5 *linearis* Pers. syn. pl. II, 37.
Crus galli δ. *linearis* DC. prodr. II, 626.
Méspilus linearis Dsf. hist. d. arbr. et arbriss. II, 156.
- 6. 5 *spinosissima* Lodd. in bot. cab. t. 1100. ? Europa australis.
- * 7. 55 *glandulosa* Mneh Verz. ausl. B. u. St. Weiss. 31. Ait. hort.
Kew. 1. ed. II, 168.
coccinea Lindl. in bot. reg. t. 1957.
Méspilus glandulosa Willd. hort. Berol. 523.

Pyrus glandulosa Moench meth. 680.

- * β) Douglasii T. and Gr. fl. of N. Amer. I, 464.
Douglasii Lindl. in bot. reg. t. 1810.
punctata β. brevispina Dougl. in Hk. fl. bor. amer. I, 201.
- * γ) purpurea Bosc in DC. prodr. II, 628.
Mespilus purpurea Poir. enc. méth. suppl. IV, 73.
- * δ) rotundifolia Moench Verz. ausl. B. u. Staud. v. Weiss. 29. t. 1.
Mespilus rotundifolia Dur. Harbk. Baumz. I, 607.
Pyrus rotundifolia Moench meth. 680.
- * ε) succulenta Schrad. ind. sem. hort. Gott. 1834.?
Mespilus succulenta Sweet hort. brit. 176.
- * 8. δ macracantha Lodd. in Loud. arb. et frut. brit. II, 819. et 855. f. 572. America foed.
spina longissima Hort.
β) minor Loud. arb. et frut. brit. II, 819. et 855. f. 573.
glandulosa β. macracantha Lindl. in bot. reg. fol. 1912. sed t. 1917.
- * 9. δ rivularis Nutt. in T. and Gr. fl. of N. Amer. I, 464. America bor.-occid.
- * 10. 5 odorata Wendl. in Flora VI, 700. America borealis.
- * 11. 53 coccinea L. cod. Nro. 3642. bot. mag. t. 3432. bot. reg. t. 1957. America borealis.
Mespilus coccinea Mill. dict. Dur. Harbk. Baumz. 2. Aufl. I, 612.
β) cuneata Wender. cat. sem. hort. Marburg. 1825. Flora IX, 354.
- * γ) maxima Lodd. cat. Loud. arb. et frut. brit. II, 817.
- * δ) mollis T. and Gr. fl. of N. Amer. I, 465.
mollis Schrad. hort. Goetting.
- * ε) oligandra T. and Gr. fl. of N. Amer. I, 465.
- * ζ) populifolia Ell. sketch of the bot. of S. Car. Flor. I, 553.
- * η) viridis L. cod. Nro. 3643.
Mespilus maxima Dum. Cours. bot. cult. ed. 2. V, 451.
- * 12. 5 corallina Lodd. cat. ? Tausch in Flora XXI, 717. America borealis.
coccinea 2. corallina Loud. arbor. et frut. brit. II, 817.
pyriformis Hort.
? mollis Scheele in Linn. XIX, 569.
- 13. 5 indentata Lodd. cat. Americae borealis.
coccinea 3. indentata Loud. arbor. et frut. brit. II, 817.
- 14. δ pubescens Wendl. in Flora VI, 700. America borealis.
- B. Stam. 15—20; Discus; Fol. majora, integriuscula aut lobata; Flor. corymbosi.
- 15. δ pubescens Steud. nomencl. bot. ed. 2. I, 433. Mexico.
Mespilus pubescens Kth in syn. pl. Humb. et Bonpl. III, 462. H. B. et K. gen. pl. VI, t. 555.
- * 16. δ mexicana DC. prodr. II, 629. bot. reg. t. 1910. Mexico.
Lambertiana Hort. Mexico.
- 17. 5 hypolasia C. Koch. Mexico.
Mespilus mexicanus Sweet brit. fl. gard. 2. sér. III, t. 300.
- 18. δ stipulosa Steud. nomencl. bot. ed. 2. 434. Ecuador (Quito).
Mespilus stipulosa Kth syn. pl. Humb. et Bonpl. III, 462.
- 19. δ quitensis Benth. pl. Hartv. 173. Ecuador (Quito).
- 20. δ arborescens Ell. sketch of the bot. of S. Car. and Georg. I, 550. America foed. austr.
- * 21. 5 leucophleas (nec leucophaeos) Mch Verz. ausl. B. u. America borealis.
Str. v. Weiss. 31. t. 2.
flava Hook. fl. bor. amer. I, 202.
latifolia Pers. syn. pl. II, 37.
pyrifolia Ait. hort. Kew. 2. ed. II, 168. bot. reg. t. 1877.
radiata Lodd. cat.
tomentosa Dur. Harbk. Baumz. 1. Aufl. I, 183. T. and Gr. fl. of N. Am. I, 465.
Mespilus Calpodendron Ehrh. Beitr. z. Naturk. II, 67.
- latifolia Poir. enc. méth. IV, 444.
- lobata Poir. enc. méth. suppl. 71. (teste T. and Gr.)
- pyrifolia Willd. hort. Berol. 523.
β) fol. minor., glabris; Mespilus cornifolia Poir. enc. méth. IV, 414.
- * 22. δ punctata Ait. hort. Kew. II, ed. 2. 169. Jacq. hort. Vind. I, t. 28. America borealis.
Crus Galli Duroi Harbk. Baumz. 1. Aufl. I, 195.
Mespilus cuneifolia Ehrh. Beitr. z. Naturk. III, 21.
- punctata Spach hist. d. végét. phan. II.
- * β) aurea Pursh fl. Amer. sept.
dulsis Ronalds in Loud. arbor. et frut. II, 818.

- pentágyna flava Godefr. in Loud. arbor. et frut. II, 818.
 xanthocarpus Hort.
23. 3) stricta Ronalds in Loud. arbor. et frut. II, 818. America borealis.
 Fontanesiana Steud. nomencl. bot. ed. 2. I, 432.
 Mespilus Crus galli Dsf. hort. Paris. (teste Spach).
 - elliptica Gu. u. H. Abbild. fremd. Holzart. t. 144.
 - Fontanesiana Spach hist. d. végét. phan. II.
24. 5) sanguinea Pall. fl. ross. I, 25. t. 11. (nec T. and Gr. et al.) Siciria.
 β) altaica Led. in Lodd. cat. Gmel. fl. sil. III, 176. Nro. 12.
 purpurea 2. altaica Loud. arb. et frut. brit. II, 823.
 γ) fructu luteo Led. fl. ross. II, 88.
 δ) - nigro Falk in Led. fl. ross. II, 88.
 ε) inermis Kar. et Kir. enum. pl. alt. Nro. 327.
25. 5) alnifolia S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 130. Japonia.
- G. Stamina 15—20; Discus; Folia minora, saepe lobata; Flores 1—6.
26. 5) opaca Hk. et Arn. in Hk. comp. to the bot. mag. I, 25. America foederata
media et australis.
 aestivalis T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 468.
 elliptica Ell. sketch of the bot. of S. Car. and Flor. I, 549.
 Mespilus aestivalis Walt. fl. carol. 148.
 β) lucida T. and Gr. fl. of N. Amer. I, 468. ? Ell. sk.
 of the bot. of S. Car. u. Flor. I, 552.
27. 5) flava Ait. hort. Kew. ed. 1. II, 169. bot. reg. t. 1939. America foederata
media et australis.
 caroliniana Pers. syn. pl. II, 36.
 flavissima Hort.
 Mespilus caroliniana Poir. in enc. méth. IV, 442.
 - flava Willd. hort. Berol. I, 523.
 - prunifolia Hort. (teste Dum. Cours.)
- β) lobata Lindl. in bot. reg. t. 1932. Loud. arb. et frut. brit. II, 824. (nec Bosc).
 lutea Hort. et ? DC. prodr. II, 627.
 Mespilus lutea Poir. enc. méth. suppl. IV, 72.
- γ) trilobata Lodd. cat. Loud. arb. et frut. brit. II, 824.
 spinosissima Lee.
28. 5) turbinata Pursh fl. Amer. sept. II, 725.
 flexispina Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1837.
 ? glandulosa Ait. hort. Kew. ed. 1. II, 169. (teste T. and Gr.)
 Mespilus flexispina Munch Verz. ausl. B. u. St. v. Weiss. 62. t. 4.
 - turbinata Spreng. syst. veget. II, 506.
29. 3) elliptica Ait. hort. Kew. ed. 1. II, 168. America borealis.
 flava Ell. sketch of the bot. of S. Car. and Flor. I, 551.
 glandulosa Mich. fl. bor. amer. I, 288.
 Michauxii Pers. syn. pl. II, 38.
 viridis Walt. fl. carol. 336.
 Mespilus Michauxii Poir. enc. méth. suppl. IV, 69.
- β) folia rotundata; spathulata Pursh fl. Amer. sept. I, 336. bot. reg. t. 1890.
 glandulosa Ait. hort. Kew. 1. ed. II, 168 (teste Lindl.).
 Mespilus spathulatha Spr. syst. veget. II, 507.
30. 5) tomentosa L. cod. Nro. 3645. (nec T. and Gr.) Trew. pl. rar. t. 17. America borealis.
 Mespilus Trewiana Tausch in Flora XXI, 716.
31. 5) pruinosa Wendl. in Flora VI, 701. America borealis.
32. 3) berberifolia T. and Gr. fl. of N. Amer. I, 469. America australis.
33. 5) uniflora Dur. Harbk. Baumz. 1. Aufl. I, 184. America foederata.
 axillaris Lodd. cat.
 parvifolia Ait. hort. Kew. ed. 1. II, 169.
 tomentosa Mich. fl. bor. am. I, 289. et (teste W.) L. cod. Nro. 3645.
 Mespilus axillaris Pers. syn. pl. II, 39.
 - flexuosa Poir. enc. méth. suppl. IV, 73.
 - laciniata Walt. fl. carol. 147.
 - parvifolia Willd. hort. Berol. 523.
 - xanthocarpus Ehrh. Beitr. z. Naturk. II, 67.
- β) betulaefolia Lodd. cat.
- γ) florida Lodd. cat. Loud. arbor. et frut. brit. II, 842.
- δ) grossulariaefolia Loud. arbor. et frut. brit. II, 842.
 linearis Lodd. cat.
- ε) viridis Lodd. cat.
 Mespilus viridis Sweet hort. brit. 175.

34. 5 *virginica* (*virginiana* Hort.) Lodd. cat. Loud. arb. et frut. brit. II, 842. Amer. foed. (Virginia).
35. 5 *cuneata* S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2, 130. Japonia.
36. 5 *integrifolia* Rxb. fl. ind. II, 509. India orientalis.
- D. Stam. 15—20; Discus nullus; Folia glabra aut pubescentia; Poma rubentia.
- * 37. 5 *apiifolia* Mich. fl. bor. amer. I, 287. America foederata
Oxyacantha Walt. fl. carol. 147. media et australis.
Mespilus apiifolia Poir. enc. méth. IV, 68.
 β) *minor* Lodd. cat. Loud. arb. et frut. brit. II, 825. et 860. f. 588.
38. 5 *flssa* Bosc in DC. prodr. II, 628. America foederata.
Mespilus flssa Poir. enc. méth. suppl. IV, 72.
- * 39. 5 *popullifolia* Walt. fl. carol. 149. Mill. dict. fig. 179. America foederata.
cordata Ait. hort. Kew. ed. 1. II, 168. bot. reg. t. 1151.
acerifolia Burgsd. Anleit. z. Erz. d. Holzart. 2. Aufl. II, 151.
Mespilus acerifolia Poir. enc. méth. IV, 442.
 - *corallina* Dsf. tabl. de l'éc. de bot. 174.
 - *cordata* Mill. dict. fig. t. 179.
 - *Phaenopyrum* Ehrh. Beitr. z. Naturk. II, 67.
 β) fol. varieg.
40. 5 *spathulata* Mich. fl. bor. amer. I, 288. bot. cab. t. 1261. America foederata
microcarpa Lindl. bot. reg. t. 1846. media et australis.
Mespilus spathulata Poir. enc. méth. suppl. IV, 68.
 - *sempervirens* Hort. (teste Dum. Cours.)
 β) *foliis multo latioribus* Poir. enc. méth. suppl. IV, 68.
- E. Stam. 15—25; Discus nullus; Sepala serius inflexa; Fol. coriacea, integra.
41. 5 *crenulata* Roxb. fl. ind. II, 509. bot. reg. XXX, t. 52. Nepal.
Pyracantha 2. crenulata Loud. arb. et frut. brit. II, 844.
Mespilus crenulata Don prodr. fl. nepal. 238.
- * 42. 5 *Pyracantha* Pers. syn. pl. II, 37. Europa australis,
Cotoneaster Pyracantha Spach hist. d. vég. phan. II. Oriens, ? China.
Mespilus lucida Sweet hort. brit. 175.
 - *Pyracantha* L. cod. Nro. 3654.
Oxyacantha Pyracantha Medik.
 β) *pomo albo*.
43. 5 *subfusca* Led. in bull. de l'acad. de Pétersb. II, 313. Colchis, Pontus.
- F. Stam. 15—20; Discus nullus; Folia canescentia; Poma nigrescentia.
- * 44. 5 *nigra* W. et K. pl. rar. Hung. I, t. 61. Hungaria.
 ? *carpathica* Lodd. cat.
Mespilus nigra Willd. hort. Berol. 524. bot. cab. t. 1021.
- * 45. 5 *pentágyna* W. et K. in Willd. sp. pl. II, 1006. Hungaria.
Mespilus pentágyna Spr. syst. veget. II, 507.
- G. Stam. 15—20; Discus; Folia lobata aut pinnatifida; Poma minora, erebriora.
46. 5 *triloba* Pers. syn. pl. II, 37. Marocco, Sicilia,
polyacantha Jan. elench. 8. Italia inferior.
Mespilus triloba Poir. voy. en Barb. II, 177.
 - *polyacantha* Guss. prodr. fl. sic. suppl. 154.
 - *monógyna* β. Guss. prodr. fl. sic. I, 565.
maroccana Ten. fl. nap. IV, 275.
- * 47. 5 *Oxyacantha* L. cod. Nro. 3647, Europa, Oriens.
Celsiana Hort. nonn.
oxyacanthoides Bert. fl. ital. V, 148.
spinosa Gilib. fl. lith. V, 231.
Mespilus Crataegus Borkh. (teste Steud., sed ubi?)
 - *Oxyacantha* All. fl. ped. II, 141.
Ostia *Oxyacantha* var. *digyna* Clairv. man. d'herb. en Suisse 162.
Oxyacantha vulgaris Erndt virid. warsaw. 86.
 β) *capitata* Smith in Loud. arb. et frut. brit. II, 834.
 γ) *eriocarpa*; *élegans* Mut. fl. franç. I, 358.
dissecta Borkh. (teste Steud., sed ubi?)
Mespilus élegans Poir. enc. méth. IV, 439.
 δ) *flexuosa* Smith in Loud. arb. et frut. brit. II, 835.

56. 5 pinnatifida Bge in mém. d. sav. étrang. de St Pétersb. II, 100. China borealis.
 57. 5 Oliveriana (Oliveria Lodd.) Bosc in DC. prodr. II, 630. Oriens.
 Oxyacantha var. Oliveriana Lindl. in bot. reg. t. 1933.
 platyphylla Lindl. in bot. reg. t. 1874. (teste Hohenack.)
 Mespilus Oliveriana Poir. enc. méth. suppl. IV, 72.
 * 58. 5³ melanocarpa Bieb. fl. taur. cauc. I, 386. Krim, Transcaucasia.
 orientalis Bosc in DC. prodr. II, 629. (nec Bieb. teste Hohenack.)
 Oxyacantha II. melanocarpa Loud. arb. et frut. brit. II, 831. et 865. f. 605.
 ? platyphylla Lindl. bot. reg. t. 1874.
 fissa Lec.
 Mespilus melanocarpa Spreng. syst. veget. II, 507.
 - orientalis Poir. enc. méth. suppl. IV, 72.
 59. 5 nigra Zigr. dendrol. Fl. d. russ. R. I, 191. Sibiria.
 monógyna nigra Pall. fl. ross. I, 26. t. 12.
 H. Stam. 15—20; Discus; Folia lobata aut pinnatifida; Poma majora, pauciora.
 60. 5 maroccana Pers. syn. pl. II, 37. bot. reg. t. 1855. Africa borealis.
 Mespilus maura γ. maroccana Poir. enc. méth. suppl. IV, 74.
 61. 5 maura L. fl. suppl. 253. Africa borealis.
 Mespilus maura Poir. enc. méth. suppl. IV, 73.
 β) diversifolia Pers. syn. pl. II, 37.
 62. 5 laciniata Ucria in opusc. di aut. sic. VI, 251. Sicilia.
 orientalis Jan. elench. 7.
 Mespilus laciniata Guss. prodr. fl. sic. I, 565.
 - pubescens Presl del. Prag. 53.
 * 63. 5 orientalis Bieb. fl. taur. cauc. I, 397. Transcaucasia, Pontus,
 β) fructu coccineo; odoratissima Horn. hort. Hafn. suppl. 52. Armenia, Asia minor,
 Mespilus odoratissima bot. repos. t. 590. Krim.
 γ) fructu sanguineo; sanguinea Schrad. ind. sem. hort. Gott. 1834.
 orientalis Lindl. in bot. reg. t. 1852.
 Schraderiana Led. fl. ross. II, 91.
 * 64. 5 tanacetifolia Pers. syn. pl. II, 38. bot. reg. t. 1884. Oriens.
 Mespilus tanacetifolia Poir. enc. méth. IV, 440. bot. rep. t. 591.
 β) Celsiana Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. VII, 286.
 ? Oxyacantha 22. Celsiana Loud. arb. et frut. brit. II, 832.
 γ) glabra Lodd. in Loud. arb. et frut. brit. II, 828. et 864. f. 598.
 δ) incisa Lodd.; Leeana Loud. arb. et frut. brit. II, 828. et 864. f. 599.
 65. 5 Azarólus L. cod. Nro. 3648. bot. rep. t. 579. Gallia australis, Italia,
 Azarólus crataegoides Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Oriens.
 Forsttechn. II, 1253.
 Mespilus Azarólus All. fl. ped. II, 241.
 - triloba Poir. voy. en Barb. II, 177. (teste Mut.)
 Oxyacantha β. Lam. fl. franç. II, 484.
 Pyrus Azarólus Scop. fl. carn. ed. 2. II, 347.
 β) floribus plenis.
 γ) fructu flavo-albida nouv. Duh. IV, 158.
 δ) - longo nouv. Duh. IV, 158.
 66. 5 Azarella Gris. spic. fl. Rum. et Bith. I, 88. Rumelia.
 * 67. 5 Aronia Bosc in DC. prodr. II, 629. bot. reg. t. 1897. Oriens.
 Crataegus Azarólus β. Willd. sp. pl. II, 103.
 Mespilus Aronia Willd. enum. suppl. 35.
 - Azarólus β. Aronia Poir. enc. méth. IV, 438.
 I. Species dubiae aut plane incognitae.
 68. 5 atrofusca Stev. in Hohenack. enum. pl. Talsch. 130. Transcaucasia.
 69. ? flavescens Bosc in DC. prodr. II, 630. Patria ignota.
 70. 5 laciniata Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1355. ? America borealis.
 Mespilus laciniata Borchm. Deutschl. Baumz. 296.
 71. 5 Lagenaria F. et M. in Hohenack. enum. pl. Talsch. 131. Transcaucasia.
 72. ? obovata Bosc in DC. prodr. II, 630. Patria ignota.
 Mespilus obovata Bosc (in Steud. nomencl. bot. ed. 2. II, 136.).
 73. ? odorata Bosc in DC. prodr. II, 630. Patria ignota.
 ? Mespilus odorata Wendl. in Flora VI, 700.
 74. ? ovicearpa Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 455. (s.-Mesp.) America borealis.
 75. 5 Poiretiana DC. prodr. II, 630. Patria ignota.
 Mespilus linearis Poir. enc. méth. suppl. IV, 72.
 - Poiretiana Sweet hort. brit. 175.

76. 5 *prunellaefolia* Bosc in DC. prodr. II, 627. Patria ignota.
Méspilus prunellaefolia Poir. enc. méth. suppl. IV, 72.
77. ? *quinquelobata* Bosc in DC. prodr. II, 630. Patria ignota.
78. ? *serratifolia* Dsf. hort. Par. 3. éd. 408. (sine dubio Sorbi species?) Patria ignota.
79. ♂ *subspinosa* DC. prodr. II, 626. (an *Raphiolepis* species?) Chili.
80. ? *trifoliata* Bosc in DC. prodr. II, 630. Patria ignota.
81. ? *umbellata* Dsf. hort. Paris. éd. 3. 408. Patria ignota.
82. ♂ *unilateralis* Pers. syn. pl. II, 37. Carolina.
- Méspilus unilateralis* Poir. in enc. méth. suppl. IV, 73.
83. ? *acanthocarpa* Heynh. nomencl. bot. II, 165. Patria ignota.
- Not. Praeterea in horto nostro dendrologico species aut varietates coluntur sequentes: 1) *alpestris* (an *Crus galli* var.?), 2) *apiifolia* minor, 3) *cerásina*, 4) *floribunda*, 5) *glomerata*, 6) *Pinschow*, 7) *sphaerica*.

II. *Méspilus* L. (nec *Mespylus* Dsf.)(μεσπίλη aut μεσπίλον, *Mespilum*, *Crataegi* aut *Mespili* species.)

- * 1. 5 *germanica* L. cod. Nro. 3653. Gu. u. H. Abb. einh. Holzart. t. 69. Europa, Oriens.
domestica Gater. descr. d. pl. d. env. de Montaub. 92.
vulgaris Rchb. fl. exc. 630.
Crataegus germanica Hort.
Ostia Méspilus Clairv. man. d'herb. en Suisse 162.
- * β) *abortiva* Dum. Cours. bot. cult. ed. 2. V, 446.
 γ) *angustifolia* Borchm. Deutschl. Baumz. 295.
 δ) *apyrena* Duh. arbr. fruit. 8vo. II, 157. t. 4.
 ε) *diffusa* Ait. hort. Kew. II, 172.
laurina Dum. Cours. bot. cult. V, 446.
 ζ) *inermis* Poir. enc. méth. IV, 443.
- * η) *macrocarpa* Duh. arbr. fruit. ed. 8vo. II, 154. t. 3.
 θ) *macrophylla*; *laurifolia* Poir. enc. méth. IV, 443.
 ι) *pyriformis* Dierb. syst. Uebers. d. um Heidelb. wildw. cult. Gew. 147.
 κ) *stricta* Ait. hort. Kew. II, p. 172.
- * 2. 5 *grandiflora* Sm. exot. bot. I, 33. t. 18. Caucasus.
lobata Poir. enc. méth. suppl. IV, 71. bot. mag. t. 3442.
Smithii Ser. in DC. prodr. II, 633.
Crataegus grandiflora Hort.
 - *lobata* Bosc nec Loud.
3. 5 *stipulácea* Desf. (teste Steud. nom. bot. ed. 2. I, 434.) Patria ignota.
Loddigesiana Spach hist. d. végét. phanér. II.
Crataegus stipulácea Lodd. catal.
4. ? *tomentosa* Sartorelli (teste Steud. nom. bot. ed. 2. II, 136. sed ubi?). Patria ignota.

III. *Eriólobus* DC.

(έριον, lana, Wolle et λοβος, auricula, hoc loco: lacinia calycina, Kelchabschnitt.)

1. ♂ *trilobata* C. Koch. Syria.
Crataegus trilobata Labill. ic. pl. Syr. rar. IV, 15. t. 10.
Pyrus trilobata DC. prodr. II, 636.

IV. *Osteoméles* Lindl. (nec *Osteomelis* G. Don.)

(όστειον, os, Knochen et μήλον, malum, Apfel.)

1. 5 *anthyllidifolia* Lindl. in transact. of the Linn. soc. III, 98. t. 8. *Insula sandwicensis*.
Méspilus anthyllifolia Spreng. syst. veget. II, 85. Japonia.

V. *Chamaeméles* Lindl. (nec *Chamaemelis* G. Don.)

(χάμαι, humi, auf der Erde et μήλον, malum, Apfel.)

1. 5 *coriácea* Lindl. in transact. of the Lin. soc. XIII, 104. t. 11. Ins. Madeira.

VI. *Hesperoméles* Lindl.

(ίσπερα, occidens, Abendland, hoc loco: America et μήλον, malum, Apfel.)

1. ♂ *cordata* Lindl. in bot. reg. ad. tab. 1956. Peruvia.
Crataegus ferruginea Pers. syn. pl. II, 37.
Eriobótrya cordata Lindl. in transact. of the Linn. soc. XIII, 102.
Méspilus ferruginea Poir. enc. méth. suppl. IV, 273.
 - *lanuginosa* R. et P. fl. per. t. 425. f. 1.
Osteoméles ferruginea H. B. et K. gen. et sp. pl. amer. VI, 167.
 β) *latifolia* H. B. K. gen. et sp. amer. VI, 167. t. 553.

2. ♀ *oblonga* Lindl. in bot. reg. ad tab. 1956. Peruvia.
 3. ♀ *obtusifolia* Lindl. in bot. reg. ad tab. 1956. Peruvia.
Crataegus obtusifolia Pers. syn. pl. II, 37.
Eriobótrya obtusifolia DC. prodr. II, 632.
Méspilus obtusifolia Poir. enc. méth. suppl. IV, 73.
 - *Persooni* Spreng. syst. veg. II, 506.
 4. ♀ *cuneata* Lindl. in bot. reg. ad tab. 1956. Peruvia.
 5. ♀ *glabrata* C. Koch. Nova Granada.
Eriobótrya glabrata Steud. nomencl. bot. ed. 2. 585.
Méspilus glabrata Spr. syst. veg. II, 506.
Osteoméles glabrata H. B. K. gen. et sp. pl. amer. VI, 166. t. 553.

VII. *Stranvaesia* Lindl.

(Fox Will. Stranvays, scriba officialis anglicus rerum externarum ad rempublicam mexicanam pertinentium et peregrinatoris mexicani Hartwegii fautor.)

1. ♀ *glaucescens* Lindl. in bot. reg. t. 1956. Nepal.
Crataegus glauca Wall. num. list. 673. Loud. arb. et frut. brit. II, 844. f. 562. 563.
 2. 5 *digyna* Sieb. et Zucc. Abh. d. baier. Acad. phys. Kl. IV, 2. 129. Japonia.
Crataegus Sieboldii Steud. nomencl. bot. 2. ed. I, 434.
 - *villosa* Thb. fl. jap. 204.
Mashilea Sieboldii Blume (teste Steud., sed ubi?).
Méspilus Sieboldii Blume bijdr. 1102. (teste Sieb.)
 - *villosa* Poir. enc. méth. IV, 445.
Photinia Sieboldii G. Don dichl. pl. II, 602.
 - *villosa* DC. prodr. II, 631.

VIII. *Eriobótrya* Lindl.

(ἐρίον, lana, Wolle et βερρυς, racemus, Traube.)

- * 1. ♀ *japonica* Ldl. in tr. of the Linn. soc. XIII, 102. S. et Z. China, Japonia.
 fl. jap. I, t. 97.
Crataegus Bibas Lour. fl. coch. I, 391. (Pi-pa, nomen chinense.)
Méspilus japonica Thunb. fl. japon. 206. bot. reg. t. 365.
 - *populifolia* Hort.
 2. ♀ *chinensis* G. Don dichl. pl. II, 603. China.
Crataegus chinensis Steud. nom. bot. ed. 2. II, 432.
Méspilus chinensis Blume bijdr. 1102.
 3. ? *heterophylla* Lindl. in transact. of the Linn. soc. XIII, 102. (s. descr.) Peruvia.

IX. *Raphiölepis* Lindl. (rectius *Raphiolepis*.)

(ῥαφίς, acus, Nadel et λεπίς, squama, Schuppe, ob bracteas angustas.)

- * 1. ♀ *indica* Lindl. in transact. of the Linn. soc. XIII, 105. China, Cochinchina,
Crataegus indica L. cod. Nro. 3646. bot. mag. t. 1726. India orientalis.
Méspilus indica Poir. enc. méth. suppl. IV, 73.
 2. ♀ *Pheostémon* Lindl. collect. bot. Nro. 3. in adnot. China, Cochinchina.
indica Ker. in bot. reg. t. 468.
Loureirol Spreng. syst. veget. II, 508.
Crataegus indica Lour. fl. coch. I, 391.
 3. ♀ *rubra* Lindl. collect. bot. Nro. 3. t. 3. bot. reg. t. 1400. China (Canton).
Crataegus rubra Lour. fl. coch. I, 391.
Méspilus sinensis Poir. enc. méth. suppl. IV, 70.
 4. 5 *salicifolia* Lindl. collect. bot. Nro. 3. in adnot. bot. reg. t. 652. China.
 5. ♀ *spiralis* G. Don dichlam. pl. II, 602. China.
Méspilus spiralis Blume bijdr. 1102.
Crataegus spiralis Steud. nom. ed. 2. 434.
 6. ♀ *japonica* S. et Z. fl. jap. I, 162. t. 85. Japonia.
 7. ♀ *Mertensii* S. et Z. fl. jap. I, 164. Japonia.
 β) *integerrima* H. et Arn. bot. of Beech. voy. 263.
 8. ? *laevis* Lodd. cat. in G. Don dichl. pl. II, 602. (an *Photinia laevis* DC.?) Patr. ignota, an China?
 9. ? *latifolia* Lodd. cat. in G. Don dichl. pl. II, 602. (an *Hesperomeles latifolia* H. B. K.?) Patr. ignota, an China?

X. *Photinia* Lindl.

(φωτεινός, lucidus, glaenzend, ob folia lucida.)

A. *Euphotinia* (Ovaria complete bilocularia).

1. ♀ *serrulata* Lindl. in transact. of the Linn. soc. XIII, 103. China, Japonia.

- Crataegus glabra* Thunb. fl. japon. 205. bot. mag. t. 2105. bot. eab. t. 248.
Mespilus glabra Poir. enc. méth. IV, 446.
 β) *obovata* H. et Arn. bot. of Beech. voy. 185.
2. ♂ *prunifolia* Lindl. in bot. reg. ad tab. 196. China, Japonia.
serrulata β. Hook. et Arn. bot. Beech. voy. 185.
3. ♂ *arguta* Wall. num. list. 673. Lindl. in bot. reg. ad tab. 1956. India orientalis.
 4. ♂ *arbutifolia* Ldl. in tr. of the Linn. soc. XIII, 103. bot. reg. t. 491. California.
Crataegus arbutifolia Ait. hort. Kew. ed. 2. III, 202.
- B. *Myriomèles* (*Ovaria semibilocularia*).
5. ♂ *pustulata* Lindl. in bot. reg. ad tab. 1956. China.
 6. ♂ *integrifolia* Lindl. in transact. of the Linn. soc. XIII, 103. Nepal.
Pyrus integerrima Wall. in Don prodr. fl. nep. 237.
7. ♂ *eugeniaefolia* Lindl. in bot. reg. ad tab. 1956. India orientalis.
 8. ♂ *Lindleyana* W. et Arn. prodr. fl. pen. Ind. or. I, 302. India orientalis.
Whigt icon. pl. Ind. orient. I, t. 228.
 9. ♂ *Notoniana* W. et Arn. pr. fl. pen. Ind. or. I, 302. (? Wall. num. list. 671.) India orientalis.
- C. *Species dubiae*.
10. ♂ *dubia* Lindl. in transact. of the Linn. soc. XIII, 104. t. 10. Nepal, India orient.
Mespilus tinctoria Don prodr. fl. nep. 238.
 - *bengalensis* Roxb. fl. ind. II, 510.
 β) *bengalensis* Wall. in G. Don dichl. pl. II, 602.
11. 5 *laevis* DC. prodr. II, 631. Japonia.
Crataegus laevis Thunb. fl. jap. 204.
Mespilus laevis Poir. enc. méth. IV, 445.
- XI. *Peraphyllum* Nutt.
 (? *παρα*, *pera*, Tasche et *φύλλον*, *folium*, Blatt.)
1. 5 *ramosissimum* Nutt. in T. and Gr. fl. of N. Amer. I, 474. America boreali-occid.
- XII. *Amelanchier* Medik.
 (nomen sabaudum A. vulgaris, teste Clus.)
- * 1. 35 *Botryapium* DC. prodr. II, 632. America borealis.
canadensis T. and Gr. fl. of N. Amer. I, 473.
Aronia Botryapium Pers. syn. pl. II, 39.
Crataegus racemosa Lam. enc. méth. I, 84.
Mespilus arborea Mich. hist. d. arbr. forest. de l'Am. sept. I, 336. t. 66.
 - *canadensis* L. cod. Nro. 3655.
Pyrus Botryapium L. fl. suppl. 255. Gu. et H. Abb. fr. Holzart. t. 79.
 β) *cordata* Mich. fl. bor. amer. I, 291. (sub *Mespilo canadensi*.)
Pyrus Botryapium Wangenh. Beitr. z. Forstw. am. Hoelz. 90. t. 28. f. 65.
 - *Wangenheimiana* Tausch in Flora XXI, 714.
 γ) *oblongifolia*; *intermedia* Spach hist. d. végét. phané. II.
- * 2. 35 *ovalis* DC. prodr. II, 632. America borealis.
canadensis γ. *rotundifolia* T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 473.
Aronia ovalis Pers. syn. pl. II, 39.
Crataegus spicata Lam. enc. méth. I, 84.
Mespilus Amelanchier Walt. fl. carol. 148.
 - *canadensis* Schmidt oesterr. Baumz. t. 84.
 - γ. *rotundifolia* Mich. fl. I, 291.
Pyrus ovalis Willd. sp. pl. II, 1014.
 - *rotundifolia* Hort.
 β) *subcordata*; *Malus microcarpa* Raf. préc. d. déc. et trav.
3. 35 *alnifolia* Nutt. in Journ. acad. Philad. VII, 22. America britannica et
canadensis δ. *alnifolia* T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 473. foederata borealis.
florida Lindl. in bot. reg. t. 1589.
ovalis β. *semiintegrifolia* Hook. fl. bor. amer. I, 202.
Aronia alnifolia Nutt. gen. of N. Am. pl. I, 306.
Pyrus alnifolia Lindl. in transact. of the Linn. soc. XIII, 98.
 β) *parvifolia* Loud. arb. et frut. brit. II, 877.
canadensis ε. *pumila* Nutt. in T. et Gr. fl. of N. Am. I, 474.
- * 4. 5 *sanguinea* DC. prodr. II, 633. bot. reg. t. 1177. America britannica et
canadensis ζ. *oligocarpa* T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 474. foederata borealis,
Aronia sanguinea Nutt. gen. of N. Amer. pl. I, 306. Terra nova.

Méspilus canadensis δ . oligocarpa Mich. fl. bor. amer. I, 291.

Pyrus sanguinea Pursh fl. bor. am. I, 340.

5. 5 *Bartramiana* Tausch in Flora XXI, 715. (sub *Pyro*.) America foederata.
Aronia praecox Neum. cat. hort. Leibn.
 6. 5 *Neumanniana* Tausch in Flora XXI, Beibl. 1. 76. (sub *Pyro*.) America foederata.
Aronia affinis Neum. cat. hort. Leibn.
 * 7. 5 *vulgaris* Moench meth. 682. Europa austr. occid.
Aronia Amelanchier Rehb. fl. exc. 630.
 - *rotundifolia* Pers. syn. pl. II, 39.
Crataegus Amelanchier Dsf. hist. d. arbr. et arbriss. I, 149.
 - *rotundifolia* Lam. enc. méth. I, 83.
Méspilus Amelanchier L. cod. Nro. 3656. Jacq. fl. austr. t. 300.
Pyrenia Amelanchier Clairv. man. d'herbor. en Suisse 162.
Pyrus Amelanchier Willd. sp. pl. II, 1015. Gu. et H. Abb. deutsch. Holzart. I, t. 74.
Sorbus Amelanchier Crantz stirp. austr. II, 53.
 β) *floecosa* Guss. fl. sic. syn. I, 559. (an sp. propr. ? teste Guss.)
 γ) *tomentosa* Koeh syn. éd. 2. 261.
 8. 5 *suborbicularis* (neo orbicularis) Borkh. Handb. d. Forst-
 bot. II, 1262. Europa austr. orient.
cretica DC, prodr. II, 632.
Aronia cretica Pers. syn. pl. II, 40.
Crataegus cretica Dsf. choix d. pl. du coroll. inst. de Tourn. 79. t. 60.
 - *rotundifolia* β . *cretica* Lam. enc. méth. I, 84.
Pyrus Amelanchier β . Guss. fl. sic. syn. I, 559.
 - *cretica* Willd. spec. pl. II, 1015. Jeq. fl. austr. t. 300.
 9. 5 *integrifolia* Boiss. diagn. pl. nov. orient. III, 8. Asia minor.
 10. 5 *pisidia* Boiss. diagn. pl. nov. orient. X, 2. Asia minor.
 11. 5 *parviflora* Boiss. diagn. pl. nov. orient. III, 9. Oriens.
 ? *Pyrus parviflora* Dsf. choix d. pl. du coroll. d. inst. de Tourn. 79. t. 58.

XIII. *Aronia* Pers.

(ἀρώνια apud Graecos veteres *Méspil* aut *Crataegi species*.)

- * 1. 5 *pyrifolia* Pers. syn. pl. II, 39. America britannica et
Azarolus arbutifolia Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forst- foederata borealis.
 techn. II, 1225. Terra nova.
Crataegus pyrifolia Lam. enc. méth. I, 83.
 ? - *serrulata* (nec serrata) Poir. enc. méth. suppl. I, 262.
Méspilus arbutifolia L. cod. Nro. 3655. Mill. fig. t. 109.
Pyrus arbutifolia L. fl. suppl. 256. bot. mag. t. 3668.
 β) *fructu albo* Bechst. Forstbot. 1375.
 γ) - *atropurpureo*; *depressa* Spach. hist. d. végét. phanér. II.
Pyrus depressa Lindl. in transact. of the hort. soc. VII, 230.
 δ) *fructu serotino versicolore*; Lindl. in transact. of the hort. soc. VII, 229.
xanthocarpa Lodd. cat.
 e) *fructu subglobose fusco*; *intermedia* Ldl. in transact.
 of the hort. soc. VII, 229.
 2. 5 *floribunda* Spach hist. d. végét. phan. II. ? America borealis.
Pyrus floribunda Lindl. in transact. of the hort. soc. VII, 230.
 bot. reg. t. 1006.
 * 3. 5 *arbutifolia* Pers. syn. pl. II, 39. America borealis.
glabrescens Spach hist. d. végét. phan. II.
melanocarpa Ell. sketch of the bot. of S. Car. and Flor. I, 556.
Crataegus arbutifolia Lam. enc. méth. I, 83.
Méspilus arbutifolia β . *melanocarpa* Mich. fl. bor. amer. I, 292.
Pyrus arbutifolia β . *nigra* Willd. sp. pl. II, 1013.
 - *melanocarpa* Willd. enum. I, 525.
 - *pensylvanica* Hort. in transact. of the hort. soc. VII, 231.
 β) *subpubescens* Lindl. in transact. of the Linn. soc. VII, 232.
 * 4. 5 *pubens* Spach hist. d. végét. phan. II. America borealis.
Pyrus capitata Hort. in transact. of the hort. soc. VII, 232.
 - *pubens* Ldl. in transact. of the Linn. soc. VII, 232.
 5. 5 *grandifolia* Spach hist. d. végét. phan. II. America borealis.
Pyrus grandifolia Ldl. in transact. of the Linn. soc. VII, 232.
 bot. reg. t. 1154.
 6. 5 *pumila* Neum. in Flora XXI, Beibl. 1. 77. (sub *Pyro*.) Patria ignota.
 ? *Méspilus pumila* Lodd. cat. Krauss Afbœld. d. fr. Broom. en Heest. t. 86.

XIV. *Sorbus* L.(sorbus apud Latinos: *Sorbus domestica* L., Spierling.)A. *Chamaeméspilus* (Petala erecta).

- * 1. 5 *Chamaeméspilus* Crantz stirp. austr. II, 40, t. 1. f. 3. Europa australis.
Aria Chamaeméspilus Host fl. austr. II, 8.
Aronia Chamaeméspilus Pers. syn. pl. II, 39.
Azarólus Chamaeméspilus Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1350.
Crataegus Chamaeméspilus Jacq. fl. austr. III, t. 231.
- *humilis* Lam. enc. méth. I, 83.
Méspilus canadensis Dur. Harbk. Baumz. 1. Aufl. I, 416. (teste Pott in 2. Aufl.)
- *Chamaeméspilus* L. cod. Nro. 3657. Gu. et H. Abb. d. Holzart. t. 70.
Pyrenia Chamaeméspilus Clairv. man. d'herbor. 162.
Pyrus Chamaeméspilus Pott in Dur. Harbk. Baumz. 2. Aufl. II, 321.
Sorbus Chamaeméspilus Crantz stirp. austr. II, 40, t. 1. f. 3.
β) *tomentosa*; *Aronia Aria-Chamaeméspilus* Rehb. fl. exc. II, 630.
? *Crataegus Pseudo-Aria* Spach hist. d. végét. phan. II.
Aria fl. roseo Wimm. et Grab. Fl. v. Schl. 127.
Pyrus sudetica Tausch in Flora XVII, 75.
- B. *Aria* (Pet. patentia; Styli liberi; Fol. integra aut lobata).
- * 2. 5 *alpina* C. Koch. Alpes.
Aronia densiflora Spach hist. d. végét. phan. II.
Azarólus alpina Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1234.
Crataegus alpina Mill. dict. Dur. Harbk. Baumz. 1. Aufl. I, 192.
- *arbutiflora* Desf. (teste Steud., sed ubi?)
Pyrus alpina Willd. hort. Berol. 527.
- *densiflora* Steud. nom. bot. ed. 2. II, 423.
- * 3. 3 *Florentina* C. Koch. Italia media et inferior.
Crataegus Florentina Zucc. in Roem. collect. ad omn. rem bot. spect. I, 142.
Méspilus Florentina Bert. amoen. ital. 29.
Pyrus crataegifolia Sav. tratt. degli alb. ed. 2. I, 169.
- *Florentina* Targ. Tozz. in mem. di fis. d. soc. it. d. sc. XX, 302. t. 20.
- *torninalis* B. minor *cuneifolia* Ten. syll. fl. neapl. 243.
- * 4. 5 3 *Aria* Crantz fl. austr. I, 46. t. 2. f. 2. Europa, Oriens.
Aria nivea Host fl. austr. II, 8.
Azarólus (nec *Lazarolus* Steud.) *Aria* Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1229.
Crataegus Aria L. cod. Nro. 3640. Fl. dan. t. 302.
Méspilus Aria Scop. fl. carn. I, 345.
Pyrenia Aria Clairv. man. d'herbor. en Suisse 162.
Pyrus Aria Ehrh. Beitr. z. Naturk. IV, 20. engl. bot. t. 1858.
- *intermedia* Ten. fl. nap. IV, 279. (teste Bert.)
β) *acutifolia* DC. prodr. II, 636.
- *longifolia* Duh. traité d. arbr. et arb. nouv. ed. IV, 34.
γ) *angustifolia* Lindl. in transact. of the Linn. soc. VII, 234.
δ) *bullata* Lindl. in transact. of the Linn. soc. VII, 234.
Pyrus Aria acuminata Hort.
ε) *rotundifolia* Behl. in Bechst. Forstbot. 5. Aufl. 216. (sub *Pyro*.)
ζ) *rugosa* Lindl. in transact. of the Linn. soc. VII, 234.
η) *semilobata* Behl. in Bechst. Forstbot. 5. Aufl. 317. (sub *Pyro*.)
Azarólus intermedia Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1232. (teste Behl.)
Pyrus intermedia Bechst. Diana IV, 110.
θ) *undulata* Lindl. in transact. of the Linn. soc. VII, 234.
- * 5. 3 *edulis* C. Koch. ? Gallia.
Crataegus Aria Spach hist. d. végét. phan. II.
- *edulis* Hort.
Pyrus edulis Willd. hort. Berol. 527.
- *intermedia* β. *angustifolia* DC. prodr. II, 636.
6. 3 *corymbosa* C. Koch. Patria ignota.
Crataegus corymbosa Desf. hort. Paris. 1824.
- *flabellifolia* Spach hist. d. végét. phan. II.
Pyrus edulis Wats. dendrol. brit.

- * 7. 5♂ *græca* C. Koch. Graecia, Sicilia.
Crataegus græca Spach hist. d. végét. phanér. II.
Pyrus Aria Sibth. et Sm. fl. gr. t. 479.
 - *græca* Hort.
 - *meridionalis* Guss. fl. sic. syn. II, 2. 831.
- * β) *rotundifolia* Hort.
Crataegus obtusata Spach hist. d. végét. phan. II.
Pyrus Aria crética Lindl. in transact. of the Linn. soc. VII, 234.
 - *obtusata* Steud. nom. bot. 2. ed. II, 424.
- * 8. ♀ *vestita* Lodd. cat. 1836. India orientalis, Nepal.
Crataegus cuspidata Spach hist. d. végét. phan. II.
Pyrus crenata Don prodr. fl. nep. 237.
 - *nepalensis* Hort.
 - *vestita* Wall. num. list Nro. 679.
9. 5 *lanata* C. Koch. Nepal.
Pyrus Kamonensis Wall. num. list Nro. 678. G. Don dichl. pl. II, 647.
 - *lanata* Don prodr. fl. nepal. 237.
- * 10. ♀ *intermedia* Pers. syn. pl. II, 38. Scandinavia, Rossia
borealis, Britannia,
Gallia.
Aria β. suecica L. cod. Nro. 3640.
scandica Fries fl. halland. 83.
Aria Hostii Jacq. fl. in Host fl. austr. II, 8.
Azarolus (nec *Lazarolus* Steud.) *intermedia* Borkh. Handb. d. Forstbot. II, 1232.
Crataegus Aria Luc. fl. osil. 157.
 - *Aria β. suecica* Ait. hort. Kew. 1. ed. II, 167.
 - *Hostii* Spach hist. de végét. phan. II.
 - *scandica* Wahlenb. fl. Upsal. 165.
Pyrus Aria Prytz fl. fenn. brev. 72.
 - *intermedia* Ehrh. Beitr. z. Naturk. IV, 20.
 - *Hostii* Hort.
 - *semipinnata* Bohl. in Bechst. Forstbot. 5. Aufl. 324.
 β) *pinnatifida* Fries summ. veget. Scand. 175.
- * 11. ♀ *latifolia* Lam. enc. méth. II, 38. Germania, Scandinavia,
Azarólus hybrida Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1239. ? Gallia.
Crataegus dentata Thuill. fl. d. env. de Par. I, 245.
 - *hybrida* Bechst. Diana I, 81.
 - *latifolia* Lam. enc. méth. I, 83. fl. franç. III, 486.
Pyrus Aria Gu. et. H. Abb. d. Holzart. t. 79. (teste Rehb.)
 - *arguta* Tausch in Flora XVII, 2. 490.
 - *decipiens* Bechst. Forstbot. 614 et 1449.
 - *intermedia α. latifolia* DC. prodr. II, 636.
 - *latifolia* Lindl. in transact. of the Linn. soc. VII.
- C. *Eusorbus* (*Petala patentia*; *Styli libri*; *Folia pinnata*).
- * 12. 35 *hybrida* L. cod. Nro. 3650. Fl. dan. t. 301. Scandinavia, Fennia,
Germania, Britannia.
Azarólus pinnatifida Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1245.
Crataegus Aria γ. fennica L., cod. Nro. 3640.
Pyrus fennica Bab. man. of brit. bot. 3. ed. 111.
 - *hybrida* Sm. brit. fl. 534.
 - *intermedia* Thom. cat. d. pl. suisses 1818.
 - *pinnatifida* Sm. in engl. bot. t. 2331.
 β) *arbuscula* Poir. enc. méth. suppl. V, 164.
 γ) *lanuginosa* Loud. arb. et frut. brit. II, 916.
 δ) *pendula* Lodd. cat. Loud. arbor. et frut. brit. II, 916.
13. ♀ *auriculata* Pers. syn. pl. II, 39. Aegyptus.
Pyrus auriculata DC. prodr. II, 636.
- * 14. 5 *spuria* Pers. syn. pl. II, 39. hot. reg. t. 1196. Germania (an pl. hybr. ?).
heterophylla Rehb. fl. exc. 628.
Aronia sorbifolia Spach hist. d. végét. phanér. II.
Crataegus sorbifolia Hort. in enc. méth. suppl. IV, 73.
Méspilus sorbifolia Poir. enc. méth. suppl. IV, 72.
Pyrus heterophylla Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1248.
Pyrus hybrida Mneh Verz. ausl. B. u. Staud. v. Weiss. 90. t. 6.
 - *sorbifolia* Wats. dendr. brit. t. 53.
 - *spuria* DC. prodr. II, 637.
 β) *pendula*; *spuria sambucifolia* Hort. Loud. arb. et frut. brit. II, 925.

15. 5 *micrantha* Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 464. America foederata med.
microcarpa Pursh fl. bor. am. I, 341.
aucuparia α. Mich. fl. bor. am. II, 291.
Pyrus microcarpa DC. prodr. II, 636.
16. 5 *americana* Willd. enum. hort. Berol. I, 520. America brit. et foed.
aucuparia β. Mich. fl. bor. am. I, 290.
Pyrus americana DC. prodr. II, 637.
17. 5 *praemorsa* C. Koch. Italia inferior, Sicilia
aucuparia Ucria hort. Panorm. 208.
Pyrus praemorsa Guss. fl. prodr. I, 571.
- * 18. *aucuparia* L. cod. Nro. 3649. engl. bot. t. 337. Europa, Sibiria, Oriens.
glabra Gil. fl. lith. V, 233.
Mespilus aucuparia All. fl. pedem. II, 142.
Pyrenia aucuparia Clairv. man. d'herbor. en Suisse 162.
Pyrus aucuparia Grtn. de fruct. et sem. II, 45. t. 87.
 β) *asplesifolia* Hort.
 γ) *fastigiata* Loud. arb. et frut. brit. II, 916.
 δ) *foliis variegatis*.
 ε) *fructu luteo*.
 ζ) *monstrosa*.
 η) *pendula*.
 θ) *saturejaefolia* Hort.
- * 19. 5 *lanuginosa* Kit. in DC. prodr. II, 637. Hungaria.
domestica β. *lanuginosa* Maly enum. pl. imp. austr. 333.
Pyrus lanuginosa DC. prodr. II, 637.
- * 20. 5 *doméstica* L. cod. Nro. 3651. Gallia, Helvetia, Italia,
imper. austriacum,
Krim, Germania,
Scandinavia, Britannia.
Cornus domestica Spach hist. d. végét. phaner. II.
Malus Sorbus Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1254.
Méspilus doméstica All. fl. pedem. II, 142.
Pyrenia Sorbus Clairv. man. d'herbor. en Suisse 162.
Pyrus doméstica Sm. br. fl. 532. engl. bot. t. 350.
 - *Sorbus* Grtn. de fruct. et sem. II, 43. t. 87.
 β) *coriacea* Bert. fl. it. V, 153.
Pyrus Sorbus Mor. et Not. capr. 53.
 γ) *maliformis* Lodd. cat. Loud. arb. et frut. brit. II, 921.
 δ) *pyriformis* Lodd. cat. Loud. arb. et frut. brit. II, 921.
- * 21. 5 *sambucifolia* C. Koch. Camschatca,
ins. Amer. bor.-occid.
aucuparia Stell. in Pall. nord. Beitr. II, 300.
Pyrus sambucifolia Ch. et Schlecht. in Linn. II, 36.
 - *sorbifolia* Cham. in Spreng. syst. veget. IV, 2. 343.
 β) *microphylla* Bong. de veg. ins. Sitch. 134.
22. 5 *grácilis* C. Koch. Japonia.
Pyrus grácilis S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. KI. IV, 2. 231.
23. 5 *foliolosa* C. Koch. Himalaya, Nepal.
Pyrus foliolosa Wall. num. list. 677. ic. pl. rar. asiat. II. t. 189.
24. 5 *ursina* C. Koch. Himalaya, Nepal.
Pyrus ursina Wall. num. list. 675. G. Don dichl. pl. II, 648.
- D. *Torminaria* (*Petala patentia*; *Styli inter se connexi*; *Folia lobato-angulata*).
- * 25. 5 *torminalis* Crantz stirp. austr. II, 45. Europa.
 • *Azarólus* (nec *Lazarolus* Steud.) *torminalis* Borkh. Handb.
 d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1235.
Crataegus torminalis L. cod. Nro. 3641. Jacq. fl. austr. t. 443.
Méspilus torminalis All. fl. pedem. II, 141.
Pyrenia torminalis Clairv. man. d'herbor. en Suisse 162.
Pyrus torminalis Ehrh. Beitr. VI, 92. Gu. et H. Abb. d. Holzart. t. 80.
 Not. Praeterea in horto nostro dendrologico colitur: *S. macrophylla* Hort.

XV. *Cotoneaster* Medik.

(*Cotoneum*, *Quittenbaum*; itaque *Cotoneaster*, wilder *Quittenb.*, ut *Oleaster*, wilder *Oelb.*)

A. *Folia decidua*, herbacea.

- * 1. 5 *vulgaris* Lindl. in transact. of the Linn. soc. XIII, 101. engl. bot. t. 2713.

Europa.

Crataegus Cotoneaster Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1361.

Méspilus Cotoneaster L. cod. Nro. 3659.

Ostinia Cotoneaster Clairv. man. d'herb. en Suisse 162.

Pyrus Cotoneaster Mneh. meth. 681.

β) *depressa* Fries nov. fl. succ. 410.

γ) *excelsa* Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 447.

δ) *leucocarpa* Eichw. naturh. Sk. v. Lith., Volh. u. Pod.

ε) *lutea* Fries nov. fl. succ. 140.

- * 2. 5 *tomentosa* Lindl. in transact. of the Linn. soc. XIII, 101. Pyreneaeus, Alpes,
Dalmatia, Hungaria.
- coccinea* Steud. nom. bot. ed. 2. I, 426.
- vulgaris* β. *tomentosa* Vis. fl. dalm. III, 243.
- Mespilus eriocarpa* DC. fl. franç. V, 532.
- *coccinea* W. et K. pl. Hung. rar. III, t. 326.
- *orientalis* Mill. dict.
- *pygmaea* Baumg. stirp. M. Transsylv. II, 40.
- *tomentosa* Willd. sp. pl. II, 1012.
- Ostinia tomentosa* Clairv. man. d'herb. en Suisse 162. Patria ignota.
- * 3. 5 *Fontanesii* Spach hist. d. végét. phanérog. II. Himalaya.
- Méspilus racemiflora* Desf. hort. Paris. Suecia, Rossia, Sibiria.
- * 4. 5 *rosea* Edgew. in transact. of the Linn. soc. XX, 46.
- * 5. 5 *laxiflora* Jacq. fl. in bot. reg. t. 1305. bot. mag. t. 3519.
- nigra* Fries summ. veg. Scand. 175.
- vulgaris* β. *melanocarpa* Led. fl. alt. II, 219.
- Mespilus Cotoneaster nigra* Fisch. in Hort.
- *melanocarpa* Fisch. in Hort. Sicilia.
- 6. 5 *Nebrodensis* C. Koch. Hispania.
- Méspilus Nebrodensis* Bert. fl. ital. V, 629.
- Pyrus Nebrodensis* Guss. fl. sic. syn. I, 569. Isthmus caucasicus,
- * 7. 5 *Granatensis* Boiss. voy. dans le midi Esp. I, 624. t. 60.
- * 8. 5 *nummularia* F. et M. ind. II. sem. hort. Petrop. 34.
- tomentosa* C. A. Mey. Verz. kauk. Pfl. 171.
- Méspilus Cotoneaster* var. *Bieb.* fl. taur. cauc. III, 333.
- *tomentosa* Hohenack. enum. pl. Elisab. 235.
- 9. 5 *peduncularis* Boiss. diagn. pl. nov. orient. III, 8. Asia minor.
- * 10. 5 *multiflora* Bunge in Led. fl. alt. II, 220. icon. pl. fl. ross. III, 274. Isthm. cauc., Songaria.
- * 11. 5 *uniflora* Bunge in Led. fl. alt. II, 220. icon. pl. fl. ross. III, t. 269. Sibiria australis.
- 12. 5 *acutifolia* Lindl. in Led. fl. ross. II, 92. Sibiria austr., Mongolia.

B. Folia coriacea, plerumque sempervirentia, sed decidua.

- * 13. 5 *affinis* Lindl. in transact. of the Linn. soc. XIII, 101. Nepal.
- Méspilus affinis* Don prodr. fl. nepal. 238.
- * 14. 5 *frigida* Wall. in bot. reg. t. 1229. Nepal.
- Pyrus Nussia* Ham. Don prodr. fl. nep. 237.
- 15. 5 *bacillaris* Wall. in bot. reg. ad t. 1229. India orientalis.
- 16. 5 *obtusa* Wall. in bot. reg. ad t. 1229. India orientalis.

C. Folia sempervirentia, persistentia.

- * 17. 5 *acuminata* Lindl. in transact. of the Linn. soc. XIII, 101. t. 9. Nepal.
- Crataegus acuminata* Desf. hort. Paris.
- Mespilus acuminata* Lodd. bot. cab. 199.
- 18. 3 *Lindleyi* Steud. nom. bot. ed. 2. 426. Nepal.
- elliptica* Hort.
- laevis* Hort.
- nummularia* Lindl. in transact. of the hort. soc. VI, 396.
- Eriobótrya elliptica* Lindl. in transact. of the Linn. soc. XIII, 102.
- Méspilus Cuila* Ham. in Don prodr. fl. nep. 238.
- * 19. 5 *rotundifolia* Wall. in Lindl. bot. reg. ad tab. 1229. Nepal.
- microphylla* β. *Uva ursi* Lindl. bot. reg. t. 1187.
- Uva ursi* Hort.
- * 20. 5 *microphylla* Wall. in Lindl. bot. reg. t. 1114. Nepal.
- * 21. 5 *buxifolia* Wall. num. list. 661. bot. reg. ad t. 1229. India orientalis.
- 22. 5 *denticulata* H. B. K. nov. gen. et sp. amer. VI, 169. t. 559. Mexico.
- Méspilus denticulata* Spreng. syst. veget. II, 505.

- * 23. 5 *compta* Léon. in fl. d. serr. IV, 338b. Mexico.
 Not. Praeterea in horto nostro dendrologico species aut varietates, nobis non
 satis cognitae, coluntur sequentes: 1) *emarginata* Hoffmssg, 2) *princeps*, 3) *Royleana*,
 4) *spicata*, 5) *thymifolia*.

XVI. *Cydonia* Pers.

(κυδονεα et κυδονια, Cydonia et Cotoneum, Quittenbaum.)

- * 1. 5 *vulgaris* Pers. syn. pl. II, 40. Europa orientali-austr.,
 communis Lois. in nouv. Duh. IV, 136. Oriens, China borealis.
 : *europeaea* Sav. tratt. degli alb. tosc. ed. 2. I, 99.
 : *Pyrus Cydonia* L. cod. Nro. 3665.
 : *Sorbus Cydonia* Crantz stirp. austr. II, 47.
 * a) *maliformis* Mill. diet.
 : *Pyrus maliformis* Hort.
 * β) *pyriformis* Hort. Blackw. herb. t. 137.
 : *Cydonia vulgaris* γ. *oblonga* Mill. diet.
 : *Pyrus oblonga* Hort.
 * γ) *lusitana* Mill. dict. Nro. 3. Duh. arb. fruit. 1. 195. c. ic.
 : *Pyrus lusitana* Hort.
 δ) *sylvestris* Duh. traité d. arbr. et arbrias. I, t. 85.
 2. 3 *tomentosa* C. Koch. India orientalis.
 : *Pyrus tomentosa* Roxb. fl. ind. II, 512.
 3. 5 *Sumboshia* Ham. in Don prodr. fl. nep. 237. Nepal.
 : *Pyrus Sumboshia* Spreng. syst. veg. IV, 2. 196.
 * 4. 5 *sinensis* Thouin in ann. du Mus. XIX, 145. t. 8. et 9. China.
 : *Pyrus sinensis* (*chinensis* Spreng.) Willd. Berl. Baumz. 2. Aufl. 326.
 5. 5 *indica* Spach hist. d. végét. phané. II. India orientalis.
 : *Pyrus indica* Colebr. in Wall. pl. rar. as. II, t. 173. (nec Rxb. ?)
 6. 5 *japonica* Pers. syn. pl. II, 40. Japonia.
 : *Chaenoméles japonica* Lindl. transact. of the Linn. soc. XIII, 97.
 : *Malus japonica* Dsf. hort. Paris.
 : *Pyrus japonica* Thunb. fl. jap. 207. bot. mag. t. 692.
 * β) *flore albo*.
 * γ) - *carneo*.
 * δ) - *pleno*.
 * ε) - *specioso* Hort.

Not. Praeterea in horto nostro colitur, nobis non satis cognita: *inermis parviflora*.

XVII. *Pirus* Gaertn. (*Pyrus*, ut L. et aut. dicunt, falsa scribendi ratione.)(Pirus, nec *Pyrus*, apud Latinos: Birnbaum.)

- A. *Pirophorum* (*Styli liberi*, *Poma basi non umblicata*).
- * 1. 5 *communis* L. cod. Nro. 3660. Europa austr., Oriens.
 : *Achras* Gaertn. de fruct. et sem. II, 44.
 : *corymbosa* Gil. fl. lith. V, 234.
 : *Pyraster* Borkh. Handb. d. Forsth. u. Forsttechn. II, 1287.
 : *Pyrénia* *Pyrus* Clairv. man. d'herbor. 161.
 : *Sorbus* *Pyrus* Crantz stirp. austr. II, 56.
 * a) *Achras* Wallr. sched. crit. 213. Boenn. prodr. fl. Monast. 144.
 * β) *dasyphylla* Tausch in Flora XXI, 716. (*tomentosa* Koch syn. ed. 2. 260.)
 : *Pöllveria* Lej. fl. d. env. de Spa II, 311. bot. cab. t. 1009. (teste Rchb.)
 : *Upsaliensis* Lodd.
 * γ) *flore pleno*.
 * δ) *foliis variegatis*.
 * ε) *fructu variegato*.
 * ζ) *pyramidalis* Pers. syn. pl. II, 40.
 * η) *Pyraster* Wallr. sched. crit. 214. Boenn. prodr. fl. Monast. 144.
 * θ) *quercifolia* Hort.
 * ι) *sanguinolenta* Hort.
 * κ) *sativa* DC. fl. franc. IV, 430.
 * λ) *carne duriuscula adstringente; vinifera* Sch. et Mart. Fl. v. Wuert. 319.
 * μ) - *acido sacch., pomo subglobosa; globosa*
 : Sch. et Mart. Fl. v. Wuert. 322.
 * ν) - *saccharata, pomo oblongo, magno; Pom-*
 : *pejana* L. cod. Nro. 3660 γ.
 : *jaspidea* Hort.

- ε) carne fragili, pomo subgloboso, basi acum.; Dola-
belliana Sch. et Mart. Fl. v. Wuert. 320.
 ο) - - pomo elliptico; oviformis Sch. et Mart. Fl.
v. Wuert. 321.
 π) - molli, pomo elongato, apice rotund.; Bergamotia
Sch. et Mart. Fl. v. Wuert. 322.
 Falerna L. cod. Nro. 3660 β.
 ρ) - mollissima, pomo ovato; liquescens Pers. syn. pl. II, 40.
Falerna Sch. et Mart. Fl. v. Wuert. 323.
 σ) - moschato-saccharata; Favonia L. cod. Nro. 3660 δ.
 τ) - succosa, saccharata; rufescens Pers. syn. pl. II, 40.

2. δ angulata Kit. in Roch. pl. Ban. rar. 26. (sine descr.)
 3. δ denticulata Dum. Cours. bot. cult. 2. ed. V, 435.
 4. 5 Pollveria (Polveria Dsf. Pollvilla Gmel.) L. cod. Nro. 3661.
auricularis Knoop pomolog. II, 38. t. 4.
Bollwyllyeriana (Pollvilleriana Bauh. Rchb.) DC. fl. franç.
suppl. 530. bot. reg. t. 1437.
irregularis Duroi Harbk. Baumz. 1. Aufl. II, 216. Muenchh.
Hausv. V, 246.
tomentosa Mneh meth. 680.
Azarólus Pollvilleriana Borkh. Handb. d. Forstbot. u.
Forsttechn. II, 1251.

5. δ nivalis L. fl. suppl. 253. Jacq. fl. austr. t. 147. bot. reg. t. 1484.
 6. δ sinensis Lindl. in transcript. of the hort. soc. VI, 397. bot.
reg. t. 1248.

communis Lour. fl. cochinch. 393.
siniça Royle illustr. of the himal. mount. 206.

7. 5δ Pyrainus Raf. giorn. II, fasc. 12. 173.
cuneifolia Guss. pl. rar. ic. 402. t. 39. (teste Guss.)

8. 5δ salvifolia DC. prodr. II, 634. bot. reg. t. 1482.

9. 5δ amygdaliformis Vill. cat. d. pl. du jard. de Strasb. 323.
cuneifolia Vis. fl. dalm. II, t. 38.
communis Gouan. hort. reg. Monsp. 242.
eriopleura Rchb. fl. exc. 630. (teste Vis.)
nivalis Lindl. in bot. reg. t. 1484.
parviflora Guss. prodr. fl. sic. suppl. I, 154. (teste Bert.)
salicifolia Lois. not. s. l. pl. à ajout. à la fl. de Fr. 79.
salviaefolia Pett. bot. Wegw. Nro. 103.

10. 5δ elaeagrifolia (nec elaeagnifolia DC.) Pall. in nov. act.
Petrov. VII, 355. t. 10.

orientalis Hornem. hort. Hafn. suppl. 52.

11. 5 salicifolia L. fl. suppl. 255. Pall. fl. ross. I, t. 9. bot. reg. t. 514.

12. 5δ sinaica Thouin in mém. du Mus. I, 170. t. 9.
montis Sinai Hort.

orientalis Hort.

pérscica Pers. syn. pl. II, 40.

Sinai Dsf. arb. II, 144. Duh. arb. fruit. nouv. ed. VI, t. 57.

β) Michauxii Bose in enc. méth. suppl. IV, 432.

13. 35 syriaca Boiss. diagn. pl. nov. orient. X, 1.

14. 5δ angustifolia Dne in ann. d. sc. nat. IV, 359.

Bovei Steud. nom. bot. ed. 2. 423.

15. 5δ glabra Boiss. diagn. pl. orient. VI, 53.

16. δ Pashia Ham. in G. Don dichl. pl. II, 622.

variolosa Wall. num. list.

17. 35 parviflora Dsf. ch. d. pl. du coroll. d. inst. de Tourn. 78. t. 59.

18. ? malifolia Spach hist. d. végét. phanér. II.

19. ? oblongifolia Spach hist. d. végét. phanér. II.

20. δ canescens Spach hist. d. végét. phanér. II.

Hungaria.
China.
Patria ignota.

Austria.

China.

Italia.

Gallia meridionalis.
Italia, Gallia australis.

Krim, isthmus caucas.

Sibiria.
Oriens, Arabia.

Syria.
Syria.

Persia australis.
Himalaya.

Oriens.
Patria ignota.
Patria ignota.
Patria ignota.

B. Malus (Styli basi subcoaliti).

a. Pom. non umbilicata; Calyx persistens.

21. δ sempervirens Willd. en. hort. Berol. suppl. 35.
coronaria Wang. Beitr. z. d. Forstwiss. nordam. Hoelz.
161. t. 21. f. 47.

America foederata.

- Pyrus angustifolia* Ait. hort. Kew. ed. 1. II, 276. Lindl.
bot. reg. t. 1207.
Malus angustifolia Mich. fl. bor. amer. I, 292.
- *sempervirens* Dsf. hist. d. arbr. et arbr. II, 141.
β) *pendula* Hort.
- * 22. ♂ *coronaria* L. cod. Nro. 3664. bot. mag. 2009. bot. reg. 651. America foederata.
odorata Hort.
Malus coronaria Mill. dict. Mich. hist. d. arbr. forest. II, 67. t. 65.
23. ♂ *rivularis* Dougl. in Hook. fl. bor. amer. I, 471. America boreali-occid.
diversifolia Bong. de veget. ins. Sitcha 133.
- * 24. ♂ *spectabilis* Ait. hort. Kew. ed. 1. II, 175. bot. mag. 267. China, Mongolia,
Japonia.
baccata Thunb. fl. jap. 207.
Malus spectabilis Dsf. hist. d. arbr. et arbr. II, 141.
- *sinensis* Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 429.
Méspilus spectabilis Hort.
β) *flore pleno*.
- * 25. ♂ *umbellata* Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 429. China.
26. ♂ *lobata* C. Koch. India orientalis.
indica Roxb. fl. ind. II, 512. (nec Wall.)
- b. *Poma umbilicata; Calyx persistens.*
- * 27. ♂ *Malus* L. cod. Nro. 3662. Persia, isthm. caucas.,
China borealis.
Malus communis Dsf. hist. d. arbr. et arbriss. II, 140. In India orient., Europa,
Africa bor., Amer. foed.
- *sativa* Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 426. et in Chili sine dubio
- *umbellata* Gil. fl. lith. V, 235. introducta.
Pyrrenia Malus Clairv. man. d'herbor. en Suisse 161.
Pyrus Malus β. *mitis* Wallr. sched. 215.
- β. *tomentosa* Bl. et Fing. comp. fl. Germ. I, 604.
Sorbus Malus Crntz stirp. austr. II, 57.
β) *flore pleno* Hort.
γ) *foliis tricoloribus* Hort.
δ) - *variegatis* Hort.
ε) *frutescens* Hort.
- * 27. ♂ *pomo curtispindulo; Cestiana* L. cod. Nro. 3662.
* 27. ♂ - *depresso-glob., scabriusculo, dulci; prasomila* L. cod. Nro. 3662 γ.
* 27. ♂ - - - *subpruinoso; Appiana (Apiana)* Pers. syn. pl. 40.
* 27. ♂ - - - ; *carne duriuscula; rubelliana* L. cod. Nro. 3662 δ.
* 27. ♂ - - - ; *megamila* Sch. et Mart. Fl. v. Wuert. 317.
* 27. ♂ α) - *globoso, striato, carne alba; striata* Sch. et Mart. Fl. v. Wuert. 317.
* 27. ♂ λ) - *nigro; melanocarpa* Hort.
* 27. ♂ μ) - *orbiculato; epirotica* L. cod. Nro. 3662 η.
* 27. ♂ ν) - *ovato-conico, carne candida; conocarpa* Sch. et Mart. Fl. v. Wuert. 315.
* 27. ♂ ξ) - *subgloboso aut oblongo, costato, arom.; Cavillea* L. cod. Nro. 3662 ζ.
δ. *costata* exp. Sch. et Mart. Fl. v. Wuert. 315. 316.
- * 28. ♂ *acerba* DC. prodr. II, 635. Europa media et austr.
Pyrus Malus Sm. in engl. bot. t. 179. (an spontanea?),
- - α. *austera* Wallr. sched. 215. Oriens.
- - α. *sylvestris* L. cod. Nro. 3662. fl. Dan. t. 1101.
Malus sylvestris Moench meth. 682.
- *acerba* Mér. nouv. fl. d. env. de Par. 187.
β) *tenuiflora* Boeningh. prodr. fl. Monast. 145.
29. ♂ *subcordata* Led. fl. ross. II, 95. Ins. Aleutae, Sitcha.
30. ♂ *eristyla* Mor. stirp. sard. elench. II, 3. (t. Guss. diff. a P. Malo). Sicilia.
31. ♂ *dasyphylla* Bl. et Fing. comp. fl. Germ. 2, 605. Europa media et austr.
Malus dasyphyllus Borkh. Handb. d. Forsth. u. Forstt. II, 1269. Oriens.
- * 32. 5 *praecox* Pall. fl. ross. I, 22. Rossia australi-orient.
Pyrus Malus β. *paradisaiaca* L. cod. Nro. 3662 β.
- *pumila* Hort.
Malus praecox Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1271.
- *pumila* Mill. dict. Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 426.
- * 33. ♂ *Sieversii* Led. fl. alt. II, 222. Sibiria australis.
34. ♂ *suavolens* Wender. in Flora XIV, 131. Patria ignota.
* 35. ♂ *Astrachanica* DC. prodr. II, 635. Rossia australi-orient.
Fontanesiana Steud. nom. bot. 2. ed. II, 423.
Malus Astrachanica Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 426.

- Malus Fontanesiana* Spach hist. d. végét. phan. II.
- hybrida Dsf. hist. d. arbr. et arbriss. II, 141. (teste Spach.)
36. ♂ dioica (nec divisa Lk) Mnech Verz. ausl. B. u. Staud. v.
Weiss. 87. t. 8. Patria ignota.
apétala Muenchh. Hausv. V, 247.
Malus dioica Moench meth. suppl. 289.
- * 37. ♂ prunifolia Willd. Phytogr. I, 8. Sibiria.
Malus β. Ait. hort. Kew. II, 175.
? *Malus* hybrida Loisel. in Duham. Mill. dict. fig. t. 269.
* β) pomo coccineo.
* γ) - luteo.
* δ) - nigro.
* ε) - perlucido (transparente).
* ζ) - striato.
- * 38. ♂ heterophylla Steud. nom. bot. ed. 2. II, 423. Patria ignota.
Malus heterophylla Spach hist. d. végét. phan. II.
39. ♂ Cikloviensis Kit. in Roch. pl. Ban. rar. 26. (sub *Malo* et sine descr.) Hungaria.
40. ♂ Schottii transact. of the hort. soc. 2. ser. II, 411. (sine descr.) Patria ignota.
41. ♂ quinquefolia Ham. in G. Don dichl. pl. II, 647. India orientalis.
42. ♂ Roxburghii C. Koch. India orientalis.
Pyrus chinensis Roxb. fl. ind. II, 511. (nec Spr. et Willd.)
c. *Calyx caducus*.
- * 43. baccata L. cod. Nro. 3663. Sibiria, Himalaya.
microcarpa Wendl. (teste Steud., sed ubi?)
rubicunda Hfmsgg Verz. d. Pfl. Kult. 192. 3. Nachtr. 55.
Malus baccata Moench meth. 682.
- tomentosa Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. V, 428.
- sibirica Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1280.
Méspilus baccata quorumd. (teste Dum. Cours.)
β) latifolia Tausch in Flora XXI, 713.
Crataegus Cerasi foliis Amman. ruth. 195. t. 31.
γ) fol. variegatis.
44. ♂ cerasifera Tausch in Flora XXI, 714. Sibiria australi-orient.
Malus baccata Loisl. in nouv. Duham. VI, t. 43. f. 2.
- prunifolia Dsf. hort. Paris. 1824.
- cerasifera Spach hist. d. végét. phan. II.
β) calvillea Tausch in Flora XXI, 714.
γ) xanthocarpa Tausch in Flora XXI, 714.
45. ♂ betulaeifolia Bunge in mém. d. étrang. de St. Pétersb. II, 101. China borealis.
- C. Species plane dubiae.
46. ? ceratocarpa Wend. Bem. ueb. versch. Pfl. d. bot. Gart. zu Marb. Patria ignota.
* 47. ? sphaerocarpa Wend. Bem. ueb. versch. Pfl. d. bot. Gart. zu Marb. Patria ignota.
48. ? glutinosa Madiot (teste Steud., sed ubi?). Patria ignota.
49. ? Hadiensis Forsk. fl. arab. aeg. p. CXIII. Arabia.
50. ? spinosa Forsk. fl. arab. aeg. p. XXVII. Litt. Hellesponti.
* 51. ? microphylla Wall. (teste Steud.; an *Cotoneaster microphylla* Wall.) India orientalis.
- Not. Praeterea in horto nostro dendrologico species, nobis non satis notae, coluntur sequentes: 1) hyemalis, 2) lanuginosa Hort. neo DC., 3) *Malus intermedia pinnatifida*, 4) *Malus sibirica*, 5) montana, 6) olivaeformis, 7) ovata, 8) sp. e China, 9) sp. e Lasistania, 10) turgida.

Fam. 62. Calycanthaceae.

XVIII. Calycanthus L.

(καλύξ, calyx, Kelch et άνθος, flos, Bluethe.)

- * 1. 5 floridus L. cod. Nro. 3812. Gu. et H. Abb. fr. Holzart. t. 4. America foederata.
sterilis Walt. fl. carol. 151.
* β) asplenifolius Lodd. cat. Loud. arb. et frut. brit. II, 963.
* γ) foliis variegatis.
* δ) glaucus Willd. en. plant. hort. Berol. 559. bot. rep. t. 539.
acuminatus Hort.
* ε) inodorus Ell. sk. of the bot. of S. Car. and Georg. I, 576.

- * 5) *fertilis* Walt. fl. carol. 151. bot. reg. t. 404.
 ferax Mich. fl. bor. amer. I, 305.
 laevigatus Willd. enum. pl. hort. Berol. 559. hort. Ber. t. 90. bot. reg. t. 481.
 pensylvanicus Lodd. in Loud. hort. brit. 214.
 7) *nanus* Duham.; Cels in Dum. Cours. bot. cult. 2. 6d. V, 556.
 8) *oblongifolius* Nutt. gen. of N. amer. pl. I, 312.
 2. 5 *philadelphicus* Nois. in Steud. nom. bot. ed. 2. I, 262. America foed. bor.
 3. 5 *prunifolius* Sweet hort. brit. 195. Carolina.
 4. 5 *occidentalis* Hk. et Arn. bot. of Beech. voy. 340. t. 84. California.
 Not. *Praeterea* in horto nostro dendrologico coluntur species aut varietates, nobis non satis notae, sequentes: 1) *heterophylla*, 2) *macrocarpa*, 3) *purpurascens*.

XIX. *Chimonanthus* Lindl.

(χαίμων, hyems, Winter et ἀνθος, flos, Blueth.)

- * 1. *fragrans* Lindl. in bot. reg. ad t. 451. China, Japonia.
 praecox Lk enum. hort. Berol. II, 66.
 Calycanthus praecox L. cod. Nro. 3813. bot. mag. 466.
 Meratia fragrans N. v. E. in nov. act. ac. Leop. Caes. nat. cur. XI, 107.
 * β) *grandiflorus* Lindl. in bot. reg. t. 451.
 γ) *luteus* Sweet hort. brit. 195.

Fam. 63. *Melastomataceae*.

XX. *Melastoma* L.

(μελας, niger, schwarz et στομα, os, Mund.)

1. 5 *calycinum* Hook. in Lond. journ. of bot. I, 485. China (Hongkong).
 2. 5 *candidum* D. Don in mem. of the Werner. soc. IV, 228. China, ins. sundaicae.
 3. 5 *macrocarpum* Don in mem. of the Wern. soc. IV, 289. China.
 malabathricum Sims in bot. mag. t. 529. bot. reg. t. 672.
 septemnerium Lour. fl. coch. 335 (teste Hinds).
 4. η) *dodecandrum* Lour. fl. coch. 336. Insulae moluccanae,
 roseum Poir. enc. meth. suppl. III, 644. Cochinchina, China.
 5. 5 *normale* Don prodr. fl. nep. 220. Nepal.
 nepalense Lodd. in bot. cab. t. 707.
 6. 5 *Wallichii* DC. prodr. III, 146. Nepal.

XXI. *Osbeckia* L.

(P. Osbeck a. 1750—52 Chinam permigravit; ecclesiae hallandicae presbyter, † 1805.)

1. η) *chinensis* L. cod. Nro. 2648. bot. reg. t. 542. China.
 Simsii DC. prodr. III, 140.
 Melastoma osbeckioides Ker bot. mag. t. 2235.
 2. η) *nepalensis* (nipaulensis, napaulensis) Hook. ex. fl. t. 31. Nepal.
 speciosa Don prodr. fl. nep. 222.
 Melastoma squamosa Ham. in Wall. num. list.
 β) *albiflora* Lindl. in bot. reg. t. 1475.
 3. 5 *angustifolia* Don pr. fl. nep. 221. Wall. pl. as. rar. III, t. 251. Nepal.
 4. 5 *stellata* D. Don in bot. reg. t. 674. Assam, Nepal,
 septemnervia Ham. in Wall. num. list. Himalaya.
 5. 5 *ternifolia* Don prodr. fl. nep. 221. Wall. pl. asiat. rar. III, t. 240. Nepal.
 6. η) *japonica* Naud. in ann. d. sc. nat. 3. sér. IV, 70. Japonia.
 7. η) *repens* DC. prodr. III, 143. China.
 heteranthera Spreng. syst. veget. II, 312.
 Melastoma repens Desr. in enc. meth. bot. IV, 54.
 Rhexia heteranthera H. B. K. monogr. Melast. II, 23.
 8. 5 *Chulésis* (nec *bulensis*) Don prodr. fl. nep. 221. Nepal.
 9. 5 *rostrata* Don prodr. fl. nep. 221. Nepal.
 10. η) *myrtifolia* Blume in mus. bot. Lugd. Bat. 51. Nepal.

XXII. *Oxyspora* HC.

(ὄξυς, acer, scharf et σπορα, rectius σπερμα, semen, Samen.)

1. 5 *paniculata* DC. prodr. III, 123. Wall. pl. asiat. rar. I, t. 88. Nepal.
 Arthrostemma paniculatum Don prodr. fl. nep. 222.
 Rhexia paniculata Ham. in Spr. syst. veget. IV, 2. 160.

XXIII. *Allomorpha* Blume.

(ἄλλος, alius, anders et μορφή, forma, Gestalt.)

1. η) *pauciflora* Benth. in Hook. Lond. journ. of bot. I, 485. China (Hongkong).

Fam. 64. Memecyleae.**XIV. Memecylon L.**

(μαμακυλον aut μιμακυλον, apud Graecos veteres fructum Arbuti significat.)

1. ? nigrescens H. et Arn. in bot. of Beech. voy. 186. China (Macao).
 2. 5 scutellatum H. et Arn. in bot. of Beech. voy. 186. China, Cochinchina.
 Scutula scutellata Lour. fl. coch. 290.

Fam. 65. Myrtaceae.**Trib. 1. Xerocarpace (Poma lignosa).****XV. Baeckea L.**

(Abraham Baeck, archiaterus suecicus et Linnaei amicus, † 1795.)

1. 5 frutescens L. cod. Nro. 2947. bot. mag. t. 2902. China.
 chinensis Grtn. de fruct. et sem. I, 157. t. 31.

Trib. 2. Sarcocarpace (Poma bacciformia).**XVI. Myrtus L.**

(μυρτινος, μυρτινη aut μυρτος, myrtus, Myrte.)

- * 1. 5 communis L. cod. Nro. 3603. Europa austr., Oriens.
 β) flore pleno; multiplex Hort.
 γ) foliis argenteo-variegatis.
 δ) - aureo-variegatis.
 ε) - lanceolatis, acuminatis; belgica L. cod. Nro. 3603 ζ.
 ζ) - lanceolato-ovatis, acutis; lusitanica L. cod. Nro. 3603 η.
 η) - lineari-lanceolatis, acutis; mucronata L. cod. Nro. 3603 θ.
 minima Mill. dict.
 θ) - ovatis; Romana L. cod. Nro. 3603 α. Mill. fig. t. 184. f. 1.
 ι) - ovato-lanceolatis, acutis; italica L. cod. Nro. 3603 γ.
 κ) - - confertis; baetica L. cod. Nro. 3603 δ. herb. Blackw. t. 114.
 λ) - parvis; microphylla Hffmssgg Verz. d. Pflanz. Kult. I, 82.
 μ) media Hffmssgg Verz. d. Pflanz. Kult. II, 82.
 ν) pomo albo; leucocarpa Hort.
 * 2. 5 Tarentina Bert. fl. ital. V, 120. Italia, Dalmatia.
 communis β. Tarentina L. cod. Nro. 3603. Duh. arbr. II, t. 11.
 3. 5 tomentosa Ait. hort. Kew. ed. 2. II, 159. bot. mag. t. 250. Japonia, India orient.
 canescens Lour. fl. coch. I, 381. China, Cochinchina.
 4. 5 laevis Thunb. fl. jap. 498. (teste Sieb. verisim. Pomaceae). Japonia.

XVII. Eugenia Mich.

(ad honorem principis Sabaudiae, Eugenii, botanices fautoris, a. 1729 a prof. Micheli dicata.)

1. 5 microphylla R. Br. in Abel's narr. of a journ. in China 181. China, Himalaya.

XVIII. Syllisium Meyen et Schauer.

(συλλυειν, separare, trennen, ob petala discreta.)

1. 5 buxifolium M. et Sch. in nov. act. ac. Caes. Leop. Car. China (Macao).
 XIX, suppl. 1. 334.
 Syzygium buxifolium H. et Arn. bot. of Beech. voy. 187.

XIX. Psidium L.

(ψιδιον, rectius σιδιον, malum granatum, Granate.)

1. 35 Guajava L. amoen. acad. II, 206. Blume mus. bot. Lugd. Bat. 71. China, Cochinchina,
 α) pomiferum L. cod. Nro. 3595. India orientalis c. ina.
 sapidissimum Jacq. hort. Schoenbr. III, 62, t. 366.
 β) pyriferum L. cod. Nro. 3594. bot. reg. t. 1079.
 vulgare Rich. in act. de la soc. d'hist. nat. de Par. 110.
 Guajava pyriformis Gaertn. de fr. et sem. I, 181. t. 38.
 γ) minus; Cujavillus Burm. fl. ind. 114.
 2. 5 caninum Lour. fl. coch. 379. China (Canton).

XXX. Syzygium Grtn. (nec Syzgium.)

(συζυγος, conjugatus, verbunden, ob petala in calyptram coalita.)

1. ♂ areolatum DC. prodr. III, 250. mém. s. la fam. d. myrt. t. 17. Nepal.
 2. ♂ venulosum Royle ill. of the him. mount. 217. Himalaya.
 3. ♂ venosum DC. prodr. III, 260. mém. s. la fam. d. myrt. t. 17. Nepal.

XXXI. Calyptranthes Swartz.

(καλυπτρα, operculum, Deckel et άνθος, flos, Bluethe.)

1. ♂ mangiferifolia Hance in Walp. am. bot. syst. II, 628. China australis.

Fam. 66. Granateae.**XXXII. Punica L.**

(arbor Punica apud Latinos ob florum colorem punicum: Granatstrauch.)

- * 1. 5 Granatum L. cod. Nro. 3616. bot. mag. t. 1832. Africa borealis, Oriens,
 β) flore albo; albescens Andr. repos. t. 96.
 γ) - - pleno.
 δ) - flavo; flavum Hort.
 ε) - magno; grandiflorum Hort.
 ζ) - rubro pleno; multiplex Hort.
 η) - fructo parvo; microcarpa S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 132.

Fam. 67. Combretaceae.**XXXIII. Terminalia L.**

(derivatio a v. terminus, finis, Ende, quia ad ramorum extremitates folia in orbem fere dependent, mihi dubia.)

1. ♂ attenuata Edgew. transact. of the Linn. soc. XX, 46. Japonia (Bonin).

XXXIV. Conocarpus Grtn.

(κονος, conus, Kegel et καρπος, fructus, Frucht.)

1. 5 erecta Jacq. sel. stirp. amer. hist. 78. t. 52. Florida, America, Asia et Africa tropica.

XXXV. Combretum L.

(Combretum apud Plinium herba quaedam; derivatio obscura.)

1. ♀ nanum Ham. in Don prodr. fl. nep. 219. Nepal.
 2. § chinense Roxb. hort. beng. 28. China.
 3. 5 Wallichii DC. prodr. III, 21. Nepal.

XXXVI. Anogeissus Wall.

(ἀνα, sursum, aufwaerts et γεισσον, subgrundium, Wetterdach, ob fructus retrorsum imbricatos.)

1. ♂ latifolia Wall. num. list 4014. India orient., Himalaya.
 Conocarpus latifolia Rxb. hort. beng. 34. ? fl. ind. II, 442.

XXXVII. Cacoucia Aubl.

(nomen guyanense Cacouciae coccineae Aubl.)

1. § chinensis ADR. Juss. in DC. prodr. III, 22. China.

XXXVIII. Quisqualis Rumph.

(nomen indicum; G. Don a v. quis, wer et qualis, von welcher Beschaffenheit!! derivat.)

1. § indica L. cod. Nro. 3065. bot. mag. t. 2033. bot. reg. t. 432. China, India orient.
 β) glabra Burm. fl. ind. 104. t. 28. f. 2. Spr. syst. veg. II, 332. c. ins.
 γ) pubescens Burm. fl. ind. 104. t. 35. f. 2. Spr. syst. veg. II, 331.
 δ) villosa Rxb. fl. ind. II, 426. Rumph. herb. amb. V, 38.
 2. § chinensis Lindl. bot. reg. new. ser. XVII, t. 15. China, Cochinchina.
 ? indica Lour. fl. coch. 336.
 Loureiroi G. Don dichl. pl. II, 667.

Fam. 68. Alangieae.**XXXIX. Marlea Rxb.**

(nomen in India orientali pro M. begoniaefolia usurpatum.)

1. ♂ macrophylla S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 135. Japonia.
 2. ♂ platanifolia S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 134. Japonia.

- * 3. 55 *begoniaefolia* Rxb. pl. of the coast of Corom. III, t. 283.
bot. reg. new ser. XI, t. 61.

Stylidium chinense Lour. fl. coch. I, 272.

Stylis chinensis Poir. enc. méth. suppl. V, 260.

India orient., Himalaya,
Nepal, China.

XL. *Alangium* Lam.

(Alangi, nomen malabaricum.)

1. ♂ *decapetalum* Lam. enc. méth. I, 174. Wight ic. pl. I, t. 194. India orient., Himalaya.
hexapetalum Rxb. fl. ind. II, 502.
Grewia salvifolia L. fl. suppl. 409.
β) *tomentosum* Lam. enc. meth. I, 174.

Fam. 68. *Rhizophoreae*.

XLI. *Rhizophora* L.

(ρίζα, radix, Wurzel et φερειν, ferre, tragen.)

1. ♂ *Mangle* L. cod. Nro. 3433.
Bruguiera Mangle Dennst.

Florida, Carolina,
America et Africa trop.

XLII. *Carallia* Roxb.

(Caralli, nomen indicum *C. lucidae* Roxb.)

1. ♂ *sinensis* Arn. in nov. act. ac. Leop. Car. XVIII, 334. China, Cochinchina.
Diátoma brachciata Lour. fl. coch. 362.
Petalotoma brachciata DC. prodr. III, 295.
2. ♂ *lucida* Roxb. pl. of the coast of Corom. III, 8. t. 211. India orient., Himalaya.

Omissa:

- p. 169. Nro. 42.: γ. *pauciflora* Pers. syn. pl. II, 37.
Mespilus pauciflora Poir. enc. méth. IV, 441.
p. 175. Nro. 12.: *Amelanchier asiatica* C. Koch.
Aronia asiatica S. et Z. fl. jap. I, 87. t. 92.

Japonia.

INDEX.

- Alangium* Rxb. XL.
decapetalum Lam. 1.
hexapetalum Rxb. 1.
tomentosum Lam. 1.
Allomorphia Blume XXIII.
pauciflora Benth. 1.
Amelanchier Medik. XII.
alnifolia Nutt. 3.
asiatica C. Koch 12. (p. 187.)
Botryapium DC. 1.
canadensis T. et Gr. 1.
- γ. *rotundifolia* T. et Gr. 2.
- δ. *alnifolia* 3.
- ε. *pumila* Nutt. 3 β.
- ζ. *oligocarpa* T. et Gr. 4.
cretica Lindl. 8.
florida Lindl. 3.
integrifolia Boiss. 9.
intermedia Spach 1 γ.
orbicularis Aut. 8.
ovalis DC. 2.
- β. *semiintegrifolia* Hook. 3.
parviflora Boiss. 11.
pisidia Boiss. 10.
sanguinea DC. 4.
suborbicularis Borkh. 8.
vulgaris Mneh 7.
Anogeissus Wall. XXXVI.
latifolia Wall. 1.
Aria Chamaemespilus XIV, 1.

- Aria Hostii* Jacq. XIV, 10.
nivea Host XIV, 4.
Aronia Pers. XIII.
affinis Neum. XII, 6.
alnifolia Nutt. XII, 3.
Amelanchier Rehb. XII, 7.
arbutifolia Pers. 3.
Ario-Chamaemespilus Rehb. XIV, 1 β.
asiatica S. et Z. XII, 12. (p. 187.)
Botryapium Pers. XII, 1.
Chamaemespilus Pers. XIV, 1.
cretica Pers. XII, 8.
densiflora Spach XIV, 2.
depressa Spach 1 γ.
floribunda Spach 2.
glabrescens Spach 3.
grandifolia Spach 5.
intermedia Ldl. 1 ε.
melanocarpa Ell. 3.
ovalis Pers. XII, 2.
praecox Neum. XII, 5.
pubens Spach 4.
pumila Neum. 6.
pyrifolia Lam. 1.
rotundifolia Pers. XII, 7.
sanguinea Nutt. XII, 4.
sorbifolia Spach XIV, 14.
xanthocarpa Sweet 1 δ.
Arthrostemma paniculatum Don XXII, 1.
Azarolus alpina Borkh. XIV, 2.

- Azarolus arbutifolia** Borkh. XIII, 1.
Aria Borkh. XIV, 4.
Chamaemespilus Borkh. XIV, 1.
crataegoides Borkh. I, 65.
hybrida Borkh. XIV, 11.
intermedia Borkh. XIV, 4 γ. et 10.
pinnatifida Borkh. XIV, 12.
Pollveriana Borkh. XVII, 4.
terminalis Borkh. XIV, 25.
Baeckea L. XXV.
 chinensis Gaertn. 1.
 frutescens L. 1.
Bruguiera Mangle Dennst. XLI, 1.
Caocucia Aubl. XXXVII.
 chinensis A. Juss. 1.
Calycanthus L. XVIII.
 acuminatus Hort. 1 δ.
 asplenifolius Lodd. 1 β.
 ferax Mich. 1 ζ.
 fertilis Walt. 1 ζ.
 floridus L. 1.
 glaucus Willd. 1 γ.
 inodorus Ell. 1 ε.
 laevigatus W. 1 ζ.
 nanus Duh. 1 γ.
 oblongifolius Loud. 1 θ.
 occidentalis Hk. et Arn. 4.
 pensylvanicus Lodd. 1 ζ.
 philadelphicus Nois. 2.
 praecox L. XIX, 1.
 prunifolius Sweet 3.
 sterilis Walt. 1.
Calyptanthus Swartz XXXI.
 mangiferifolia Hance 1.
Carallia Rxb. XLII.
 lucida Rxb. 2.
 sinensis Rxb. 1.
Chaenomeles japonica Lindl. XVI, 6.
Chamaemeles Lindl. V.
 coriacea Lindl. 1.
Chimonanthus Ldl. XIX.
 fragrans L. 1.
 grandiflorus Ldl. 1 β.
 praecox Lk. 1.
Combretum L. XXXV.
 chinense Roxb. 2.
 nanum Ham. 1.
 Wallichii DC. 3.
Conocarpus Grtn. XXXIV.
 erecta Jcq. 1.
 latifolia Roxb. XXXVI, 1.
Cormus domestica Spach XIV, 20.
Cotoneaster Medik. XV.
 acuminata Lindl. 17.
 acutifolia Lindl. 12.
 affinis Lindl. 13.
 bacillaris Wall. 15.
 buxifolia Wall. 21.
 coccinea Steud. 2.
 compta Lém. 23.
 denticulata H. B. K. 22.
 elliptica Hort. 18.
 emarginata Hffmssgg ad fin.
 Fontanesii Spach 3.
 frigida Wall. 14.
 Granatensis Boiss. 7.
Cotoneaster laevis Hort. 18.
 laxiflora Lindl. 5.
 Lindleyi Steud. 18.
 microphylla Wall. 20.
 - β. **Uva ursi** Lindl. 19.
 multiflora Bge 10.
 Nebrodensis C. Koch 6.
 nigra Fries 5.
 nummularia F. et M. 8.
 - Lindl. 18.
 obtusa Wall. 16.
 peduncularis Boiss. 9.
 princeps Hort. ad fin.
 Pyracantha Spach 1, 42.
 rosea Edgew. 4.
 rotundifolia Wall. 19.
 Royleana Hort. ad fin.
 spicata Hort. ad fin.
 tomentosa Lindl. 2.
 - C. A. Mey. 8.
 thymifolia Hort. ad fin.
 uniflora Bge 11.
 Uva ursi Hort. 19.
 vulgaris Lindl. 1.
 - **tomentosa** Vis. 2.
 - **melanocarpa** 5.
Crataegus L. 1.
 acanthocarpa Heynh. 83.
 acerifolia Burgsd. 39.
 acuminata Dsf. XV, 17.
 aestivalis Torr. et Gr. 26.
 alnifolia Sieb. et Zucc. 25.
 alpestris Hort. ad fin.
 alpina Mill. XIV, 2.
 altaica Led. 24 β.
 Amelanchier Dsf. XII, 7.
 angustifolia Borkh. 2.
 apifolia Borkh. 50.
 - Mich. 37.
 - Rehb. 47 τ.
 - **minor** Hort. ad fin.
 arborescens Eil. 20.
 arbutifolia Ait. X, 4.
 - (**nec arbutiflora**) Dsf. XIV, 2.
 - Lam. XIII, 3.
 - Lodd. 2 ε.
Aria L. XIV, 4.
 - Luc. XIV, 10.
 - Spach XIV, 5.
 - β. **suecica** Ait. XIV, 10.
 - γ. **fennica** L. XIV, 12.
Aronia Bosc 67.
atrofusca Led. 68.
aurantiaca Booth 47 π.
aurea Hort. 47 ο.
 - Pursh 22 β.
axillaris Lodd. 33.
Azarella Gris. 66.
Azarolus L. 65.
 - β. **Willd.** 67.
adiata Hort. 2 θ.
berberifolia Torr. et Gr. 32.
betulaefolia Lodd. 33 β.
Bibas Lour. VIII, 1.
Bosciana Steud. 2 δ.
brevistyla Kunze 51.

Crataegus Calpodendron Ehrh. 21.
caroliniana Lodd. 4.
 - Pers. 27.
carpathica Lodd. 44.
Celsiana Dum. Cours. 64 β.
 - Hort. 47.
cerasina Hort. ad fin.
Chamaemespilus Dsf. XIV, 1.
chinensis Steud. VIII, 2.
coccinea L. 11.
 - Lindl. 7.
 - 2. *corallina* Loud. 12.
 - 3. *indentata* Loud. 13.
corallina l'Herit. 39.
 - Lodd. 12.
cordata Ait. 39.
corymbosa XIV, 6.
Cotoneaster Borkh. XV, 1.
crenulata Roxb. 41.
cretica Dsf. XII, 8.
Crus galli Dur. 22.
 - L. 2.
 - Wats. 3.
 - δ. *linearis* DC. 5.
cuneata Sieb. et Zucc. 35.
 - Wender. 11 β.
cuneifolia Borkh. 22.
 - Lodd. 2.
cuspidata Spach XIV, 8.
dentata Thuill. XIV, 11.
dissecta Borkh. 47 γ.
 - DC. 54.
Douglasii Lindl. 7 β.
dulcis Ronalds. 22 β.
edulis Hort. XIV, 5.
elegans Mut. 47 γ.
elliptica Ait. 29.
 - Ell. 26.
ferruginea Pers. VI, 1.
fissa Bosc 38.
 - Lee 58.
fiabellifolia Spach XIV, 6.
flava Ait. 27.
 - Ell. 29.
 - Hook. 21.
flavescens Bosc 69.
flavissima Hort. 27.
flexispina Borkh. 28.
flexuosa DC. 33.
Florentina Zucc. XIV, 3.
florida Lodd. 33 γ.
floribunda Hort. ad fin.
Fontanesiana Steud. 23.
glabra Thunb. X, 1.
germanica Hort. II, 1.
glandulosa Ait. 28. 29 β.
 - Mich. 29.
 - Moench 7.
 - β. *macrantha* Lindl. 8 β.
glauca Wall. VII, 1.
glomerata Hort. ad fin.
graeca Spach XIV, 7.
Granatensis Boiss. 52.
grandiflora Hort. II, 2.
grossulariaefolia 33 δ.
heterophylla Fluegge 55.

Crataegus Hostii Spach XIV, 10.
humilis Lam. XIV, 1.
hybrida Bechst. XIV, 11.
hypolasia C. Koch 17.
indentata Lodd. 13.
indica L. IX, 1.
 - Lour. IX, 2.
inermis Hfmsgg 2 β.
Insegnae Bert. 49.
integrifolia Roxb. 36.
kyrtostyla Fing. 50 x.
laciniata Borkh. 70.
 - Stev. 50 λ.
 - Ucria 62.
laevigata DC. 48.
laevis Thunb. X, 11.
Lagenaria F. et M. 71.
Lambertiana Hort. 16.
lancifolia Wender. 2 δ.
latifolia Pers. 21.
 - Lam. XIV, 11.
Leeana Loud. 64 δ.
leucophleus Moench 21.
linearis Lodd. 33 δ.
 - Pers. 5.
lobata Bosc II, 2.
 - Lindl. 27 β.
lucida Ell. 26 β.
 - Mill. 2.
 - Wang. 2 ε.
lutea DC. et Hort. 27 β.
macracantha Lodd. 8.
macrocarpa Hegetschw. 50 η.
maroccana Pers. 60.
 - Ten. 46.
maura L. fl. 61.
media Bechst. 47 v.
melanocarpa Bieb. 58.
mexicana DC. 16.
Michauxii Pers. 29.
microcarpa Lindl. 40.
mollis Scheele 12.
monogyna Jacq. 50.
 - *nigra* Pall. 59.
nigra W. et K. 44.
 - Zigr. 59.
obovata Bosc 72.
obtusata Spach XIV, 7 β.
obtusifolia Pers. VI, 3.
odorata Bosc 73.
odoratissima Horn 63 β.
Oliveriana (Oliveria) Bosc 57.
opaca Hook et Arn. 26.
orientalis Bieb. 63.
 - Bosc 58.
 - Jan 62.
 - Lindl. 63 γ.
ovalifolia Hornem. 2 ε.
Oxyacantha L. 47.
 - Bert. 50.
 - fl. dan. 47. φ.
 - Walt. 37.
 - β. Lam. 47 φ. et 65.
 - var. β. L. 50.
 - *Oliveriana* Lindl. 57.
 - 11. *melanocarpa* Loud. 58.

- Crataegus oxyacantha** 22. **Celsiana** Loud. 64.
- oxyacanthoides* Bert. 47.
 - Thuill. 47 φ.
 - parvifolia* Ait. 33.
 - pauciflora* Pers. 42 γ. (p. 187.)
 - pectinata* Bosc 53.
 - pentagyna* W. et K. 45.
 - *flava* Godefr. 22 β.
 - Phaenopyrum** Borkh. 39.
 - pinnatifida* Bge 56.
 - Pinschow* Hort. ad fin.
 - platyphylla* Lindl. 57. 58.
 - Poiretiana** DC. 75.
 - polyacantha* Jan 46.
 - populifolia* Ell. 11 ζ.
 - Walt. 39.
 - praecox* Hort. 47 φ.
 - prunellaeifolia* Bosc 76.
 - prunifolia* Pers. 4.
 - Pseudo-Aria** Spach XIV, 1 β.
 - pterifolia* Lodd. 47 ω.
 - pubescens* Steud. 15.
 - punctata* Ait. 22.
 - *brevispina* Dougl. 7 β.
 - purpurea* Bosc 7 β.
 - Penny 47 αα.
 - 2. *altaica* Lodd. 24 β.
 - Pyracantha** Pers. 42.
 - 2. *crenulata* Loud. 41.
 - pyracanthifolia* Hort. 2.
 - pyrifolia* Ait. 21.
 - Lam. XIII, 1.
 - pyriformis* Hort. 12.
 - quercifolia* Booth 47 ββ.
 - quinquelobata* Bosc 77.
 - quitensis* Benth. 19.
 - racemosa* Lam. XII, 1.
 - radiata* Lodd. 21.
 - reginae* Hort. 47 γγ.
 - rivularis* Nutt. 9.
 - rotundifolia* Lam. XII, 7.
 - Moench 7 δ.
 - β. *cretica* Lam. XII, 8.
 - rubra* Lour. IX, 3.
 - salicifolia* Hort. Ait. 2 δ.
 - sanguinea* Pall. 24.
 - Schrad. 63 γ.
 - scandica* Wahlenb. XIV, 10.
 - Schraderiana* Led. 63 γ.
 - serratifolia* Dsf. 78.
 - serrulata* (nec *serrata*) Poir. XIII, 1.
 - sibirica* Lodd. 50 μ.
 - Sieboldii* Steud. VII, 2.
 - sorbifolia* XIV, 14.
 - sphaerica* Hort. ad fin.
 - spathulata* Mich. 40.
 - Pursh 29 β.
 - spicata* Lam. XII, 2.
 - spina longissima* Hort. 8.
 - spinosa* Gil. 47.
 - spinosissima* Lee 27 γ.
 - Lodd. 6.
 - spiralis* Steud. IX, 5.
 - splendens* Ait. 2 ε.
 - Hort. 47 θ.
 - stipulacea* Lodd. II, 3.
- Crataegus stipulosa** Steud. 18.
- stricta* Ronalds. 22 γ.
 - subfusca* Led. 43.
 - subserrata* Benth. 1.
 - subspinosa* DC. 79.
 - subvillosa* Schrad. 11 δ.
 - succulenta* Schrad. 7 ε.
 - tanacetifolia* Pers. 64.
 - Webb 50 τ.
 - tomentosa* Dur. 21.
 - L. 30.
 - Mich. 33.
 - tormalis* L. XIV, 25.
 - transylvanica* Hort. 50 v.
 - trifoliata* DC. 80.
 - triloba* Pers. 46. 50.
 - trilobata* Labill. III, 1.
 - Lodd. 27 γ.
 - turbinata* Pursh 28.
 - umbellata* Dsf. 81.
 - uniflora* Duroi 33.
 - unilateralis* Pers. 82.
 - villosa* Thunb. VII, 2.
 - virginica* (virginiana) Lodd. 34.
 - viridis* L. 11 η.
 - Lodd. 33 ε.
 - Walt. 29.
 - Watsoniana* Steud. 3.
 - xanthocarpus* Hort. 22 β.
- Cydonia** Pers. XVI.
- communis* Lois. 1.
 - europaea* Savi 1.
 - japonica* Pers. 6.
 - indica* Spach 5.
 - inermis parviflora* Hort. ad fin.
 - lusitanica* Mill. 1 γ.
 - maliformis* Mill. 1 α.
 - pyriformis* Hort. Blackw. 1 β.
 - speciosa* Hort. 6 ε.
 - sinensis* Thouin 4.
 - Sumboshia* Ham. 3.
 - tomentosa* C. Koch 2.
 - vulgaris* Pers. 1.
- Diatoma brachiatum** Lour. XLII, 1.
- Eriobotrya** Lindl. VIII.
- chinensis* G. Don 2.
 - cordata* Lindl. VI, 1.
 - elliptica* Lindl. XV, 18.
 - glabrata* Steud. VI, 5.
 - heterophylla* Lindl. 3.
 - japonica* Lindl. 1.
 - obtusifolia* DC. VI, 3.
- Eriolobus** C. Koch III.
- trilobata* C. Koch 1.
- Eugenia** Mich. XXVII.
- microphylla* Royle 1.
- Grewia salvifolia** L. fl. XL, 1.
- Guajava pyriformis** Gaertn. XXIX, 1.
- Hesperomeles** Lindl. VI.
- cordata* Lindl. 1.
 - cuneata* Lindl. 4.
 - glabrata* C. Koch 5.
 - oblonga* Lindl. 2.
 - obtusifolia* Lindl. 3.
- Lazarolus** Steud. v. **Azarolus** Borkh.
- Malus** Tourn. XVII, B.

Malus acerba Mér. XVII, 28.
angustifolia DC. Mich. XVII, 21.
Astrachanica Dum. Cours. XVII, 35.
baccata Lois. XVII, 44.
 - Mneh XVII, 43.
cerasifera Spach XVII, 44.
Cikloviensis Kit. XVII, 39.
communis Dsf. XVII, 27.
coronaria Mill. XVII, 22.
dasyphylla Borkh. XVII, 31.
dioica Moench XVII, 36.
Fontanesiana Spach XVII, 35.
heterophylla Spach XVII, 38.
hybrida Dsf. XVII, 35.
 - Lois. XVII, 37.
japonica Dsf. XVI, 6.
intermedia Hort. ad fn.
microcarpa Raf. XII, 2 β.
paradisiaca Borkh. XVII, 32.
praecox Borkh. 32.
prunifolia Dsf. 44.
pumila Mill. 32.
sativa Dum. Cours. XVII, 27.
sempervirens Dsf. XVII, 21.
sibirica Borkh. 43.
 - Hort. ad fn.
sinensis Dum. Cours. XVII, 24.
Sorbus Borkh. XIV, 20.
spectabilis Dsf. XVII, 24.
sylvestris Mneh XVII, 28.
tomentosa Dum. Cours. XVII, 43.
umbellata Gil. XVII, 27.
Marlea Rxb. XXXIX.
begoniaefolia Rxb. 3.
platanifolia S. et Z. 2.
macrophylla S. et Z. 1.
Mashilea Sieboldii Blume VII, 2.
Melastoma L. XX.
candidum Don 2.
calycinum Hk. 1.
dodecandrum Lour. 4.
malabathricum Sims 3.
macrocarpum Don 3.
nepalensis Lodd. 5.
normale Don 5.
osbeckioides Ker XXI, 1.
roseum Poir. 4.
repens Desv. XXI, 7.
septemnervium Lour. 3.
squamosum Ham. XXI, 2.
Wallichii DC. 6.
Memeceylon L. XXIV.
nigrescens H. et Arn. 1.
scutellatum H. et Arn. 2.
Meratia fragrans N. v. E. XIX, 1.
Mespilus L. II.
acerifolia Poir. I, 39.
acuminata Lodd. XV, 17.
aestivalis Walt. I, 26.
affinis Don XV, 13.
Amelanchier L. XII, 7.
 - Walt. XII, 2.
anthyllidifolia Spreng. IV, 1.
apiifolia Spreng. I, 37.
arborea Mich. III, XII, 1.
arbutifolia L. XIII, 1.

Mespilus arbutifol. β. melanocarpa Mich. XIII, 3.
Aria Scop. XIV, 4.
Aronia Willd. I, 67.
aucuparia All. XIV, 18.
axillaris Pers. I, 33.
Azarolus All. I, 65.
 - β. *Aronia* Poir. I, 67.
baccata quor. XVII, 43.
badiata Bosc. I, 2 δ.
bengalensis Rxb. X, 10.
Bosciana Spach I, 2 δ.
Calpodendron Ehrh. I, 21.
canadensis L. XII, 1.
 - Schmidt XII, 2.
 - γ. *oligocarpa* Mich. XII, 4.
caroliniana Poir. I, 27.
Celsiana Dum. Cours. I, 64 β.
Chamaemespilus L. XIV, 1.
chinensis Blume VIII, 2.
coccinea Ehrh. I, 41.
 - Mill. I, 11.
 - W. et K. XV, 2.
Constantinopolitana Hort. I, 55.
corallina Dsf. I, 39.
cordata Mill. I, 39.
cornifolia Poir. I, 21 β.
Cotoneaster L. XV, 1.
 - var. *Bieb.* XV, 8.
 - *nigra* Fisch. XV, 5.
Crataegus Borkh. I, 47.
crenulata Don I, 41.
Crus galli Dsf. I, 23.
 - Poir. I, 2.
Cuila Buchan. XV, 18.
cuneifolia Ehrh. I, 22.
 - Moench I, 2.
cuneiformis Marsh. I, 2.
denticulata Spreng. XV, 22.
dissecta Dum. Cours. I, 54.
domestica All. XIV, 20.
 - Gater I.
elegans Poir. I, 47 γ.
elliptica Gu. at H. I, 23.
eriocarpa DC. XV, 2.
ferruginea Spreng. VI, 1.
fissa Poir. I, 38.
flabellata Bosc. I, 11 γ.
flava Willd. I, 27.
flexispina Mneh I, 28.
flavescens Bosc. I, 69.
flexuosa Poir. I, 33.
Florentina Bert. XIV, 3.
Fontanesiana Spach I, 23.
germanica L. 1.
glabra Poir. X, 1.
glabrata Spr. VI, 5.
glandulosa Willd. I, 7.
grandiflora Sm. 2.
heterophylla Poir. 55.
hyemalis Walt. I, 2 α.
indica Poir. IX, 1.
japonica Thunb. VIII, 1.
Insegnae Tin. I, 49.
intermedia Poir. 47 v.
laciniata Borchm. I, 70.
 - Guss. I, 62.

Mespilus laciniata Walt. I, 33.
laevigata Poir. I, 48.
laevis Spreng. X, 11.
lanuginosa R. et P. VI, 1.
latifolia Poir. I, 21.
laurifolia Poir. I §.
laurina Dum. Cours. I c.
linearis Dsf. I, 5.
 - Poir. I, 75.
lobata Poir. 2 et I, 21.
Loddigesiana Spach 3.
lucida Dum. Cours. I, 2.
 - Sweet I, 42.
lutea Poir. I, 27 β.
maura Poir. I, 61.
 - *maroccana* Poir. I, 60.
maxima Dum. Cours. I, 11 η.
melanocarpa Fisch. XV, 5.
 - Spreng. I, 58.
mexicana Sweet I, 17.
Michauxii Poir. I, 29.
monogyna All. I, 50.
 - β. Guss. 46.
nana Dum. Cours. I, 2 γ.
Nebrodensis Bert. XV, 6.
nigra Willd. I, 44.
obovata Bosc I, 72.
obtusifolia Poir. VI, 3.
odorata Wendl. I, 10. et 73.
odoratissima Andr. I, 63 β.
Oliveriana Poir. I, 57.
orientalis Mill. XV, 2.
 - Poir. I, 58.
ovicarpa Hort. I, 74.
Oxyacantha All. I, 47.
oxyacanthoides DC. I, 47 φ.
parvifolia Willd. I, 33.
pauciflora Poir. 42. (p. 187.)
pectinata Dum. Cours. I, 53.
pentagyna Spreng. I, 45.
Persoonii Spreng. VI, 3.
Phaenopyrum Ehrh. I, 39.
Poiretiana Sweet I, 75.
polyacantha Guss. I, 46.
populifolia Hort. VIII, 1.
pruinosa Wendl. I, 31.
prunellaefolia Poir. I, 76.
prunifolia Poir. I, 4.
pubescens H. B. K. I, 15.
 - Presl I, 62.
 - Wendl. I, 14.
pumila Lodd. XIII, 6.
punctata Spach I, 22.
purpurea Poir. I, 7 γ.
pygmaea Baumg. XV, 2.
Pyracantha L. I, 42.
pyracanthifolia Lodd. I, 2.
pyrifolia Wild. I, 21.
racemiflora Dsf. XV, 3.
rotundifolia Dur. I, 7 δ.
sanguinea Spach I, 7 et 24.
sempervirens Hort. I, 40.
Sieboldii Blume VII, 2.
sinensis Poir. IX, 3.
Smithii Ser. DC. 2.
sorbifolia Poir. XIV, 14.

Mespilus spathulata Poir. I, 40.
 - Spreng. I, 29 β.
spectabilis Hort. XVII, 24.
spiralis Blume IX, 5.
stipulacea Dsf. 3.
stipulosa H. B. K. I, 18.
subspinosa Vent. I, 79.
succulenta Sweet I, 7 c.
tanacetifolia Poir. I, 64.
tinctoria Don X, 10.
tomentosa Hohenack XV, 8.
 - Willd. XV, 2.
terminalis All. XIV, 25.
Trewiana Tausch I, 30.
triloba Poir. I, 46. 65.
turbinata Spreng. I, 28.
unilateralis Poir. I, 82.
villosa Spreng. VII, 2.
viridis Sweet 33 c.
vulgaris Rehb. 1.
Watsoniana Spach I, 3.
xanthocarpus Ehrh. I, 33.
Myrtus L. XXVI.
belgica L. 1 c.
baetica L. 1 z.
canescens Lour. 3.
communis L. 1.
 - β. Tarentina L. 2.
italica L. 1 c.
laevis Thunb. 4.
lusitanica L. 1 ζ.
media Hoffmssg I μ.
microphylla Hoffmssg I λ.
minima Mill. 1 η.
mucronata L. 1 η.
Romana L. 1 θ.
tomentosa Ait. 3.
Tarentina Bert. 2.
Osteckia L. XXI.
angustifolia Don 3.
chinensis L. 1.
Chulesis (nec *chulensis*) Don 8.
heteranthera Spr. 7.
japonica Naud. 6.
myrtifolia Blume 10.
nepalensis Hk. 2.
repens DC. 7.
rostrata Don 9.
septemnervia Haw. 4.
Simsii DC. 1.
speciosa Don 2.
stellata Don 4.
ternifolia Don 5.
Osteomeles Lindl. IV.
anthyllidifolia Lindl. 1.
ferruginea H. B. K. VI, 1.
glabrata H. B. K. VI, 5.
latifolia H. B. K. VI, 1 β.
Ostia *Cotoneaster* Clairv. XV, 1.
Mespilus Clairv. II, 1.
Oxyacantha digyna Clairv. I, 47.
 - *monogyna* Clairv. I, 50.
tomentosa Clairv. XV, 2.
Oxyacantha Pyracantha Medik. I, 42.
vulgaris Erndt I, 47.
Oxyspora DC. XII.

Oxyspora paniculata DC. 1.
Peraphyllum Nutt. XI.
 ramosissimum Nutt. 1.
Petalotoma brachchiata DC. XLI, 1.
Photinia Lindl. X.
 arbutifolia Lindl. 4.
 arguta Wall. 3.
 bengalensis Wall. 10 β.
 dubia Lindl. 10.
 eugeniaefolia Lindl. 7.
 integrifolia Lindl. 6.
 laevis DC. 11.
 Lindleyana W. et Arn. 8.
 Notoniana W. et Arn. 9.
 prunifolia Lindl. 2.
 pustulata Lindl. 5.
 serrulata Lindl. 1.
 - β. Hook. 2.
 Sieboldii G. Don VII, 2.
 villosa DC. VII, 2.
Pirus (nec *Pyrus*) L. XVII.
 acerba DC. 28.
 Achras Grtn. 1.
 - Wallr. 1 α.
 alnifolia Lindl. XII, 3.
 alpina Willd. XIV, 2.
 Amelanchier Willd. XII, 7.
 - β. Guss. XII, 8.
 americana DC. XIV, 16.
 amygdaliformis Vill. 9.
 angulata Kit. 2.
 angustifolia Ait. 21.
 - Dne 14.
 anthyllidifolia Sm. IV, 1.
 apetala Muenchb. 36.
 Appiana (Apiana) Pers. 27 θ.
 arbuscula Poir. XIV, 12 β.
 arbutifolia L. fil. XIII, 1.
 - β. nigra Willd. XIII, 3.
 arguta Tausch XIV, 11.
 Aria Ehrh. XIV, 4.
 - *cretica* Lindl. XIV, 7 β.
 - Gu. et H. XIV, 11.
 - Prytz XIV, 10.
 - Sibth. et Sm. XIV, 7.
 Astrachanica DC. 35.
 aucuparia Grtn. XIV, 18.
 - Ucria XIV, 17.
 auriculata DC. XIV, 13.
 auricularis Knoop 4.
 Azarus Scop. I, 65.
 baccata L. 43.
 - Thunb. 24.
 Bartramiana Tausch XII, 5.
 Bergamotia Sch. et Mart. 1 π.
 Bollwylleriana DC. 4.
 betulaefolia Bge 45.
 Botryapium L. fil. XII, 1.
 - Wangenh. XII, 1 β.
 - Willd. XII, 2 β.
 Bovei Steud. 14.
 canescens Spach 20.
 capitata Hort. XIII, 4.
 cavillea Hort. 27 ξ.
 cerasifera Tausch 44.
 ceratocarpa Wender. 46.

Pirus Cestiana L. 27 ζ.
 Chamaemespilus Ehrh. XIV, 1.
 chinensis Roxb. 42.
 - Spreng. XVI, 4.
 communis L. 1.
 - Lour. 6.
 - Gouan 9.
 conocarpa Sch. et Mart. 27 v.
 coronaria L. 22.
 - Wangenh. 21.
 corymbosa Gil. 1.
 costata Sch. et Mart. 27 ξ.
 Cotoneaster Munch XV, 1.
 crataegifolia Savi XIV, 3.
 crenata Don XIV, 8.
 cretica Willd. XII, 8.
 cuneifolia Guss. 7.
 - Vis. 9.
 Cydonia L. XVI, 1.
 dasyphylla Bl. et Fing. 31.
 - Tausch 1 β.
 decipiens Bechst. XIV, 11.
 densiflora Steud. XIV, 2.
 denticulata Dum. Cours. 3.
 depressa Lindl. XIII, 1 γ.
 dioica (divisa Lk) Willd. 36.
 diversifolia Bong. 23.
 Dolabelliana Sch. et Mart. 1 ξ.
 domestica Sm. XIV, 20.
 edulis Wats. XIV, 6.
 - Willd. XIV, 5.
 elaegrifolia (nec *elaecagnifolia*) Pall. 10.
 epirotica L. 27 μ.
 eriopleura Rehb. 9.
 eristyla Mor. 30.
 Falerna (nec *Valerna*) L. 1 π.
 - Sch. et Mart. 1 ρ.
 Favonia L. 1 α.
 fennica Bab. XIV, 12.
 Florentina Tozz. Targ. XIV, 3.
 floribunda Lindl. XIII, 2.
 foliolosa Wall. XIV, 23.
 Fontanesiana Steud. 35.
 frutescens Hort. 27 ε.
 glabra Boiss. 15.
 glandulosa Munch I, 7.
 globosa Sch. et Mart. 1 μ.
 glutinosa Madiot 48.
 gracilis S. et Z. XIV, 22.
 graeca Hort. XIV, 7.
 grandifolia Lindl. XIII, 5.
 Hadiensis Forsk. 49.
 heterophylla Borkh. XIV, 14.
 - Steud. 38.
 Hostii Hort. XIV, 10.
 hybrida Munch XIV, 14.
 - Sm. XIV, 12.
 hyemalis Hort. ad fn.
 japonica Thunb. XVI, 6.
 jaspidea Hort. I v.
 indica Roxb. 26.
 - Colebr. XVI, 5.
 integerrima Wall. X, 6.
 intermedia Bechst. XIV, 4 γ.
 - Ehrh. XIV, 10.
 - Ten. XIV, 4.

- Pirus intermedia* Thom. XIV, 12.
intermedia α . *latifolia* DC. XIV, 11.
 - β . *angustifolia* DC. XIV, 5.
irregularis Duroi 4.
Kamonensis Wall. XIV, 9.
lanata Don XIV, 9.
lanuginosa DC. XIV, 19.
 - Hort. ad fin.
latifolia Lindl. XVII, 8.
liquescens Pers. 1 p.
lobata C. Koch 26.
lusitanica Hort. XVI, 1 γ .
malifolia Spach 18.
maliformis Hort. XVI, 1 α .
Malus L. 27.
 - Sm. 28.
 - α . *austera* Wallr. 28.
 - α . *sylvestris* L. 28.
 - β . *paradisica* L. 32.
 - β . *mitis* Wallr. 27.
 - β . *tomentosa* Bl. et Fing. 27.
 - β . Ait. 37.
megamila Sch. et Mart. 27 ι .
melanocarpa Hort. 27 λ .
 - Willd. XIII, 3.
meridionalis Guss. XIV, 7.
Michauxii Bosc 12 β .
microcarpa DC. XIV, 15.
 - Wendl. 43.
microphylla Wall. 51.
montana Hort. ad fin.
montis Sinai Hort. 12.
Nebrodensis Guss. XV, 6.
nepalensis Hort. XIV, 8.
Neumanniana Tausch XII, 6.
nivalis L. fl. 5.
 - Lindl. 9.
Nussia Don XV, 14.
oblonga Hort. XVI, 1 β .
oblongifolia Spach 19.
obtusata Steud. XIV, 7 β .
odorata Hort. 22.
olivaeformis Hort. ad fin.
orientalis Horn. 10.
 - Hort. 12.
ovata Hort. ad fin.
ovalis Willd. XII, 2.
oviformis Sch. et Mart. 1 o.
paradisica Hort. 32.
parviflora Dsf. 17. et XII, 11.
 - Guss. 9.
Pashia Ham. 16.
pennsylvanica Hort. XIII, 3.
persica Pers. 12.
pinnatifida Sm. XIV, 12.
Pollveria L. 4.
 - Lej. 1 β .
Pollvilla Gm. 4.
Pollvilleriana Rehb. 4.
Pompejana L. 1 v.
praecox Hort. 32.
praemorsa Guss. XIV, 17.
prasomila L. 27 η .
prunifolia Willd. 37.
pubens Lindl. XIII, 4.
pumila Hort. 32.
- Pirus Pyrainus* Raf. 7.
Pyrastrer Borkh. 1.
 - Wallr. 1 γ .
quinqueflora Ham. 41.
quercifolia Hort. 1 θ .
rivularis Dougl. 23.
rotundifolia Behl. XIV, 4 ϵ .
 - Hort. XII, 2.
 - Mneh 1, 7 δ .
Roxburghii C. Koch 42.
rubelliana L. 27 ι .
rubicunda Hfmsgg 43.
rufescens Pers. 1 τ .
salicifolia L. fl. 11.
 - Lois. 9.
salviaefolia DC. 8.
 - Pett. 9.
sambucifolia Ch. et Schlicht. XIV, 21.
sanguinea Pursh XII, 4.
sanguinolenta Hort. 1 ι .
sativa DC. 1.
Schottii transact. hort. soc. 40.
semilobata Behl. XIV, 4 η .
semipinnata Behl. XIV, 10.
sempervirens Dsf. 21.
Sieversii Led. 33.
Sinai Dsf. 12.
sinaica Thoun 12.
sinensis Willd. XVI, 4.
 - Lindl. 6.
sinica Royle 6.
sorbifolia Cham. XIV, 21.
 - Wats. XIV, 14.
Sorbus Grtn. XIV, 20.
 - Mor. et Not. XIV, 20 β .
spectabilis Ait. 24.
sphaerocarpa Wender. 47.
spinosa Forsk. 50.
spuria DC. XIV, 14.
striata Sch. et Mart. 27 κ .
stricta Royle 6.
suaveolens Wender. 34.
subcordata Led. 29.
sudetica Tausch XIV, 1 β .
Sumboshia Ham. XVI, 3.
sylvestris Hort. 28.
syriaca Boiss. 13.
tenuiflora Boenn. 28 β .
tomentosa Moench 4.
 - Roxb. XVI, 2.
torminalis Ehrh. XIV, 25.
 - B. minor Ten. XIV, 3.
trilobata DC. III, 1.
turgida Hort. ad fin.
Upsaliensis Lodd. 1 β .
umbellata Dum. Cours. 25.
ursina Wall. XIV, 24.
variolosa Wall. 16.
vestita Wall. XIV, 8.
vinifera Sch. et Mart. 1 λ .
Wangenheimiana Tausch XII, 1 β .
- Psidium* L. XXIX.
caninum Lour. 2.
Guajava L. 1.
pomiferum L. 1 α .
pyriferum L. 1 β .

- Psidium** *sapidissimum* Jacq. 1 α.
 vulgare Rich. 1 β.
Punica L. XXXII.
 Granatum L. 1.
Pyrus Aut. v. *Pirus*.
Pyrenia *Amelanchier* Clairv. XII, 7.
 Aria Clairv. XIV, 4.
 aucuparia Clairv. XIV, 18.
 Chamaemespilus Clairv. XIV, 1.
 Malus Clairv. XVII, 27.
 Pyrus Clairv. XVII, 1.
 torminalis Clairv. XIV, 25.
Quisqualis Rumph XXXVIII.
 chinensis Ldl. 2.
 glabra Burm. Spreng. 1 β.
 indica L. 1.
 - Lour. 2.
 Loureiroy G. Don 2.
 pubescens Burm. Spreng. 1 γ.
 villosa Roxb. 1 δ.
Raphiolepis IX.
 japonica Sieb. et Zucc. 6.
 indica Lindl. 1.
 - Ker. 2.
 integerrima Hook. 7 β.
 laevis Lodd. 8.
 latifolia Lodd. 9.
 Loureiroy Spreng. 2.
 Mertensii S. et Z. 7.
 Pheostemon Lindl. 2.
 rubra Lindl. 3.
 salicifolia Lindl. 4.
 spiralis G. Don 5.
Rhexia *heteranthera* H. B. K. XXI, 7.
 paniculata Spreng. XXII, 1.
Rhizomorpha L. XLI.
 Mangle L. 1.
Scutula *scutellata* Lour. XXIV, 2.
Sorbus XIV.
 alpina C. Koch 2.
 Amelanchier Crntz XII, 7.
 americana Pursh 16.
 Aria L. 4.
 - *flore roseo* W. et Gr. 1 β.
 - β. *suecica* L. 10.
 asplenifolia Hort. 18 β.
 aucuparia L. 18.
 - α. Mich. 15.
 - β. Mich. 16.
Sorbus *aucuparia* Stell. 21.
 aucuparia Ueria 17.
 auriculata Pers. 13.
 Chamaemespilus Crntz 1.
 coriacea Bert. XIV, 20 β.
 corymbosa C. Koch 6.
 Cydonia Crntz XVI, 1.
 domestica L. 20.
 - β. *lanuginosa* Maly 19.
 edulis C. Koch 5.
 foliolosa Spach 23.
 Florentina C. Koch 3.
 glabra Gil. 18.
 gracilis C. Koch 22.
 graeca C. Koch 7.
 heterophylla Rchb. 14.
 hybrida L. 12.
 intermedia Pers. 10.
 lanata C. Koch 9.
 lanuginosa Kit. 19.
 latifolia Lam. 11.
 macrophylla Hort. ad fin.
 Malus Crntz XVII, 27.
 micantha Dum. Cours. 15.
 microcarpa Pursh 15.
 microphylla Bong. 21 β.
 praemorsa C. Koch 17.
 Pyrus Crntz XVII, 1.
 saturejaefolia Hort. 18 δ.
 sambucifolia C. Koch XIV, 21.
 scandica Fries 10.
 spuria Pers. 14.
 torminalis Crntz 25.
 ursina C. Koch 24.
 vestita Lodd. 8.
Stranvaesia Lindl. VII.
 digyna Sieb. et Zucc. 2.
 glaucescens Lindl. 1.
Stylidium *chinense* Lour. XXXIX, 1.
Stylis *chinense* Poir. XXXIX, 1.
Syllisium Meyen et Sch. XXVIII.
 buxifolium Meyen et Sch. 1.
Syzygium Grtn. XXX.
 areolatum DC. 1.
 buxifolium H. et Arn. XXVIII, 1.
 venosum DC. 2.
Terminalia L. XXXIII.
 attenuata Edg. 1.

ORDO XI.

Aphananthae.

Fam. 70. Anacardiaceae.

I. Pistacia L.

(πικραλία, Pistacia, Pistazienbaum, e voce arabica „fustak“ orta dicitur.)

- * 1. ♂ vera Hayne Arzn. Gew. XIII, t. 18. L. cod. Nro. 7418. Syria, et nunc in terris omnibus mediterraneis.
sativa Presl fl. sic. I, 18.
Terebinthus Mill. dict.
- β) narbonensis L. cod. Nro. 7417. Bocc. mus. II, t. 93.
reticulata Willd. sp. pl. IV, 751.
Terebinthus β. heterophylla DC. fl. fr. suppl. 584.
- * γ) trifolia (trifoliata Dsf.) L. cod. Nro. 7416.
offeinarum Ait. hort. Kew. III, 398.
- * 2. ♂ Terebinthus L. cod. Nro. 4719. Hayne Arzn. XIII, t. 19. Terrae maris mediterr.
vera Mill. dict. ins. canarienses.
 β) sphaerocarpa DC. prodr. II, 64.
- 3. ♂ atlantica Dsf. fl. atl. II, 364. Archipelagus graecum
 β) latifolia DC. prodr. II, 64. Bosphorus, Africa bor.
Patria ignota.
- 4. ♀ fagaroides Willd. en. pl. hort. Berol. suppl. 66. Krin, Transcaucasia.
- 5. ♂ mutica F. et M. in Hohenack. en. pl. Tal. 102.
- 6. ♂ chinensis Bge mém. d. sav. étr. de Pét. II, 89. China borealis.
- 7. ♀ palaestina Boiss. diagn. pl. nov. orient. I, 1. Palaestina.
- * 8. ♂ Lentiscus L. cod. Nro. 7420. S. et Sm. fl. gr. t. 957. Terrae maris mediterr.
Terebinthus Lentiscus Mneh meth. 345. ins. canarienses.
 β) angustifolia; Massiliensis Mill. dict.
 γ) Chia Dsf. tabl. de l'éc. de bot. 199.

II. Schinus L.

(σχινος, lentiscus, Mastixbaum, quia arbor succum mastichi similem exsudat.)

- 1. ♂ discolor Benth. bot. of Belch voy. of Sulph. II, t. 9. California.

III. Odina Rxb.

(O-the-yin-pu-marum, nomen indicum.)

- 1. ♂ Wodier Rxb. fl. ind. II, 293. Royle ill. of the him. mount. t. 31. f. 2. India orientalis,
Haberialia grandis Dennst. clav. ad hort. malab. 21. Himalaya.

IV. Rhus L.

(ρους apud Graecos Gerberstrauch, Rhus Coriaria L.)

A. Cótinus (Folia simplicia; Drupa semiobcordata, reticulata).

- * 1. 5 Cótinus L. cod. Nro. 2128. Jeq. fl. austr. t. 210. Europa austr., Oriens,
Cótinus Coggrygia (Coccygia Mneh) Scop. fl. carn. I, 220. China bor. ? Amer. bor.
- coriaria Duh. traité d. arbr. et arbust. I, t. 78.
- 2. 5 velútina Wall. in G. Don dichl. pl. II, 69. Himalaya.

B. Lobadium (Folia tripartita; Drupa globosa, villosa).

- * 3. 5 aromatica Ait. hort. Kew. I, 367. ann. du Mus. V, t. 30. America borealis,
? canadensis Marsh. arbust. amer. 129. Mexico.

Lobadium aromaticum Raf. in journ. phys. LXXXIX, 98.

Schmaltzia aromatica Dsv. in journ. de bot. II. (? frustra quaes.)

Turpinia pubescens Raf. in med. repos. of New-York II. hexad. V, 350.

β) *mexicana*; *aromatica* H. et Arn. bot. of Beech. voy. 284.

- * 4. 5 *suaveolens* Ait. hort. Kew. I, 367. America borealis.

Lobadium suaveolens Raf. in journ. phy. LXXXIX.

Myrica trifoliata Hort. et forte L. cod. Nro. 7415. (teste Turp. et Raf.)

Schmaltzia suaveolens Dsv. journ. de bot. II. (frustra quaes.)

Toxicodendron crenatum Mill. dict. (teste Poir.)

Turpinia glabra Raf. in med. repos. de New-York. II. hexad. V, 350.

5. 5 *verrucosa* Scheele in Linn. XXI, 592. Texas.

6. 5 *trilobata* Nutt. in T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 219. Neo-Mexico, California.

- * 7. 5 *microphylla* Engelm. in fl. Gr. pl. Wright. I, 40. Texas.

C. *Thezéra* (Folia terna aut quinata; Drupa sub rotundata, apice trituberculata).

8. 5 *dioica* Brouss. in Willd. en. pl. hort. Berol. I, 325. Mauritania, Sicilia,

crataegiformis Pers. syn. pl. I, 326. Hispania.

? *Oxyacantha* Cav. ann. scienc. nat. III, 36.

oxyacanthoides Dum. Cours. bot. cult. I. éd. III, 568.

zizyphina Tin. pl. rar. Sic. pag. 8.

Rhamnus tripartita Ucria in opusc. di Aut. sic. VI, 249.

Zizyphus tripartita R. et S. syst. V, 342. VI, 663.

9. 5 *pentaphylla* Dsf. fl. alt. I, 267. t. 77. Mauritania, Sicilia.

Thezéra Pers. syn. pl. I, 325.

Rhamnus pentaphylla L. cod. Nro. 1555. Bocc. ic. et descr. rar. pl. Sic. t. 21.

D. *Toxicodendron* (Folia terna, raro quina; Drupa ovato-rotunda, saepe villosa).

- * 10. 5 § *Toxicodendron* L. cod. Nro. 2121. America borealis.

Toxicodendron pubescens Mill. dict.

β) *lobata* Hook. fl. bor. amer. I, 127. t. 46.

diversiloba T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 218.

variobolata Steud. nom. bot. ed. 2. II, 452.

γ) *serrata* Engelm. et A. Gr. in Bost. journ. VI, 159.

δ) *serrata* Mill. dict. (sub *Toxicodendro*.)

- * 11. § *radicans* L. cod. Nro. 2120. bot. mag. t. 1806. America borealis.

Toxicodendron vulgare Mill. dict.

β) *microcarpa* Pursh fl. Amer. sept. I, 205. (sub *Rh. Toxicod.*)

γ) *volubilis* Mill. dict. (sub *Toxicodendro*.)

12. 5 *paniculata* Wall. in G. Don dichl. pl. II, 73. Nepal.

13. 5 *parviflora* Roxb. fl. ind. II, 100. Nepal.

E. *Sumac* (Folia plurijuga; Drupa ovato-rotunda, saepe villosa).

- * 14. 5 § *týphina* L. cod. Nro. 2113. nouv. Duh. II, t. 47. America borealis,

canadensis Mill. dict.

viridiflora Poir. enc. méth. VII, 504. (teste Torr. et Gr.)

β) *frutescens* Willd. en. pl. hort. Berol. 323.

γ) *monstrosa*; *Datisca hirta* L. cod. Nro. 7484. (teste Benn.)

- * 15. 5 *glabra* L. cod. Nro. 2115. Dill. hort. Elth. t. 243. America borealis,

virginica Catesb. nat. hist. of Car. Flor. app. t. 4. praesertim orientalis,

Toxicodendron glabrum Mill. dict. Neo-Mexico.

β) *flore coccineo*; *elegans* Ait. hort. Kew. ed. 1. 162. Wats. dendr. brit. t. 16.

γ) *flore virescente*; *caroliniana* Mill. dict. (sub *Toxicod.*)

viridiflora Poir. enc. méth. VII, 504. ill. d. genr. III, t. 207. f. 1.

δ) *laevicaulis* Torr. in pl. Fendler. 28.

- * 16. 5 *pumila* Mich. fl. bor. am. I, 182. Meerb. pl. sel. icon. t. 14. Carolina.

Meerburgiana Schult. fl. in R. et S. syst. veg. VI, 663.

- * 17. 5 *venenata* DC. prodr. II, 68. Dill. hort. Elth. t. 292. America borealis.

Vernix L. cod. Nro. 2116. (nec Thunb.) Wats. dendr. brit. t. 19.

Toxicodendron pinnatum Mill. dict.

- * 18. 5 *Copallinum* L. cod. Nro. 2118. Jcq. hort. Schoenbr. t. 341. America borealis.

β) *lanceolata* Engelm. et A. Gr. in Bost. journ. VI, 158.

γ) *leucantha* Jcq. hort. Schoenbr. t. 342.

δ) *multijuga* T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 217.

19. 5 *virens* Lindh. in Bost. journ. of nat. hist. VI, 159. Texas, Neo-Mexico.

- * 20. 3 *vernicefera* DC. prodr. II, 68. Kaempf. amoen. 791. c. ic. Japonia, Nepal.

juglandifolia Wall. in Don prodr. fl. nep. 248.

- Vernix Thunb. fl. jap. 121.
Wallichii Sweet. hort. brit. 118.
21. 5 succedanea L. cod. Nro. 2117. Wight ic. pl. Ind. or. t. 560. Japonia, China.
Toxicodendron altissimum Mill. dict.
22. 5 sylvestris S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 141. Japonia.
23. 5 ailanthoides Bge in Mém. d. sav. étr. de St. Pétersb. II, 89. China borealis.
24. 5 hypoleuca Champ. in Hk. journ. of bot. a. Kew. gard. misc. IV, t. 43. China (Hongkong).
Nepal.
25. 5 acuminata DC. prodr. II, 68.
? Kakrasingee Royle ill. of the him. mount. 175. Nepal.
26. 5 fraxinifolia Don prodr. fl. nep. 248. India orientalis.
27. 5 pruinosa Hbmsgg 2. u. 3. Nachtr. zu d. Verz. 198. Nepal.
28. 5 Améla Don prodr. fl. nep. 248.
Bucki-Amelam (Buckiamela Royle) Rxb. hort. beng. 22. fl. ind. II, 99. Nepal.
29. 5 semialata Murr. in comm. Goett. VI, (1784) 27. t. 3. India orient., Cochinch.,
China, Japonia.
- β) Osbeckii DC. prodr. II, 67; javanica L. cod. Nro. 2114. China.
30. 5 chinensis Mill. dict. DC. prodr. II, 68. China.
- * 31. 5 Coriaria L. cod. Nro. 2112. S. et Sm. fl. gr. t. 290. Europa australis,
Oriens.
- β) acute-serrata; Sumac (nec Sumae Heynh.) Targ.
Tozz. obs. bot. VI, 3. t. 1. f. 1.
- γ) humilis Guss. fl. sic. syn. I, 361.
32. ? heterophylla DC. cat. hort. Monspel. 136. Patria ignota
(nec prom. bonae sp.).

V. *Lithrea* (nec *Lythraea*) Miers.
(origine mihi plane dubia, forte chilensi.)

1. 5 laurina Walp. repert. bot. I, 551. California.
Rhus laurina Nutt. in T. et Gr. fl. of N. Am. I, 219. 690.

VI. *Styphonia* Nutt.

(sine dubio a v. στυφος aut στυφνος, acerbus, herbé, ob pulpam drupae acerbam.)

1. 5 integrifolia Nutt. in T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 220. California.
2. 5 serrata Nutt. in T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 220. California.

VII. *Augia* Lour.

(αύγη, splendor, Glanz, ob nitorem vernicis ex hac arbore manantis.)

1. 5 sinensis Lour. fl. coch. 411. China.
Calophyllum Augia Steud. nom. bot. I, 261.

VIII. *Sabia* Colebr.

(sabia, nomen bengalicum.)

1. 5 parviflora Wall. in Rxb. fl. ind. (1824) II, 310. Nepal.
2. 5 campanulata Wall. in Rxb. fl. ind. (1824) II, 311. Nepal.

IX. *Semecarpus* L.

(σημα, nota, Merkmal et καρπος, fructus, Frucht.)

1. 5 cuneifolia Wall. num. list. Himalaya.
Anacardium β. cuneifolium DC. prodr. II, 62.

X. *Buchanania* Roxb.

(Francis Buchanan, serius Hamilton de Leny, Indiam orientalem et Avam per multos annos permigravit.)

1. 5 latifolia Roxb. hort. beng. 32. fl. ind. II, 385. India orientalis,
Himalaya.
Spondias elliptica Rottl. (ubi?)

Fam. 71. *Spondiaceae*.

XI. *Spondias* L.

(σπονδιας et σποδιας apud Graecos prunorum speciem significat.)

1. 5 axillaris Roxb. fl. ind. II, 453. Nepal.

Fam. 72. Burseraceae.**XII. Canarium L.**

(Canari, nomen malaiacum.)

1. ♂ Piméla Kon. (nec Koen.) ann. of bot. I, 36. t. 7. f. 1. China, Cochinchina.
Piméla nigra Lour. fl. coch. 495.
2. ♀ album Raeusch. nomencl. bot. DC. prodr. II, 80. China, Cochinchina.
Piméla β. Kon. ann. of bot. I, 361.
Piméla alba Lour. fl. coch. 495.

XIII. Garuga Roxb.

(Garuga, nomen indicum.)

1. ♂ pinnata Roxb. pl. of the coast of Corom. III, t. 208. India orient., Himalaya.

Fam. 73. Amyrideae.**IV. Amyris L.**

(sine dubio origine arabica et forte cum v. μύρον, unguentum, Salbe, aut μούρα, Myrrhe, connexa.)

1. ♀ floridána Nutt. in Sill. journ. V, 295. Florida.

Fam. 74. Juglandaeae.**XV. Juglans L.**

(Juglans i. e. Jovis glans, Jupiter's Eichel.)

- * 1. ♂ regia L. cod. Nro. 7223. Oriens, Europa austr.,
China borealis.
α) bifera Lam. enc. méth. IV, 500.
β) bisflorens Bechst. Forstbot. 522.
γ) fertilis Hort. (praeparturiensis Hort.)
δ) filicifolia Lodd. (heterophylla Hort.)
laciniata Lam. enc. méth. IV, 500.
- * ε) frutescens (fruticosa) Hort.
ζ) serótina Lam. enc. méth. IV, 500.
- * η) macrocarpa Pers. syn. pl. II, 566. (maxima Hort.)
θ) microcarpa Rehb. fl. exc. II, 489.
- * ι) spicata Hort. Mackoy.
κ) ténera Lam. enc. méth. IV, 400. Bechst. Forstb. 522.
λ) tenuicorticata Bechst. Forstbot. 522.
- * 2. ♀ nigra L. cod. Nro. 7225. Mich. hist. d. arbr. for. I, 158. t. 1. America borealis.
nigra oblonga Marsh. arb. amer. 109.
- * 3. ♂ cinérea L. cod. Nro. 7226. Jcq. ic. pl. rar. I, t. 192. Amer. sept., Carolina.
alba oblonga Marsh. arb. amer. 110.
cathártica Mich. hist. d. arbr. forest. de l'Amér. sept. I, 165. t. 2.
? exaltata Bartr. Reise d. Car. 42.
oblonga Mill. dict. Dur. Harbk. Baumz. 2. Aufl. I, 474.
4. ♀ Camirum Lour. fl. coch. I, 702. China.
5. ♀ pyriformis Liebm. in Vidensk. Medd. fra d. nat. Foren. i Kjöb. 1850. 80. Mexico.

Species dubiae.

- * 6. ♀ ferrugínea Hort. Patria ignota.
7. ♂ baccata L. cod. Nro. 7227. India occidentalis.
8. ♂ mexicana hort. Cels. Mexico.

XVI. Carya Nutt.

(καρυα, Wallnussbaum apud Graecos.)

- * 1. ♀ olivaeformis Nutt. gen. of N. Amer. pl. II, 221. Louisiana.
Juglans cylindrica Lam. enc. méth. IV, 505.
- illinoensis Wengen. Beitr. z. Forstwiss. nordam. Holzart. 54. t. 18. f. 114.
- olivaeformis Mich. fl. bor. amer. 192. Mich. hist. d. arbr. for. I, 172. t. 3.
- Pecan Mhlb. in d. Ges. naturf. Fr. zu Berl. n. Schrift. III, 392.
- rubra Grtn. de fr. et sem. II, 51. t. 89.
β) angustifolia Ait. hort. Kew. III, 361. (sub Juglande.) Sweet hort. brit.

- * 2. ♀ *sulcata* Nutt. gen. of N. amer. pl. II, 221. America borealis.
Juglans alba minima Marsh. arb. amer. 113.
- *amara* Mhlnb. in d. Ges. naturf. Fr. zu Berl. n. Schrift. III, 390.
- *angustifolia* Lam. enc. méth. IV, 505.
- *cordiformis* Wangenh. Beitr. z. Forstw. nordam. Holzart. 25. t. 10. f. 25.
- *mucronata* Mich. fl. bor. am. II, 192.
- *sulcata* Willd. Berl. Baumz. 1. Aufl. 154. t. 7.
β) *laciniosa* Mich. hist. d. arbr. forest. I, 199. t. 9. (sub *Juglande.*)
γ) *pubescens* Sweet hort. brit. 465. (ed. 3. p. 612.)
Juglans pubescens W. en. pl. hort. Ber. suppl. 64.
- * 3. ♀ *alba* Nutt. gen. of N. amer. pl. II, 221. America borealis,
praes. Carolina.
compressa G. Don.
Juglans alba Mich. fl. bor. amer. II, 193.
- *albaovata* Marsh. arbust. amer. 115.
- *compressa* Grtn. de fr. et sem. II, 51.
- *glabra* Gmel. syst. nat. II, 755. Dur. Harbk. Baumz. I, 335.
- *ovata* Mill. dict.
- *squamosa* Mich. hist. d. arbr. for. de l'Amér. sept. I, 190. t. 8.
β) *ovalis* Wangenh. Beitr. z. Forstw. nordam. Holzart. 24. (sub *Jugl.*)
Juglans alba odorata Marsh. arb. amer. 115.
4. ♀ *rigida* Loud. arb. et frut. br. III, 1451. America borealis,
praes. Carolina.
Juglans rigida Lodd. cat. 1836.
- * 5. ♀♂ *tomentosa* Nutt. gen. of N. Amer. pl. II, 221. Torr. fl. of New-Y. t. 100. America boreali-
orientalis.
Juglans alba L. cod. Nro. 7224. fl. bor. amer. II, 197.
- *alba-acuminata* Marsh. arb. amer. 112.
- *tomentosa* Mich. hist. d. arbr. for. I, 184. t. 6.
β) *maxima* Nutt. gen. of N. amer. pl. 221.
6. ♀ *microcarpa* Nutt. gen. of N. Amer. pl. II, 221. Pennsylvania.
- * 7. ♀ *amara* Nutt. gen. of N. Amer. pl. II, 222. America borealis,
praes. Louisiana.
Hicorius amarus Raf. fl. Ludov. 109.
Juglans amara Mich. hist. d. arbr. for. I, 177. t. 4.
- *latifolia* Lam. enc. méth. IV, 503.
- * 8. ♀ *porcina* Nutt. gen. of N. Am. pl. II, 222. America borealis.
Juglans porcina Mich. hist. d. arbr. for. I, 206. t. 9.
β) *ficeiformis* Mich. hist. d. arbr. for. de l'Amér. sept. I, 209. (sub *Jugl.*)
Juglans glabra Muehlenb. in d. Ges. naturf. Fr. zu Berl. n. Schr. III, 391.
γ) *obcordata*; *glabra* Sweet hort. brit.
Juglans obcordata Muehlenb. in d. Ges. naturf. Fr. zu Berl. n. Schr. III, 392.
- *pyriformis* Muehlenb. catal. pl. Amer. sept. 92.
- * 9. ♀ *aquatica* Nutt. gen. of N. Am. pl. II, 222. Carolina, Georgia.
Juglans aquatica Mich. hist. d. for. arbr. I, 182. t. 5.
- * 10. ♀ *myristicaeformis* Nutt. gen. of N. Amer. pl. II, 222. Carolina.
Juglans myristicaeformis Mich. hist. d. arbr. for. I, 211. t. 10.
11. ♀ *integrifolia* Spreng. syst. veg. III, 849. Louisiana.
Hicorius integrifolius Raf. fl. Ludov. 109.
12. ♀ *ambigua* Loud. arb. et frut. br. III, 1451. America borealis.
Juglans ambigua Mich. N. Am. sylv. 190.
13. ♀ *tetraptera* Liebm. in Vidensk. Medd. fra d. nat. For. i Kjøb. 1850. 80. Mexico.

XVII. *Pterocarya* Kth.

(πτερον, ala, Fluegel et καρνα, nux, Nuss.)

- * 1. ♀ *caucasica* C. A. Mey. Verz. kauk. Pfl. 134. Transcaucasia,
Persia.
fraxinifolia Spach hist. d. végét. phanér.
Fraxinus laevigata Hort. Par. in Lam. enc. méth. IV, 502.
Juglans fraxinifolia Lam. enc. méth. IV 502.
- *pterocarpa* Mich. fl. bor. amer. II, 192.
Rhus obscura Bieb. fl. taur. cauc. I, 243.
2. ♀ *sorbifolia* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. IV, 2. 141. Japonia.
3. ♀ *rhoifolia* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. IV, 2. 141. Japonia.

XVIII. *Platycarya* S. et Z.

(πλατυς, amplius, gross et καρνα, nux, Nuss.)

1. ♀ *strobilifera* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. III, 2. 741. t. 5. f. 1. Japonia.

XIX. *Fortunaea* Lindl.

(custos caldariorum societatis horticulturne Londinensis [superintendent of the hothouse-departement] nunc Chilam permigravit.)

1. ♂ *chinensis* Lindl. Journ. of the Soc. 1, 150. c. ic. fl. d. China (Tschusan),
serr. IV, 326b. c. ic. Japonia.

Fam. 75. *Connaraceae*.**XX. *Connarus* L.**

(*κωνναρος* teste Spr. *Zizyphus vulgaris* Lam.)

1. ? *juglandifolius* H. et Arn. bot. Beech. voy. 179. China (Macao).

XXI. *Burea* Aubl.

(origine mihi plane dubia, forte vox guyanensis.)

1. ♂ *Milletii* Planch. in Linn. XXIII, 420. China.

Connarus Roxburghii H. et Arn. in bot. of Beech voy. 179.

2. ♂ *microphylla* Planch. in Linn. XXIII, 420. China.

Aegiceras minus Gaertn. de fr. et sem. I, t. 46.

Averrhoa sinica Hance in Walp. ann. bot. syst. II, 241.

Connarus microphyllus H. et Arn. bot. of Beech. voy. 179.

Fam. 76. *Homalineeae*.**XII. *Blackwellia* Comm.**

(Elizabeth Blackwell plantas officinales ineunte saeculo praeterito pinxit, quo conjugem suum e custodia eripuit.)

1. 5 *nepalensis* (*napalensis*, *napaulensis*) DC. prodr. II, 54. Wall.

pl. as. rar. II, t. 179

Nepal.

2. 5 *padiflora* (nec *pubiflora* Walp.) Lindl. bot. reg. t. 1308.

China.

fagifolia Hort. in Sweet hort. br. 117 (ed. 3. p. 141).

Fam. 77. *Aquilariaceae*.**XIII. *Aquilaria* L.**

(lignum Aqu. malaccensis Lam. ab incolis aquilinum, Aquilinum, Adlerholz, nominatus.)

1. ♂ *Ophispermum* Poir. in dict. d. sc. nat. XVIII, 161. China.

chinensis Spreng. syst. veg. II, 356.

Ophispermum sinense Lour. fl. cochinch. 344.

XXIV. *Hornera* Jungh.

(Lud. Horner, jussu regis Hollandiae nuperrime insulam Sumatram aggressus, sed jam in oppido Padang defunctus.)

1. 5 ♂ *umbellata* Jungh. in Tijdschr. ov. naturl. Gesch. VII, 314. Japonia.

Japonia.

2. 5 ♂ *glomerata* Jungh. in Tijdschr. ov. naturl. Gesch. VII, 314.

Japonia.

Fam. 78. *Hamamelideae*.

Trib. 1. *Altingieae* (Flores dioici aut hermaphroditi; Germinis loculi pluriovulati).

XXV. *Liquidambar* L.

(quasi ambra liquida, quia succus aromaticus ex arbore fluit.)

- * 1. ♂ *Styraciflua* L. cod. Nro. 5237. Mich. hist. d. arbr. fol. III, t. 4. Amer. bor., Mexico.

- * 2. ♂ *imberbe* Willd. sp. pl. IV, 475.

Oriens.

orientalis Mill. dict.

Platanus orientalis Poocek. voy. II, t. 89.

XXVI. *Rhodeleia* Hook.

(*ρόδον*, rosa, Rosa et *λεϊος*, glaber, nudus, glatt, i. e. stachellose Rosa.)

1. 35 *Championi* Hk. in bot. map. t. 4509. fl. d. serr. VI, t. 561. China.

China.

formosa Champ. in Walp. ann. bot. syst. II, 842.

Trib. 2. Hamamelideae (Flores hermaphroditii; Germinis loculi ovulati).

XVII. *Fothergilla* L.

(J. Fothergill, medicus Londinensis in villa Upton hortum botanicum possedit, † 1780.)

- * 1. 5 *alnifolia* L. fl. suppl. 267. Gu. et H. Abb. fr. Holzart. t. 16. America borealis.
Gardéni Mich. fl. bor. am. I, 313.
major Lodd. in bot. cab. t. 1520.
- Hamamélis monoica L. in Rees cycl. XVII.
 - β) *acuta* Sims in bot. mag. ad t. 1341.
Gardéni Jcq. ic. pl. rar. t. 100.
 - γ) *glauca* Hort.
 - δ) *major* Sims in bot. mag. t. 1342.
 - ε) *serotina* Sims in bot. mag. t. 1342.
 - ζ) *speciosa* Hort.
 - η) *obtusa* Sims in bot. mag. t. 1341.

XXVIII. *Helwingia* (nec *Hellwingia*) Willd.

(Andr. Helwing, sacerdos Angerburgiae in Prussia † 1748, de plantis Prussiae ser.)

- 1. 5 *rusciflora* (nec *ruscifolia*) Willd. sp. pl. IV, 716. Japonia.
- japonica* Dietr. Nachtr. z. Lex. d. Gaertn. u. Bot. III, 660.
- Osyris japonica* Thb. fl. jap. 31.

XXIX. *Eustigma* Gardn. et Ch.

(ἐὺ, bene, gut et στίγμα, Narbe, ob stigmata magna.)

- 1. 5 *oblongifolium* Gardn. et Ch. in Hk. Kew. gard. misc. 312. China (Hongkong).

XXX. *Hamamélis* L.

(ἀμαμηλὶς et ὀμομηλὶς, apud Graecos fructus, qui simul ac mala maturant.)

- 1. 5 *japonica* S. et Z. d. baier. Acad. phys. Kl. IV, 2. 193. Japonia.
- 2. 5 *virginica* L. cod. Nro. 1021. Gu. et H. Abb. fr. Holz. t. 75. Virginia, Carolina.
- carolinensis* Gmel. (ubi? nec in syst. nat.)
- corylifolia* Mneh meth. 273.
- macrophylla* Pursh. fl. Am. syst. I, 116.
 - α) *androgyna* Walt. fl. carol. 255.
 - β) *dioica* Walt. fl. carol. 255.
 - γ) *monoica* Walt. fl. carol. 255.
 - δ) *parvifolia* Nutt. gen. of N. Am. pl. I, 107.

XXXI. *Loropétalum* R. Br.

(λωρον, lorum, Riemen et πέταλον, petalum, Blumenblatt.)

- 1. 5 *chinense* Gardn. in Hk. Kew. gard. misc. I, 321. China.
- Hamamélis chinensis* R. Br. char. and descr. of 3 new sp.
Chin. pl. 4 c. ic.
- *virginica* L. Var. Dietr. syn. pl. I, 550.

XXXII. *Corylopsis* S. et Z.

(corylus, Haselstaude et ὄψις, visus, Ansehen.)

- 1. 5 *spicata* S. et Z. fl. jap. I, 47. t. 19. Japonia.
- 2. 5 *pauciflora* S. et Z. fl. jap. I, 48. t. 20. Japonia.

XXXIII. *Parrotia* C. A. Mey.

(Fr. Parrot professor physices Dorpatensis, montem Ararat ascendit; † 1841.)

- 1. 5 *persica* C. A. Mey. Kawk. Pfl. 46. Transkaukasia,
Hamamelis persica DC. prodr. IV, 268. Persia borealis.
- 2. 5 *Jacquemontiana* Dne in Jcqm. voy. bot. IV, 73. t. 82. Ind. orient., Himalaya

XXXIV. *Distylium* S. et Z.

(δις, duplex, doppelt et στυλος, stylus, Griffel.)

- 1. 5 *racemosum* S. et Z. fl. jap. I, 179. t. 94. Japonia.

Fam. 79. *Bhamnaceae*.XXXV. *Paliurus* Grtn.(ἡ παλιουρος apud Graecos jam *Paliurus australis*; origine plane dubia.)

- 1. 5 *australis* Grtn. de fr. et sem. I, 43. f. 5. S. et Sm. fl. gr. t. 240. Terrae maris mediter-
aculeata Lam. ill. pl. t. 210. enc. méth. IV, 697. bot. mag. t. 1843. ranei, Oriens.

- Pétasus* Dum. Cours. bot. cult. VI, 266.
clypeiformis Medik. bot. Beobacht. d. J. 1782. p. 327.
spina Christi Mill. dict.
Rhamus Paliúrus L. cod. Nro. 1566. Pall. fl. ros. II, 65.
Zizyphus Paliúrus Willd. sp. pl. I, 1103. bot. mag. t. 1893.
2. 5 *virgata* Don prodr. fl. nepal. 189. bot. mag. t. 2535. Nepal.
Zizyphus incurva bot. mag.
- *virgata* Dietr. syn. plant. I, 810.
3. 5 *agrestis* Lam. enc. méth. suppl. III, 192. China.
Rhamus agrestis Lour. fl. coch. 197.
Zizyphus agrestis Schult. in R. et S. syst. veg. V, 341.
4. 3 *ramosissima* Poir. enc. méth. suppl. IV, 262. China (Canton), Japonia.
Aubletia (nec *Aubletii*) R. et S. syst. veg. V, 343.
Aubletia ramosissima Lour. fl. coch. 348.
Rhamus ramosissima Aut.
Zizyphus ramosissima Spr. syst. veget. I, 771.
- *Aubletii* D. Dietr. syn. pl. I, 810.
β) *japonica* S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 147.

XXXVI. *Zizyphus* Grtn. (*Ziziphus* Lam.)

(*Zizyphus* et *Ziziphus*, teste Columella a consule Sexto Papirio Augusti tempore ex Oriente in Italia introducta; *Sisuf* apud Arabes fructum *Z. Loti* Lam. significare ab autoribus dicitur, sed Arabes fructum *Loti* montani [i. e. *Zizyphi Loti* Lam.] *Sejal* [Zejal] nominant.)

1. 5 *vulgaris* Lam. enc. méth. III, 316. S. et Sm. fl. gr. 239. Persia Syria et Pontus, sua sponte, ? Mongolia, China borealis.
ill. d. genr. t. 185. f. 1.
Júbuba Mill. dict.
offinarum Medik. bot. Beob. d. J. 1782.
sativa Dsf. hist. d. arbr. et arbriss. II, 373. nouv. Duh. III, t. 16.
Rhamus Zizyphus L. cod. Nro. 1772. Pall. fl. ross. II, t. 59.
- *paliurioides* Pall. fl. ross. II, 59.
β) *inermis* Bge in mém. d. étrang. de Pét. II, 88.
2. 5 *chinensis* (sinensis DC.) Lam. enc. méth. III, 317. China, Japonia.
Rhamus Zizyphus Lour. fl. coch. 196.
3. 5 *Lotus* Lam. enc. méth. bot. III, 317. Spr. Gesch. d. Bot. I, t. 3. Hispania, Italia,
sativa Grtn. de fr. et sem. I, 202. t. 43. f. 4.
sylvestris Mill. dict.
Rhamnus Lotus L. cod. Nro. 1567. Dsf. act. Par. 1788. t. 21.
4. 5 *heterogénea* Poir. enc. méth. bot. suppl. III, 193. Persia, India orientalis.
Rhamus heterogénea Burm. fl. ind. 61. Pluk. almag. t. 312. f. 4.
5. 5 *Spina* Christi W. sp. pl. I, 1105. Africa borealis, Aethiopia, Palaestina.
africana Mill. dict.
Napéca Lam. enc. méth. bot. III, 320.
Rhamus spina Christi L. cod. Nro. 1573.
- *Nabéca* Forsk. fl. aeg. ar. 204.
β) *inermis* Forsk. fl. aeg. ar. 206. Lam. enc. méth. III. 310.
6. 5 *acuminata* Royle ill. of the him. mount. 168. Himalaya.
7. 3 *incurva* Roxb. fl. ind. I, 614. (ed. Seramp. 1824. II, 364.) Nepal.
8. 3 *nitida* Roxb. fl. ind. I, 609. (ed. Seramp. 1824. II, 358.) China.
9. 3 *albans* Roxb. fl. ind. I, 607. (ed. 1824.) II, 354. China.
10. 5 *flexuosa* Wall. in Roxb. fl. ind. II, (ed. Seramp. 1824) 365. Nepal, Himalaya.
11. 5 *oxyphylla* Edgew. in transact. of the Linn. soc. XX, 43. Himalaya.
12. 5 *Oenóplia* (*Aenoplia* Lam.) Mill. dict. India orientalis.
albans Rxb. fl. ind. I, 607. (teste Spr.)
Napéca Roth nov. pl. sp. praes. Ind. orient. 159. (nec *Napaeca* in ind.)
Rhamnus Oenoplia (*Oenopolia* et *Oenopia*) L. cod. Nro. 1571.
13. 5 *Bhunder* Royle ill. of the him. mount. 168. Himalaya.
14. 5 *Júbuba* Lam. enc. méth. III, 318. Mosambik, Java, India
mauritiana Wall. num. list. (in Royle ill. of the him. mount. 168.) orientalis, Himalaya,
soraria Schult in R. et S. syst. veg. V, 337. China.
trinervia Rth. nov. pl. sp. praes. Ind. orient. 158.
Rhamnus Júbuba L. cod. Nro. 1570.
15. 5 *soporifera* Lam. enc. méth. suppl. III, 192. China borealis.
Rhamnus soporifera Lour. fl. coch. 196.
16. 5 *lycioides* A. Gr. in Bost. journ. VI, 168. Texas.

17. 5 obtusifolia A. Gr. gen. fl. amer. ill. II, 170. t. 163. America borealis.
Paliurus texana Scheele in Linn. XXI, 580.
Rhamnus obtusifolia Hk. in T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 685.

XXXVII. *Rhamnus* L.

(ῥαμνος jam apud Graecos Rhamni species significat; derivatio dubia teste Wittstein a voce celtica „ram“ i. e. virgultum, Gestraeuch; forte cum voce graeca ῥαδαμνος, ranus, Zweig connexa.)

A. Spinescentes, Flores tetrameri.

- * 1. 5 cathartica L. cod. Nro. 1549. Hayne Arzn. V, t. 43. engl. Europa, Oriens, Sibiria,
? America borealis.
 bot. t. 1629.
spinosa Gil. fl. lith. V, 132.
Wibhor Lucé prodr. fl. osil. 62.
Cervispina cathartica Much meth. 686.
 β) *Hydriensis* Hacq pl. alp. carn. II, t. 2.
 γ) *repens* Hartm. Handb. i. skand. fl. 111.
 *
 * 2. 5 dahurica (daurica) Pall. fl. ross. II, 24. Sibiria.
 3. 5 globosa Bge in mém. d. étrang. de Pét. II, 88. China bor., Himal., Japoa.
 4. 5 virgata Roxb. fl. ind. I, 604. (ed. Seramp. 1824. II, 351.) Nepal, India orientalis.
 5. 5 tinctoria W. et K. pl. rar. Hung. III, t. 255. Austria.
 6. 5 parvifolia Bge in mém. d. étrang. de Pét. II, 88. China boreal., Mongolia
 * 7. 5 infectoria L. cod. Nro. I, 550. Vis. fl. dalm. II, t. 37. Europa australis,
intermedia Steud. et Hochst. in Flora X, 74. ? isthmus caucasicus
Lycium Scop. fl. carn. I, 163.
 ? *minor* Mill. dict.
tinctoria W. et K. pl. Hung. rar. III, t. 255. (teste Bert.)
 β) *pubescens* Gris. spic. fl. Rum. et Bith. I, 150.
 * 8. 5 saxatilis L. cod. Nro. 1553. Jeq. fl. austr. t. 53. Austria, Helvetia,
longifolia Mill. dict. Germania merid.,
Frangula saxatilis Cram. enum. pl. 41. Graecia, Italia.
 * 9. 5 spathulæfolia F. et M. ind. IV, sem. hort. petr. 46. Transcaucasia.
 * 10. 5 Pallasii F. et M. ind. IV, sem. hort. petr. 46. Transcaucasia, Pontus,
Erythroxylon Bieb. fl. taur. cauc. I, 68. Persia borealis.
 - β. *angustissima* Poir. in enc. méth. IV, 466.
lycioides Pall. Reis. III, 591. fl. ross. II, 26. t. 63.
 * 11. 5 *Erythroxylon* Pall. Reis. III. app. 722. Nro. 78. t. T. f. 1.
 fl. ross. II, 26. t. 62.
 * 12. 5 *lycioides* L. cod. Nro. 1551. Cav. ic. et descr. II. t. 182. Sibiria.
 β) *arragonensis* Ass. syn. fl. arr. 27. Penins. pyrenaica,
 γ) *latifolia* Poir. enc. méth. IV, 464. Mauritiana.
 13. 5 *velutina* Boiss. elench. pl. nov. hisp. Nro. 47. voy. dans
 le Mid. de l'Esp. II, 129. Hispania.
 14. 5 *pubescens* Poir. enc. méth. IV, 464. Gallia.
oleoides Lam. fl. franç. ed. 3. II, 545.
 * 15. 5 *oleoides* L. cod. Nro. 1552. Mor. fl. sard. I. 384. t. 26. Europa australis,
amygdalina Dsf. fl. atl. I, 198. Barbaria, Africa boreal.
oleifolia Hort.
Lycium siculum Ucria op. di aut. sic. VI, 254. (Roem. Arch. I.)
 β) *lycioides* Brot. fl. lus. I, 300.
 γ) *cuneifolia* Poir. enc. méth. suppl. IV, 89.
 δ) *buxifolia* Poir. enc. méth. bot. IV, 463. Pluk. Almag. t. 96. f. 6.
 16. 5 *persicaefolia* Mor. stirp. sard. elench. II, 2. fl. sard. I, 385. t. 27. Sardinia.
amygdalina Mor. stirp. sard. elench. I, 11. (nec Dsf.)
 17. 5 *prunifolia* Sibth. et Sm. prodr. fl. 157. Creta.
 18. 5 *crenata* S. et Z. Abh. d. baier. Acad. IV, phys. Kl. 2. 146. Japonia.

B. Inermes, Flores tetrameri.

- * 19. 5 alpina L. cod. Nro. 1561. bot. cab. t. 1077. Alpes, Transsylvania,
Frangula latifolia Mill. dict. Albania, Gallia,
Alaternus alpinus Moench meth. 344. Corsica, Hispania.
 * 20. 5 pumila L. cod. Nro. 1562. Europa media et
Frangula β. pumila Vis. fl. dalm. III, 233. australis.
repens Hort.
Frangula rotundifolia Mill. dict.

- β) *rupestris* Vill. hist. d. pl. du Dauph. II, 531.
 Villarsii Lk Handb. z. Erk. d. Gew. II, 120.
 γ) *valentina* Willd. sp. pl. I, 1096.
pumila Cav. ic. et descr. II, t. 181.
 δ) *neapolitana* Lk Handb. z. Erk. d. Gew. II, 120.
pusilla Ten. viagg. in Abruzz. 56. fl. nap. t. 123.
 21. 5 *Sibthorpiana* R. et S. syst. veg. VI, 286.
pubescens Sibth. et Sm. fl. gr. t. 239
 22. 5 *lanceolata* Pursh fl. Am. sept. I, 166.
Shortii Nutt. in Journ. acad. Philad. VII, 91.
Sageretia (nec *Segetetia*) *lanceolata* G. Don dichl. pl. II, 29.
Cardiôlepis nigra Raf. neogen. Nro. 2.
 - *rubra* Raf. neogen. Nro. 1.
 - *spinosa* Raf. neogen. Nro. 3.
 β) *parvifolia* T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 262.
franguloides Pursh fl. Am. sept. I, 166.
 23. 5 *tomentella* Benth. pl. Hartw. 303. California.
 24. 5 *laurifolia* Nutt. in T. et Gr. fl. of N. Am. I, 260. California.
 25. 5 *crocea* Nutt. in T. et Gr. fl. of N. Am. I, 261. California.
 * 26. 5 *Alaternus* L. cod. Nro. 1565. nouv. Duh. III, 42. t. 14. Europa australis,
Alaternus Phýlica Mill. ict. Nro. 1. t. 16. f. 1. Moench Oriens occidentalis,
 méth. 344. Africa borealis.
 * β) *angustifolia*; *Monspeliaca* hort. Par. in enc. méth. IV, 470.
Clusii Willd. en. pl. hort. Ber. I, 250. Mill. ic. t. 16. f. 2.
 γ) *argentea* Hort.
 δ) *aurea* Hort.
 ε) *aureo et albo variegata* Hort. Dum. Cours. bot. cult. VI, 259.
 ζ) *elliptica* Poir. in enc. méth. IV, 470.
 η) *integrifolia* Sweet hort. brit. 3. ed. 136.
 θ) *glabra* Sweet hort. brit. 3. ed. 136.
 ι) *latifolia*; *hispanica* hort. Par. in enc. méth. IV, 470.
 κ) *maculata* Hort. Dum. Cours. bot. cult. VI, 259.
 λ) *rotundifolia*; *balearica* hort. Paris. in enc. méth. IV, 470.
 * 27. 5 *hybrida* l'Her. sert. angl. t. 5. Hybrida.
burgundiaca Hort. Par. in enc. méth. IV, 473.
sempervirens Hort.
 28. 5 *procumbens* Edgew. in transact. of the Linn. soc. XX, 43. Ind. orient., Himalaya.
 C. Inermes; Flores pentameri. (*Frangula* Adans.)
 * 29. 5 *Frangula* L. cod. Nro. 1563. Europa, Oriens, Sibiria.
Frangula Alnus Mill. dict. Mneh méth. suppl. 271.
 - *vulgaris* Rehb. fl. exc. 488.
 β) *angustifolia* Loud. arb. et frut. br. II, 537.
 γ) *variegata* Hort.
 30. 5 *rupestris* Scop. fl. carn. I, 164. t. 5. Illyria, Istria, Rumelia,
pumila Wulf. in Jcq. coll. II, 141. t. 11. (teste Gris.) Caucasus.
rumeliaca Friv. in Flora XVIII, 332.
Wulfenii Spr. syst. veg. I, 768.
Frangula Wulfenii Rehb. fl. exc. 488.
 31. 5 *purpurea* Edgew. in transact. of the Linn. soc. XX, 44. Himalaya.
 32. 5 *Roylei* C. Koch. Himalaya.
rupestris Royle illustr. of the Him. mount. 169.
 33. 5 *grandifolia* F. et M. in Hoh. en. pl. Talysh. 99. Isthmus caucasicus.
alpina Pall. fl. ross. II, 24.
 34. 5 *sanguinea* Pers. syn. pl. I, 239. Hispania (Galicia).
 * 35. 5 *alnifolia* l'Her. sert. angl. 5. Nova Britannia,
franguloides Mich. fl. bor. amer. I, 153. Pensylvania, New-York.
Frangula americana Mill. dict.
 * 36. 5 *caroliniana* Walt. fl. car. 101. America borealis.
 ? *longifolia* Dum. Cours. bot. cult. ed. 2. VI, 260.
Wildenowiana R. et S. syst. veg. V, 295.
 37. 5 *Purshiana* DC. prodr. II, 25. America boreali-
alnifolia Pursh fl. Am. sept. I, 166. occidentalis.
 38. 5 *ferruginea* Nutt. in Journ. ac. Phil. VII, 90. Florida.
 39. 5 *californica* Eschsch. in mém. de l'ac. de Pét. X, 281. California, Neo-Mexico.

Frangula californica A. Gr. gen. fl. amer. illustr. II, 178.

β) *tomentella* A. Gr. pl. Wright II, 26.

40. 5 *oleifolia* Hk. fl. bor. amer. I, 123. t. 44.

California, Oregon.

D. Species dubiae.

41. ? *prunifolia* Mik. in Flora I, 272. (s. descr.)

Creta.

Not. Praeterea in horto nostro species minus cognitae coluntur: 1) *canadensis* Hort.; 2) *Wicklii* Hort.; 3) *xanthocarpa* Hort.

XXXVIII. *Ceanothus* L.

(ὁ κωνωθος apud Theophrastum herbam nobis obscuram significat.)

A. Folia trinervia.

* 1. η *americanus* L. cod. Nro. 1584. bot. mag. t. 1479.
trinervis Mnch meth. 651.

America borealis,
China.

β) *decumbens* Hort.

γ) *glaber* Spach hist. d. végét. phaner.

δ) *herbaceus* Raf. in Dsv. Journ. de bot. I, 227.

reclinatus Bosc.

perennis Pursh fl. Am. sept. I, 167.

ε) *intermedius* Pursh fl. Am. sept. I, 167.

ζ) *macrocarpus* Hort.

η) *Milleri* Tausch in Flora XXI. Beibl. I, 79. Mill. ic. t. 86.

θ) *Neumannii* Tausch in Flora XXI, 738.

ι) *Pitchéri* T. et Gr. fl. of N. Amer.

κ) *tardiflorus* Horn. hort. Hafn. 230.

* 2. 5 *ovatus* Dsf. hist. d. arbr. et arbriss. II, 381.
ovalis Big. fl. Bost. ed. 2. 92. Torr. fl. New-Y. I, 145. t. 20.
intermedius Hk. fl. bor. Amer. I, 24. nec Pursh.
Fontanesianus Spch hist. de vég. phan.

Canada, New-York,
Michigan, Maine,
Arkansas.

3. 5 *sanguineus* Pursh fl. Am. sept. I, 167.

Missouri, Rocky mountains,
Oregon.

4. 5 *Oreganus* Nutt. in T. et Gr. fl. of N. Am. I, 265.

sanguineus Hk. fl. bor. Amer. I, 125.

5. 5 *velutinus* Dougl. in Hk. fl. bor. Amer. I, 125. t. 45.

Oregon.

β) *laevigatus* Hk. fl. bor. Amer. I, 125.

6. 5 *incanus* T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 266.

California.

7. 5 *sorediatus* H. et Arn. in bot. of Beech. voy. suppl. 328.

California.

8. 5 *oliganthus* Nutt. in T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 266.

California.

9. 5 *hirsutus* Nutt. in T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 266.

California.

10. 5 *thyrsiflorus* Eschsch. in mém. de l'ac. de St. Pét. 1826.

California.

* 11. 5 *microphyllus* Mich. fl. bor. am. I, 154.

Georgia, Florida.

? *Wendlandianus* R. et S.

12. 5 *serpyllifolius* Nutt. gen. of N. Amer. pl. I, 154.

Georgia.

13. 5 *divaricatus* Nutt. in T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 266.

California.

14. 5 *integerrimus* H. et Arn. bot. of Beech. voy. suppl. 328.

California.

15. 5 *Fendleri* A. Gr. pl. Fendl. 29.

Nova Mexico.

16. 5 *Greggii* A. Gr. pl. Wright II, 28.

Neo-Mexico.

17. 5 *venosus* Royle ill. of the him. mount. 169. (an Colubrinae sp.?)

Himalaya.

B. Folia uninervia.

18. 5 *spinus* Nutt. in T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 267.

California.

19. η *prostratus* Benth. pl. Hartw. 302.

California.

* 20. 5 *cuneatus* H. et Arn. in bot. of Beech. voy. 329.

California, Oregon.

macrocarpus Nutt. in Torr. et Gr. of N. Amer. I, 267.

Rhamnus cuneatus Hk. fl. bor. Amer. I, 124.

β) *cinerascens* H. et Arn. bot. of Beech. voy. 329.

cuneatus Nutt. in T. Gr. fl. of N. Amer. I, 267.

21. 5 *collinus* Dougl. in Sweet hort. br. 113.

America borealis.

22. 5 *verrucosus* Nutt. in T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 267.

California.

23. 5 *rigidus* Nutt. in T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 268. bot. mag. t. 4662.

California.

24. 5 *dentatus* T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 268. fl. d. serr. VI, t. 567.

California.

25. 5 *papillosus* T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 268. fl. d. serr. VI, t. 567.

California.

XXXIX. *Scutia* Commers.

(sine dubio a v. *scutra*, Schuessel, quia colyx dimidiatus fructum basi circumdat.)

1. § 5 *paniculata* G. Don dichl. pl. II, 34.

India orientalis.

Ceanothus paniculatus Rth nov. gen. et sp. 154.

Celastrus Rothiana Schult. in R. et S. syst. veg. V, 423.
- *nutans* Rxb. hort. beng. 18. fl. ind. I, 623.

XL. Sageretia (nec *Segetetia*) Brongn.

(*Sageret e regia societate agriculturæ parisiensis sodalis.*)

1. 5 *Michauxii* Brongn. in ann. de sc. nat. X, 359. t. 13. f. 2. America foederata.
Rhamnus minutiflora Mich. fl. bor. Amer. I, 154.
2. 5 *theezans* Brongn. in ann. d. sc. nat. X, 360. China.
Berchemia hamosa Wall. num. list. Nro. 4253 (teste Benth.)
Rhamnus theezans (nec *theesans* G. Don) L. cod. Nro. 1554.
- *Thea* Osb. Reise 232.
β) *integra* Dum. Cours. bot. cult. VI, 258.
3. § *oppositifolia* Brongn. in ann. d. sc. nat. X, 360. Nepal, Himalaya.
Zizyphus oppositifolia Wall. in Rxb. fl. ind. ed. 1824. II, 370.
Berchemia oppositifolia Wall. num. list.
4. § *hamosa* Brongn. in ann. d. sc. nat. X, 360. Nepal.
Zizyphus hamosa Wall. in Rxb. fl. ind. (ed. 1824.) II, 369.
Berchemia hamosa Wall. num. list.
5. § *trigyna* G. Don. dichl. pl. II, 29. Nepal.
Rhamnus trigyna Don prodr. fl. nep. 190.

XLI. Berchemia Neck.

(sine dubio ad honorem Nicolai Berghem aut Berchem, pictor etiam animalium plantarumque, † Haarlem 1683.)

- * 1. § *volubilis* DC. prodr. II, 22. America foederata.
Rhamnus scandens Hill. hort. Kew. 453. t. 20.
- *volubilis* L. fl. suppl. 132.
Oenoplea volubilis Schult. in R. et S. syst. veg. V, 332.
Zizyphus volubilis Willd. sp. pl. I, 1102.
2. § *laxa* Wall. num. list. Himalaya.
3. § *floribunda* Brongn. in ann. de sc. nat. X, 357. Nepal.
Zizyphus floribunda Wall. in Rxb. fl. ind. II, 367.
4. § *flavescens* Brongn. in ann. d. sc. nat. X, 357. Nepal.
Zizyphus flavescens Wall. in Rxb. fl. ind. II, 367.
5. 5 *Loureiroana* DC. prodr. II, 23. China, Cochinchina.
Rhamnus lineata Lour. fl. coch. 197.
Zizyphus Loureiroana D. Dietr. sp. pl. I, 811.
6. 5 *lineata* DC. prodr. II, 23. et Arn. in Beech. voy. bot. t. 37. China.
Zizyphus lineata Willd. sp. pl. I, 1182.
Rhamnus lineata L. cod. Nro. 1564. Osb. Reise n. Ost. u. Chin. 217. t. 7.
Oenoplea lineata Schult. in R. et S. syst. veg. V, 333.
7. 5 *racemosa* S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 147. Japonia.

XLII. Condalia Cav.

(Ant. Condal, Petri Loefflingii itineris in Orinacon medio saeculo socius.)

1. 5 *obovata* Hook. ic. pl. t. 287. A. Gr. gen. illustr. II, t. 164. Texas, Neo-Mexico.
β) *foliis parvis* A. Gr. pl. Wright. I, 32.
2. 5 *spathulata* A. Gr. pl. Wright. I, 32. Neo-Mexico.

XLIII. Miorerhamnus A. Gr.

(μικρος, parvus, klein et *Rhamnus*, Kreuzdorn.)

1. 5 *ericoides* A. Gr. pl. Wright. I, 34. Texas, Neo-Mexico.

XLIV. Karwinskia Zucc.

(Baro Karwinsky, Bavarus, Brasiliam et Americam centralem permigravit.)

1. 5 *Humboldtiana* Zucc. in Denkschr. d. baier. Ac. IV, 351. Mexico, California,
glandulosa Zucc. in Denkschr. d. baier. Ac. IV, t. 16. Neo-Mexico, Texas.
Rhamnus biniflora DC. prodr. II, 26.
- *Humboldtiana* Schult. in R. et S. syst. veg. V, 295.
H. B. et K. n. gen. et sp. am. VII, t. 618.

XLV. Adolphia Meisn.

(in memoriam clariss. Rhamnorum monographi, Adolphi Brongniart, botanices professor Parisiensis.)

1. 5 *infesta* Meisn. pl. vasc. gen. I, 70. II, 50. Mexico, Neo-Mexico.
? *Ceanothus infestus* DC. prodr. II, 31. Texas.

- Colletia ? infesta* Brongn. in ann. d. sc. nat. II, 320.
 - *multiflora* DC. prodr. II, 24.
Colubrina infesta Schlecht. in Linn. XV, 468.

XLVI. Hovenia Thb.

(Hoven, senator Amstelodamensis et Thunbergii fautor.)

- * 1. 5 *dulcis* Thb. fl. jap. 101. S. et Z. fl. jap. I, t. 73. 74. Japonia.
 2. 5 *inaequalis* DC. prodr. II, 40. Nepal.
dulcis Don prodr. fl. nep. 189.
acerba Lindl. in bot. reg. t. 501.
pubescens Sweet (teste Steud. nom. bot. I, 777.).

XLVII. Colubrina Rich.

(coluber, Schlange, ob caulem volubilem.)

1. 5 *asiatica* Brongn. in ann. d. sc. nat. X, 369. Nepal, India orientalis,
Ceanothus asiaticus L. cod. Nro. 1585. Cav. ic. et descr. Archipelagus indicus,
 t. 440. f. 1. Mauritius, Africa trop.
 - *capsularis* DC. prodr. II, 32. (Tahiti), ins. societatis.
Celastrus capsularis Forst. prodr. 112.
Pomaderris capsularis G. Don in Loud. hort. brit. 84.
Rhamnus asiaticus Lam. ill. d. genr. t. 129.
 2. 5 *nepalensis* (nipaulensis) G. Don dichl. pl. II, 36. Nepal.
Ceanothus nepalensis (napalensis) Wall. in Rxb. fl. ind. (ed. 1824) II, 375.
 3. 5 *triquetra* G. Don dichl. pl. II, 37. Nepal.
Ceanothus triqueter Wall. in Rxb. fl. ind. (ed. 1824) II, 376.
 4. 5 *texensis* A. Gr. in Bost. journ. VI, 169. Texas.
Rhamnus ? texensis T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 263.

XLVIII. Gouania Jcq.

(Antoine Gouan, professor botanices Monspeliae.)

1. 5 *nepalensis* (nipaulensis, napalensis) Wall. in Rxb. fl. ind. (1824) II, 417. Nepal.
 2. 5 *leptostachya* DC. prodr. II, 40. Himalaya.
tiliaefolia Roxb. pl. of the coast of Corom. I, 67. t. 98.

XLIX. Androglossum Benth.

- (ἀνγρ, vir, hoc loco stamen, Staubgefaess et γλῶσσα, lingua, Zunge, ob filamenta lata.)
 1. 5 *reticulatum* Benth. in Hk. journ. of bot. a. Kew. gard. misc. IV, 42. China (Hongkong).

Fam. 80. Nitrariaceae.

I. Nitraria L.

(nitraria apud Romanos Salpetergrube, i. e. planta nitrosa aut salsuginea.)

1. ♀ *Schoberi* L. cod. Nro. 3457. Pall. fl. ross. I, t. 50. Isthmus caucasicus,
caspia C. A. Mey. Verz. kauk. Pfl. 164. Tataria, Sibiria.
 β) *sibirica* Lam. ill. pl. t. 403. f. 1.
 2. ♀ *Olivieri* J. et Sp. ill. pl. orient. III, t. 295. Syria, Mesopotamia.

Fam. 81. Aquifoliaceae (Ilicineae).

II. Ilex L.

(apud Latinos Quercus species.)

A. Folia spinescentia.

- * 1. 5 *Aquifolium* L. cod. Nro. 1028. Goep. del. sem. hort. Europa media et me-
 Vratisl. a. 1852. ridionalis, Oriens,
Aquifolium illex Scop. fl. carn. I, 168. ins. canar., Canada?
 - *spinosum* Munch meth. 72.

a) *Folia undulata, sinuata, dentato-spinosa.*

- * α) *calamistrata* Hort. Booth et van H.
 * β) *carnola* Hort. Booth.
 * γ) *crassifolia* Ait. hort. Kew. I, 169.
 * δ) *crispa* Hort. Loud. arb. et frut. brit. II, 507.
 * ε) *echinata* Mill. dict.

- ζ) *elegans* Hort. Bollw.
- η) *ferox* Ait. hort. Kew. I, 169.
- θ) *latifolia* Loud. arb. et frut. brit. II, 507.
- ι) *latispina* Hort. Booth et van Houtte.
 recurva Loud. enc.
- κ) *macrophylla* Hort.
- λ) *Maderensis* Hort. Verschaff. et Booth.
- μ) *monstrosa* Hort. Booth.
- ν) *revoluta* Booth (*contorta* v. Houtte).
- ξ) *Shepherdii* Hort. Booth.
- ο) *vulgaris* Goepf. del. sem. hort. Vratisl. a. 1852.

b) *Folia dentato-spinosa, planiuscula, vel plana* (senescens Sweet hort. brit.).

- α) *Altaclarensis* Loud. arb. et frut. brit. II, 507. (*canadensis* Hort. Booth et van H.)
- β) *angustifolia* Loud. arb. et frut. brit. II, 507.
- γ) *laurifolia* Loud. arb. et frut. brit. II, 507.
- δ) *myrtifolia* Hort. Boeckm.
- ε) *nigricans* Hort. van Houtte.
- ζ) *platyphylla* Hort. Booth.
- η) *serrata* Desf. hist. d. arbr. et arbriss. II, 361. (*serratifolia* Loud.)
 ciliata Loud. arb. et frut. brit. II, 507. 508.
 recurva Ait. hort. Kew. I, 169.
- θ) *Thunbergiana* Hort. Booth.

c) *Folia integra vel integerrima plana* (senescens Gaud., fl. helv. I, 462.).

- α) *fagifolia* Loud. hort. brit. 384.
- β) *heterophylla* Ait. hort. Kew. I, 169.
- γ) *integrifolia* Hort. Rinz et Haen. (*excorticata* Hort. Bollw.)
- δ) *polymorpha* Hort. Boeckm.
- ε) *rotundifolia* Hort. van H.

d) *Folia ex parte aut tota colorata.*

- α) *Folia albo et aureo-marginata.*
- β) *Folia albo et aureo-picta.*
- γ) *Folia albo et aureo-variegata.*
- δ) *Folia flava.*

e) *Baccae flavae aut albae.*

- α) *leucocarpa* Hort.
- β) *xanthocarpa* Hort.; *chrysocarpa* Wender. observ. bot.

Not. Praeterea in horto dendrologico coluntur ex parte ab iis, quae supra dictae sunt, vix diversae: 1) *candicans*; 2) *ciliaris minor*; 3) *gigantea*; 4) *pendula*; 5) *scotica*; 6) *virens*.

2. 5 5 *balearica* Desf. hist. d. arbr. et arbriss. II, 362.

Insulae balearicae.

Aquifolium γ. Lam. enc. méth. III, 145.

? *Cassine* γ. Lam. enc. méth. III, 147.

Maderensis Willd. en. pl. hort. Berol. suppl. 4.

β) *foliis aureo-maculatis.*

γ) *foliis tricoloribus.*

Patria ignota.

3. 5 *ovata* Goepf. del. sem. hort. Vratisl. a. 1852.

4. 5 *leptocantha* Lindl. in Paxt. flow. gard. 1852. p. 78.

5. 3 *opaca* Ait. hort. Kew. I, 169. Wats. dendr. bot. t. 3.

America borealis.

Aquifolium Walt. fl. carol. 241.

quercifolia Meerb. icon. pl. select. II, t. 5.

β) *acuminata* Loud. arb. et frut. brit. II, 517.

γ) *globosa* Loud. arb. et frut. brit. II, 517.

δ) *latifolia* Loud. arb. et frut. brit. II, 517.

ε) *macrodon* Loud. arb. et frut. brit. II, 517.

China.

6. 5 *Loureiroi* Steud. nom. bot. ed. 2. I, 803.

Aquifolium Lour. fl. coch. I, 114.

Carolina.

7. 5 *laxiflora* Lam. enc. méth. bot. III, 147.

Aquifolium bacc. flavis Walt. fl. carol. 241.

8. 5 *cornuta* Lindl. in Paxt. flow. gard. 1850. p. 43.

9. 3 *dipyrena* Wall. in Rxb. fl. ind. (ed. 1824) I, 473. Wall. pl.
 rar. asiat. III, t. 292.

China borealis.

β) *Cunninghami* Hort. Booth.

Nepal, Himalaya,
Tataria chinensis.

B. Folia serrata aut crenata.

- * 10. 5 Cassine L. cod. Nro. 1029. Catesb. nat. hist. of Car. Fl. I, t. 31. Carolina, Florida.
 caroliniana Mill. dict. Nro. 3.
 cassinoides Lk en. pl. hort. Ber. I, 148.
 castaneaefolia Hort.
 β) angustifolia Lam. enc. méth. III, 147.
- * 11. 5 brexiaefolia Hort. van H. Patria ignota.
- * 12. 5 angustifolia Willd. en. pl. hort. Ber. I, 172. Wats. dendr. brit. t. 4. America borealis.
 Cassine γ. Lam. enc. méth. III, 147.
 myrtifolia Walt. fl. carol. 241.
 rosmarinifolia Lam. ill. pl. I, 356. Nro. 1728.
 β) ligustrifolia Pursh fl. Amer. sept. 116.
 γ) Watsoniana Spch hist. d. vég. phanérog.
- * 13. 5 prinoides Ait. hort. Kew. II, 278. America borealis.
 decidua Walt. fl. car. 241.
 Prionitis Willd. en. pl. hort. Ber. suppl.
 Prinos decidua DC. prodr. II, 16. Wats. dendr. brit. t. 115.
 β) aestivalis Lam. enc. méth. bot. III, 147. (? Madera.)
- * 14. 5 vomitoria Ait. hort. Kew. I, 278. Carolina, Florida, Georgia.
 Cassena Mich. fl. bor. am. I, 229.
 Cassine Walt. fl. car. 241.
 floridana Lam. ill. pl. I, 356. Nro. 1731. enc. méth. suppl. III, 67.
 ligustrina Jcq. colt. IV, 105. ic. pl. rar. t. 310. Wendl. hort. Herrenh. t. 31.
 religiosa Barton fl. virg. 69.
 Cassine caroliniana Lam. enc. méth. I, 652.
 - Peragua Mill. ic. t. 83. f. 2.
15. ? Wallichii Steud. nomencl. bot. I, 803. Himalaya, India orient.
 macrophylla Wall. num. list.
16. 5 odorata Ham. in Don prodr. fl. nep. 189. Nepal.
 chinensis Sims in bot. mag. t. 2043. China.
 triflora Blume bijdr. 1150. Japonia.
17. 5 emarginata Thb. fl. jap. 78. Japonia.
18. 5 crenata Thb. fl. jap. 78. Japonia.
19. 5 heterophylla G. Don dichlam. pl. II, 17. Japonia.
 Aquifolium β. heterophylla Blume bijdr. 1150.
20. 5 serrata Thb. fl. jap. 78. Japonia.
- * 21. 5 latifolia Thb. fl. jap. 79. Paxt. fl. gard. 1852. F. 240. Japonia.
 macrophylla Blume bijdr. 1150.
22. ? serrata Royle illustr. of the himal. mount. 167. (s. descr.) Himalaya.
- * 23. 5 Tarajo Hort. Angl. Goep. delect. sem. hort. Wratisl. 1852. Patria ignota.

C. Folia integra.

- * 24. 5 Dahoon Walt. fl. car. 241. Carolina, Georgia, Florida.
 Cassine Willd. hort. Ber. I, t. 31.
 Cassine β. Lam. enc. méth. III, 147.
 β) laurifolia Nutt. in Sillim. amer. journ. V, 289. Wats. dendr. brit. t. 114.
 phillyreaefolia Hort. Bollw.
- * 25. 5 ligustrifolia G. Don dichl. pl. II, 19. America borealis.
 angustifolia Nutt. gen. of N. Amer. pl. I, 109. (teste G. Don.)
- * 26. 5 ambigua Torr. fl. of New-Y. II, 2. Carolina.
 Cassine caroliniana Walt. fl. carol. 242.
 Prinos ambigua Mich. fl. bor. am. II, 23. Wats. dendr. brit. t. 29.
 β) quinarina Mich. fl. bor. amer. II, 236.
27. 5 Doniana DC. in R. et S. syst. veget. Mant. III, 335. Nepal.
 nepalensis (nipaulensis) Spr. syst. veg. app. 48.
 elliptica Don prodr. fl. nep. 189.
28. 5 rotunda Thb. fl. jap. 77. Japonia.
29. 5 pubescens H. et Arn. bot. of Beech. voy. 176. t. 35. China.
30. 5 microcarpa Ldl. et Paxt. fl. gard. I, 43. f. 28. China borealis.
31. 5 Reewesiana Kumm. in O. u. Dietr. allg. Gartenz. 1851. p. 85. China.
32. 5 quadripétala Medik. bot. Beob. d. Jahr. 1782. p. 208. Patria ignota.

LII. Othera Thb.

(derivatio vocis mihi ignota.)

1. 5 japonica Thb. fl. jap. 61. Japonia.
 flex Othera Spr. syst. veg. I, 496.

LIII. *Prinos* L.(ἡ πρῖνος, apud Graecos veteres *Quercus Ilex* L. et *Q. coccifera* L.)A. *Ageria* (Folia decidua).

- * 1. 5 *verticillata* L. cod. Nro. 2252. Wats. dendr. brit. t. 30. America borealis.
padifolia Willd. en. pl. hort. Ber. 394.
Gronovii Mich. fl. bor. amer. II, 236.
conferta Mueh meth. 481.
β) *ambigua* Pursh fl. Amer. sept. I, 220.
dubia G. Don dichl. pl. II, 20.
- * 2. 5 *integrifolia* Ell. sk. of the bot. of S. Car. a. Georg II, 706. America foeder. austr.
Nutt. gen. of N. Am. pl. I, 213.
- 3. 5 *laevigata* Pursh fl. Am. sept. I, 220. Wats. dendr. brit. t. 28. Am. bor. (mont. Allegh.)
- 4. 5 *lanceolata* Pursh fl. Amer. sept. II, 17. Georgia, Carolina.
- 5. 5 *asprella* H. et Arn. in bot. of Beech. voy. 176. China (Macao).
- 6. ? *prunifolia* Dsf. hort. Paris. ed. 2. 272. Patria ignota.

B. *Winterlia* (Folia persistentia).

- 7. 5 *integra* H. et Arn. bot. of Beech. voy. 261. Japonia.
Ilex integra Thb. fl. jap. 77.
? - *asiatica* L. cod. Nro. 1030.
- * 8. 5 *glabra* L. cod. Nro. 2253. Torr. fl. of New-Y. II, t. 1. America borealis.
Winterlia triflora Mueh meth. 74.
β) *angustifolia* Pursh fl. Amer. sept. I, 221.
- 9. 5 *atomaria* Nutt. gen. of N. Amer. pl. I, 213. Georgia, Carolina.
β) *coriacea* Pursh fl. Am. sept. I, 221. Wats. dendr. brit. t. 27.

C. *Species dubiae*.

- 10. ? *longifolia* Dsf. in Steud. nom. bot. ed. 2. II, 396. America borealis.
- 11. ? *undulata* Hort. in Steud. nom. bot. ed. 2. II, 396. Patria ignota.
- * 12. ? *canadensis* Lodd. in Steud. nom. bot. ed. 2. II, 396. Canada.
- 13. ? *cassinoides* Hort. in Steud. nom. bot. ed. 2. II, 396. America borealis.

LIV. *Nemopanthos* Raf.

(νήμος, saltus, Hain et ἄνθος, flos, Blume.)

- * 1. 5 *canadensis* DC. mém. soc. gen. I, 44. pl. rar. hort. gen. t. 3. America borealis.
fascicularis Raf. journ. phys. 1819. 96.
Ilex canadensis Mich. fl. bor. Amer. II, 299. t. 49.
- *delicatula* Bart. fl. virg. 67.
- *prunifolia* Muehlenb. cat. pl. Amer. sept. 17.
Prinos lucida Ait. hort. Kew. II, 478.

LV. *Cassine* L.

(vox americana.)

- * 1. 3 *excelsa* Wall. in Rxb. fl. ind. (ed. 1824) II, 376. Nepal.
Ilex excelsa Wall. num. list. 4328.

Fam. 82. *Celastrineae*.LVI. *Lophopetalum* Wight.

(λόφος, crista, Kamm der Haehne et πέταλον, petalum, Blumenblatt.)

- 1. 5 *grandiflorum* Wight in Ann. of nat. hist. III, 151. India orientalis, Nepal.
lucidum Steud. nom. bot. ed. II, 68.
Evonymus lucida Don prodr. fl. nep. 191.
- *grandiflora* Wall. in Rxb. fl. ind. (ed. 1824) II, 404. pl. asiat. rar. t. 254.
- *lacera* Don prodr. fl. nep. 191. (teste Royle.)

LVII. *Evonymus* (*Euonymus*, false *Evonimus*) L.(εὖ, bene, gut et ὄνομα, nomen, Name i. e. arbor fausti nominis, apud Theophrastum Εὐώνυμον, quod *Evonymum latifolium* Scop. significat.)A. *Petala oblonga, ovata aut cordata*.

- * 1. 5 *europaea* L. cod. Nro. 1597. fl. dan. t. 1089. Europa, Oriens, Ural.
vulgaris Mill. dict. Scop. fl. carn. II, 166.
tenuifolia Marzar. vicef. 24.

- angustifolia Vill. hist. d. plant. Dauph. II, 540.
 β) angustifolia Schultz fl. Stargard. suppl. I, 16.
 γ) latifolia Gilib. fl. tith. V, 129.
 * δ) leucocarpa Lam. enc. méth. II, 572.
 * ε) multiflora Opiz Boeh. phan. u. cryptog. Gew. 32.
 * ζ) nana Lodd. cat.
 * η) pendula Hort.
 * θ) variegata Hort.
2. 5 velútina F. et M. in Hoh. Talisch. 101. Transcaucasia.
 europaea β. velútina C. A. Mey. Verz. kauk. Pfl. 134.
 3. 5 fibrillifera F. et M. in Hoh. Talysch. 102. Transcaucasia (Gendshæ).
 * 4. 5 verrucosa Scop. fl. carn. I, 166. fl. austr. t. 49. Germania, Helvetia,
 pannonica Erndt virid. Wars. 41. imper. Austr., Rossia,
 europaea γ. leprosa L. fl. suppl. 154. Ural, Oriens.
 * 5. 5 latifolia Scop. fl. carn. I, 165. Jcq. fl. austr. t. 289. Europa australis,
 europaea β. latifolia L. cod. Nro. 1597. Germania, Pannonia,
 vulgaris β. Lam. fl. franc. II, 524. Krim, Oriens.
 * 6. 5 nana Bieb. fl. taur. cauc. III, 160. Isthmus caucasicus.
 * 7. 3 Hamiltoniana Wall. in Rxb. fl. ind. (ed. 1824) II, 403. Nepal.
 atropurpurea Rxb. fl. ind. I, 627. (ed. 1-24. II, 402.)
 8. 3 tingens Wall. in Roxb. fl. ind. (ed. 1824.) II, 406. Ind. orient., Nepal, Himal.
 * 9. 3 fimbriata Wall. in Rxb. fl. ind. (ed. 1824.) II, 408. Ind. orient., Nepal, Himal.
 * 10. ? theaeifolia Wall. in Royl. ill. of the himal. mount. 167. (s. descr.) Himalaya.
 11. 3 grossa Wall. in Rxb. fl. ind. (ed. 1824.) II, 408. Nepal.
 12. 3 micrantha Don prodr. fl. nep. 191. Nepal, China, Mongolia.
 ? frigida Wall. in Roxb. fl. ind. (ed. 1824) II, 409.
 13. 3 bullata Wall. bot. cab. t. 1749. Nepal.

B. Petala orbiculata.

14. 5 longifolia Medik. bot. Beob. d. Jahr. 1782. p. 311. ? Europa australis.
 * 15. § 5 echinata Wall. in Rxb. fl. ind. (ed. 1824.) II, 410. bot. mag. t. 2767. Nepal, Ind. or., Himal.
 16. § vagans Wall. in Rxb. fl. ind. (ed. 1824.) II, 412. Nepal, Himalaya.
 * 17. § chinensis Lour. fl. coch. 194. China (Canton).
 * 18. 5 Lindleyi C. Koch. China.
 chinensis Ldl. in transact. of the hort. soc. VI, 74.
 19. ? nitida Benth. in Hk. Lond. journ. of bot. I, 483. China (Hongkong).
 20. 5 subtriflóra Bl. Bijdr. 1147. Japonia.
 * 21. 5 japonica Thb. fl. jap. 100. bot. reg. new ser. XVII, t. 6. Japonia.
 nec Wall. et G. Don. Japonia.
 22. 5 Thunbergiana Bl. Bijdr. 1147. Japonia.
 Celastrus alata Thb. fl. jap. 98.
 23. 5 Sieboldiana (nec Sieboldii Walp.) Bl. Bijdr. 1147. Japonia.
 europaea Thb. fl. jap. 101.
 * 24. 5 atropurpurea Jcq. hort. Vind. II, t. 120. America borealis.
 caroliniensis Marsh. arbust. amer. 43.
 β) latifolia Marsh. arbust. amer. 43.
 * 25. § 5 americana L. cod. Nro. 1598. Torr. fl. of New-Y. I, t. 20. America borealis.
 alternifolia Mch meth. 71.
 sempervirens Marsh. arbust. amer. 43.
 * β) obovata Nutt. gen. of N. Amer. pl. I, 154.
 * γ) sarmentosa Nutt. gen. of N. Amer. pl. I, 154.
 scandens Hort.
 * 26. 5 angustifolia Pursh fl. Amer. sept. I, 168. Georgia.
 27. 3 nepalensis Hort. in Steud. nom. bot. ed. 2. I. 621. Nepal.

LVIII. Vuonimus Presl.

(transmutatione literarum vocis Euonymus:)

1. 35 péndula Presl in Abh. d. boehm. Ac. d. Wiss. 5. Folge III. India orientalis.
 Evónymus japonica Roxb. fl. ind. (ed. 1824.) II, 403. (teste Royle.)
 - péndula Wall. num. list. Nro. 4280.

LIX. Catha Forsk.

(Gatt. Arades Celastrum edulem Vahl volant.)

1. 3 rufa G. Don dichl. pl. II, 10. Nepal.
 Celastrus rufa Wall. in Roxb. fl. ind. (ed. 1824.) 304.

2. ? *Benthamii* Gardn. et Ch. in Hk. gard. misc. I, 310. China (Hongkong).
monosperma Benth. in Hook. Lond. journ. of bot. I, 483.
 3. 5 *articulata* G. Don. dichl. pl. II, 10. Japonia, Mongolla,
Celastrus articulata Thb. fl. jap. 97. China borealis.
 - *auriculata* Steud. nomencl. bot. I, 314. (nec Vitm.)
 - *orbiculata* Lam. ill. pl. Nro. 2700. enc. méth. suppl. II, 145.

LX. *Celastrus* L.

(τὸ κήλαστρον et ἡ κήλαστρος apud Graecos veteres *Ilex* 'Aquifolium' L.)

A. *Folia integerrima.*

1. 5 *Orixa* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 150. Japonia.
Ilex Orixa Spr. syst. veget. I, 496.
Orixa japonica Thb. fl. jap. 61.
Othera Orixa Lam. enc. méth. suppl. IV, 187.
 2. 5 *bullata* L. cod. Nro. 1591. Pluken. Almag. t. 28. f. 5. Patr. ign. (nec Virginia).
 3. § *obtusata* Presl in Abh. d. boehm. Ac. d. Wiss. 5. Folge III, 464. California.
- B. *Folia serrata, dentata aut crenata.*
4. § *dependens* Wall. in G. Don dichl. am. pl. II, 8. Nepal.
multiflora Rxb. fl. ind. I, 622. (ed. 1824) II, 389.
 5. § *stylosa* Wall. in Rxb. fl. ind. (ed. 1824) II, 401. Nepal.
 6. 5 *alnifolia* Don prodr. fl. nep. 190. Nepal.
 7. 5 *microcarpa* Don prodr. fl. nep. 191. Nepal.
 8. § *punctata* (nec *punctulatus* S. et Z.) Thb. fl. jap. 97. China, Japonia.
 9. § *striata* Thb. fl. jap. 97. Japonia.
 10. ? *neglecta* Royle ill. of the him. mount. 167. Nepal.
 11. ? *Royleana* Wall. num. list. Himalaya.
 12. ? *spinosa* Royle ill. of the him. mount. 167. Himalaya.
 13. § *dilatata* Thb. in transact. of the Linn. soc. II, 332. Japonia.
evonymoides Thb. jap. (teste Steud. sed ubi?)
 * 14. § *scandens* L. cod. Nro. 1592. America borealis.
Evonymoides scandens Munch meth. 70.
 15. § *europaea* Boiss. elench. pl. 46. Hispania.

LXI. *Microtropis* Wall.

(μικρός, parvus, klein et τροπή, carina, Schiffchen.)

1. § *discolor* Wall. num. list. Nro. 4337. India orientalis, Nepal.
Cassine discolor Wall. in Rxb. fl. ind. (ed. 1824) II, 375.
Evonymus garciniaefolia Rxb. fl. ind. I, 628. (ed. 1824 II, 402.)
 - *lacera* Don prodr. fl. nep. 191.

LXII. *Maytenus* Feuill.

(Maiten, nomen chilense.)

1. § *phyllanthoides* Benth. bot. of Sulph. 54. California.

LXIII. *Elaeodendron* Jeq.

(Ελαιον, oleum, Oel et δένδρον, arbor, Baum; ob fructus oleiferos.)

1. § *dichotomum* Royle ill. of the him. mount. 167. India orientalis.
glaucum Wall. num. list. Nro. 4325.
Roxburghii W. et Arn. fl. of the pen. Ind. or. I, 157.
Neerija dichotoma Rxb. fl. ind. I, 646.
Rhamnus Neerija Spr. syst. veg. suppl. 86.
 2. § *glaucum* Pers. syn. pl. I, 241. India orientalis,
Celastrus glauca Vahl symb. bot. II, 42. China, Ceylon.
Mangifera glauca Rottb. nov. act. Hafn. II, t. 4. f. 1.
Schrebera albens Retz obs. bot. VI, 25. t. 3.
Senecia glauca Lam. illustr. III, Nro. 2714.

LXIV. *Pachystigma* Raf.

(παχύς, crassus, dick et στίγμα, stigma, Narbe.)

1. 5 *myrsinites* Raf. in monthl. mag. 1812. America boreali-
Ilex myrsinites Pursh fl. Am. sept. I, 119. occidentalis.
Myginda myrtifolia Nutt. gen. of N. Amer. pl. I, 109. Neo-Mexico.
Oreophila myrtifolia Nutt. in T. et Gr. fl. of N. Amer. pl. I. 259.
 β) *major* Hook. fl. bor. amer. I, 120. t. 41.

LIV. *Mortonia* A. Gr.

- (Sam. Georg. Morton praeses academiae rerum naturalium Philadelphicae.)
 1. *h sempervirens* A. Gr. pl. Wright. I, 35. t. 4. Texas.
 2. *5 scabrella* A. Gr. pl. Wright. II, 28. Neo-Mexico.

LXVI. *Schaefferia* Jacq.

(Jac. Christ. Schaeffer rerum sacrarum antistes, Ratisbonensis de fungis bavaricis scripsit; † 1790.)

1. *5 cuneifolia* A. Gr. pl. Wright. I, 35. Neo-Mexico, Texas.

LXVII. *Glossopetalum* Schreb.

(γλώσσα, lingua, Zunge et πέταλον, petalum, Blumenblatt.)

1. *5 spinescens* A. Gr. pl. Wright. II, 29. Neo-Mexico.

INDEX.

- Adolphia* Meisn. XLV.
infesta Meisn. 1.
Aegiceras minus Gaertn. XXI, 2.
Alaternus alpinus Munch XXXVII, 19.
 - *Phyllica* Mill. XXXVII, 26.
Amyris L. XIV.
floridans Nutt. 1.
Androglossum Benth. II.
reticulatum Benth. 1.
Aquifolium flex Scop. LI, 1.
spinosa Munch LI, 1.
Aquilaria L. XXIII.
chinensis Spreng. 1.
Ophispermum Poir. 1.
Aubletia ramosissima Lour. XXXV, 4.
Augia Lour. VII.
sinensis Lour. 1.
Averrhoa sinica Hance XXI, 2.
Berchemia Neck. XLI.
flavescens Brogn. 4.
floribunda Brogn. 3.
hamosa Wall. XL, 2. et 4.
laxa Wall. 2.
lineata DC. 6.
Loureiroana DC. 5.
oppositifolia Wall. XL, 3.
racemosa S. et Z. 7.
volubilis DC. 1.
Blackwellia Comm. XXII.
fagifolia Sweet 2.
nepalensis DC. 1.
padi (nec pubi) flora Lindl. 2.
Buchanania Rxb. X.
latifolia Rxb. 1.
Calophyllum Augia Steud. VII, 1.
Canarium L. XII.
album Raeusch. 2.
Canarium Pimela Kon. 1.
 - *β.* Kon. 2.
Cardiolepis nigra Raf. XXXVII, 22.
rubra Raf. XXXVII, 22.
spinosa Raf. XXXVII, 22.
Carya Nutt. XVI.
alba Nutt. 3.
amara Nutt. 7.
ambigua Loud. 12.
angustifolia Ait. 1 *β.*
aquatica Nutt. 9.
compressa G. Don 3.
glabra Sweet 8 *γ.*
integrifolia Spreng. 11.
microcarpa Nutt. 6.
myristicaeformis Nutt. 10.
obcordata Sweet 8 *γ.*
olivaeformis Nutt. 1.
porcina Nutt. 8.
pubescens Sweet 2 *γ.*
rigida Loud. 4.
sulcata Nutt. 2.
tetraptera Liebm. 13.
tomentosa Nutt. 5.
Cassine L. LV.
caroliniana Lam. LI, 14.
 - Walt. LI, 26.
discolor Wall. LXI, 1.
excelsa Wall. 1.
Peragua Mill. LI, 1.
Catha Forsk. LIX.
articulata G. Don 3.
Benthami Gardn. et Ch. 2.
monosperma Benth. 2.
rufa G. Don 1.
Ceanothus L. XXXVIII.
americanus L. 1.

- Ceanothus asiaticus* L. XLVII, 1.
capsularis DC. XLVII, 1.
collinus Dougl. 21.
euneatus H. et Arn. 20.
 - Nutt. 20 β.
decumbens Hort. 1 β.
dentatus T. et Gr. 24.
divaricatus Nutt. 13.
Fendleri A. Gr. 15.
Fontanesianus Spach 2.
glaber Spach 1 γ.
Greggii A. Gr. 16.
herbaceus Raf. 1 δ.
hirsutus Nutt. 9.
infestus DC. XLV, 1.
incanus T. et Gr. 6.
integerrimus H. et Arn. 14.
intermedius Hook. 2.
 - Pursh 1 ε.
laevigatus Hook. 5 β.
macrocarpus Hort. 1 ζ.
 - Nutt. 20.
microphyllus Mich. 11.
Milleri Tausch 1 η.
nepalensis Wall. XLVII, 2.
Neumannii Tausch 1 θ.
oliganthus Nutt. 8.
Oreganus Nutt. 4.
ovalis Big. 2.
ovatus Dsf. 2.
paniculatus Rth XXXIX, 1.
papillosus T. et Gr. 25.
perennis Pursh 1 δ.
Pitcheri T. Gr. 1 ι.
prostratus Benth. 19.
reclinatus Bosc. 1 δ.
rigidus Nutt. 23.
sanguineus Hook. 4.
 - Pursh 3.
serpyllifolius Nutt. 12.
sorediatus H. et Arn. 7.
spinosa Nutt. 18.
tardiflorus Hornem. 1 ζ.
thyrsiflorus Eschsch. 10.
trinervis Mneh 1.
triqueter Wall. XLVII, 3.
velutinus Dougl. 5.
venosus Royle 17.
verrucosus Nutt. 22.
Wendlandianus R. et S. 11.
Celastrus L. LX.
alata Thb. LVII, 22.
alnifolia Don 6.
articulata Thb. LIX, 3.
auriculata Steud. LIX, 3.
bullata L. 2.
capsularis Forst. XLVII, 1.
dependens Wall. 4.
dilatata Thb. 13.
evonymoides Thb. 13.
europaea Boiss. 15.
glauca Vahl LXIII, 2.
microcarpa Don 7.
multiflora Rxb. 4.
neglecta Royle 10.
Celastrus nutans Rxb. XXXIX, 1.
obtusa Presl 3.
orbiculata Lam. LIX, 3.
Orixa S. et Z. 1.
punctata Thb. 8.
Royleana Wall. 11.
rufa Wall. LIX, 1.
scandens L. 14.
spinosa Royle 12.
striata Thb. 9.
stylosa Wall. 5.
Cervispina cathartica Mneh XXXVII, 1.
Colletia infesta Brogn. XLV, 1.
 - multiflora DC. XLV, 1.
Colubrina Rich. XLVII.
 - *asiatica* Brogn. 1.
 - *infesta* Schlecht. XLV, 1.
 - *nepalensis* G. Don 2.
 - *texensis* A. Gr. 4.
 - *triquetra* G. Don 3.
Condalia Cav. XLII.
 - *obovata* Hook. 1.
 - *spatulata* A. Gr. 2.
Connarus L. XX.
 - *juglandifolius* H. et Arn. 1.
 - *microphyllus* H. et Arn. XXI, 2.
 - *Roxburghii* 5. et Arn. XXI, 1.
Corylopsis S. et Z. XXXII.
 - *pauciflora* S. et Z. 2.
 - *speciata* S. et Z. 1.
Cotinus Coggyrgia Scop. IV, 1.
Coriaria Duh. IV, 1.
Datisca hirta L. IV, 14 γ.
Distylium S. et Z. XXXIV.
 - *racemosum* S. et Z. 1.
Elaeodendron Jcq. LXIII.
 - *dichotomum* Royle 1.
 - *glaucum* Pers. 2.
 - Wall. 1.
 - *Roxburghii* W. et Arn. 1.
Euonymus v. *Evonymus*.
Eustigma Gardn. et Ch. XXIX.
 - *oblongifolium* Gardn. et Ch. 1.
Evonymoides scandens Mneh LX, 14.
Evonymus L. LVII.
 - *alternifolia* Mneh 25.
 - *americana* L. 25.
 - *angustifolia* Pursh 26.
 - Vill. 1.
 - *atropurpurea* Jcq. 24.
 - Rxb. 7.
 - *bullata* Wall. 13.
 - *carolinensis* Marsh. 24.
 - *chinensis* Lindl. 18.
 - Lour. 17.
 - *echinata* Wall. 15.
 - *europaea* L. 1.
 - Thb. 23.
 - β. *latifolia* L. fl. 5.
 - γ. *leprosa* L. fl. 4.
 - δ. *velutina* C. A. Mey. 2.
 - *sibrillifera* F. et M. 3.
 - *imbriata* Wall. 9.
 - *frigida* Wall. 12.
 - *grandiflora* Wall. LVI, 1.

- Evonymus garciniaefolia* Rxb. LXI, 1.
grossa Wall. 11.
Hamiltoniana Wall. 7.
japonica Rxb. LVIII, 1.
- Thb. 21.
lacera Don. LVI, 1. et LXI, 1.
latifolia Gil. 1 γ.
- Marsh. 24 β.
latifolia Scop. 5.
Lindleyi C. Koch, 18.
longifolia Medik. 14.
lucida Don LVI, 1.
micrantha Don 12.
multiflora Opiz 1 c.
nana Bieb. 6.
- Lodd. 1 ζ.
nepalensis Hort. 27.
nitida Benth. 19.
obovata Nutt. 25 β.
pannonica Erndt 4.
pendula Wall. LVIII, 1.
sarmentosa Nutt. 25 γ.
sempervirens Marsh. 25.
scandens Hort. 25 γ.
Sieboldiana Bl. 23.
subtriflora Bl. 20.
tenuifolia Marzar. 1.
theaeifolia Wall. 10.
Thunbergiana Bl. 22.
tingens Wall. 8.
vagans Wall. 16.
velutina F. et M. 2.
verrucosa Scop. 4.
vulgaris Mill. 1.
- β. Lam. 5.
Fraxinus laevigata Hort. Par. XVII, 1.
Fortunaea Lindl. XIX.
chinensis Lindl. 1.
Fothergilla L. XXVII.
alnifolia L. 1.
Gardeni Mich. 1.
major Lodd. 1.
Frangula Alnus Mill. XXXVII, 29.
americana Mill. XXXVII, 35.
latifolia Mill. XXXVII, 19.
californica A. Gr. XXXVII, 39.
rotundifolia Mill. XXXVII, 20.
saxatilis Cram. XXXVII, 8.
vulgaris Rchb. 29.
Wulfenii Rchb. 30.
Gouania Jcq. XLVIII.
leptostachya DC. 2.
nepalensis Wall. 1.
tiliaefolia Rxb. 2.
Garuga Rxb. XIII.
pinnata Rxb. 1.
Glossopetalum Schreb. LXVII.
spinescens A. Gr. 1.
Haberlia grandis Dennst. III, 1.
Hornera Jungh. XXIV.
glomerata Jungh. 2.
umbellata Jungh. 1.
Hamamelis L. XXX.
androgyna Walt. 2 a.
carolinensis Gmel. 2.
Hamamelis chinensis R. Br. XXXI, 1.
dioica Walt. 2 β.
japonica S. et Z. 1.
macrophylla Pursh 2.
monoica L. XXVII, 2.
- Walt. 2 γ.
persica DC. XXXIII, 2.
virginica L. 2.
- Var. Dietr. XXXI, 1.
Helwingia Willd. XXVIII.
japonica Dietr. 1.
rusciflora Willd. 1.
Hovenia Thb. XLVI.
acerba Lindl. 2.
dulcis Don 2.
- Thb. 1.
inaequalis DC. 2.
pubescens Sweet 2.
Hicorius amarus Raf. XVI, 7.
integrifolius Raf. XVI, 11.
Ilex L. LI.
acuminata Loud. 5 β.
aestivalis Lam. 13 β.
Altaclarensis Loud. 1 b, α.
ambigua Torr. 26.
angustifolia Loud. 1 b, β.
- Nutt. 25.
- Willd. 12.
Aquifolium L. 1.
- Lour. 6.
- Walt. 5.
- β. *heterophylla* Bl. 19.
- γ. Lam. 2.
- *bacc. flav.* Walt. 7.
asiatica L. LIII, 7.
balearica Dsf. 2.
brexiaefolia van H. 11.
calamistrata Booth et van H. 1 a, α.
canadensis Booth et van H. 1 b, α.
- Mich. LIV, 1.
candicans Hort. ad fin.
carnola Booth 1 a, β.
caroliniana Mill. 10.
Cassena Mich. 14.
Cassine L. 10.
- Walt. 14.
- Willd. 24.
- β. Lam. 24.
- γ. Lam. 2. 12.
cassinoides Lk 10.
castaneaefolia Hort. 10.
chinensis Sims 16.
chrysocharpa Wender. 1 e, β.
ciliata Loud. 1 b, γ.
contorta van H. 1 a, v.
cornuta Lindl. 8.
crassifolia Ait. 1 a, γ.
crenata Thb. 18.
crispa Hort. 1 a, δ.
Cunninghami Booth 9 β.
Dahoon Walt. 24.
decidua Walt. 13.
delicatula Barton LIV, 1.
diphyrena Wall. 9.
Doniana DC. 27.

Ilex echinata Mill. 1 a, ε.
elegans Hort. Bollw. 1 a, ζ.
elliptica Don 27.
emarginata Thb. 17.
excelsa Wall. LV, 1.
exorticata Hort. Bollw. 1 c, γ.
fagifolia Loud. 1 c, α.
ferox Ait. 1 a, η.
floridana Lam. 14.
gigantea Hort. ad fin.
globosa Loud. 5 γ.
heterophylla Ait. 1 c, β.
 - G. Don 19.
integra Thb. LIII, 7.
integrifolia Hort. Rinz et Haen. 1 c, γ.
latifolia Thb. 21.
latispina Booth et van H. 1 a, τ.
laurifolia Loud. 1 b, γ.
 - Nutt. 24 β.
laxiflora Lam. 7.
leptocantha Lindl. 4.
leucocarpa Hort. 1 e, α.
ligustrifolia G. Don 25.
 - Pursh 12 β.
ligustrina Jacq. 14.
Loureiroi Steud. 6.
macrodon Loud. 5 ε.
macrophylla Bl. 21.
 - Hort. 1 a, z.
 - Wall. 15.
Maderensis Versch. et Booth 1 a, λ.
 Willd. 2.
microcarpa Lindl. et Paxt. 30.
monstrosa Booth 1 a, μ.
myrsinites Pursh LXIV, 1.
myrtifolia Boeckm. 1 b, δ.
 - Walt. 12.
nepalensis Spreng. 27.
nigricans van H. 1 b, ε.
odorata Ham. 16.
opaca Ait. 5.
Orixa Spr. LX, 1.
Othera Spr. LII, 1.
ovata Goepp. 3.
pendula Hort. ad fin.
phillyreaefolia Hort. Bollw. 24 β.
platyphylla Booth 1 b, ζ.
polymorpha Boeckm. 1 c, δ.
prionoides Ait. 13.
Prionitis Willd. 13.
prunifolia Muehlb. LIV, 1.
pubescens H. et Arn. 29.
quadripetala Medik. 32.
quercifolia Meerb. 5.
quinaria Mich. 26 β.
recurva Ait. 1 b, η.
 - Loud. 1 a, τ.
Reevesiana Kumm. 31.
religiosa Barton 14.
revoluta Booth 1 a, ν.
rosmarinifolia Lam. 12.
rotunda Thb. 28.
rotundifolia van H. 1 c, ε.
scotica Hort. ad fin.
senescens Gaud. 1 c.

Ilex serrata Dsf. 1 b, η.
 - Royle 22.
 - Thb. 20.
Shepherdii Booth 1 a, ξ.
Tarajo Goepp. 23.
Thunbergiana Booth 1 b, θ.
triflora Bl. 16.
virens Hort. ad fin.
vomitorea Ait. 14.
Wallichii Steud. 15.
Watsoniana Spach 12 γ.
xanthocarpa Hort. 1 e, β.
Juglans L. XV.
alba L. XVI, 5.
 - Mich. XVI, 3.
 - acuminata Marsh. XVI, 5.
 - minima Marsh. XVI, 2.
 - odorata Marsh. XVI, 3 β.
 - oblonga Marsh. 3.
 - ovata Marsh. XVI, 3.
amara Mich. XVI, 7.
 - Muehlb. XVI, 2.
ambigua Mich. XVI, 12.
angustifolia Lam. XVI, 2.
aquatica Mich. XVI, 9.
baccata L. 7.
bifera Lam. 1 α.
biflora Bechst. 1 β.
Camirum Lour. 4.
cathartica Mich. 3.
cinerea L. 3.
compressa Grtn. XVI, 3.
cordiformis Wangenh. XVI, 2.
cylindrica Lam. XVI, 1.
exaltata Bartr. 3.
ferruginea Hort. 6.
fertilis Hort. 1 γ.
fisciformis Mich. XVI, 8 β.
flicifolia Lodd. 1 δ.
fraxinifolia Lam. XVII, 1.
glabra Gmel. XVI, 3.
 - Muehlb. XVI, 8 β.
heterophylla Hort. 1 δ.
illinoensis Wangenh. XVI, 1.
laciniosa Mich. XVI, 2 β.
latifolia Lam. XVI, 7.
maxima Hort. 1 η.
macrocarpa Pers. 1 η.
mexicana Hort. 8.
microcarpa Nutt. XVI, 6.
mucronata Mich. XVI, 2.
myristicaeformis Mich. XVI, 10.
nigra L. 2.
obcordata Muehlb. XVI, 8 γ.
oblonga Mill. 3.
olivaeformis Mich. XVI, 1.
ovalis Wangenh. XVI, 3 β.
ovata Mill. XVI, 3.
Pecan (Pekkan) Muehlb. XVI, 1.
porcina Mich. XVI, 8.
 - ficiformis Mich. XVI, 8 β.
praeparturiensis Hort. 1 γ.
pterocarpa Mich. XVII, 1.
pubescens Willd. XVI, 2 γ.
pyriformis Muehlb. XVI, 8 γ.

- Juglans pyriformis* Liebm. 5.
 regia L. 1.
 rigida Lodd. XVI, 4.
 rubra Grtn. XVI, 1.
 serotina Lam. 1 c.
 spicata Hort. Mack. 1 t.
 squamosa Mich. XVI, 3.
 sulcata Willd. XVI, 2.
 tomentosa Mich. XVI, 5.
Karwinskia Zucc. XLIV.
 glandulosa Zucc. 1.
 Humboldtiana Zucc. 1.
Liquidambar L. XXV.
 imberbe Willd. 2.
 orientalis Mill. 2.
 Styraciflua L. 1.
Lithrea (nec *Lythraea*) Miers V.
 laurina Walp.
Lobadium aromaticum Raf. IV, 3.
 - *suaeveolens* Raf. IV, 4.
Lophopetalum Wight LVI.
 grandiflorum Wight 1.
 lucidum Steud. 1.
Loropetalum R. Br. XXXI.
 chinense Gardn. 1.
Lycium siculum Ucr. XXXVII, 15.
Mangifera glauca Rottb. LXIII, 2.
Maytenus Feuill. LXII.
 phyllanthoides Benth. 1.
Microrhamnus A. Gr. XLIII.
 ericoides A. Gr. 1.
Microtropis Wall. LXI.
 discolor Wall. 1.
Mortonia A. Gr. LXV.
 scabrella A. Gr. 2.
 sempervirens A. Gr. 1.
Myginda myrtifolia Nutt. LXIV, 1.
Myrica trifoliata Hort. et L.? IV, 4.
Neerija dichotoma Rxb. LXIII, 1.
Nemopanthus Raf. LIV.
 canadensis DC. 1.
 fascicularis Raf. 1.
Nitraria L. L.
 caspia C. A. Mey. 1.
 Olivieri J. et Sp. 2.
 Schoberi L. 1.
 sibirica Lam. 1 β.
Odina Rxb. III.
 Wodier Rxb. 1.
Oenoplia lineata Schult. XLI, 6.
 volubilis Schult. XLI, 1.
Ophispermum sinense Lour. XXIII, 1.
Oreophila myrtifolia Nutt. LXIV, 1.
Orixa japonica Thb. LX, 1.
Osyris japonica Thunb. XXVIII, 1.
Othera Thb. LII.
 japonica Thb. 1.
 Orixa Lam. LX, 1.
Pachystigma Raf. LXIV.
 myrsinites Raf. 1.
Paliurus Grtn. XXXV.
 aculeata Lam. 1.
 agrestis Lam. 3.
 Aubletia R. et S. 4.
 australis Grtn. 1.
Paliurus clypeiformis Medik. 1.
 japonica S. et Z. 4 β.
 petasus Dum. C. 1.
 ramosissima Poir. 4.
 spina Christi Mill. 1.
 texana Scheele XXXVI, 17.
 virgata Don, 2.
Parrotia C. A. Mey. XXXIII.
 Jacquemontiana Dne 2.
 persica C. A. Mey. 1.
Pimela alba Lour. XII, 2.
 nigra Lour. XII, 1.
Pistacia L. I.
 atlantica Dsf. 3.
 chia Dsf. 8 γ.
 chinensis Bge. 6.
 fagaroides Willd. 4.
 lentiscus L. 8.
 Massiliensis Mill. 8 β.
 mutica F. et M. 5.
 narbonensis L. 1 β.
 officinarum Ait. 1 γ.
 palaestina Boiss. 7.
 reticulata Willd. 1 β.
 sativa Presl 1.
 Terebinthus L. 2.
 - Mill. 1.
 - Pall. 5.
 - β. heterophylla DC. 1 β.
 trifolia L. 1 γ.
 vera L. et Hayne 1.
 - Mill. 2.
Platanus orientalis Poccocke XXV, 21.
Platycarya S. et Z. XVIII.
 strobilacea S. et Z. 1.
Pomaderris capsularis G. Don XLVII, 1.
Prinos L. LIII.
 ambigua Mich. LI, 26.
 - Nutt. 2.
 - Pursh 1 β.
 asprella H. et Arn. 5.
 atomaria Nutt. 9.
 canadensis Lodd. 12.
 cassinoides Hort. 13.
 conferta Mch. 1.
 coriacea Pursh. 9 β.
 decidua DC. LI, 13.
 dubia G. Don 1 β.
 glabra L. 8.
 Gronovii Mich. 1.
 integra H. et Arn. 7.
 integrifolia Ell. 2.
 laevigata Pursh 3.
 lanceolata Pursh 4.
 longifolia Dsf. 10.
 lucida Ait. LIV, 1.
 padifolia Willd. 1.
 undulata Hort. 11.
 verticillata L. 1.
Pterocarya Kth. XVII.
 caucasica C. A. Mey. 1.
 fraxinifolia Spach. 1.
 rhoifolia S. et Z. 3.
 sorbifolia S. et Z. 2.
Rhamnus L. XXXVII.

Rhamnus agrestis Lour. XXXV, 3.
Alaternus L. 26.
alnifolia l'Her. 35.
 - Pursh 37.
alpina L. 19.
 - Pall. 33.
amygdalina Desf. 15.
 - Moiris 16.
aragonensis Asso 12 β.
asiatica Lam. XLVII, 1.
balearica Hort. Par. 26 λ.
biniflora DC. XLIV, 1.
burgundiaca Hort. Par 27.
buxifolia Poir. 15 β.
californica Eschsch 39.
canadensis Hort. ad fin.
caroliniana Walt. 36.
cathartica 1.
Clusii Willd. 26 β.
crenata S. et Z. 18.
crocea Nutt. 25.
cuneata Hook. XXXVIII, 20.
cuneifolia Poir. 15 γ.
dahurica (daurica) Pall. 2.
Erythroxylon Bieb. 10.
 - Pall. 11.
ferruginea Nutt. 38.
Frangula L. 29.
 - β. *pumila* Vis. 20.
franguloides Mich. 35.
 - Pursh 22 β.
globosa Bge 3.
grandifolia F. et M. 33.
heterogenea Burm. XXXVI, 4.
hispanica Hort. 26 ι.
Humboldtiana Schult. XLIV, 1.
hybrida l'Her. 27.
Hydriensis Hacq. 1 β.
infectoria L. 7.
intermedia Steud. et Hchst. 7.
Jujuba L. XXXVI, 14.
lanceolata Pursh 22.
laurifolia Nutt. 24.
lineata L. XLI, 6.
 - Lour. XLI, 5.
longifolia Dum. C. 36.
 - Mill. 8.
Lotus L. XXXVI, 3.
lycioides Brot. 15 β.
 - L. 12.
 - Pall. 10.
Lycium Scop. 7.
minor Mill. 7.
minutiflorus Mich. XL, 1.
Monspelica Hort. 26 β.
Nabeca (Napeca) Fork. XXXVI, 5.
neapolitana Lk 20 β.
Neerija Spr. LXIII, 1.
obtusifolia Hook. XXXVI, 17.
Oenoplia L. XXXVI, 12.
oleifolia Hook. 40.
 - Hort. 15.
oleoides L. 15.
 - Lam. 14.
paliuroides Pall. XXXVI, 1.

Rhamnus Paliurus L. XXXV, 1.
Pallasii F. et M. 10.
parvifolia Bge 6.
pentaphylla L. IV, 9.
persicaefolia Mor. 16.
procumbens Edgew. 28.
prunifolia Mik. 42.
 - S. et Sm. 17.
pubescens Poir. 14.
 - S. et Sm. 21.
pumila Cav. 20 γ.
pumila L. 20.
 - Wulf. 30.
purpurea Edgew. 31.
Purshiana DC. 37.
pusilla Ten. 20 β.
ramosissima Aut. XXXV, 4.
repens Hartm. 1 γ.
 - Hort. 20.
rotundifolia Hort. 26 λ.
Roylei C. Koch 32.
rumelica Friv. 30.
rupestris Royle 32.
 - Scop. 30.
 - Vill. 20 β.
sanguinea Pers. 34.
saxatilis L. 8.
scandens Hill. XLI, 1.
sempervirens Hort. 27.
Shortii Nutt. 22.
Sibthorpiana R. et S. 21.
soporifera Lour. XXXVI, 15.
spathulaefolia F. et M. 9.
spina Christi L. XXXVI, 5.
spinosa Gilib. 1.
Thea Osb. XL, 2.
thezans L. XL, 2.
texensis T. et Gr. XLVII, 4.
tinctoria W. et K. 5, 7.
tomentella Benth. 23.
trigyna Don XL, 5.
tripartita Ucr. IV, 8.
valentina Willd. 20 γ.
velutina Boiss. 13.
Villarsii Lk 20 β.
virgata Rxb. 4.
volubilis L. fl. XLI, 1.
Wickluis Hort. ad fin.
Wihhor Lucé 1.
Wildenowiana R. et S. 36.
Wulfenii Spreng. 30.
xanthocarpa Hort. ad fin.
Zizyphus L. XXXVI, 1.
 - Lour. XXXVI, 2.

Rhodoleia Hook. XXVI.
Championi Hook. 1.
formosa Champ. 1.

Rhus L. IV.
acuminata DC. 25.
ailantoides Bge 23.
Amela Don 28.
aromatica Ait. 3.
Bucki-Amelam Rxb. 28.
canadensis Marsh. 3.
 - Mill. 14.

- Rhus chinensis* Mill. 30.
copallinum L. 18.
Coriaria L. 31.
Cotinus L. 1.
crataegiformis Pers. 8.
dioica Brouss. 8.
diversiloba T. et Gr. 10 β.
elegans Ait. 15 β.
fraxinifolia Don 26.
glabra L. 15.
heterophylla DC. 32.
hypoleuca Champ. 24.
javanica L. 29.
juglandifolia Wall. 20.
Kakrasingee Royle 25.
laevicaulis Torr. 15 β.
lanceolata Engelm. et A. Gr. 18 β.
laurina Nutt. V, 1.
Meerburgiana Schult. 16.
microphylla Engelm. 7.
obscura Bieb. XVII, 1.
Oxyacantha Cav. 8.
oxyacanthoides Dum. C. 8.
paniculata Wall. 12.
parviflora Rxb. 13.
pentaphylla Dsf. 9.
pruinosa Hfmsgg 27.
pumila Mich. et Meerb. 16.
radicans L. 11.
semialata Murr. 29.
 - γ. *Roxberghii* DC. 28.
suaveolens Ait. 4.
succedanea L. 21.
Sumac Targ. Tozz. 31.
sylvestris S. et Z. 22.
Thezera Pers. 9.
Toxicodendron L. 10.
trilobata Nutt. 6.
typhina L. 14.
varielobata Steud. 10 β.
velutina Wall. 2.
venenata DC. 17.
verniciifera DC. 20.
Vernix L. 17.
 - Thunb. 20.
verrucosa Scheele 5.
virens Lindh. 19.
virginica Catesb. 15.
viridiflora Poir. 14. 15.
Wallichii Sweet 20.
zizyphina Tin. 8.
Rurea Aubl. XXI.
 - *Milletii* Planch. 1.
 - *microphylla* Planch. 2.
Sabia Colebr. VIII.
 - *campanulata* Wall. 2.
 - *parviflora* Wall. 1.
Sageretia Brongn. XL.
 - *hamosa* Brongn. 4.
 - *lanceolata* G. Don XXXVII, 22.
 - *Michauxii* Brongn. 1.
 - *oppositifolia* Brongn. 3.
 - *theezans* Brongn. 2.
 - *trigyna* G. Don 5.
Schinus L. II.
Schinus discolor Benth. 1.
Schmaltzia aromatica Dsv. IV, 3.
 - *suaveolens* Dsv. IV, 4.
Schaefferia Jacq. LXVI.
 - *cuneifolia* A. Gr. 1.
Schrebera albens Retz LXIII, 2.
Scutia Commers. XXXIX.
 - *paniculata* G. Don 1.
Segetetia pro *Sageretia*.
Semecarpus L. IX.
 - *cuneifolia* Wall. 1.
 - *Anacardium* β. *cuneifol.* DC. 1.
Senecia glauca Lam. LXIII, 2.
Spondias L. XI.
 - *axillaris* Rxb. 1.
 - *elliptica* Rottl. X, 1.
Styphonia Nutt. VI.
 - *integrifolia* Nutt. 1.
 - *serrata* Nutt. 2.
Terebinthus Lentiscus Mach I, 8.
Toxicodendron altissimum Mill. IV, 21.
 - *carolinianum* Mill. IV, 15.
 - *crenatum* Mill. IV, 4.
 - *glabrum* Mill. IV, 15.
 - *pubescens* Mill. IV, 10.
 - *serratum* Mill. IV, 10 γ.
 - *vulgare* Mill. IV, 11.
 - *volubile* Mill. IV, 11 γ.
 - *pinnatum* Mill. IV, 17.
Turpinia pubescens Raf. IV, 3.
 - *glabra* Raf. IV, 4.
Vuenomus Presl LVIII.
 - *pendula* Presl 1.
Winterlia triflora Munch LIII, 8.
Zizyphus Grtn. XXXVI.
 - *acuminata* Royle 6.
 - *Aenoplia* Lam. 12.
 - *africana* Mill. 5.
 - *agrestis* Schult. XXXV, 4.
 - *albans* Rxb. 9. 12.
 - *Aubletii* D. Dietr. XXXV, 4.
 - *Bhunder* Royle 13.
 - *chinensis* Lam. 2.
 - *flavescens* Wall. XLI, 4.
 - *flexuosa* Wall. 10.
 - *floribunda* Wall. XLI, 3.
 - *hamosa* Wall. XL, 4.
 - *heterogenea* Poir. 4.
 - *incurva* bot. mag. XXXV, 2.
 - Rxb. 7.
 - *Jubba* Lam. 14.
 - Mill. 1.
 - *lineata* Willd. XLI, 6.
 - *Lotus* Lam. 3.
 - *Loureiroana* D. Dietr. XLI, 5.
 - *lycioides* A. Gr. 16.
 - *mauritanica* Wall. 14.
 - *Napeca* Lam. 5.
 - Rth 12.
 - *nitida* Rxb. 8.
 - *obtusifolia* A. Gr. 17.
 - *Oenoplia* Mill. 12.
 - *officinarum* Medik. 1.
 - *oppositifolia* Wall. XL, 3.
 - *oxyphylla* Edgew. 11.

Zizyphus Paliurus Willd. XXXV, 1.
ramosissima Spreng. XXXV, 4.
sativa Dsf. 1.
- Grtn. 3.
sinensis DC. 2.
soporifera Lam. 15.
sororia Schult. 14.

Zizyphus spina Christi Willd. 5.
sylvestris Mill. 3.
trinervia Rth 14.
tripartita R. et S. IV, 8.
virgata D. Dietr. XXXV, 2.
volubilis Willd. XLI, 1.
vulgaris Lam. 1.



ORDO XII.

Leguminosae.

Fam. 93. Mimoseae.

I. Prosópis L.

(Prosopis, planta mihi incerta apud Apulejum; vox sine dubio a πρόσωπον, persona, Maske deriv.)

1. 5 *Stephaniana* Kth in Spreng. syst. veget. II, 326. Buxb. cent. III, 48. Caucasia, Persia,
Syria.
Acacia Stephanania Willd. sp. pl. IV, 1088.
Lagonychium Stephanianum Bieb. fl. taur. cauc. III, 288.
Mimosa Stephaniana Bieb. Besch. d. Laend. zw. Ter.
u. Kur. am kasp. M. 205.
- β) *syriaca*; *Mimosa agrestis* Sieb. in Spreng. syst. veg. II, 206.
2. 3 *glandulosa* Torr. ann. Lyc. New-Y. II, 192. t. 2. America bor. (Oregon,
Texas, Arkansas).
Algarobia glandulosa Torr. and Gr. fl. of N. Amer. I, 399.
3. 5 *reptans* Benth. in Hook. journ. of bot. IV, 352. Texas, Chile.
4. 5 *odorata* Torr. et Frem. rep. of the expl. exp. to the rocky m. 313. t. 1. Am. bor.-occid.

II. Desmanthus Willd.

(δέσμος, fascia, Band et ἔθος, flos, Bluethe.)

1. ♀ *Jamesii* Torr. and Gr. fl. of N. Amer. I, 402. America borealis
(Arkansas).
Acacia Cooleyi Eaton (teste T. et Gr.)
2. ♀ *depressus* Humb. et Bonpl. in Willd. sp. pl. IV, 1546. Peruvia, Antill. min.,
Amer. foed. austr.-occid.
Mimosa depressa Poir. enc. méth. suppl. I, 58.
- * 3. ♀ *diffusus* Willd. sp. pl. IV, 1546. Amer. foed. australi-
occid., Venezuela.
Mimosa Pernambucana L. Cod. Nro. 7670.

III. Leucaena Benth.

1. 5 *frondosa* Willd. sp. pl. IV, 1076 (sub *Acacia*; teste Bindh.) China,
India orientalis.
var. *L. glaucae* B.)
Coronia Ham. in Wall. num. list. Nro. 5239. (sub *Acacia*.)

IV. Mimósa L.

(Mimo, cujus motus imitari videtur, quia folia, si attinguntur, se complicant.)

1. 5 *borealis* A. Gray in pl. Fendl. 39. Novo-Mexico.
- * 2. 5 *Lindheimeri* A. Gray in Bost. journ. of nat. hist. VI, 181. Texas.
3. 5 *fragrans* A. Gray in Bost. journ. of nat. hist. VI, 181. Texas.
4. 5 *malacophylla* A. Gray in Bost. journ. of nat. hist. VI, 182. adn. Texas.
5. 3 *corniculata* Lour. fl. coch. 800. China (Canton).
6. 3 *fera* Lour. fl. coch. 801. China, Cochinchina.

V. Acácia L.

(ἀκασία apud Graecos teste Spr. *Acacia vera* Willd. teste nonn. origine celtica.)

1. 5 *texensis* Torr. and Gr. fl. of N. Amer. I, 404. Texas.
2. 5 *frutescens* Steud. nom. bot. I, 5. China.
Mimosa fruticosa Rxb. fl. ind. II, 549.
3. 5 *pennata* Willd. sp. pl. IV, 1090. India orientalis, Nepal,
Madera.
arborescens Don prodr. fl. nepal. 247.

- megaladena* Desv. *journal de bot.* 1814. t. 60.
prensans Lowe in *bot mag.* t. 3408.
Mimosa ferruginea Rottl. in *Spreng. syst. veg.* II, 207.
 - *torta* Roxb. *fl. ind.* II, 566.

VI. *Albizia* Durazz.

(in honorem Albizzi, nat. rer. scrotator Stalicus.)

1. 3 *procéra* Benth. in *Hook. Lond. journ. of bot.* III, 89. *Philippinae, Himalaya,*
Acacia elata Grah. in *Wall. num. list.* 5233. *India orientalis.*
 - *procéra* W. *sp. pl.* IV, 1063.
Mimosa coriacea Blanco *Flor. de il. Filip.* 734.
 - *elata* Rxb. *fl. ind.* II, 546.
 - *procéra* Rxb. *pl. of the coast of Corom.* I, 2. t. 21.
 2. 3 *mollis* Benth. in *Hook. Lond. journ. of bot.* I, 527. *India orientalis.*
Julibrissin β. *mollis* Durazz. in *encycl. du XIX siècle.* II, 32.
Acacia mollis Wall. *pl. asiat. rar.* II, 76. t. 177.
 3. 3 *lucida* Benth. in *Lond. journ. of bot.* III, 86. *Himalaya orientalis*
Inga lucidior Steud. *nom. bot.* I, 810. *(Nepal, Assam, Mellun).*
 - *lucida* Wall. *num. list. Nro.* 5267. (exp.)
Mimosa lucida Roxb. *fl. ind.* II, 544.
 4. 3 *Miletti* Benth. in *Lond. journ. of bot.* III, 89. *China (Macao).*
 5. 3 *Nemu* Benth. in *Hook. Journ. of bot.* I, 527. *Japonia, China.*
Acacia Nemu Willd. *sp. pl.* IV, 1065.
Mimosa arborea Thunb. *fl. jap.* 229.
 - *speciosa* Thunb. in *Transact. of the Linn. soc.* II, 336.
 * 6. 3 *Julibrissin* Boiv. Benth. in *Lond. Journ. of bot.* III, 91. *Asia centralis, Persia.*
Acacia Julibrissin Willd. *sp. pl.* IV, 1065.
Mimosa arborea Forsk. *fl. aeg. arab.* 177.
 - *Julibrissin* Scop. *del. fl. et faun. Insubr.* I. t. 8.
 7. 3 *stipulata* Benth. in *Lond. Journ. of bot.* III, 92. *Ceylon, India orient.,*
Acacia Smithiana Wall. *num. list.* 5237. *Nepal, Himalaya.*
 - *stipulata* DC. *prodr.* II, 469.
Inga purpurascens Hassk. *cat. pl. h. hort. Bogor.* 291.
Mimosa stipulata (*stipulacea*) Rxb. *fl. ind.* II, 549.
 * 8. 3 *Lebbek* Benth. in *Lond. Journ. III,* 87. *Aegyptus.*
latifolia Boiv. in *encycl. du XIX siècle* II, 33.
Acacia Habbas Link *enum. pl. hort. Berol.* II, 444.
 - *Lebbek* Willd. *sp. pl.* IV, 1066.
Mimosa Sirissa Roxb. *fl. ind.* II, 544.
 β) *rubescens* Benth. in *Lond. Journ. of bot.* III, 87.
 γ) *parviflora*; *Acacia macrophylla* Bunge in *mém. d. sav. étrang. de St. Pét.* II, 94.

VII. *Pithecolobium* Mart.

(πιθηκος, simia, Affe et λόβος, legumen, Huelse.)

1. 3 *bigéminum* Mart. *fl. Bras.* 115. *India oerintalis,*
Acacia arrofula Don *prodr. fl. nepal.* 247. *Nepal, China.*
Inga bigemma Willd. *sp. pl.* IV, 1007.
 - *annularis* Grah. *lucida* Wall. et *Wightiana* Grah. in
Wall. num. list. Nro. 5269. 5267 B. et 5281.
Mimosa bigemina Vahl *symb. bot.* II, 103. (an *L. cod. Nro.* 7653.)
 2. 3 *lucidum* Benth. in *Lond. Journ. of bot.* III, 205. *China (Macao).*
Inga bigemina H. and Arn. in *bot. of Beech. voy.* 182. (an *W. sp. pl.* IV, 1007. ?)
 3. 3 *dulce* Benth. in *Lond. Journ. of bot.* III, 199. *India orientalis, Java,*
Acacia obliquifolia Mart. et Gal. in *Bull. de Brux.* X, 2. 317. *ins. Philippinae, China,*
Inga dulcis W. *sp. pl.* IV, 1005. *Mexico, America*
 - *javana* DC. *prodr.* II, 436. *australis.*
 - *pungens* W. *sp. pl.* IV, 1004.
Mimosa dulcis Rxb. *pl. of Corom.* I, t. 99.
 - *Unguis cati* Blanc. *flora de Filip.* 731.

VIII. *Inga* Willd.(Plum.; vox americana *Inga* verae Willd.)

1. ? *dimidiata* H. and Arn. *the bot. of Beech. voy.* 181. *China (Macao).*

Fam. 84. **Caesalpinaceae.**IX. **Gymnocladus** Lam.

(γυμνόκλαδος, nudus, nacket et κλαδός, ramus, Zweig.)

- * 1. 5 canadensis Lam. enc. méth. I, 733. Mich. fl. Am. sept. II, t. 51. America borealis.
Guilandina dioica L. cod. Nro. 3006.

X. **Caesalpinia** L.

(Caesalpinia, professor Pisanus primus systema plantarum naturale elaboravit, † 1603.)

1. 5 japonica S. et Z. Abh. d. baier. Acad. d. Wiss. math. phys. Japonia.
Kl. IV, 2. 117.
? Crista Thunb. fl. jap. 179.
2. ? Millettii Hook. and Arn. in bot. of Beech. voy. 182. China.
3. § chinensis Roxb. fl. ind. II, 361. China.
4. 5 lebbekkoides DC. prodr. II, 483. China.

XI. **Guilandina** L.

(Melch. Wieland (Guilandinus) Borussus, Orientem permigr., prof. Patavinus, † 1589.)

- * 1. 5 Bonduc L. cod. Nro. 3002. Ind. orient., Arabia.
β) Bonducella L. cod. Nro. 3003. China, Japonia (Bonin).
Caesalpinia Bonducella Flem. in asiat. rech. XI, 159.
Glycyrrhiza aculeata Forsk. fl. aeg. arab. 135.

XII. **Poinciana** L.

(de Poincy ineunte saeculo XVIII praefectus Franco-gallicus Antillarum.)

- * 1. 5 pulcherrima L. cod. Nro. 2988. bot. mag. t. 995. India orientalis, China.
Caesalpinia pulcherrima Swartz observ. bot. quib. pl. Cochinchina.
Ind. occ. illustr. 166.

XIII. **Callerya** Endl.

(ab Endlichero viro mihi ignoto dicata.)

1. 5 tomentosa Endl. gen. pl. suppl. III, 104. China.
Marquartia tomentosa Vag. in nov. act. acad. Caes.
Leop. Carol. nat. cur. XIX, suppl. I. 35. t. 1. 2.

XIV. **Hoffmannseggia** Cav.

(Joh. Centur. comes ab Hoffmannsegg, Dresdensis, botanices nec non entomologiae fautor scrutatorque, † 1849.)

1. ♀ Drummondii Torr. and Gr. fl. of N. Amer. I, 393. Texas.
2. ♀ Jamesii Torr. and Gr. fl. of N. Amer. I, 393. America anglica et
Pomaria glandulosa Torr. in Ann. lyc. New-York II, 193. foederata borealis.
- Jamesii Walp. rep. bot. I, 811.
3. ♀ caudata A. Gr. in Bost. journ. of nat. hist. VI, 179. Texas.

XV. **Cassia** L.

(Kaessia apud Arabes, Kestia apud Hebraeos Cassiam cinnamomeam significat.)

- A. *Fistula* (Legumen cylindricum; Stamina omnia fertilia, aequalia).
1. 5 Fistula L. cod. Nro. 2968. Hayne Arzn. Gew. IX, t. 39. Aegyptus, Arabia,
Bactrylobium Fistula W. hort. Ber. I, 440. India orient., China.
Cathartocarpus Fistula Pers. syn. pl. I, 459.
β) rhombifolia Rxb. fl. ind. II, 334. Wight ic. pl. Ind. or. I, t. 289.
Cathartocarpus rhombifolius G. Don dichl. pl. II, 453.
- B. *Chamaefistula* (Legumen subcylindricum; Stamina inaequalia, 3 sterilia).
2. 5 chinensis Lam. enc. méth. I, 644. China.
grandiflora Pers. syn. pl. I, 457.
Chamaefistula chinensis G. Don dichl. pl. II, 452.
- * 3. 5 occidentalis (L.) Vog. syn. gen. Cass. 21. bot. reg. t. 83. America foederata
caroliniana Walt. fl. carol. 135. australis et tropica.
ciliata Raf. fl. Ludov. 100. Australia, Africa occid.,
? linearis Mich. fl. bor. amer. I, 261. India orient., China.
planisiliqua L. cod. Nro. 2967.
Senna orientalis Roxb. fl. ind. II, 343.
β) aristata Collad. hist. nat. et méd. d. Cass. 109.

- γ) *glabra*; *geminiflora* Schrenk hort. Mon. t. 26.
 δ) *scabriuscula* Vog. syn. gen. Cass. 20.
 ε) *Sóphera* L. cod. Nro. 2979.
 chinensis Jacq. icon. pl. rar. t. 73.
 coromandelica Jacq. fragm. bot. fig. color. illustr. 67. t. 100.
 purpurea et *esculenta* Roxb. in Wight et Arn. prodr. fl. penins. Ind. or. I, 257.
 sopheroides Collad. hist. nat. et méd. d. Cass. 133.
 torósa Cav. descr. de las plant. 131.
 torulosa et *indica* Poir. in enc. méth. II, 126.
 Chamaestifula *Sóphera*, *torósa* et *coromandeliana* G. Don dichl. pl. II, 452.
 Senna *Sóphera*, *purpurea* et *esculenta* Roxb. fl. ind. II, 342. 346. 347.
 * 4. 5 *bicapsularis* L. cod. Nro. 2962. ? India orient., China.
 sennoides Jcq. ic. pl. rar. I, t. 170.
 Senna bicapsularis Rxb. fl. ind. II, 342.

C. *Chamaesenna* (Leg. compressum; Antherae 7 crassae, apice biporosae).

5. 5 *biflora* L. cod. Nro. 2972b. bot. mag. 810. Vog. syn. gen. Cass. 29. Texas, America trop.
 galeaefolia L. cod. Nro. 2972b.
 α) *paucijuga*; *pallida* Vahl eclog. amer. III, 12.
 Acapulcensis H. B. et K. nov. gen. VI, 353.
 β) *multijuga*; *frondosa* Ait. hort. Kew. II, 35.
 biflora L. cod. Nro. 2972a. bot. mag. 810. bot. reg. t. 1310.
 Crista Jacq. icon. pl. rar. I, t. 74.
 tenuissima L. cod. Nro. 2978.
 6. ♀ *bauhinioides* A. Gr. in Bost. journ. of nat. hist. VI, 180. Texas.

XVI. *Bauhinia* L.

(Fratres Johannes et Casper Bauhin, medici Basillensis et botanici celeberrimi, prior † 1613, posterior † 1624.)

1. ♀ *variegata* L. cod. Nro. 2951. India orientalis, China,
 purpurea Wall. num. list. 5795. Himalaya.
 β) *cándida* Rxb. fl. ind. II, 318.
 γ) *chinensis* H. and Arn. in bot. of Beech. voy. 183.
 2. ♀ *chinensis* Vog. in nov. act. ac. Caes. Leop. XIX, suppl. I, 42. China.
 variegata β. *chinensis* DC. prodr. II, 514. ic. pl. chin. e bibl. Braam. t. 36.
 3. 5 *retusa* Rxb. hort. beng. 31. India or., Himal., China.
 4. 5 *racemosa* Lam. enc. méth. III, 390. India orient., Himalaya.
 parviflora Vahl symb. bot. III, 55.
 spicata Koen. Rottl.
 5. § *VahlII* W. et Arn. prodr. fl. pen. Ind. or. I, India orient., Himalaya.
 racemosa Vahl symb. bot. III, 56. t. 62. Hook. ic. pl. t. 140.
 6. § *corymbósa* Roxb. fl. ind. II, 329. bot. reg. new. ser. XII, t. 47. China, Cochinchina,
 scandens Burm. fl. ind. 94. India orientalis.
 7. § *scandens* L. cod. Nro. 2947. Rumph. herb. amboin. V, t. 1. China, India orientalis,
 Lingua DC. prodr. II, 516. insulae Moluccanae.
 8. § *emarginata* Roxb. Wall. num. list. 5792. G. Don dichl. pl. II, 462. India orient., Himal.

XVII. *Ceratonía* L.

(*κεράτων* et *κερατώνα* jam apud Graecos Legumen C. Siliquae, Johannisbrod.)

- * 1. 5 *Siliqua* L. cod. Nro. 7715. Europa australis,
 α) *Pulpo nigricante*. Africa borealis.
 β) *Pulpo flavescente*.

XVIII. *Gleditschia* L.

(Joh. Gottl. Gleditsch amicus cultorque Linnaei, prof. Berolinensis, † 1786.)

- * 1. 5♂ *caspica* Desf. hist. d. arbr. et arbriss. II, 247. Littora maris caspii.
 2. 5 *heterophylla* Bunge in mém. d. sav. étrang. de St. Pé. II, 95. China borealis.
 * 3. 5 *sinensis* (*chinensis* Hort.) Lam. enc. méth. II, 465. DC. mém.
 s. la fam. d. lég. I, t. 1. Mongolia, China.
 horrida Willd. sp. pl. IV, 1098.
 japónica Lodd.
 * 4. 5♂ *ferox* Desf. hist. d. arbr. et arbriss. II, 247. America foed. austr.
 orientális Bosc.
 macroacantha Willd. Berlin. Baumz. 164.
 * 5. 3 *macroacantha* Desf. hist. d. arbr. et arbriss. II, 246. Patria ignota, teste
 Fontanésii Spach hist. d. végét. phan. I, 95. Spach e China.
 ferox Desf. cat. hort. Paris. 3. édit. 409. (teste Spach.)

6. ♀ *indica* Pers. syn. pl. II, p. 623. India orientalis.
 * 7. ♀ *tricanthos* L. cod. Nro. 7696. Mich. hist. d. arbr. for. III, t. 10. America britannica et
meliloba Walt. fl. carol. 254. foederata borealis.
spinosa Marsh. arb. amer. 94.
latisiliqua et *flava* Hort.
 β) *laevis* Hort; *inermis* L. cod. Nro. 7697. DC. mém. s. la fam. d. lég. t. 22. f. 109.
 * 8. ♀ *brachycarpa* Pursh fl. Amer. sept. I, 221. America borealis.
tricanthos β. Mich. fl. bor. Amer. II, 257.
 * 9. ♀ *monosperma* Walt. fl. carol. 254. Mich. hist. d. arbr. for. III, t. 11. America foederata
caroliniensis Lam. enc. méth. II, 461. borealis et media.
triacantha Gaertn. de sem. et fruct. t. 146.
 - β. *monosperma* Ait. hort. Kew. III, 444.
aquatica Marsh. arbust. americ. 95.
inermis Mill. dict.
 10. ♀ *macrostachya* Hort. Patria ignota.
 11. ♀ *micrantha* Lodd. Patria ignota.

Fam. 85. Papilionaceae.

Trib. 1. Dalbergieae (Arbores aut frutices, saepe scandentes; Fol. pinnata;
 Stam. connata; Cotyled. crassae, carnosae).

XIX. *Pterocarpus* L.

(πτερόν, ala, Fluegel et κάρπος, fructus, Frucht.)

1. ♀ *flavus* Lour. fl. cochinch. 525. China, ins. Molucc.

XX. *Dalbergia* L. fl.

(Nic. et Gust. Dalberg, ille medicus reg. Stockh., hic praef. milit., Linnaei amici.)

1. ♀ *latifolia* Rxb. pl. of Corom. II, t. 113. India orient., China.
 2. ♀ *sericea* G. Don dichl. pl. II, 375. Nepal.
 3. ♀ *japonica* G. Don dichl. pl. II, 375. Japonia.

XXI. *Pongamia* Lam.

(Pongam vox malabaria Pongamiae glabrae Vent.)

1. ♀ *chinensis* DC. prodr. II, 416. Cochinchina, China.
Robinia mitis Lour. fl. coch. 555.

XXII. *Millettia* (nec *Milletia*) W. et Arn.

(ad honorem Dr. Millett, med. Cantoniensis ab autorib. prodromi fl. Indiae orient. dicta.)

1. ? *nitida* Benth. in Hook. Lond. journ. of bot. I, 484. China.

XXIII. *Derris* Lour.

(δέρρις, membrana, a legumine membranaceo.)

1. § *trifoliata* Lour. fl. cochinch. 528. China.

Trib. 2. Sophoreae (Fol. pinnata; Stam. libera; Leg. bivalve; Cotyled. subfoliaceae).

XXIV. *Ammothamnus* Bunge.

(ἀμμος, arena, Sand et θάμνος, virgultum, Gestraeuch.)

1. 5 *Lehmanni* Bge in Arb. d. naturf. Ver. in Riga I, 214. Songaria.

XXV. *Sóphora* R. Br.

(sufr. nomen arab. plantae leguminiferae aut a voce subâr, i. e. fructus Tamarindorum.)

1. ♀ *speciosa* Benth. in Bost. journ. of nat. hist. VI, 178. Texas.
Dermatophyllum speciosum Scheele in Linn. XXI, 459.
 2. 5 *velutina* Lindl. in bot. reg. t. 1185. Nepal.
 3. 5 *tomentosa* L. cod. Nro. 2933. Florida, Brasilia,
crassifolia Jaum in nouv. Duh. III, 87. India occid. et ? orient.
littoralis Schrad. in Goett. Anz. 1821. 709.
nitens Schum. et Thonn. Beskr. of Guin. plant. 251.
occidentalis L. cod. Nro. 2934.
 β) *truncata* Torr. and Gr. fl. of N. Amer. I, 389.

XXVI. Edwardsia Salisb.

(Sydenh. Edwards, a. 1815 ephemerides botanicas „botanical register“ condidit.)

1. 5 mollis Royle illustr. of himal. pl. 196. t. 34. Himalaya.
 Sôphora mollis et Houghiana Wall. num. list. Nro. 5335 et 5336.

XXVII. Ammodendron Fisch.

(ἀμμος, Sand et δένδρον, arbor, Baum.)

1. ♀ Eichwaldii Led. in Eichw. pl. nov. aut min. cogn. casp. Littora maris caspii or.
 cauc. 37. t. 33. .
 cáspium Eichw. pl. nov. aut min. cogn. casp. cauc. 7.
 2. ♀ Sievêrsii Fisch. in DC. prodr. II, 523. Led. ic. pl. fl. ross. t. 107. Sibiria austr., Tataria.
 Hallia argénteá Spreng. syst. veg. III, 195.
 Podalyria argénteá Willd. sp. pl. II, 500.
 Robínia argénteá Sievers in Pall. n. nord. Beitr. VII, 326. 331.
 Sôphora argénteá Pall. nov. act. Petropol. X, 373. t. 8.
 - bifolia Pall. spec. Astrag. 124. t. 91.
 Virgilia argénteá Poir. in enc. méth. VIII, 679.
 β) Lehmannianum Bge in Arb. d. naturf. Ver. zu Riga I, 215.
 3. ♀ Karelíni F. et M. in Led. fl. ross. I, 717. Littora maris caspii or.

XXVIII. Cladrastis Rafin.

(κλαδος, ramulus, ein junger Zweig et ῥαστος, levissimus, sehr leicht, ob ramos fragillimos.)

- * 1. ♂ tinctória Raf. fl. Kentuck. and new. fl. and bot. of N. Am. III, 83. America foederata
 Virgilia lútea Mich. hist. d. arbr. forest. de l'Amer. sept. (Tennessee, Kentucky).
 III, 265. t. 50.
 - Kentuckea Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. VI, 16.

XXIX. Styphnolóbium Schott.

(στεφνος, acerbus, herbe et λοβος, legumen, Huelse.)

- * 1. 5 japonicum Schott Wien. Zeitschr. 1830. 844. Japonia, Tataria.
 Sôphora japonica L. cod. Nro. 2936. nouv. Duh. III, t. 21.
 - símica (chinensis Lodd.) Rosier journ. de phys. XIV, 248.
 β) variegata G. Don dichl. pl. II, 109.
 γ) péndula G. Don dichl. pl. II, 109.
 2. 35 affine Walp. repert. bot. I, 807. America foederata
 Sôphora affinis Torr. and Gr. fl. of N. Amer. I, 390. (Arkansas).

XXX. Zanthyrsis Raf.

(ξανθος, flavus, gelb et θυρσος, thyrsus, hoc loco: Bluethenstrauss.)

1. 5 paniculata Raf. new flor. and bot. of N. Amer. III, 84. Florida austr., Cuba.
 áurea Collins herb. nec Aut.

XXXI. Agastianis (rectius Agastocyaneum) Raf.

(ἀγαστόν, mirum quantum, ausserordentlich et χυάνεος, coeruleus, blau.)

1. 5 secundiflora Raf. new fl. and bot. of N. Amer. III, 86. America tropica,
 Broussonetia secundiflora Orteg. nov. aut rar. pl. hort. Mexico, Texas.
 Madrit. dec. V, 61. t. 7.
 Sôphora secundiflora Lag. in DC. cat. hort. Monspel. 148.
 Virgilia secundiflora Cavan. ic. et descr. pl. V, t. 401.

Trib. 3. Podalyriaceae (Folia simplicia aut ternata; Stam. libera; Leg. bivalve;
 Cotyledones foliaceae).

XXXII. Anágyris L.

(ἀναγυρίς apud Graecos veteres A. foetidam L. significat, origine mihi dubia.)

- * 1. 5 foétida L. cod. Nro. 2944. S. et Sm. fl. gr. t. 366. Terrae maris mediterr.
 β) glauca Hort. Dum. Cours. bot. cult. VI, 50.
 * 2. 5 neapolitána Ten. fl. Napl. IV, 187. t. 227. f. 3. Italia inferior, Sicilia,
 eretica Mill. dict. ins. Archipelag. graeci.
 foétida β. Bert. fl. it. IV, 405.

XXXIII. Pickeringia Nutt.

(Pickering, botanicus Americae foederatae.)

1. 5 montána Nutt. in Torr. and Gray fl. of N. Amer. I, 389. America borealis.

XXXIV. Piptanthus D. Don.

(πικρετιν, cadere, fallen et άνθος, flos, Bluethe, ob dentes calycinios, petala et stamina
mox decidua.)

1. 5 nepalensis (nipaulensis) D. Don in Sweet brit. fl. gard. III, 264. Nepal.
Anágyris nepalensis Grah. in Wall. num. list. Nro. 5340.
Baptisia nepalensis Hook. exot. fl. t. 131.
Thérmia nepalensis Spreng. syst. veget. IV, 2. 171.
Thermopsis laburnifolia D. Don prodr. fl. nep. 239.
- nepalensis DC. prodr. II, 99.

XXXV. Macrótropis DC.

(μακρος, grandis, gross et τροπις, carina, Schiffchen.)

1. 5 foétida DC. prodr. II, 98. China (Canton).
Anágyris foétida Lour. fl. coch. 318.
- sinensis Steud. nom. bot. I, 83.
2. 5 emargináta Walp. rep. bot. II, 903. China.
Láya emargináta Hook. and Arn. in bot. of Beech. voy. 183. t. 38.

XXXVI. Ormosia Jacks.

(όρμος, collare, Halsband, ob usum seminum rubrorum.)

1. 5 glauca Wall. pl. asiat. rar. II, 23. t. 127. Nepal.

XXXVII. Corolis L.

(κερκις jam apud Graecos veteres C. Siliquastrum L.)

- * 1. 5 Siliquastrum L. cod. Nro. 2945. bot. mag. t. 1138. Europa australis,
Siliquastrum orbiculátum Mneh meth. 54. Tataria.
β) albiflóra Hort.
γ) parviflóra DC. prodr. II, 518.
2. 5 chinensis Bunge in Mém. d. sav. étr. de St. Pétersb. II, 95. China borealis.
* 3. 5 canadensis L. cod. Nro. 2946. America britannica et
Siliquastrum cordátum Mneh meth. 54. foederata borealis.
β) pubescens Pursh fl. Amer. sept. 308.
4. 5 occidentalis Torr. in Bost. journ. of nat. hist. VI, 177. Texas, Mexico.
Siliquastrum var. Benth. pl. Hartw. 307.

Trib. 4. Phaseoleae (Herbae aut Frutices saepe scandentes; Folia ternata, raro
pinnata; Stamina connata; Legumen bivalve; Cotyledones crassae, carnosae).

XXXVIII. Pueraria DC.

(Puerari, professor botanices Hafniensis exeunte saeculo praeterito, VahlII amicus.)

1. 5 Wallichii DC. mém. s. la fam. d. Legum. 254. t. 43. Nepal.

XXXIX. Dumásia DC.

(J. B. Dumas, professor medicam. Paris. et ephemeridum „Annales d. sciences nat.“ editor.)

1. 5 truncata Sieb. et Zucc. in Abh. d. math. phys. Kl. d. baier.
Akad. d. Wiss. IV, 4. 119. Japonia.

XL. Galactia P. Browne.

(γαλα, lac, Milch, ob succum lacteum G. pendulae Pers.)

1. 5 marginalis Benth. in Ann. d. Wien. Mus. II, 126. Texas.

XLI. Glycine (L.) DC.

(γλυκυς, dulcis, suess, ob radices nonnullarum specierum esculentas.)

1. 5 Soja Sieb. et Zucc. in Verhandl. d. math. phys. Kl. d. baier.
Akad. d. Wiss. IV, 2. 119. Japonia.
? javanica Thunb. in Transact. of the Linn. soc. II, 340.

XLII. Mucúna Adans.

(vox brasiliensis M. urentis DC.)

1. 5 macrocarpa Wall. pl. asiat. rar. I, 41. t. 47. Nepal.

XLIII. Wistaria (nec Wisteria Aut.) Nutt.

(Caspar Wistar, professor universitatis pensylvanicae ineunte saeculo XIX.)

- * 1. 5 speciosa Nutt. gen. of N. Amer. pl. II, 115. America foederata
frutescens DC. prodr. II, 390. brit. fl. gard. 2. sér. II, 104. media et australis.

Apios frutescens Pursh fl. Amer. sept. II, 474.

Glycine frutescens L. cod. Nro. 5364. bot. mag. t. 2103.

Thyrsanthus frutescens Ell. sk. of the bot. of S. Car. and Georg. II, 237.

β) *macrostachya* Torr. et Gr. fl. of N. Amer. I, 283.

2. § *japonica* Sieb. et Zucc. fl. jap. I, 88. t. 43.

Japonia.

3. 5 § *brachybotrys* Sieb. et Zucc. fl. japon. I, 92. t. 45.

Japonia.

* 4. § *chinensis* DC. prodr. II, 390. brit. fl. gard. III, t. 211.

Mongolia, China.

Consequána Loud. hort. brit. 315. Paxt. mag. of bot. VII, 127. c. ic.

floribunda DC. prodr. II, 390.

Dolichos japonicus Spreng. syst. veg. III, 252.

- *polystachyus* Thb. fl. jap. 281. (teste Zucc.)

Glycine chinensis (sinensis) Sims bot. mag. t. 2083. bot. reg. t. 650.

- *floribunda* Willd. sp. pl. III, 1066.

β) *flora albo.*

XLIV. *Diplonox* Raf.

(διπλοος, duplex, doppelt et ὄνοξ, ungulum, Nagel, ob corallarum alarum formam.)

1. § *elegans* Rafin. flor. Ludovic. 101.

Am. foed. (Louisiana).

XLV. *Dolichos* L.

(δολχος, apud Graecos phaselus, Bohna.)

1. ♀ *frutescens* Ham. in Don prodr. fl. nep. 240.

Nepal.

XLVI. *Rhynchosia* Lour.

(ρυγχος, proboscis, Ruessel.)

1. 5 *Pseudo-Cajan* Cambess. in Jacquem. voy. dans l'Inde IV, 45. t. 55.

Cashemiria.

XLVII. *Flemingia* Roxb.

(in honorem Joannis Fleming, Roxburghii tempore praesis collegii medici Calcuttae.)

1. 5 *semialata* Roxb. fl. ind. III, 340. Wight ic. pl. Ind. orient. t. 326.

Nepal.

Millingtonia semialata Roxb. in Eastind. comp. mus. t. 1623.

Trib. 5. *Hedysareae* (Folia simplicia aut pinnata; Legumen articulatum aut nuculaceum; Cotyledones serius foliaceae).

XLVIII. *Coronilla* L.

(corona, Kranz, ob florum inflorescentiam.)

* 1. 5 *ameroides* Boiss. et Sprunn. in Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 100.

Graecia.

* 2. 5 *Emerus* L. cod. Nro. 5463. Gu. Abb. d. d. Holzart. t. 134.

Europa australis,

pauciflora Lam. fl. franç. II, 661.

Germania australis,

Emerus major Mill. icon. t. 132. f. 1. et minor f. 2.

Helvetia.

* 3. ♀ *junceae* L. cod. Nro. 5464. bot. reg. t. 820. bot. cab. t. 235.

Gallia, Italia infer.

* 4. ♀ *valentina* L. cod. Nro. 5465. bot. mag. t. 185.

Italia, Gallia, Hispania.

? *hispanica* Mill. dict.

stipularis Lam. enc. méth. II, 120.

5. ♀ *pentaphylla* Desf. fl. atl. II, 171. Mill. icon. t. 289. f. 2.

Africa borealis.

6. ♀ *argentea* L. cod. Nro. 5469. Mill. icon. t. 289. f. 1.

Creta.

* 7. ♀ *glauca* L. cod. Nro. 5466. fl. gr. t. 711.

Europa australis.

coronata Ucria hort. Panorm. 312.

β) *Stipulae acutae*; *valentina* Ucria hort. Panorm. 312.

8. ♀ *multiflora* DC. prodr. II, 310.

Hispania.

XLIX. *Diphaca* Lour.

(δις, dupliciter, doppelt et φακη, lens, hoc loco legumen, Huelse, ob germen duplex.)

1. 5 *cochinchinensis* Lour. fl. coch. 554. Rumph. herb. amb. III, t. 128.

China, Cochinchina,

Dalbergia Diphaca Pers. syn. pl. II, 276.

ins. Moluccanae.

L. *Uraria* Desv.

(origine mihi plane dubia, forte indica.)

1. ♀ *Lagopus* DC. in ann. d. sc. nat. IV, 100.

Nepal, Himalaya.

2. 5 *arboresca* G. Don dichlam. pl. II, 287.

Nepal.

Desmódium arborescens Sweet hort. brit. 3. edit. 180.

? *Erythrina arborescens* Roxb. pl. of Corom. III, t. 219.

Hedysarum arborescens Ham. in D. Don prodr. fl. nep. 243.

3. *h* crinita Desv. Journ. de bot. III, 122. t. 5. f. 19. China, India orientalis.
Hedysarum crinitum L. cod. Nro. 5543.
Onobrychis crinita Spr. syst. veg. III, 205.
β) macrostachya Wall. pl. asiat. rar. II, 8. t. 110.

LI. *Desmódium* Desv.

(δεσμος, ligula, Band, ob filamenta ligulae modo connata.)

A. Folia simplicia.

1. 5 pseudotriquetrum DC. in ann. d. sc. nat. I, 100. Nepal.
2. *h* latifolium DC. prodr. II, 328. Wight icon. pl. I, t. 270. China, India orientalis.
collinum Wall. num. list. 5693.
Hedysarum latifolium Roxb. fl. ind. III, 350.
3. *h* triquetrum DC. prodr. II, 326. China, India orientalis,
Hedysarum alatum Rxb. fl. ind. III, 348. Burm. fl. zeyl. t. 81. Ceylon.
- triquetrum L. cod. Nro. 5504. Burm. fl. ind. t. 52. f. 2.

B. Folia ternata.

4. *h* dubium Lindl. in bot. reg. t. 967. Himalaya.
5. *h* laxiflorum DC. in ann. d. sc. nat. IV, 100. Nepal.
6. 5 elegans DC. in ann. d. sc. nat. IV, 100. Nepal.
7. 5 nutans Hook. in bot. mag. t. 2867. India orientalis,
Hedysarum nutans Wall. in Edinb. philos. Journ. Himalaya.
8. 5 pendulum Wall. pl. rar. asiat. I, 81. t. 94. Nepal, India orientalis.
9. *h* confertum DC. in ann. d. sc. nat. IV, 100. Nepal.
* 10. *h* Sambuense (Suembuense) DC. prodr. II, 335. Nepal.
Hedysarum Sambuense Don prodr. fl. nep. 243.
Otótropis Sambuensis N. v. E. in Linn. XIII, 120.
11. *h* concinnum DC. in ann. d. sc. nat. IV, 100. Nepal.
Hedysarum concinnum Spreng. syst. veg. IV, 2. 292.
12. § laxum DC. in ann. d. sc. nat. IV, 102. Nepal.
Hedysarum laxum Spreng. syst. veget. IV, 2. 292.
13. *h* podocarpum DC. in ann. d. sc. nat. IV, 102. Nepal.
14. *h* oxyphyllum DC. in ann. d. sc. nat. IV, 102. Nepal.
Hedysarum oxyphyllum Spreng. syst. veget. IV, 2. 292.
15. 5 sequax Wall. pl. rar. asiat. II, 46. t. 157. Nepal (Kamaon).
16. *h* multiflorum DC. in ann. d. sc. nat. IV, 102. Nepal, Himalaya.
floribundum G. Don dichlam. pl. II, 297.
Hedysarum floribundum D. Don prodr. fl. nep. 244.
17. *h* tiliaefolium G. Don dichl. pl. II, 297. Nepal, Himalaya.
Hedysarum tiliaefolium D. Don prodr. fl. nepal. 244.
18. *h* dioicum DC. prodr. II, 338. Nepal.
Hedysarum dioicum Ham. in D. Don prodr. fl. nepal. 244.
19. *h* polycarpum DC. prodr. II, 334. W. et Arn. prodr. pen. Ind. or. I, 227. Cochinchina,
purpureum H. et Arn. in bot. of Beech. voy. 62. China, Nepal, India
serpens Wall. num. list. Nro. 5733. orientalis c. insullis,
tenuis Grah. in Wall. num. list. Nro. 5730. ins. societatis.
Hedysarum polycarpum Lam. ill. d. genr. t. 628. enc. méth. VI, 413.
- purpureum Rxb. fl. ind. III, 358.
- Wallichianum Spr. syst. veg. IV, 2. 293.
β) angulatum DC. in ann. d. sc. nat. IV, 100.
retusum G. Don dichlam. pl. II, 297.
? Hedysarum retusum Don prodr. fl. nep. 243.
γ) capitatum DC. prodr. II, 336.
δ) heterocarpum DC. prodr. II, 337.
Hedysarum heterocarpum L. cod. Nro. 5512.
Hedysarum concium Poir. in enc. méth. VI, 419.
ε) Hippocrépis DC. prodr. II, 338.
Hippocrépis barbata Lour. fl. coch. 553.
20. *h* microphyllum DC. prodr. II, 337. Japonia.
Hedysarum racemosum Thunb. fl. japon. 285.

LII. *Dicorma* DC.

(δις, dupliciter, doppelt et ἵμας, fulcrum, Stuetze, hoc loco bractea, Deckblatt.)

1. 5 pulchellum DC. prodr. II, 339 et Wight icon. pl. t. 418. China (Canton),
Hedysarum pulchellum L. cod. Nro. 5507. Himalaya, Java.

Phylloidium pulchellum Desv. *journal de bot.* III, 123. t. 5. f. 24.

Zornia pulchella Pers. *syn. pl.* II, 318.

2. *h. elegans* DC. *prodr.* II, 339.

China.

? *Desmodium lutescens* Desv. *journal de bot.* III, 122. (teste Wight et Arn.)

Hedysarum elegans Lour. *fl. cochinch.* 450.

- *lutescens* Poir. *enc. méth.* VI, 417.

Zornia elegans Pers. *syn. pl.* II, 318.

- *lutescens* Steud. *nom. bot.* 1. ed. p. 900.

LIII. *Tavariéra* DC.

(J. Bapt. Tavernier, Parisiensis, Europaeam et Asiam orientalem austr. permigr. † 1689.)

1. *h. incana* Boiss. *diagn. pl. orient. nov.* II, 90.

Persia.

conoclada Jaub. et Sp. *ill. pl. orient.* 120. t. 61.

2. *h. glabra* Boiss. *diagn. pl. orient. nov.* II, 90.

Persia australis.

ephedroides Jaub. et Sp. *ill. pl. orient. nov.* 122. t. 62.

3. *h. spártea* DC. *prodr.* 339.

Persia.

Hedysarum Spartium Burm. *fl. ind.* 166. t. 51. f. 2.

LIV. *Hedysarum* (L.) Jaume.

(*ἡδυσαρων*, a voc. *ἡδύς*, dulcis, suavis, et *ἀραιύειν* exhaurire, apud Graecos: *Securigera Coronilla* DC.)

1. 5 fruticosum (*frutescens* Pall.) L. *fl. suppl.* 333.

Sibiria.

2. 5 scoparium F. et M. in Schrenk *enum. pl. nov. p. 89* in adnot.

Sibiria australis.

3. *h. syriacum* Boiss. *diagn. pl. nov. orient.* II, 90.

Syria.

LIV. *Onobrychis* Gaertn.

(*ὄνυβρυχις* apud Graecos verisimiliter *Onobrychis sativa* Lam.)

1. *h. cornúta* Desv. *journal de bot.* 1814. I, 81.

Hedysarum cornutum L. *cod. Nro.* 5544.

- *orientále* Jaume *fam. nat.* II, 239.

Armenia,
Transcaucasia.

2. *h. tragacanthoides* DC. *prodr.* II, 347.

Oriens (? Syria).

3. *h. pumila* Dsv. *journal de bot.* 1814. I, 84.

Hedysarum pumilum L. *cod. Nro.* 5538.

Hispania.

LVI. *Ebenus* L.

(*κωνίου ἔβενος* apud Graecos: *E. cretica* L.)

1. *h. crética* L. *cod. Nro.* 5304. *brit. fl. gard.* 2. ser. II, t. 260.

Creta.

Anthyllis cretica Lam. *encycl. méth.* I, 203. *bot. mag.* 1092.

2. *h. Montbretii* J. et Sp. in *ann. d. sc. nat.* 2. sér. XIX, 154.

Asia minor.

laguroides Boiss. *diagn. pl. orient. nov.* II, 99.

3. *h. pogonótropis* J. et Sp. in *ann. d. sc. nat.* 2. sér. XIX, 155. *ill. pl. or. t.* 252.

Asia minor.

barbígera Boiss. *diagn. pl. orient. nov.* II, 98.

4. *h. macrophylla* J. et Sp. in *ann. d. sc. 2. sér.* XIX, 156. *ill. pl. or. t.* 253.

Asia minor.

5. *h. hirsúta* J. et Sp. *illustr. pl. orient.* III, t. 251.

Asia minor.

LVII. *Lespedeza* Mich.

(*Lespedez*, ineunte hoc saeculo *Floridæ* praefectus et fautor *Michauxii* hanc terram permigrantis.)

* 1. 5 *júncea* Pers. *syn. pl.* II, 318.

Hállia júncea Otto (teste Steud., sed ubi?)

Hedysarum júnceum L. *cod. Nro.* 5520. L. *fl. dec.* 1.

pl. rar. hort. Upsal. t. 4.

Trifólium cytisóides Pall. *Reis. n. versch. Prov. d. russ. R.* III, 266.

- *hedysaróides* Pall. *Reis. n. versch. Prov. d. russ. R.* III, 751. t. D. d. f. 3. et A.

β) *latifolia*; *Pallasii* G. *Don dichl. pl.* III, 307.

Sibiria, Tataria,
Japonia, China, India
orientalis, ? Nova
Hollandia.

2. *h. trichocarpa* Pers. *syn. pl.* II, 318.

Hedysarum trichocarpum Willd. *sp. pl.* III, 1194.

Trifólium dahuricum (*davuricum*) Laxm. in *nov. comm. ac. Petrop.* XV, 560. t. 30. f. 5.

Sibiria, Mongolia,
China borealis.

3. 5 *cuneáta* G. *Don dichl. pl.* II, 307.

júncea DC. *prodr.* II, 348. (teste Benth.)

Anthyllis cuneata Dum. *Cours. bot. cult.* VI, 100.

Aspálathus cuneáta Don (teste Steud., ubinam?)

Hedysarum júnceum Roxb. *fl. ind.* III, 362.

China, Himalaya,
Nova Hollandia.

4. 5 *chinensis* G. *Don dichlam. pl.* II, 307.

argyraea S. et Z. in *Abh. d. baier. Ac. d. Wiss. phys. math.* Kl. IV, 2. 120.

Hedysarum seríceum Thunb. *fl. japon.* 239.

China, Japonia.

5. 5 *Caragánae* Bunge in ann. d. sc. nat. VI, 59. China borealis.
 6. 5 *floribunda* Bunge in ann. d. sc. nat. VI, 59. China borealis.
 7. ♀ *eriocarpa* DC. in ann. du Mus. d. sc. nat. IV; 102. Nepal.
Aspálathus violácea D. Don prodr. fl. nep. 246.

LVIII. *Campylótropis* Bge.

(καμπύλος, curvus, krumm et τροπίς, carina, Schiffchen.)

1. 5 *chinensis* Bunge in ann. d. sc. nat. 2. sér. VI, 58. China borealis.
Lespedeza macrocarpa Bunge in mém. d. sav. étr. d. St. Pét. II, 92.
 2. 5 *ciliata* (Lespedeza) Benth. in Hk. journ. of bot. a. Kew gard. misc. IV, 48. China.
 3. 5 *viatorum* (Lespedeza) Champ. in Hk. journ. of bot. a. Kew
 gard. misc. IV, 48. China.

LIX. *Alhagi* Desv.(al hadsch, modo linguae anglicae al hag scriptum, apud Arabes nostram
A. manniferam Desv. significat.)

1. ♀ *mannifera* Desv. in journ. de bot. III, 120. t. 4. f. 4. Aegyptus, Syria.
Maurorum DC. prodr. II, 352. Mesopotamia.
Hedysarum Alhagi L. cod. Nro. 5493.
Manna hebraica Don prodr. fl. nep. 247.
 2. ♀ *Nepalensium* (Nepaulensium, nec nipaulensis) DC. prodr. II, 352. Nepal.
Hedysarum Hamiltonii Spreng. syst. veg. III, 316.
Manna nepalensis D. Don prodr. fl. nep. 247.

Trib. 6. Galegeae. (Folia pinnata; Stamina 9, rarissime 10 connata; Legumina
 continuum; Cotyledones serius foliaceae.)

LX. *Amorpha* L.

(ἀμορφος, informis, formlos, ob corollam papilionaceam incompletam.)

- * 1. 5 *fruticosa* L. cod. Nro. 5245. bot reg. t. 427. America foederata.
 β) *coerulea* Lodd.
 γ) *ornata* Wend. ind. sem. hort. Marburg. a. 1835.
 * 2. 5 *Lewisii* Lod. cat. (an fruticosa var.) America borealis.
 * 3. ♀ *herbácea* Walt. fl. carol. 179. bot. cab. t. 689. America foederata
pubescens Willd. sp. pl. III, 970. australis.
púmila Mich. fl. bor. amer. II, 64.
 * 4. 5 *nana* Nutt. gen. of North Amer. pl. II. 91. bot. mag. t. 2112. America foederata
microphylla Pursh fl. Amer. sept. II, 466. media et occidentalis
fragrans Sweet br. fl. gard. III, t. 241.
húmilis Tausch in Flora XXI, 750.
 * 5. 5 *cróceo-lanata* Wats. dend. brit. t. 139. America borealis.
 * 6. 5 *canescens* Nutt. gen. of N. Amer. pl. II, 92. America borealis.
 * 7. 5 *caroliniana* Croom in Sillim. journ. XXV, 74. America foederata
cyanostácha Curt. in Bost. journ. of nat. hist. I, 140. australis.
glabra Desf. cat. hort. Paris. 192.
 8. 5 *californica* Nutt. in Torr. and Gr. fl. of N. Amer. I, 306. California.
 * 9. 5 *Tennessensis* Schuttlev. in Kze del. sem. hort. Lips. 1848. Tennessee in Amer. foed.
 10. 5 *Roemeriana* Scheele in Linn. XXI, 461. Texas.
 11. 5 *laevigata* Nutt. in Torr. and Gr. fl. of N. Amer. I, 306. Amer. foed. bor. et med.
 12. 5 *paniculata* Torr. and Gr. of N. Amer. I, 306. Amer. bor. med. et austr.
 Not. Praeterea in horto dendrologico species nobis minus notae colitur: *elata* Hort

LXI. *Tephrosia* Pers.

(τεφρος, cinereus, aschenfarbig, ob colorem foliorum specierum nonnullarum.)

1. ♀ *vestita* Vog. in nov. act. acad. Leopold. Carol. XIX. suppl. I. p. 15. China.
 2. ♀ *chinensis* Lindl. in transact. of the hort. soc. VII, 38. China.
 3. ♀ *sophoroides* DC. in ann. d. sc. nat. IV, 99. Nepal.
 4. ♀ *brachystácha* DC. in ann. d. sc. nat. IV, 99. Nepal.

LXII. *Eysenhardtia* Humb.

(Car. Guil. Eysenhardt, professor botanices Regimontanus, † 1825.)

- * 1. ♂ *amorphoides* H. B. K. nov. gen. amer. VI, 489. t. 592. Texas, Mexico.
Drummondii Torr. and Gr. fl. of N. Amer. I, 690.
texana Scheele in Linn. XXI, 462.

2. 5 *spinosa* Engelm. in Bost. journ. VI, 174.

Texas.

LXIII. Dálea L.

(Sam. Dale, medicus in urbe Bocking provinciae britannicae Essex, † 1739.)

1. \bar{h} *formosa* Torr. in ann. lyc. New-York II, 178.

America foed. occid.

2. \bar{h} *frutescens* A. Gr. Bost. journ. I, 175.

Texas.

LXIV. Psorálea L.

(ψωραλεος, scabiosus, krätzig, ob tubercula totius plantae paene tegentia.)

1. 5 *drupácea* Bunge Arb. d. naturf. Ver. in Riga I, 221.

Tataria.

LXV. Rhynchodium Presl.

(ρυγχόδιον, rostellum, Schnaebelchen.)

* 1. \bar{h} *bituminosum* Presl bot. Beimerk. 54.

Europa australis,
Arabia, Barbaria.

Psorálea bituminosa L. cod. Nro. 5627.

Dorychnium angustifolium Mneh. meth. 110.

Aspalathium bituminosum Medik. philos. Bot. 211.

β) *angustifolia*; *frutescens* Poir. enc. méth. V, 684. (sub *Psoralea*).

γ) *latifolia*; *palaestina* Mor. stirp. sard. el. I, 16. (sub *Psoralea*).

LXVI. Indigófera L.

(indigo, Indigo et ferre, tragen.)

1. 5 *Bungeana* Walp. in Linn. XIII, 525, in adn. ad Nro. 67.

China borealis.

micrantha Bunge in mém. d. sav. étrang. d. St. Pétersb. II, 90.

2. 5 *coccinea* Lour. fl. coch. 559.

China (Canton).

3. \bar{h} *chinensis* Vog. in nov. act. acad. Caes. Leop. Carol. XIX, suppl. I, 14.

China (Macao).

4. \bar{h} *hirsuta* L. cod. Nro. 5553. Burm. fl. zeyl. t. 14.

China, Ceylon.

* 5. 5 *decóra* Lindl. Journ. of the hort. soc. I, 68. bot. reg. XXVII. t. 22.

China (Shanghai).

* 6. 5 *aspalathoides* Vahl in DC. prodr. II, 231.

India orientalis,

aspalathifolia Rxb. fl. ind. III, 371.

Himalaya.

Aspalathus indica L. cod. Nro. 5231.

Lespedeza júncea Wall. num. list. 5743 b.

7. 5 *heterantha* Wall. num. list.

Himalaya, Nepal.

virgata Rxb. fl. ind. III, 383.

Himalaya.

8. 5 *Arghawan* Royle ill. of the him. mount. 193.

Himalaya.

* 9. 5 *tinctoria* L. cod. Nro. 5556.

China, Asia australis.

10. 5 *Lindheimeriana* Scheele in Linn. XXI, 464.

Texas.

* 11. 5 *atropurpurea* Ham. in hort. Hafn. add. 152. bot. mag. t. 2065.

Nepal, India orient.

* 12. \bar{h} *Dosua* (nec *Dojua*) Ham. in Don pr. fl. nep. bot. reg. n. s. XV, t. 57.

Nepal, India orient.

13. \bar{h} *macrostachya* Vent. jard. du Malm. t. 44.

China.

LXVII. Oxyramphis Wall.

(όξυς, acutus, spitz et ραμφίς, der Haken.)

1. 5 *macrostýla* Wall. num. list. Nro. 5348.

Nepal.

Crotalaria macrostýla D. Don. prodr. fl. nepal. 242.

LXVIII. Xiphocarpus Presl.

(ξίφος, gladius, Degen et καρπος, fructus, Frucht.)

1. \bar{h} *candidus* Presl symb. bot. I, 13. t. 7.

India orientalis,

Tephrosia candida DC. prodr. II, 249.

Himalaya.

Robinia candida Rxb. hort. beng. 56. fl. ind. III, 327.

LXIX. Robínia L.

(Joh. Robin hortum Parisiensem, „jardin des plantes“ dictum, instituit ibique primus Robiniam Pseudacaciam L. deposuit; medio saeculo XVI vitam reliquit.)

* 1. δ *Pseud-Acacia* L. cod. Nro. 5450.

America borealis.

Pseudacacia odorata Mneh. meth. 145.

* β) *amorphaefolia* Lk. enum. pl. hort. Berol. II, 243.

* γ) *bullata* Hort.

* δ) *cornigera* Hort.

* ε) *crispa* DC. prodr. II, 261.

* ζ) *cylindrica* Hort.

* η) *floribunda* Hort.

* θ) *formosa* Hort.

* ι) *heterophylla* Hort.

- * x) *inermis* DC. cat. hort. Monsp. 136. (spectabilis Dum. Cours. bot. cult. VI, 140.)
- * λ) *macrophylla* Lodd. cat. Sweet hort. brit. ed. 3. p. 171.
- * μ) *monstrosa* Loud.
- * ν) *pendula* Lk enum. pl. hort. Berol. II, 243.
- * ξ) *procera* Hort. (gigantea Hort.)
- * ο) *pyramidata* Hort.
- * π) *sophoraefolia* Lk enum. pl. hort. Berol. II, 243.
- * ρ) *speciosa* Hort.
- * σ) *stricta* Lk enum. pl. hort. Berol. II, 243.
- * τ) *tortuosa* DC. cat. hort. Monsp. 137.
- * υ) *umbraculifera* DC. hort. Monsp. 137. (Parasol Hort.; *inermis* Dum. Cours.)
- * φ) *argenteo- et aureo-variegata* Hort.
- * γ) *volubilis* Hort.
- * 2. δ) *dubia* Fouc. in Desv. journ. bot. IV, 204. Patria ignota.
ambigua Poir. enc. méth. suppl. IV, 690.
echinata Mill. dict. (teste G. Don).
hybrida Audib. (sed ubi?)
- * 3. δ) *viscosa* Vent. jard. du Cels t. 4. America borealis.
glutinosa Sims in bot. mag. t. 560.
β) *albiflora*.
- * 4. 5) *hispida* L. cod. Nro. 5451. bot. mag. t. 311. America borealis.
rósea Lois. in nouv. Duh. II, t. 18.
montana Bartr. trav. tr. N. and S. Carol. etc. II, 128.
Aeschynomene hispida Roxb. (teste DC., sed ubi?)
Pseudacacia hispida Mch meth. 145.
β) *glabrescens* Hffmsgg 3. Nachtr. zu dem Verz. 57.
γ) *macrophylla* Schrad. in DC. prodr. II, 262.
δ) *nana* Ell. sk. of the bot. of S. Car. and Georg. II, 242.
- * 5. 5) *amara* Lour. fl. cochinch. 556. China, ? Cochinchina.
- * 6. ? *suberosa* Hffmsgg 2. u. 3. Nachtr. zu d. Verz. 201. India orientalis.
Not. Praeterea in horto dendrol. coluntur species aut varietates minus cognitae:
1) *Bessoniana* Hort.; 2) *Dordonii* Hort.; 3) *inermis rubra*; 4) *nigra nana*; 5) *pseudopendula*.

LXX. *Colútea* L.

- (κολούτια et κολούτια apud Graecos: C. arborescens.)
- * 1. 5) *arborescens* L. cod. Nro. 5457. Gu. Abb. d. d. Holzart. 133. Europa austr. et
hirsuta Roth tent. fl. germ. I, 305. med., Oriens, Barbaria.
β) legum. rubentibus Lam. enc. méth. I, 353.
- * 2. 5) *cruenta* Ait. hort. Kew. III, 55. Europa australi-orient.
orientalis Lam. enc. méth. I, 353. Cav. icon. et desc. pl. IV, t. 307. Oriens, Tataria.
sanguinea Pall. fl. ross. II, 88.
aperta Moench meth. 159. Schmidt oesterr. Baumz. t. 119.
humilis Scop. delic. flor. et faun. insubr. II, t. 12.
- * 3. 5) *Halépica* (Haleppica Aut.) Lam. enc. méth. I, 353. Syria.
Pocockii Ait. hort. Kew. III, 55. Schmidt oesterr. Baumz. t. 129.
istria Mill. dict. Nro. 2. t. 100.
procumbens l'Herit. stirp. nov. aut min. cogn. II, t. 42.
- * 4. 5) *melanócalyx* Boiss. et Heldr. in Boiss. diagn. pl. orient. IX, 35. Lycia, Graecia.
- * 5. 5) *media* Willd. enum. pl. hort. Berol. 771. ? Planta hybrida.
- * 6. 5) *nepalensis* (nipalensis) Hook. in bot. mag. t. 2622. Nepal, Himalaya.
- * 7. 5) *persica* Boiss. diagn. pl. orient. nov. VI, 33. Persia, Abissynia.

LXXI. *Calóphaca* Fisch.

- (καλος, pulcher, schoen et φακος, lens, Linse.)
- * 1. η) 5) *Wolgarica* Fisch. in DC. prodr. 270. Terra Wolgarica infer.
Cytisus Wolgaricus L. fl. suppl. 327.
- *nigricans* Pall. Reise III, 636. app. 754. Nro. 128. t. G. g. f. 3 A.
- *pinnatus* Páll. fl. ross. I, 73. t. 47.
Colútea Wolgarica Lam. enc. méth. I, 353.
Adenocarpus Wolgensis Spreng. syst. veget. III, 226.
- * 2. 5) *Hovenii* Schrenk enum. pl. nov. 74. Sibiria australis,
songarica (soongarica) Kar. et Kir. in bull. de l'acad. Tataria.
de sc. de Mosc. XIV, 401.

LXXII. *Halimodendron* (Halodendron DC.) Fisch.

- (άλυμα, planta salifuginea, Salzpflanze et δένδρον, arbor, Baum.)
- * 1. 5) *argenteum* Fisch. in DC. prodr. II, 269. Sibiria, Transcaucasia,
Robinia Halodendron L. fl. suppl. 330. Pall. fl. ross. t. 36. Tataria.

Caragana argentea Lam. enc. méth. I, 616.

Pseudacacia Halodendron Munch meth. 146.

β) *albiflorum* Kar. et Kir. in bull. de la soc. d. nat. de Mosc. XV, 323.

γ) *angustifolium* Hort.

δ) *brachyséma* DC. prodr. II, 269.

ε) *glabrescens* J. et Sp. in ann. d. sc. nat. 2. sér. XVIII, 238.

2. 5 *subvirescens* G. Don dichlam. pl. II, 244. Sibiria.

argenteum β. *subvirescens* DC. prodr. II, 269.

Robinia triflora l'Her. stirp. nov. aut min. cogn. 162.

3. 5 *cuspidatum* Jaub. et Sp. in ann. d. sc. nat. 2. sér. XVIII, 239. Persia.

4. 5 *emarginatum* Jaub. et Sp. in ann. d. sc. nat. 2. sér. XVIII, 239. Persia.

LXXIII. *Caragana* Lam.

(*Caragan*, nomen mongolicum *C. arborescentis* Lam.)

- * 1. 5 *microphylla* Lam. enc. méth. I, 615. Sibiria, Mongolia,
Altagana Poir. enc. méth. suppl. II, 89. China borealis.
Robinia microphylla Pall. sp. Astrag. descr. et icon. 116.
 - *Altagana* Pall. in nov. act. acad. Petrop. X, 372.
 - - var. *minima dahurica* Pall. fl. ross. t. 42. fig. later.
 β) *sericeo-villosa* Bge in mém. d. sav. étr. de St. Pé. II, 74.
- * 2. 5 *arborescens* Lam. enc. méth. I, 615. Sibiria.
inermis Munch meth. 135.
Robinia Caragana L. cod. Nro. 5453.
 - *Altagana* Pall. fl. ross. I, 68. t. 42. fig. med.
 β) *Pedun. subsolitaria*; *fruticosa* Bess. cat. pl. hort. Crem. a. 1816. p. 116.
Robinia mongolica Fisch., sed ubi?
 - *speciosa* Sw., sed ubi?
3. 5 *Bungei* Led. fl. alt. III, 264. icon. pl. fl. ross. ill. t. 464. Sibiria.
 * 4. 5 *frutescens* DC. prodr. II, 268. brit. fl. gard. III, 227. Rossia australi-orient,
cuneata Moench meth. 135. Sibiria, Mongolia,
digitata Lam. enc. méth. I, 616. China borealis,
Robinia frutescens L. cod. Nro. 5455. Tataria.
 - *frutex* Pallas fl. ross. I, t. 43.
 β) *mollis* Bess. enum. pl. Pod. et Volh. p. 29 et 74.
Robinia mollis Bieb. fl. taur. cauc. III, 477.
 - *tomentosa* Fisch. cat. pl. hort. Gor. 1812 p. 71.
- * 5. 5 *grandiflora* DC. prodr. II, 268. Isthmus caucasicus,
Robinia grandiflora Bieb. fl. taur. cauc. II, 168. Tataria.
 6. 5 *pygmaea* DC. prodr. II, 268. Sibiria.
Robinia pygmaea L. cod. Nro. 5456.
 β) *arenaria* Fisch. in DC. prodr. II, 269.
digitata β. *angustifolia* Lam. enc. méth. I, 616.
gracilis Hort.
7. 5 *Redowskii* DC. mém. s. la fam. d. Legum. 94. t. 11. f. 45. Sibiria.
 * 8. 5 *Chamlagu* Lam. enc. méth. I, 616. China borealis.
Robinia Chamlagu l'Her. stirp. nov. aut min. cogn. t. 77.
 - *chinensis* Pers. syn. pl. II, 312.
9. 5 *purpurea* Hort. angl. in Lk en. pl. hort. Ber. II, 242. (sub *Robinia*). Patria ignota.
 10. 5 *versicolor* Benth. in Royle ill. of the him. mount. 198. t. 34. f. 2. Tatar., Him., Cashmir.
 11. 5 *parvifolia* Hffmsgg Preisverz. v. Pfl. VIII. Anh. 39. Patria ignota.
 12. 5 *tenuis* Hffmsgg Preisverz. Pfl. VIII. Anh. 40. Patria ignota.
 * 13. 5 *spinosa* DC. prodr. II, 269. Sibiria.
ferox Lam. enc. méth. I, 615.
Robinia ferox Pall. fl. ross. I, 70. t. 44.
 - *spinosa* L. cod. Nro. 5454.
 - *spinosissima* Laxm. in comm. nov. acad. Petrop. XV, 558. t. 30. f. 4.
14. 5 *tragacanthoides* Poir. enc. méth. suppl. II, 90. Sibiria, Songaria,
Robinia tragacanthoides Pall. in nov. act. ac. Petrop. X, 371. t. 7. Tataria.
 β) *Bongardiana*; *tragacanthoides* Led. fl. alt. III, 207.
 γ) *leucophylla* F. et M. in Schrenk enum. pl. nov. 75.
- * 15. 5 *jubata* Poir. enc. méth. suppl. II, 89. Sibiria.
Robinia jubata Pall. in nov. act. ac. Petrop. X, 370. t. 6. spec. Astrag. t. 85.
 16. 5 *Moorkroftiana* Benth. in Royle ill. of the himal. mount. 198. Cashmir, Himalaya.
 17. 5 *brevispina* Royle illustr. of the himal. mount. 198. Himalaya.
 18. 5 *Gerardiana* Royle illustr. 198. t. 34. f. 1. Himalaya.
Astragalus Gerardianus Grah. in Wall. num. list. Nro. 5938.

19. 5 *polyacantha* Royle illustr. of the himal. mount. 198. Himalaya.
Astragalus polyacanthus Wall. num. list. Nro. 5934.
 20. 5 *spinossissima* Benth. in Royle illustr. of the himal. mount. 198. Himalaya.
Astragalus spinossissimus Wall. num. list. Nro. 5935.
 Jacquem. voy. dans l'Inde IV, 37. t. 43.
 21. *flava* Poir. in enc. méth. suppl. II, 90. China borealis.
Robinia flava Lour. fl. cochinch. II, 556.

LXXIV. *Eversmannia* Bunge.

(Ed. Eversmann, professor bot. et zoolog. Kasanensis.)

1. 5 *hedysaroides* Bunge in Goeb. Reise in d. Stepp. d. suedl. Astrachan, Songaria.
 Russl. II, 267. t. 6.
Hedysarum subspinosum Fisch. in DC. prodr. II, 343.

LXXV. *Anthyllis* L.

(ἀνθύλλης teste Sprengelii Cressa cretica L. aut Ajuga Iva Schreb.)

- * 1. 5 *barba Jovis* L. cod. Nro. 5298. S. et Sm. fl. gr. t. 682. Europa australis,
Barba Jovis argrophylla Moench meth. 110. Oriens, Africa borealis.
Vulneraria argentea Lam. fl. franç. II, 651.
 2. 5 *splendens* Willd. sp. pl. III, 1018. Creta.
 3. *sericea* Lag. nov. gen. et sp. pl. 22. Hispania.
 4. *h podocéphala* Boiss. pl. nov. hisp. elench. 25. voy. d. le
 med. d'Esp. t. 48. Hispania.

LXXVI. *Astragalus* L.

(ἀστράγαλος, teste Spreng. apud Graecos Orobi species.)

A. *Stipulae petiolo ex apice indurato-spinoso adnatae* (Tragacantha).a) *Flores subsolitarii.*

1. 5 *trigonus* DC. astragalog. 186. Aegyptus.
 2. *mesoleios* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 91. Persia media.
 3. *leiocladius* Boiss. diagn. pl. orient. II, 62. Persia occidentalis.
 4. *cryptocarpus* DC. astragalog. 187. Armenia.
 5. *raphiodontus* Boiss. diagn. pl. orient. nov. IX, 96. Regn. cabulicum.
 6. *olympicus* Pall. sp. astrag. 4. t. 4. Asia minor occid.
leucophyllus Willd. sp. pl. III, 1331.
 7. *barba Jovis* DC. astragalog. 188. Armenia.
 8. 5 *Tournefortii* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 92. Asia minor orient.
 9. 5 *ericaulos* DC. astragalog. 188. Armenia.
 10. 5 *infestus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 95. Regn. cabulicum.
 11. 5 *anisacanthus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 103. Regn. cabulicum.
 12. 5 *Michauxianus* Boiss. diagn. pl. orient. II, 62. Persia occidentalis.
breviflorus β. DC. astragalog. 194.
 13. 5 *ericocephalus* Willd. sp. pl. III, 1333. Armenia.
breviflorus DC. astragalog. 194. t. 31.
 14. 5 *Scorpius* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 103. Persia australis.
 15. 5 *Russelii* Patr. Russ. nat. hist. of Aleppo. 2. ed. II, 260. t. 13. Syria borealis.
Rauwolfii Vahl symb. bot. I, 63. (sed pl. in Rauw. itin. depicta differt.)
 16. 5 *tumidus* Willd. in mém. de l'ac. d. sc. de Berl. 1794. 95. cl. Arabia petraea.
 de phil. exp. 26.
Forskahlei Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 101.
Colutea spinosa Forsk. fl. aeg. arab. 131.
 17. *songarica* C. Koch. Sibiria australis.
oligophyllus Schrenk in bull. de la cl. phys. math. de l'ac. de Pét. II, 197. (nec Boiss.) Mesopotamia.
 18. *Bruguieri* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 102. Mesopotamia.
 19. 5 *armatus* Willd. sp. pl. III, 1330. Africa boreali-occid.,
tumidus Willk. Strand- u. Stepp. Geb. d. iber. Halbins. 116. Hispania.
 β. *armatus* DC. prodr. II, 299.
Anthyllis tragacanthoides Desf. fl. atlant. II, 150. t. 194.
 20. 5 *fasciculifolius* Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 73. Persia.
 21. 5 *erinaceus* Presl in Abh. d. boehm. Acad. d. Wiss. 5. Folge III. Graecia (Cephalonia).

b) *Flor. 2—5 aut numerosi in ax. fol. sup. sessiles in capit. term. dispositi.*

22. 5 *leucacanthus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 93. Aegyptus.

23. *h* Sleberi DC. prodr. II, 295. Aegyptus, Sinai.
radicatus Dne in ann. d. sc. nat. 2. sér. III, 268. (teste Boiss.)
24. 5 *lasiosémius* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 96. Regn. cabulicum.
 25. 5 *genistoides* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 97. Regn. cabulicum.
26. 5 *cephalonicus* Presl in Abh. d. boehm. Acad. d. Wiss. 5. Folge III. Graecia (Cephalonia).
 27. *h* *Antábicus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 86. Syria borealis.
 28. *h* *diphtherites* Fenzl in Flora XXVI, 1. 396. Assyria.
 29. *h* *strictifolius* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 78. Persia occidentalis.
 30. *h* *Drusorum* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 78. Persia.
 31. *h* *amblólepis* Fisch. in Kotsch. pl. Kurd. Kurdistan.
 32. *h* *Arnacantha* Bieb. fl. taur. cauc. II, 205. Transcaucasia, Krim.
compactus β . Willd. sp. pl. III, 1334.
Poterium Pall. spec. astrag. 1. t. 1.
33. *h* *compactus* Lam. enc. méth. I, 322. Willd. in mém. de l'ac. d. sc. de Berl. 1794. 95. cl. de phil. exp. 29. t. 1. f. 1. Armenia, Transcauc.
 β minor DC. astragalog. 191.
 γ *pyncophyllus* Stev. in mém. de la soc. d. nat. de Mosc. IV, 57. Transcaucasia.
34. *h* *Meyeri* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 88. Transcaucasia.
compactus C. A. Mey. Verz. kauk. Pl. 143. (teste Boiss.)
35. *h* *denudatus* Stev. in mém. de la soc. d. nat. de Mosc. IV, 57. Transcaucasia orient.,
pyncophyllus var. *Hohenack*. enum. pl. Talsch. 109. Armenia.
microcéphalus Willd. sp. pl. III, 1332. (teste Boiss.)
36. *h* *filagineus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 89. Persia (mons Elbrus).
 37. *h* *gossýpinus* Fisch. in pl. Kotsch. kurd. Kurdistan.
 38. *h* *myriacanthus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 91. Persia australis.
 39. *h* *Lamarekii* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 82. Asia minor orientalis,
compactus β . Lam. enc. méth. I, 322. DC. astrag. t. 34. f. 2. Armenia.
40. 5 *aureus* Willd. in mém. de l'ac. de sc. de Berl. 1794. 95. Armenia, Transcauc.
cl. de phil. exp. 29. t. 1. f. 3. Persia media.
 41. *h* *chromólepis* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 84. Transcaucasia orient.
 42. 5 *Pseudo-Tragacantha* Pall. sp. astrag. 3. t. 3. Asia minor, Rumelia,
 43. 5 *plumosus* Willd. sp. pl. III, 1333. Sicilia.
siculus β . *Nebrodensis* Guss. fl. sic. syn. II, 316. (teste Guss.)
44. 5 *mollissimus* Presl in Abh. d. boehm. Acad. d. Wiss. 5. Folge III. Syria (Palaest.).
 45. 5 *creticus* Lam. enc. méth. I, 321. Sibth. et Sm. fl. gr. t. 736. Transcauc., Asia min.,
caspius Bieb. fl. taur. cauc. II, 204. (teste Boiss.) Sicilia, Hispania.
cretensis Pall. spec. astragal. 5.
Echinus DC. astragalog. 197. t. 34.
siculus Biv. giorn. d. Palerm. Nro. 4. (teste Boiss.)
Tragacantha Ucria hort. Panorm. 316.
 β *leucophyllus* Willd. sp. pl. III, 1331. (teste Boiss.)
46. 5 *verus* Oliv. voy. de l'emp. Oth., Eg. et la Pers. III, 192. t. 44. Persia.
 47. 5 *sétifer* DC. prodr. II, 296. (species dubia.) Oriens.
 48. 5 *Tmolus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 79. Asia minor occident.
plumosus β . *tomentosus* Boiss. pl. anatol.
49. 5 *Parnassi* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 80. Graecia.
aristatus S. et Sm. fl. gr. t. 737.
50. 5 *thracicus* Gris. spec. fl. Rum. et Bith. I, 55. Rumelia.
Pseudo-Tragacantha d'Urv. enum. pl. ins. Archip. et litt. pont. Eux. 82.
51. *h* *globiflorus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 81. Persia (m. Elbrus).
 52. *h* *ptilódes* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 81. Asia minor.
 53. *h* *cruentiflorus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 82. Creta.
creticus DC. astragalog. 196. t. 33. (sed corolla alba et purpureo-striata.)
54. *h* *ochrochloros* Boiss. et Hoh. in Boiss. diagn. pl. nov. or. IX, 83. Persia occidentalis.
 55. *h* *Bethlehemiticus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 85. Syria.
 56. *h* *lepidanthus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 85. Syria borealis.
 57. *h* *Talagonicus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 87. Persia (mons Elbrus).
 58. *h* *Prusianus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 88. Asia minor occident.
 59. *h* *argyrothamypus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 89. Syria orientalis.
 60. 5 *condensatus* Led. fl. ross. I, 639. Transcauc. occident.
 61. *h* *erianthus* Willd. sp. pl. III, 1332. Armenia.
 62. *h* *Mitchellianus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 80. Asia minor.
 63. *h* *oleaeifolius* DC. astragalog. 192. Oriens.
pugniformis Willd. sp. pl. III, 1335.
64. *h* *deinacanthus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 76. Syria.
 65. *h* *Hasbeyanus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 77. Syria orientalis.

66. *h longifolius* Lam. enc. méth. I, 322. DC. astragalog. t. 30.
pugniformis l'Herit. stirp. nov. aut. min. cogn. 170. Armenia.
67. *h andraehnaefolius* Fenzl pug. pl. nov. Syr. I, 4. Asia minor austr.
68. *5 gummifer* Labill. observ. s. la phys., s. l'hist. nat. etc.
XXXVI, 1. 46. t. 1. Syria.
69. *5 strobilifer* Lindl. in bot. reg. XXVII. misc. 39. Nro. 71. Armenia media.
- c) Capitula sessilia distantia.*
70. *h kurdicus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 84. Kurdistan.
71. *h psilodontius* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 86. Syria.
72. *5 crenophilus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 90. Kurdistan.
73. *5 brachycalyx* Fisch. in Kotsch. pl. Kurd. Kurdistan.
74. *5 caucasicus* Pall. sp. Astrag. 2. t. 2. Transcauc., Armenia.
75. *5 floccosus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 61. Persia australis.
76. *5 Roussæanus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 61. Coelosyria.
gummifer β . hispidulus DC. astragalog. 190.
verus DC. prodr. II, 296.
77. *5 Royleanus* C. Koch. Himalayae montes.
strobilifer Royle ill. of the himal. mount. 199. Jacquem.
voy. d. l'Inde IV, 45. t. 47. (nec Lindl.)
- d) Pedunculi axillares breves pauciflori.*
78. *h psilacanthus* Boiss. diagn. pl. nov. or. IX, 97. Regn. cabulicum.
79. *h ovigerus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 67. Regn. cabulicum.
Phaca ovigera Boiss. diagn. pl. nov. orient. VI, 35.
80. *5 jubatus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 104. Regn. cabulicum.
81. *5 polyacanthus* Royle illustr. of the himal. mount. 199. Himalaya.
82. *5 Grahamicus* Royle illustr. of the himal. mount. 199. t. 36. f. 2. * Himalaya.
83. *h echinoides* (nec echinoides Willd. sp.) l'Herit. stirp. nov.
aut. min. cogn. 170. Creta, Asia minor.
creticus Willd. in mém. de l'acad. d. sc. de Berl. cl. de
phil. exp. 1794. 95. p. 23. t. 2. f. 2.
84. *h Poterium* Vahl symb. I, 63. Hispania.
granatensis Lam. enc. méth. I, 321.
Tragacantha β . L. cod. Nro. 5617.
85. *h retusus* Willd. in mém. de l'ac. d. sc. de Berl. 1794. 95.
cl. de phil. exp. 24. t. 2. f. 3. Oriens.
- * 86. *h Tragacantha* L. cod. Nro. 5617. Pall. sp. astrag. t. 4. f. 1. 2. Gallia australis.
Massiliensis Lam. enc. méth. I, 320.
- β) *obtusifolia* Willd. in mém. de l'acad. d. sc. de Berl.
1794 et 95. cl. de phil. exp. 21.
- * 87. *h aristatus* l'Herit. stirp. nov. aut. min. cogn. 170. Europa austr., ? Persia,
sempervirens Lam. enc. méth. I, 320. Transcaucasia.
siculus DC. prodr. II, 297. (teste DC.)
Tragacantha Vill. hist. d. pl. du Dauph. III, 470.
Phaca aristata Clairv. man. d'herbor. en Suisse 133.
- *Tragacantha* All. fl. pedem. I, 338.
88. *h Nevadensis* Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 63. Hisp. austr., Graecia.
aristatus β . australis Boiss. voy. d. le midi d'Esp. II, 180.
89. *h Caraganae* F. et M. in Hoh. enum. pl. Talsch 108. Transcauc. austr.-or.
90. *h jodótropis* Boiss. et Hoh. in Boiss. diagn. pl. nov. or. IX, 100. Persia (m. Elbrus).
91. *5 Clusii* Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 101. Himalaya.
fruticosus Asso oryctogr. Arag. 177. t. 2. f. 2.
92. *5 lycioides* Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 66. Persia media.
93. *h hórridus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 66. Asia minor, Persia.
94. *h curviflorus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 67. Persia australis.
95. *h múlticeps* Wall. num. list. Nro. 5237. Royle ill. of the
him. mount. 199. * Himalaya.
- e) Pedunculi folio subaequales aut longiores; Flores racemost aut spicatt.*
96. *h tortuosus* DC. prodr. II, 299. Mesopotamia.
97. *h submitis* Boiss. et Hoh. in Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 100. Persia (m. Elbrus).
98. *h Hermóneus* Boiss. et Hoh. diagn. pl. nov. orient. IX, 94. Syria (Libanon).
99. *h Tymphresteus* Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 63. Syria.

100. *h* macrosemius Boiss. diagn. pl. nov. orient. IX, 93. Persia (m. Elbrus).
 101. *h* angustifolius Lam. enc. méth. I, 321. Armenia, Rumelia,
 β) bracteatus Gris. spic. fl. Rum. et Bith. I, 57. Italia inferior, Sardinia,
 γ) carina apice atropurpurea; Sirinicus Ten. fl. neap. Corsica.
 prodr. app. 5. 25. fl. Napl. t. 171. f. 1. (teste Gris.)
 Genargenteus Mor. elench. pl. Sard. I, 11.
 Massiliensis β. montanus Mut. fl. franc. I, 284.
 δ) carina apice violacea; angustifolius Sibth. et Sm. fl. gr. t. 734.
 102. *h* flavescens Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 64. Asia minor occid.
 103. *h* mucronifolius Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 68. Persia media.
 104. *h* coluteoides Willd. in mém. de l'ac. d. sc. de Berl. 1794
 et 95. cl. de phil. exp. 27. Syria.
 Damascenus DC. prodr. II, 298. (teste Boiss.)
 retusus DC. astragalog. 205. t. 35.
 Anthyllis tragacanthoides Labill. ic. pl. Syr. rar. II, 16. t. 9.
 105. 5 murinus Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 72. Persia media.
 106. *h* microphysus Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 71. Persia.
 107. 5 remotiflorus Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 72. Persia australis.
 108. 5 ptychophyllus Boiss. diagn. pl. nov. orient. VI, 42. Persia australis.

f) *Pedunculii crassi, breves; Spica caulis densa, ovata aut cylindrica.*

109. *h* vestitus Boiss. et Heldr. in Boiss. diagn. pl. nov. or. IX, 98. Asia minor austr.
 110. *h* sciureus Boiss. et Hoh. in Boiss. diagn. pl. nov. or. IX, 98. Persia (m. Elbrus).
 111. 5 Susianus Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 64. Kurdistan, Pers. austr.
 112. 5 erythrolepis Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 65. Persia media.
 113. *h* brachypodus Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 68. Persia.
 114. *h* glumaceus Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 68. Persia.

g) *Pedunculii folio subaequales aut longiores; Capitulum densum.*

115. 5 campylanthus Boiss. diagn. pl. nov. orient. VI, 42. Persia australis.
 116. *h* bunophilus Boiss. et Hoh. diagn. pl. nov. orient. IX, 99. Persia media.
 117. *h* Hohenackeri Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 70. Transcaucasia.
 118. *h* tricholobus DC. prodr. II, 299. Oriens, Transcaucasia
 β) minor Hoh. enum. pl. Talyseh 109. australi-orientalis.
 119. *h* Reuterianus Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 71. Persia australis.
 120. *h* ebenoides Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 70. Persia media.
 121. *h* argyrostachys Boiss. diagn. pl. nov. orient. VI, 41. Persia media.
 122. *h* cephalanthus DC. astragalog. 211. t. 38. Persia.
 123. *h* vaginans DC. astragalog. 210. t. 37. Oriens.
 124. *h* chrysostachys Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 69. Persia media.
 125. *h* lagopoides (lagopodioides alior.) Lam. enc. méth. I, 322. Armenia.
 Lagurus Willd. in mém. de l'ac. d. sc. de Berl. 1794. 95.
 cl. de phil. exp. 26. t. 1. f. 2.
 126. *h* persicus F. et M. ind. I. sem. hort. Petrop. 3. Armenia, Transc. or.,
 lagopodioides Vahl symb. bot. I, 64. Willd. in mém. de Pers. occid., Kurdistan.
 l'ac. d. sc. de Berl. 1794. 95. t. 1. f. 4.
 lagopoides β. Lam. enc. méth. I, 312.
 Lagurus Eichw. pl. nov. aut. min. cogn. casp. cauc. 6. 31.
 β) taenirolepis Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. et in diagn. pl. nov. or. IX, 99.
 127. *h* pungens Willd. sp. pl. III, 1325. Asia minor borealis.
 bracteolatus DC. astragalog. 208.
 128. *h* mesopotamicus Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 68. Mesopotamia.

B. *Stipulae petiolo ex apice non indurato-spinoso adnatae.*

129. *h* scleropodius Led. fl. alt. III, 326. icon. pl. fl. ross. t. 295. Sibiria australis.
 130. *h* xanthotrichus Led. fl. alt. III, 324. icon. pl. fl. ross. t. 296. Sibiria australis.
 131. *h* cystalix Led. fl. ross. I, 643. Sibiria australis.
 physocalyx Kar. et Kir. bull. de la soc. d. nat. de Mosc. XV, 409.
 132. *h* melanotrichus Led. fl. alt. III, 323. icon. pl. fl. ross. t. 294. Sibiria australis.
 133. 5 dendroides Kar. et Kir. in bull. de la soc. d. nat. de Mosc. XV, 339. Sibiria.
 134. *h* intermedius Kar. et Kir. bull. de la soc. d. nat. de Mosc. XV, 340. Sibiria.
 135. *h* Turczinawii Kar. et Kir. bull. de Mosc. XV, 342. Songaria.
 136. *h* Ammodytes Pall. Reis. nach versch. Prov. d. russ. R. II.
 app. p. 742. t. X. spec. astrag. t. 5. Sibiria.
 β) albiflorus Led. fl. ross. I, 658.

- C. *Stip. a petiolo liberae, sed inter se connatae; Flor. purpurei aut rarius albi.*
137. *h* maritimus Mor. fl. sard. I, 523. Sardinia.
 138. *h* psoraleoides Lam. enc. méth. I, 317. DC. astragalog. t. 18. f. 2. Oriens.
 139. *h* hyrcanus Pall. Astrag. 25. t. 22. Littora maris caspii,
 β) Lehmannianus Bge in Arb. d. naturf. Ver. in Riga, I, 235. Tataria.
 γ) turcomanicus Bge in Arb. d. naturf. Ver. in Riga, I, 235.
 140. 5 Gebleri Fisch. in Bong. et Mey. suppl. fl. alt. Nro. 79. Sibiria.
 141. 5 brachypus Schrenk enum. pl. nov. 69. Sibiria australis.
 142. 5 paucijugus Schrenk in bull. de l'ac. de St. Pétersb. cl. phys. math. II, 196. Sibiria australis.
 Sibiria australis.
 143. 5 arborescens Bge in Arb. d. naturf. Ver. in Rig. I, 229. Tataria.
 144. *h* leptocaulis Led. fl. alt. III, 296. icon. pl. fl. ross. t. 284. Sibiria australis.
 145. 5 unifolius Bunge in Arb. d. naturf. Ver. in Rig. I, 231. Tataria.
 146. *h* Karakugensis Bunge in Arb. d. naturf. Ver. in Rig. I, 232. Tataria.
 147. 5 Ammodendron Bunge in Arb. d. naturf. Ver. in Rig. I, 233. Tataria.
- D. *Stipulae inter se et a petiolo liberae; Flores purpurascentes et albi*
148. *h* scleróxylon Bge in Arb. d. naturf. Ver. in Rig. I, 241. Tataria.
 149. *h* polyceras Kar. et Kir. bull. de la soc. d. nat. de Mosc. XV, 332. Sibiria australis.
 150. *h* suffruticosus DC. astragalog. 82. Sibiria transbaical.
 151. *h* arcuatus Kar. et Kir. in bull. de la soc. d. nat. de Mosc. XIV, 406. Sibiria australis.
 152. *h* Arbúscula Pall. astrag. p. 19. t. 17. *Sibiria australis.
 153. 5 horizontalis Kar. et Kir. bull. de la soc. d. nat. de Mosc. XIV, 406. Songaria.
 * 154. *h* fruticosus Pall. spec. Astrag. 21. t. 19. Rossia austr. et orient.
 vimeus Pall. spec. Astrag. 24. t. 21. Sibiria.
 Odessanus Bess. enum. pl. Pod. Volh. etc. 30.
 155. *h* Eremothamnus Kar. et Kir. bull. de l'acad. de Mosc. XV, 334. Sibiria australis.
- Trib. 7. *Loteae (Fol. 3-, rarius 5—11nata; Leg. continuum, rarius nucleosum; Cotyl. serius foliaceae).*

LXXVII. *Medicago* L.(μαρδικη, herba pabularia, haud dubie *Medicago sativa* L., Luzernerklée.)

- * 1. 5 arborea L. cod. Nro. 5712. Mor. fl. sard. I, t. 35. Italia, Graecia.
 2. 5 arborescens Presl fl. sic. I, p. XX. Sicilia.

LXXVIII. *Bonjeania* Rehb. (nec *Bonjeannia* Mor.)

(in honorem dom. Bonjean, botanici Cambrayensis.)

- * 1. *h* recta Rehb. fl. exc. 507. Europa australis,
 Dorycnium rectum Ser. in DC. prodr. II, 208. Africa boreali-occid.
 Gussonea recta Parlat. rar. pl. et haud cogn. Sicil. fasc. I, 6. f. 1.
 Lotus glomeratus Lam. fl. frang. II, 633.
 - *rectus* L. cod. Nro. 5698.

LXXIX. *Dorycnium* Tourn. (nec *Dorychnium* Boreau.)

(a. v. δορυ, hasta, Lanze, apud Graecos planta dubia, sed venenata et ab incolis hastis veneno imbuendis adhibita.)

- * 1. *h* latifolium Willd. sp. pl. III, 1397. Transcauc., Asia min.
 ibericum Willd. enum. pl. hort. Berol. suppl. 52. Aegyptus, Graecia,
 Lotus latifolius Sm. prodr. II, 107. Buxb. pl. min. cogn. Rumelia.
 cent. I. t. 32. f. 1.
 ? *Ononis quinata* Forsk. fl. aeg. arab. 130. (teste DC., sed
 diversa, *Anthyllidi argenteae* Dsv. similis.)
 2. 5 *Pseudo-Cytisus* C. Koch. Orientis terrae austr.
 Anthyllis argentea Dne in ann. d. sc. nat. I. sér. IX, 408.
 (teste Boiss., sed certe diversa.)
 - *Pseudo-Cytisus* Walp. repert. bot. II, 846.
 Cornicina Pseudo-Cytisus Boiss. diagn. pl. nov. orient. II, 15.

LXXX. *Hosackia* Dougl.

(David Hosack, botanices professor Novo-Eboracensis, † 1835.)

1. *h* *cytisoides* Benth. in transact. of the Linn. soc. XVII, 365. California.
 β) *rubescens* Torr. et Gr. fl. of N. Amer. I, 324.

2. *h sericea* Benth. in *transact. of the Linn. soc.* XVII, 365. California.
 3. *h prostrata* Nutt. in *Torr. et Gr. fl. of N. Amer.* I, 325. California.
 4. *h júncea* Benth. in *transact. of the Linn. soc.* XVII, 365. California.
 5. *h crassifolia* Nutt. in *Torr. and Gr. fl. of N. Amer.* I, 325. California.
 6. *h scopária* Nutt. in *Torr. and Gr. fl. of N. Amer.* I, 325. California.
Syrmatium glabrum Vog. in *Linn.* X. 591.

LXXXI. *Lupinus* L.

(Lupinus et Lupinum apud Latinos: L. albus L.)

1. *h álbigrons* Benth. in *transact. of the hort. soc. new ser.* I, 410. bot. reg. t. 1642. California.
 2. *h holosericeus* Nutt. in *Torr. and Gr. fl. of N. Amer.* I, 380. America occid.-boreal.
 3. *h Douglasii* Agardh *syn. gen. Lup.* 34. California.
 4. *h flexuosus* Lindl. in *Ag. syn. gen. Lup.* 34. Oregon.
 5. *h macrocarpus* Hook. and Arn. in *bot. of Beech. voy.* 138. California.
 6. *h decumbens* Torr. in *Ann. lyc. New-York* II, 191. Arkansas.

LXXXII. *Onónis* L.

(ὄνωνις, derivatione incerta, apud Graecos sine dubio Ononis antiquorum L.)

A. *Natrix*; Flores flavi.

1. *h crispa* L. *cod. Nro.* 5286. S. et Sm. fl. gr. t. 680. Hispania.
Natrix crispa Mneh *meth. suppl.* 54.
 2. *h hispanica* L. fl. *suppl.* 324. nec DC. *bot. mag.* t. 2450. Hispania.
 3. *h aragonensis* Asso *syn. stirp. indig. Arag.* 96. t. 6. f. 2. Pyrenaeus, Hispania.
dumósa Lapeyr. *hist. arb. d. pl. d. Pyr.* 410.
 4. *h speciosa* Lag. *gen. et sp. pl.* 294. Boiss. *voy. d. le mid.* d'Esp. 443. t. 44. Hispania.
 5. *h júncea* Asso *syn. stirp. ind. Arag.* 96. t. 5. f. 2. Hispania.

B. *Natrídium*; Flores purpurascéntes, rarius albi, pedunculati.

- * 6. *h rotundifolia* L. *cod. Nro.* 5288. *bot. mag.* t. 335. Pyrenaeus, Gallia,
latifolia Asso *mont. stirp. indig. Arag.* t. 11. f. 1. (in *syn. Helvetia, Italia super.,*
Nro. 676. sine nomine.) Tyrol.
Natrix rotundifolia Mneh *meth.* 158.
 7. *h tribracteáta* DC. fl. *franc. suppl.* 553. Austria, Gallia.
rotundifolia L. *sp. pl.* 2. edit. 1050. (teste DC.)
 * 8. *h fruticósa* L. *cod. Nro.* 5287. *bot. mag.* t. 317. Gallia, Hispania.
purpurea Mill. *diet.*
Anonis fruticosa Medik. *phil. Bot.* I, 206.
Natrix fruticosa Mneh *meth.* 158.
 β) *microphylla* DC. *prodr.* II, 161.
 9. *h tridentáta* L. *cod. Nro.* 5285. *Cav. icon.* II, t. 152. Hispania.
Arbúscula Desv. *journal. de bot.* 1814. I, 46.
 10. *h rígida* Kunze in *Flora XXIX*, 634. Hispania.
 11. *h crassifolia* Dufour in DC. *prodr.* II, 161. Hispania.
tridentáta β. *canescens* DC. *prodr.* II, 161.
 - *var.* 2. Asso *syn. stirp. ind. Arag.* p. 95. *Nro.* 671.
 γ) *nitricata* Willk. *Str. u. Stepp. d. iber. Halbins.* 114.
 12. *h angustíssima* Lam. *enc. méth.* I, 508. *Barr. pl. p. Gall.* Hispania.
Hisp. et It. obs. icon. exh. t. 299.
angustifolia G. Don *dichl. pl.* II, 160.

C. *Bugrana*; Flores purpurei, rarius albi, subsessiles.

- * 13. *h antiquorum* L. *cod. Nro.* 5265. Oriens, Europa austr.
spinosa Bert. fl. *ital.* VII, 369. et *omn. flor. ital.*
Bonaga antiquorum Medik. *phil. Bot.* I, 206.
 β) *inermis*; foetens All. fl. *pedem.* I, 317. t. 41. f. 1.
 γ) *biflora*; *arvensis* All. fl. *pedem.* I, 316.
 * 14. *h altíssima* Lam. *enc. méth.* I, 508. Europa, Sibiria,
hircina Jacq. *hort. Vindob.* t. 93. Tataria, Oriens.
hircina Retz *obs.* II, 21. et L. *sys. nat.* 10. edit. II, 478.
spinosa *var. a. mitis* L. *sp. pl.* I. ed. 1006. (*var.* 2. in ed. 2.)
Bonaga hircina Medik. *philos. Bot.* I, 206.
Anonis arvensis Moench *meth.* 157.
 β) *spinescens* Led. fl. *ross.* I, 513.

15. *h* *macracantha* (nec *macrantha*) Clarke trav. in var. countr.
of Eur., As. and Afr. II, 1. 354. Cypria.
Saxonia.
Europa.
16. *h* *violacea* Peterm. in Rab. bot. Centr. 1846. 45.
- * 17. *h* *spinosa* L. cod. Nro. 5285. Gu. Abb. d. d. Holzarz. t. 124.
antiquorum Lindl. syn. of the brit. fl. ed. 2. 322.
arvensis Bert. fl. ital. VII, 372.
- β . Smith fl. brit. II, 758.
campestris Koch et Ziz cat. pl. palat. p. 22. Sturm Heft 72.
senescens Lapeyr. hist. abr. d. pl. d. Pyrén. 405.
Anonis spinosa Moench meth. 157.
Bonaga arvensis α . Medik. phil. Bot. I, 206.
 β) *angustifolia* Wallr. sched. crit. 379.
- * 18. *h* *repens* Koch syn. ed. 2. 173. Sturm Deutschl. Fl. 72. Europa, Tataria,
? Himalaya.
antiquorum β . Bert. fl. ital. VII, 369.
arvensis Lam. enc. méth. I, 505. et Sm. fl. brit. II, 758. (exc. var. β .)
procurrens Wallr. sched. crit. 381.
Bonaga arvensis β . Medik. phil. Bot. I, 206.
 β) *mitis* Gmel. fl. bad. III, 162.
 γ) *cadúca* Vill. hist. d. pl. du Dauph. III, 428.
 δ) *maritima*; *repens* L. cod. Nro. 5266.
19. *h* *diacantha* Sieb. in Rehb. pl. crit. I, f. 15. Oriens.
antiquorum J. et Sp. ill. pl. nov. t. 154. et Rehb. pl. crit. f. 14.

D. Species incertae, forte e genere expellendae?

20. *h* *rosaefolia* DC. mém. VI. sur la fam. d. Legum. 221. Hispania.
aragonensis β . Lam. enc. méth. I, 510.
21. *h* *cicerifolia* DC. mém. VI. sur la fam. d. Legum. 222. ? Oriens.

LXXXIII. Crotalaria L.
(crotalum, die Klapper.)

1. 5 *eriantha* S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 121. Japonia.
2. *h* *elliptica* Roxb. fl. ind. III, 279. China, India orientalis.
Cyrtolobus ellipticus Wall. num. list. Nro. 5433.
3. 5 *cytisoides* Roxb. hort. beng. 54. fl. ind. III, 276. Nepal, India orientalis.
psoraleoides Don prodr. fl. nep. 242.
Priotropis cytisoides W. et Arn. prodr. fl. pen. Ind. orient. I, 189.

LXXXIV. Aspalathoides DC. (sectio Anthyllis.)
(ἀσπλάθος, teste Sprengel Calycotome villosa Lk, nunc genus Genistearum et species austro-africanas amplectens, et εἶδος, visus, Ansehen.)

1. 5 *Cytisi* C. Koch. Hispania, Gallia.
Anthyllis cytisoides L. cod. Nro. 5300.
2. 5 *Genistae* C. Koch. Hispania.
Anthyllis Genistae Duf. in DC. prodr. II, 169.
Genista terniflora Lag. gen. et sp. pl. 22.
3. 5 *Hermaniae* (nec *Hermanniae* Aut.) C. Koch. Sicil., Corsica, Graecia,
ins. Archipelag. graeci,
Creta, Palaestina.
Anthyllis Hermaniae L. cod. Nro. 5301. bot. mag. t. 2576.
Sibth. et Sm. fl. gr. t. 683.
Aspalathus erinacea Lam. enc. méth. I, 291.
Barba Jovis linearifolia Moench (teste Steud., sed ubi?).
Cytisus graecus L. cod. Nro. 5446. (teste Sm.)
4. 5 *Aspalathi* C. Koch. Oriens, Creta.
Anthyllis Aspalathi DC. prodr. II, 169.
Aspalathus cretica L. cod. Nro. 5223.
Spartium creticum Desf. tabl. de l'éc. de bot. 185.

LXXXV. Pterospartum Spach (Genistae sectio.)
(πτερόν, ala, Fluegel et σπάρτον, spartium, Pfiemenkraut.)

1. 5 *lasianthum* C. Koch. Hispania.
Genista lasiantha Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 147.
- *tridentata* Bark. Webb it. hisp. 50.
2. 5 *scolopéndrium* C. Koch. Lusitania.
Genista scolopéndria Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 148.
3. 5 *stenópteron* C. Koch. Lusitania.
Genista stenóptera Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 148.
- *tridentata* L. cod. Nro. 5204. var. β .

4. 5 *cantabrica* C. Koch. Hispania.
Genista cantabrica Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 941.
 5. 5 *tridentata* C. Koch. Penins. pyrenaica,
Genista tridentata L. cod. Nro. 5204. Africa boreali-occid.,
 β) *undulatum* Lk Anl. z. Kennnt. d. nutzbar. Gew. ? Istria.
 II, 150 (sub *Genista*).

LXXXVI. *Genista* L. (Spach).

(teste Ruellii a voce genu, Knie, teste aliorum a voce celtica Gen, parvus frutex, kleiner Busch.)

A. Legumen breve, inflatum.

1. 5
- barbara*
- Munb. in Duch. rev. bot. II, 503. (an
- Retamae*
- sp.?) Algeria.

B. Legumen breve, compressum; Semina biserialia.

a) *Inermis; Folia (saltem pleraque) opposita, ternata, stipulata.*

- * 2. 5 *radiata* Scop. fl. carn. II, 51. Europa orientalis,
Cytisus radiatus Koch Deutsohl. Fl. V, 111. Helvetia, Hungaria,
Spártium radiatum L. cod. Nro. 5198. Guimp. Abb. d. Transsylvania.
 deutsch. Holzart. t. 115. bot. mag. t. 2260.
Telinaria radiata Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 565.
 β) *leiopétala* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 240.
 γ) *nana* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 240.
 3. 5 *holopétala* Rechb. fl. Germ. exsicc. Carniolia.
radiata β. *nana* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 240.
Cytisus holopétalus Fleischmann in Maly enum. pl. imp. Austr. 347.
Telinaria holopétala Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 566.

b) *Inermis; Folia (saltem pleraque) opposita, ternata, exstipulata.*

4. 5 *Auchéri* Boiss. diagn. pl. orient. II, 7. Asia minor orientalis.
 5. 5 *cappadocica* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 242. Asia minor orientalis.
 6. 5 *Jaubértii* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 242. Jaub. et
 Sp. ill. pl. orient. II, t. 141. Asia min. occidentalis.

c) *Inermis; Folia omnia alterna, simplicia.*

7. 5 *cephalanth* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 254. Exp. Algeria.
 de l'Alg. t. 85. f. 1.
 8. 5 *libanotica* Boiss. diagn. pl. or. nov. IX, 3. Syria (Libanon).

d) *Inermis; Folia alterna aut ternata (saltem pleraque) exstipulata.*

9. 5 *spartioides* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 243. Mauritania (Algeria).
 10. 5 *biflora* DC. prodr. II, 146. Hispania australis,
Spartium biflorum Desf. fl. atl. II, 133. t. 179. Africa borealis media.
Telinaria biflora Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 566.
 β) *plumosa* Boiss. del. pl. hisp. 23. voy. d. le mid. d'Esp. II, 143.
 * 11. 5 *numidica* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 244. Regnum tunetanum.
 12. 5 *Gasparrini* (nec *Gasparini* Walp.) Presl fl. sic. I, p. XIX. Sicilia.
ephedroides Guss. fl. sic. II, 365.
Spartium Gasparrini (nec *Casparrinna* Loud.) Guss. ind.
 sem. hort. Boccadif. 1825, 11.
 13. 5 *ephedroides* DC. mém. sur la fam. d. Légum. VI, 210. t. 36. Sardinia et Corsica.
gymnóptera Dub. bot. gall. ed. 2. app. 1008.
Spartium ephedroides Spreng. syst. veg. IV, 2. 266.
 - *gymnóptera* Viv. fl. cors. prodr. app. 61.

e) *Spinescens; Folia (saltem pleraque) opposita, ternata, exstipulata.*

14. 5 *Alpiní* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 247. Graecia et Oriens.
acanthóclada DC. prodr. prodr. II, 147. (ex p.)
Lobelii d'Urv. enum. pl. Archip. et pont. Eux. 85.
Spartium acanthócladum Spreng. syst. veg. IV, 2
 - *hórridum* S. et Sm. prodr. fl. gr. II, 54. fl. gr. t. 674. (teste Spach).
 15. 5 *Bruguieri* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 248. Graecia.
acanthóclada DC. prodr. II, 146. (ex p.)
 16. 5 *Friedrichsthaliana* Walp. in ann. bot. syst. I, 219. Graecia.
Telinaria Friedrichsthaliana Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 566.

17. *h*⁵ *Echinus* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 249. Asia minor.
18. *h*⁵ *peloponnesiaca* Spach in ann. d. d. sc. nat. 3. sér. II, 249. Graecia.
- f) *Spinosa; Folia simplicia aut abortiva, stipulata.*
19. 5 *fasselata* (rectius *sphacelata* Spach) Dne in ann. d. sc. nat. Syria, ins. Archipelag.
2. sér. IV, 360. J. et Sp. ill. pl. or. II, t. 142.
- g) *Spinescens; Folia opposita et ternata, stipulata.*
20. 5 *horrída* DC. fl. franç. IV, 500. Hispania, Gallia.
erinácea Gilib. bot. II, 259 c. ic.
lusitanica Desf. tabl. de l'éc. de bot. 184. (teste DC.)
? radiata Vill. hist. d. pl. de Dauph. III, 419. (teste DC.)
Spartium horridum Vahl symb. bot. I, 51.
Telinaria horrida Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 566.
β) *eriocalyx* Boiss. voy. d. le mid. de l'Esp. II, 725.
21. 5 *Webbii* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 252. Hispania.
horrída Bark. Webb. it. hisp. 51.
22. 5 *Boissieri* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 253. Hispania.
lusitanica Boiss. voy. d. le mid. de l'Esp. 140. (ex p.)
23. 5 *lusitanica* ? Brot. fl. lusit. II, 88. Lusitania.
? *pendúlina* Gilib. (ubinam ?)
β) *aphylla*; *lusitanica* L. cod. Nro. 5213. bot. repos. t. 419.
- h) *Spinescens; Folia alterna, simplicia, plerumque exstipulata.*
24. *h* *sylvestris* Scop. fl. carn. II, 51. Sturm Deutschl. fl. Heft 49. Illyria, Dalmatia,
hispanica Wulff. in Jacq. collect. II, 165. Jacq. icon. Croatia, Litorale.
pl. rar. III, 557.
Cytisus sylvestris Vis. fl. dalm. III, 268.
25. *h* *arcuata* Koch syn. ed. 2. p. 168. Dalmatia, Croatia, Illyria.
26. 5 *dalmatica* Bartl. et Wendl. Beitr. z. Bot. II, 74. Rechb. icon. IV, 562. Dalmatia, Istria.
hispanica Host fl. austr. II, 313. (teste Vis.)
Cytisus sylvestris β. *pungens* Vis. fl. dalm. III, 269.
Spartium dalmaticum Spreng syst. veget. IV, 2. 226.
27. *h* *Michellii* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 259. Italia inferior.
dalmatica Ten. syll. fl. neap. 344.
hirsuta Ten. fl. Nap. II, 130.
28. *h* *aristáta* Presl del. Prag. I, 34. Sicilia.
29. *h* *germanica* L. cod. Nro. 5211. Gu. Abb. d. d. Holzart. t. 122. Italia superior
villosa α. Lam. fl. franç. II, 615. media, imp. austriacum,
Cytisus germanicus Vis. fl. dalm. III, 268. Gallia, Rossia,
Scorpius spinosus Munch meth. 134. Germania.
Voglera spinosa Fl. d. Wett II, 500.
β) *inermis* Koch syn. ed. 2. 168.
30. 5 *h* *Welwitschii* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 262. Hispania.
31. 5 *hirsuta* Vahl symb. bot. I, 51. Penins. pyrenaica,
cuspidata Steud. nom. bot. I, 669. Africa boreali-occid.
hirsuta β. *cuspidata* DC. prodr. II, 148.
tricuspidata var. *villosa* Dsf. fl. atl. II, 138.
Spartium cuspidatum Cav. anal. scienc. 1801. 56.
32. 5 *algarbiensis* Brot. fl. lusit. II, 89. Penins. pyrenaica.
hirsuta δ. *algarbiensis* DC. prodr. II, 148.
33. 5 *lanuginosa* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 264. Hispania.
hirsuta DC. prodr. II, 148.
34. *h* *erioclada* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 264. Algeria.
35. *h* *atlantica* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 265. Expéd. Algeria.
de l'Alg. t. 87. f. 1.
36. *h* *Olivieri* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 266. J. et Sp. Asia minor.
ill. pl. or. II, t. 144.
hirsuta γ. *orientalis* DC. prodr. II, 148.
37. *h* *orientalis* Spach. in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 267. J. et Sp. Asia minor.
ill. pl. or. II, 145. Asia minor.
38. *h* *anatolica* Boiss. diagn. pl. orient. II, 8. Asia minor.
39. 5 *h* *ulicina* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 268. Asia minor.
40. *h* *Cassia* Boiss. diagn. pl. orient. IX, 3. Syria borealis.
41. *h* *Tournefortii* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 269. Lusitania.

42. *h* *decipiens* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 270. Lusitania.
germanica Brot. fl. lusit. II, 90.
43. *h* *aprutia* Walp. in ann. bot. syst. I, 219. Italia inferior.
Telinaria aprutia Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 566.
44. 5*h* *hispanica* L. cod. Nro. 5212. Cav. ic. et descr. III, t. 211. Hispania, Nicaea,
? aegyptiaca Spreng. nov. prov. hort. Hal. et Berol. 20. Gallia, Dalmatia,
villosa Poir. voy. in Barb. II, 207. Aegyptus, Africa boreal.
 - β . Lam. fl. franç. II, 615.
Spartium hispanicum Coll. herb. ped. II, 57.
Telinaria hispanica Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 566.
45. 5*h* *Duriaei* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 271. Algeria.
46. 5*h* *tricuspidata* Dsf. fl. atl. II, 138. t. 183. Africa borealis.
47. *h* *Gibraltarica* DC. prodr. II, 148. Marocco, Hisp. austr.
- i) Spinescens; Folia alterna (saltem pleraque) ternata.*
48. *h* *juniperina* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 275. Algeria.
 β) *inermis* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 275.
49. *h* *scorpioides* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 276. Hispania.
50. *h* *triacanthos* Brot. fl. lusit. II, 89. phytogr. t. 54. Pen. pyren., Corsica,
ericetorum Hoffm. sgg, sed ubi? Marocco.
lusitanica Andr. bot. repos. t. 419. (teste Spach)
rostrata Poir. enc. méth. suppl. II, 719.
 β) *galioïdes* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 277.
 γ) *interrupta* Cav. anal. scienc. 1801. IV, 58. (sub Spartio.)
51. *h* *Cupani* Guss. cat. hort. bot. in Boccad. a. 1821, 27 et 77. Sicilla.
rigens Presl delic. Prag. I, 34.
Spartium Cupani Spreng. syst. veg. III, 177.

C. Legumen elongatum.

a) Spinæ axillares (saltem partim); Semina biserialia.

52. *h* *falcata* Brot. fl. lusit. II, 89. phytogr. 133. t. 55. Lusitania.
- * 53. *h* *anglica* L. cod. Nro. 5210. Gu. Abb. d. d. Holzart. t. 121. Europa media,
britannica Hort. Calabria.
minor Lam. fl. franç. II, 615.
Telinaria anglica Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 566.
54. *h* *ancistrocarpa* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 105. Hispania.
- b) Spinæ omnes terminales; Semina uniserialia.*
55. 5 *aspalathoides* (nec *aspalatoides* Lam.) Poir. voy. en Barb. II, 209. Africa bor. media.
Cytisus aspalathoides Spreng. syst. veget. III, 225.
Spartium aspalathoides Dsf. fl. atl. II, 147.
56. 5 *Haensleri* (nec *Haensleri* Walp.) Boiss. voy. d. le mid. Hispania.
d'Esp. II, 467. I, t. 39. Europa australis.
57. 5 *Lobelii* DC. fl. franç. IV, 2. 499. Hispania.
aspalathoides β . confertior Mor. fl. sard. I, 405. t. 29. 30. Europa australis.
Cytisus aspalathoides Vis. fl. dalm. III, 270.
Spartium erinacoides Lois. fl. gall. I. ed. II, 441.
 - *horridum* S. et Sm. fl. gr. t. 674.
Telinaria Lobelii Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss.
 5. Folge III, 566.
 β) *Salzmanni* DC. mém. s. l. Légum. 211.
 γ) *umbellata* Lois. fl. gall. 2. ed. II, 106.
Salzmanni Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 112.
58. 5 *baetica* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 113. Hispania.
aspalathoides Boiss. voy. dans le med. d'Esp. 141.

c) Inermis; Caulis erectus; Folia parvula uninervia.

59. 5 *ramosissima* Poir. enc. méth. suppl. II, 715. Africa borealis media.
Spartium ramosissimum Dsf. fl. atl. II, 132. t. 177.
Telinaria ramosissima Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 565.
60. 5 *cinerea* DC. fl. franç. IV, 494. Gallia meridionalis,
florida Asso syn. stirp. indig. Arag. 94. Hispania, Nicaea,
linifolia Vill. hist. d. pl. de Dauph. III, 74. Dalmatia.
ramosissima Boiss. voy. de le mid. de l'Esp. II, 142.
scoparia Vill. hist. d. pl. du Dauph. III, 420.
Cytisus cinereus Vis. fl. dalm. III, 270.

- Spartium ctnereum* Vill. prosp. d. l'hist. d. pl. de Dauph. 60.
 - *sphaerocarpum* Lapeyr. abr. d. pl. d. Pyr. 402.
Telinaria cinerea Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 566.
61. *h obtusiramea* Gay in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 116. Hispania.
- d) *Inermis; Caulis prostratus aut humillimus.*
62. *h alba* Bieb. fl. taur. cauc. II, 149. Rossia austr.. Armenia.
Telinaria alba Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 562.
63. *h pilosa* L. cod. Nro. 5208. Gu. Abb. d. d. Holzart. t. 120. Europa media et australis.
humifusa Thore, sed ubi?
repens Lam. fl. franc. II, 618.
Cytisus pilosus Vis. fl. dalm. III, 269.
Genistoides tuberculata Moench meth. 133.
Spartium pilosum Roth tent. fl. Germ. II, 2. 161.
Telinaria pilosa Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 566.
 β) *erecta* Lap. hist. abr. d. pl. d. Pyr. 414.
 γ) *nodosa* Tausch in Flora XXI, 748.
 δ) *sylvatica* Boenn. prodr. fl. Monast. 213.
 ε) *tenuifolia* Lam. in enc. méth. II, 619.
64. *h Godetii* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 118. Krim.
h Montbretii Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 119. Asia minor austr.
 66. *h multicaulis* Lam. enc. méth. II, 617. Ins. balearicae.
Spartium multicaule Desf. tabl. de l'éc. du Mus. 185.
67. *h caespitosa* C. Koch in Linn. XIX, 60. Asia minor occid.
 68. *h armeniaca* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 118. Armenia.
 69. *h involucrata* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 120. Asia minor.
 J. et Sp. ill. pl. or. II, 146. Oriens.
70. *h humifusa* L. cod. Nro. 5209. Lam. enc. méth. II, 619. Oriens.
alba Bieb. fl. taur. cauc. II, 149. (teste Gris.)
Telinaria humifusa Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 566.
71. *h sericea* Wulff. in Jacq. coll. II, 167. ic. pl. rar. III, t. 566. Carnioli, Italia super.,
Cytisus sericeus Vis. fl. dalm. III, 269. Croatia, Montenegro,
Telinaria sericea Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 566. Dalmatia, Litorale.
72. *h pseudopilosa* Coss. not. s. qu. pl. du mid. de l'Esp. III, 102. Hispania australis.
 73. *h murcica* Coss. not. s. qu. pl. du mid. de l'Esp. III, 101. Hispania australis.
- e) *Inermis; Caulis alatus; Folia trinervia.*
- * 74. 5 *polygalaephylla* (nec *polygalaefolia* DC.) Brot. fl. lus. II, 56. Lusitania.
exaltata Lk in Spreng. syst. veget. III, 219.
- * 75. 5 *florida* L. cod. Nro. 5207. Hispania.
 76. 5 *leptoclada* Gay in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 122. Hispania.
- D. *Species dubiae aut minus cognitae.*
77. 5 *italica* Lodd. in Steud. nom. bot. I, 670. Italia.
 78. 5 *mollis* DC. prodr. II, 145. (an *Tellines species*?) Africa boreali-occid.
Spartium molle Cav. ann. 1801, p. 57.
79. 5 *pilocarpa* Lk enum. pl. hort. Berol. II, 223. (an *Corniola* spec.?) Patria ignota.
 80. 5 *Pestalozzae* Boiss. diagn. pl. orient. nov. IX, 4. Asia minor.
 81. 5 *striata* Hill in hort. Kew. 285. t. 9. (an *Spartocytisi* sp.?) Lusitania.
 82. 5 *heterophylla* DC. prodr. II, 152. (an *Spartocytisi* sp.?) Pyrenaeus.
Cytisus heterophyllus Lap. abr. hist. d. pl. d. Pyren. 422.
83. 5 *Broteri* Poir. enc. méth. suppl. II, 720. Lusitania.
parviflora Brot. fl. lusit. II, 87.
84. 5 *micrantha* Orteg. nov. aut rar. pl. hort. Madril. dec. VI, 68. t. 10. f. 1. Hispania.
 85. 5 *sessilifolia* DC. mém. s. la fam. d. Légum. VI, 208. Asia minor.
Spartium sessilifolium Spreng. syst. veget. IV, 166.
- Not. *Praeterea* in horto dendrologico species dubiae coluntur: 1) *dahurica*; 2) *alipes*; 3) *montana*; 4) *Tiberiana*.

LXXXVII. *Corniola* Medik.

(origine mihi dubia, an a v. cornu, Horn derivanda?)

A. *Inermis*.

1. *h scariosa* Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 566. Italia, imp. austriacum,
Cytisus triangularis Vis. fl. dalm. III, 268. Turcia europaea,
Genista Genuensis Pers. syn. pl. II, 287. Asia minor.

- Genista Januensis** Viv. el. pl. hort. bot. Dinegr. 10.
 - scariosa Viv. ann. bot. 1, 2. 175. fragm. fl. ital. t. 8. bot. cab. t. 1135.
 β) lydia Boiss. diagn. pl. orient. II, 8 (sub Genista).
 γ) triangularis Presl in Abh. d. boehm. Ac. d. Wiss. 5. Folge III, 566.
 Genista triquetra W. et K. pl. Hung. rar. II, t. 153.
 - triangularis Willd. sp. pl. III, 939.
 δ) versiflora Tausch in Flora XXI, 746 (sub Genista).
2. ♀ **Antiochia** Boiss. diagn. pl. or. IX, 4 (sub Genista). Syria borealis.
 3. ♀ **pontica** C. Koch. Littora maris nigri austr.
 Genista pontica Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 127.
 J. et Sp. ill. pl. or. II, t. 147.
4. ♀ **depressa** Bieb. fl. taur. cauc. III, 460 (sub Genista). Rossia austr.-occident.
 - polytricha Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, Rumelia, (Krim,
 132. (teste Gris.) Podolia), Asia minor.
 tinctoria β. decumbens Led. fl. ross. I. 517.
 β) ptilophylla Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 131 (sub Genista).
 γ) tetragona Bess. enum. pl. Volh. et Pod. 73 (sub Genista).
 Genista albida Bess. enum. pl. Volh. et Pod. 28.
5. ♀ **commixta** Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 132. J. et Asia minor borealis
 Sp. ill. pl. or. II, t. 150 (sub Genista). (Trebisond).
 β) parvifolia Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 132.
6. ♀ **Amsantica** Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 566. Italia inferior,
 Genista Amsantica (nec Anxantica aut Anxanthona) Ten. Rumelia, Asia min.
 fl. neap. prodr. 41. fl. Nap. t. 66.
 - lamprophylla Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 126. (teste Gris.)
- * 7. ♀ **ovata** Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 566. Banatus, Bulgaria,
 Genista ovata W. et K. pl. rar. Hung. I, t. 34. bot. cab. 482. Rumelia; Helvetia,
 β) lanceolata Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 135. imp. austriacum,
 Genista nervata Kit. in Rchb. fl. exc. 520. ? Rossia media.
 - triangularis β. ciliata Roch. pl. Ban. rar. t. 15. f. 32. (teste Rchb.)
- * 8. ♀ **Mantica** Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 566. Italia, Gallia.
 Genista lasiocarpa Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 135.
 - Mantica Poll. fl. Veron. II, 458. t. 4. f. 7.
 - ovata Mut. fl. franc. I, 225.
 - β. humilior Bert. fl. it. VII, 354.
 - tinctoria β. lasiocarpa Gr. et G. Fl. de Fr. I, 353.
 β) Perreymondii Lois. fl. gall. II, 105 (sub Genista).
9. ♀ **Delarbreyi** Lec. et Lam. cat. d. pl. d'Auverg. 125 (sub Genista). Gallia.
 Genista tinctoria β. latifolia DC. fl. fr. V, 547.
- * 10. ♀ **tinctoria** Medik. philos. Bot. I, 203. Europa, Oriens, Tataria,
 Cytisus tinctorius Vis. fl. dalm. III, 268. ? America foederata.
 Genista inermis Gillib. fl. lith. V, 77.
 - sibirica Falk Beitr. II, 223. et ? L. cod. Nro. 5206. (teste Led.)
 - tinctoria L. cod. Nro. 5206. Gu. Abbild. d. d. Holzart. t. 118.
 Genistoides tinctoria Moench meth. 133.
 Spartium tinctorium Rth tent. fl. germ. II, 2. 160.
 β) angustifolia; patula Bieb. fl. taur. cauc. II, 148 (sub Genista).
 Genista leptophylla Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 127.
 J. et Sp. ill. pl. orient. 148.
 γ) hirsuta; pubescens Lange in Rchb. fl. exc. 519. (sub Genista.)
 δ) latifolia Led. fl. ross. I, 517.
 ε) plena Hort
 ζ) spatulata Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 128. J. et Sp. ill. or. t. 149.
 η) umbrosa Boenn. in Rchb. fl. exc. 519.
- * 11. ♀ **diffusa** C. Koch. Gallia, Italia.
 Genista depressa Ten. fl. Nap. t. 171. f. 2.
 - diffusa Ten. Nap. II, 129.
 - humilis Ten. fl. Nap. IV, 99.
 - Tenorei Steud. nom. bot. I, 671.
 - tenuifolia Lois. not. s. l. pl. à ajout. à la Fl. de Fr. suppl. 169.
 - tinctoria β. Poll. fl. Veron. II, 457.
 - δ. alpestris Bert. mant. pl. fl. alp. Apuan. 47.
12. ♀ **carinalis** Gris. spic. fl. Rum. et Bith. I, 3 (sub Genista). Rumelia, Graecia.
 Genista gracilis Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. II, 256.
 J. et Sp. ill. pl. orient. II, t. 143.

- * 13. \bar{h} 5 *virgata* Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 566. **Italia superior, Tyrol,**
Genista elata (elatior Koch) Wend. ind. sem. hort. Marb. 1826. **Hungaria, Litorale.**
 - *sibirica* Rchb. fl. exc. 519.
 - *tinctoria* Hayne Arzn. Gew. IX, t. 11. Bertol. fl. ital. VII, 351.
 - β . *virgata* Koch Deutschl. Fl. V, 90.
 - *virgata* Willd. Berl. Baumz. 160. Gu. et H. fremde Holzplf. t. 58.
Genistoides elata Moench meth. 133.
 β) *multibracteata* Tausch in Flora XXI, Beibl. I, 78. (sub *Genista*)
- * 14. 5 *sibirica* Medik. philos. Bot. I, 203. **Patria ignota**
Genista sibirica L. cod. Nro. 5206. Jacq. hort. Vindob. t. 190. **(nec Sibiria).**
 - *tinctoria* β . *sibirica* Lam. enc. méth. II, 618. **Transcaucasia.**
15. \bar{h} *dracunculoides* C. Koch. **Transcaucasia.**
Genista dracunculoides Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 139.
 J. et Sp. ill. pl. or. II, t. 151.
16. \bar{h} *tenella* C. Koch. **Hispania.**
tenella Willk. in bot. Zeit. 1847. 426.

B. *Spinescens*.

17. 5 *ferox* C. Koch. **Algeria, Lusitania.**
Genista ferox Poir. enc. méth. suppl. II, 708.
Spartium ferox Dsf. fl. atl. II, 136. t. 182. Poir. voy. en Barb. II, 206.
 - *heterophyllum* l'Hér. stirp. nov. aut min. cogn. 183. t. 87.
18. 5 *microphylla* Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 566. **Sardinia.**
Genista Morisii Colla herb. pedem. II, 65. Moris fl. sard. 104. t. 31.
 - *microphylla* Mor. stirp. sard. elench. I, 13.
 - *parvifolia* G. Don. dichl. pl. II, 150.
Spartium Morisii Bert. fl. it. VII, 340.
19. \bar{h} *Scorpius* Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 566. **Gallia, Hispania.**
Genista Scorpius DC. fl. franç. IV, 498. brit. fl. gard. 2. sér. I, t. 63.
 - *spiniiflora* Lam. enc. méth. II, 621. fl. de Franc. III, 603.
Spartium Scorpius L. cod. Nro. 5193.
20. 5 *Melia* C. Koch. **Insulae Archipelagoes**
Genista Melia Boiss. pl. orient. IX, 2. **graeci.**
21. 5 *corsica* Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 566. **Sardinia, Corsica.**
Genista corsica DC. fl. franç. suppl. 548. Moris fl. sard. 403. t. 31.
Spartium corsicum Lois. fl. gall. II, 440.
22. 5 *lucida* C. Koch. **Ins. balearicae.**
Genista lucida Cambess. in mém. du Mus. XIV. 231. t. 14.

LXXXVIII. *Chronanthos* DC. (sectio *Genistae*).

(χρονος, chronos, Zeit, hier Lebenszeit, et χρόνος, flos, Blueth.)

1. 5 *liparioides* C. Koch. **Oriens.**
Cytisus orientalis Lois. in nouv. Duh. 136.
Genista liparioides Boiss. diagn. orient. nov. II, 6.
2. \bar{h} *pulchella* C. Koch. **Dalmatia.**
Cytisus pulchellus Vis. fl. dalm. III, 270. t. XL. f. 2.
Genista pulchella Vis. in Flor. XXV, 51.
 - *sericea* Alesch. fl. Jadr. 169.
3. \bar{h} *Villarsii* C. Koch. **Gallia australis,**
Cytisus Villarsii Vis. fl. dalm. III, 270. t. 55. f. 1.
Genista humifusa Vill. hist. d. pl. du Dauph. III, 421. 44. f. 5.
 - *pilosa* β . *humifusa* Lap. hist. abr. d. pl. d. Pyr. 404.
 - *Villarsii* Clem. in atti della 3. reun. degli scienz. ital. 517.
 - *Villarsiana* Jord. obs. s. plus. pl. nouv. de la Fr. 6. fragm. 86. t. 2.

LXXXIX. *Corothamnus* Presl.

(χορος, scopra, Kehrbesen et θάμνος, virgultum, Gestraeuch.)

- * 1. \bar{h} *diffusus* Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 567. **Illyria, Itria,**
Cytisus diffusus Vis. fl. dalm. III, 269. **Dalmatia, Italia super-,**
Genista diffusa Willd. sp. pl. III, 942. Sturm Deutschl. Fl. Hft. 49. **Croatia.**
 - *humifusa* Wulf. in Jacq. collect. II, 169.
Spartium decumbens Jacq. ic. pl. rar. III, 555.
 β) *glabra* Bert. fl. it. VII, 355.

- * 2. *h* Halleri Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 567. Helvetia, Gallia,
Cytisus decumbens Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III. Italia media et super.,
- Kitaiibelli Vis. fl. dalm. III, 269. imp. Austriacum,
Genista decumbens Ait. hort. Kew. ed. 2. IV, 259. Jacq. Dalmatia, Albania.
ic. pl. rar. t. 555.
- Halléri Reyn. mém. pour l'hist. nat. de la Su. I, 211. c. ic.
Gaud. fl. helv. IV, t. 5.
- pedunculata l'Her. stirp. nov. aut min. cogn. 184.
- procumbens B. elata Ten. fl. Napl. V, 96.
- prostrata Lam. enc. méth. II, 618.
Spartium Halléri Jacq. (in omnibus paene floribus citatum, sed frustra quæsit.)
- decumbens Dur. fl. de Bourg. I, 299.
β) grandiflora Gr. et G. flor. de France I, 360.
γ) hirsuta Gris. spic. fl. Rum. et Bith. I, 2.
δ) procumbens W. et K. pl. Hung. rar. II, t. 180. (sub Genista.)
Cytisus procumbens Spreng. syst. veg. III, 224.
3. *h* myrtifolius Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 567. Ungaria.

XC. Chamaecytisus Vis. (nec Lk.).

(χάμις, humi, auf der Erde et χότιος, Cytisus, Geisklee.)

1. *h* dalmaticus Vis. fl. dalm. III, 272. t. 55. f. 2. Dalmatia.

XCI. Cytisopsis Jaub. et Sp.

(χότιος, cytissus, Geisklee et οφίς, visus, Ansehen.)

1. *h* doryeniifolia Jaub. et Sp. illustr. pl. orient. I, 155. t. 84. Syria, Taurus.

XCII. Genistella Moench.

(Genista parva, kleiner Ginster.)

1. 5 capitata C. Koch. Africa boreali-occid.

Genista clavata Poir. enc. méth. suppl. II, 715.

- umbellata β. capitata DC. prodr. II, 146.

Spartium clavatum Cav. anal. scienc. 1801. 63.

- sericeum Vent. jard. du Cels t. 17.

β) casuarinoides Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 146.

γ) Goudotiana Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 146.

δ) Webbiana Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 146.

2. 5 equisetiformis C. Koch. Hispania.

Genista equisetiformis Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 143.

- umbellata Bark. Webb it. hisp. 51.

3. 5 umbellata C. Koch.

Genista umbellata Poir. enc. méth. suppl. 715.

Spartium umbellatum Desf. fl. atl. II, 193. t. 179.

Telinaria umbellata Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 565.

- * 4. *h* racemosa Moench meth. 133.

Cytisus sagittalis Koch Deutschl. Fl. V, 109.

Genista sagittalis L. cod. Nro. 5203. Guimp. Abb. d.

deutsch. Holzart. II, t. 117.

Saltzwedelia sagittalis Fl. d. Wett. II, 498. Jacq. fl. austr. t. 209.

Spartium sagittale Roth tent. fl. german. II, 2. 159.

Sysbóne sagittalis Gris. spic. fl. Rum. et Bith. I, 6.

Telinaria sagittalis Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 566.

XCIII. Dendrospartum Spach. (Drymosparton Presl.)

(δένδρον, arbor, Baum et σπάρτον, Spartium, Pfriemenstrauch.)

- * 1. 5 Aetnense (nec Aethnense) Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér.

III, 152. adnot.

Sicilia.

Drymospartum Aetnense Presl bot. Bem. 138. (Abh. d. boehm. Ges. 5. Folge III.)

Genista Aetnensis (nec Aethnensis) DC. prodr. II, 150.

Spartium Aetnense Bivona stirp. sic. manip. II, 9. bot. mag. t. 2674.

- trispermum Sm. in Rees Cyclop. XXXII, Nro. 5.

2. 5 sardoum Spach in Walp. ann. bot. syst. I, 220.

Sardinia.

Drymospartum sardoum Presl bot. Bem. 138. (Abh. d. boehm. Ges. 5. Folge III.)

Genista Aetnensis Mor. fl. sard. I, 407. t. 28.

XCIV. *Genocytisus* Spach.

(γνώλα, angulum, Kante et χείρατος, Cytisus, Geisklee.)

1. 5 *angulatus* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 155. in adnot. Asia minor, Persia.
Genista angulata Lk enum. pl. hort. Berol. II, 223. ? Lam. enc. méth. II, 624.
 - *parviflora* DC. prodr. II, 145.
Retama angulata Gris. spic. fl. Rum. et Bith. I, 5.
Spartium angulatum L. cod. Nro. 5194. Sibth. et Sm. icon. fl. gr. t. 672.
 - *parviflorum* Vent. jard. du Cels t. 87.
 β) *stigmatate ciliato*; *Cytisus parviflorus* Boiss. diagn. pl. orient. II, 9. (an sp. pr.?)
2. 5 *pterocladus* Spach in ann. d. sc. nat. 3. sér. III, 155. in adn. Syria.
 Jaub. et Sp. ill. pl. orient. II, t. 152.
Cytisus pterocladus Boiss. diagn. pl. orient. II, 10.

ICV. *Spartocytisus* Bark. W.

(σπάρτον, spartium, Pfriemenstrauch et χείρατος, Cytisus, Geisklee.)

1. 5 *purgans* Bark. Webb. phytogr. canar. I, 45. Gallia.
Dendrospartium purgans Spach in Walp. ann. bot. syst. I, 220.
Drymospartum purgans Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III.
Genista purgans Lam. enc. méth. II, 620.
Sarothamnus purgans Gr. et Godr. fl. de Fr. I, 349.
Spartium (*Genista*) *purgans* L. cod. Nro. 5192.
2. 5 *acutangulus* C. Koch. Asia minor.
Cytisus acutangulus J. et Sp. ill. pl. orient. nov. II, 70. t. 153.
- * 3. 5 *albus* Bark. W. phytogr. canar. I, 45. Algeria, Lusitania.
Cytisus albus Lk enum. pl. hort. Berol. II, 241.
Genista alba Lam. enc. méth. II, 623.
 - *multiflora* Lois. in nouv. Duh. II, 76.
Spartium album Desf. fl. atl. II, 132.
 - *dispermum* Mnch meth. 130.
 - *multiflorum* Ait. hort. Kew. III, p. 11.
Sarothamnus albus Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III.
 β) *incarnatus* Sweet hort. brit. 3. ed. 156. Loud. arb. et frut. brit. II, 590.
4. 5 *sessilifolius* Bark. W. phytogr. canar. I, 45. Gallia, Italia super. et
Cytisus glaber β. Lam. fl. franç. II, 621. media, Helv., Carniola,
 - *Lobelii* Tausch in Flora XXI, 379. Lob. advers. Dalmatia, Volhynia.
 II, 52. f. 1. icon. 2. p. 45. (v. Bert. fl. it. VII, 554.)
 - *sessilifolius* L. cod. Nro. 5439. bot. mag. t. 255.

ICVI. *Lembétropis* Gris.

(λεμβος, navicula, ein kleines Fahrzeug, et τροπή, carina, Kiel.)

- * 1. 5 *nigricans* Gris. spic. fl. Rum. et Bith. I, 10. Imp. austr., Italia sup.,
Cytisus nigricans L. cod. Nro. 5438. Gu. Abb. d. deutsch. Gallia austr., Helvetia,
 Holzart. t. 129. Germania, Rossia occ.,
 - *glaber* α. Lam. fl. franç. II, 621. Rumelia.
 β) *elongatus* Willd. Berl. Baumz. 115.
- * 2. 5 *triflora* Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III. German., Europa austr.,
Cytisus hirsutus Ucr. hort. Panorm. 310. Africa borealis.
 - *nigricans* L. mant. alt. 444. (nec sp. pl., teste Bertol.)
 - *triflorus* P'Her. stirp. nov. aut. min. cogn. 184. nouv. Duh. V, t. 46.
 - *villosus* Pourr. in act. Toul. III, 317.
Spartocytisus triflorus Bark. Webb phytogr. canar. I, 45.
 β) *mollis* Willd. enum. pl. hort. Berol. suppl. 51.
3. 5 *affinis* Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III. Sicilia.
Cytisus affinis Presl fl. sic. p. XIX.
 - *triflorus* β. *siculus* Guss. fl. sic. syn. II, 248.

ICVII. *Cytisus* L.

(χείρατος, Cytisus, apud Graecos sine dubio Medicago arborea L.)

A. Flores capitati.

- * 1. 5 *austriacus* L. cod. Nro. 5444. Gu. Abb. d. d. Holzart. t. 131. Imperium austriacum,
canescens Maly in Presl del. Prag. 229. Rossia austr., Rumelia,
Malyei Steud. nomencl. bot. ed. 2. 477. Caucasus.
Viborgia austriaca Moench meth. 133.

- Chamaecytisus austriacus* Lk Handb. z. Kenntn. d. Gew. II, 155.
 β) *leucanthus* W. et K. pl. Hung. rar. II, 141. t. 132.
Chamaecytisus leucanthus Link Anl. z. Kenntn. d. Gew. II, 154.
 γ) *polycéphalus* Tausch in Flora Beibl. I, 78.
 obscurus Roch. pl. Ban. rar. t. XIII, f. 29.
- * 2. 5 *capitatus* Jacq. fl. austr. t. 33. Gu. Abbild. d. deutsch. Gallia, Helvetia, Italia,
 Holzart. t. 130. Germania, imp. austriac.,
 Asia minor.
supinus Vill. hist. d. pl. du Dauph. III, 410. (teste DC.)
Uralensis Hort.
Chamaecytisus capitatus Lk Handb. z. Kenntn. d. nutz. Gew. II, 155.
Viborgia capitata Mneh suppl. ad meth. 43.
 β) *onustus* Tausch in Flora XXI, 746.
 γ) *sulphureus* Tausch in Flora XXI, 739.
 δ) *villosus* Presl del. Prag. 36.
- * 3. 5 *supinus* L. cod. Nro. 5443. Gu. Abb. d. d. Holzart. t. 32. ? Gallia, imper. austriac.,
capitatus β. DC. fl. franç. IV, 2. 505. Rumelia, Oriens,
chrysótrichus Boiss. diagn. pl. or. II, 12. (teste Gris.) ? Rossia media.
lotoides Pourr. act. Toul. III, 318.
pubescens Gilib. fl. lith. V, 222.
rufulus Presl delic. Prag. 36.
Chamaecytisus supinus Lk Handb. z. Kenntn. d. Gew. II, 155.
Viborgia supina Mneh meth. 132.
4. 5 *Tommasinii* Vis. in fl. dalm. III, 265. Montenegro, Dalmatia.
capitatus β. *pauciflorus* Ebel zw. Tag. auf Monten. u. Dalm. II, 83.
5. 5 *Smyrnaeus* Boiss. diagn. pl. orient. II, 9.
 β) *prostratus* Boiss. diagn. pl. orient. II, 9.
- * 6. 5 *prostratus* Scop. fl. carn. II, 70. Koch syn. ed. 2. 170. Rumelia, Italia,
 bisflorus Host fl. austr. II, 340. imperium austriacum.
supinus DC. prodr. II, 156. (teste Koch.)
 β) *ciliatus* Wahlenb. fl. Carpath. II, 219.
 γ) *bracteolatus*; *supinus* Bertol. amoen. ital. 174.
 δ) *uniflorus*; *prostratus* Borkh. teste Braune in Flora II, 566.
7. 5 *eriocarpus* Boiss. diagn. pl. orient. nov. II, 11. Asia minor.
 8. 5 *drepanólobus* Boiss. diagn. pl. orient. IX, 6. Syria borealis.
 9. 5 *Cassius* Boiss. diagn. pl. orient. nov. IX, 5. Syria.
 10. 5 *flaccidus* Benth. in Royle illustr. Him. 197. India orient., Himalaya.
Glycine flaccida Wall. num. list. Nro. 5517.

B. Flores axillares, solitarii aut plures.

11. β *Tmóleus* Boiss. diagn. pl. orient. II, 11. Asia minor.
- * 12. 5 *purpureus* Scop. fl. carn. ed. 2. II, 69. t. 45. Imper. austriac. merid.,
Chamaecytisus purpureus Lk Anl. z. Kenntn. d. Gew. II, 154. Pedemontium.
Viborgia purpurea Moench suppl. ad meth. 43.
 β) *albus* Sweet hort. brit. 3. edit. 157.
 γ) *atropurpureus* Hort.
 δ) *erectus* Hort.
 e) *incarnatus* (roseus) major et minor. Hort.
13. 5 *speciosus* Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. F. III, 570. Patria ignota.
falcatus Hort.
14. 5 *ponticus* Willd. sp. pl. III, 1120. Rumelia, Asia minor,
purpureus β. Lam. enc. méth. II, 251. Pontus.
Tournefortianus Lois. in nouv. Dub. V, 157.
15. 5 *Thirceanus* C. Koch in Linn. XIX, 61. Asia minor.
16. 5 *candidus* Presl fl. sic. I, p. XIX. Sicilia.
- * 17. 5 *Ratisbonensis* Schaeff. bot. exped. Titelkupf. ? Italia inf., Germania,
biflorus l'Her. stirp. nov. aut. min. cogn. 184. Austria germ. et hung.,
hirsútus Pall. fl. ross. I, 74. Lam. enc. méth. II, 250. Rossia austr., Sibiria,
purpureus Lam. enc. méth. II, 251. (teste Poir. in suppl.) Tataria, Asia minor.
ruthenicus Fisch. ind. pl. hort. Petrop. 1824. p. 25.
supinus Jacq. fl. austr. t. 20. Sturm Deutschl. Fl. Heft 59.
 - *Wolgensis* Fisch. cat. hort. Gorenk. 1806. 110.
 - β. L. cod. Nro. 5443.
Chamaecytisus biflorus Lk Handb. z. Kenntn. d. Gew. II, 155.
 β) *glaber* L. fl. suppl. 328.

- * 7) minor; biflorus W. et K. pl. Hung. rar. II, t. 166.
 cinereus Host fl. austr. II, 343.
 supinus β . Wahlenb. fl. carp. 220.
 * 18. 5 elongatus W. et K. pl. Hung. rar. II, 200. t. 183. Gallia austr., Moravia,
 biflorus Ker. in bot. reg. t. 308. (teste Sp.) imp. austr. orient.,
 Chamaecytisus elongatus Lk Handb. z. Kenntn. d. Gew. II, 155. Serbia.
 β) multiflorus Lindl. bot. reg. t. 1191. (teste Sp. C. falcati W. et K. synon.)
 * 19. 5 aeolicus Guss. suppl. ad fl. sic. prodr. II, 221. bot. reg. t. 1902. Ins. Siciliae prox.
 20. 5 spinescens (spinosisus in Sieb. pl. ital. exs.) Sieb. in Spreng.
 syst. veget. III, 255. Dalmatia, Istria,
 argyreus Rehb. fl. exc. 523. Sicilia, Rumelia,
 ? pungens Spreng. syst. veg. III, 325. Asia minor, ? Afr. bor.
 β) ciliatus; ramosissimus Ten. syll. pl. vasc. neap. 98. fl. Napl. t. 242. f. 2.
 apulus Ten. et Guss. mem. sulte peregr. 164.
 supinus Ten. fl. Napl. II, 148. (excl. syn. teste Bert.)
 * 21. 5 hirsutus L. cod. Nro. 5442. Imp. austr., Gall. austr.,
 falcatus W. et K. pl. Huns. rar. III, t. 238. bot. cab. t. 520. Helvetia, Italia,
 Lamarckii Ten. fl. Napl. V, 94. Dalmatia, Serbia,
 pumilus Not. prosp. della fl. lig. 23. Bulgaria, Rumelia.
 supinus Alsch. fl. Iadr. 170. Bert. amoen. ital. 174.
 triflorus Lam. enc. méth. II, 250.
 virgatus Vest syllog. pl. nov. et min. cogn. I, 22.
 Chamaecytisus hirsutus Lk Handb. z. Kenntn. d. Gew. II, 155.
 β) ciliatus Koch syn. ed. 2. 171.
 γ) glabratus Gris. spic. fl. Rum. et Bith. I, 8.
 δ) serotinus Kit. in DC. prodr. II, 156.
 * 22. 5 polytrichus Bieb. fl. taur. cauc. II, 477. C. Koch in Linn. XIX, 61. Asia min., Transcauc.,
 ? Tournefortianus Lois. in nouv. Duh. V, 137. Krim.
 23. 5 hirsutissimus C. Koch in Linn. XIX, 62. Asia minor.

C. Flores solitarii axillares; Semina hilo concolori (an Lembotropis sp.?).

24. 5 glabrescens Sartor. degli Alb. indig. ai Boschi dell' It. sup. 282. Dalmatia, Italia sup.
 emeriflorus (nec emeriflorus Koch) Rehb. fl. exc. 524.

D. Flores axillares racemosi (an genus proprium?).

25. β creticus Boiss. et Heldr. in Boiss. diagn. pl. orient. IX, 5. Creta.
 26. 5 tribracteolatus Bark. Webb it. hisp. p. 53. otia hisp. 3. t. 3. Hispania.

E. Species dubiae, an e genere expellendae?

27. 5 viscosus Hill hort. Kew. 439. t. 17. Sicilia.
 28. 5 virgulatus Rehb. fl. exc. 524. Corsica.
 29. 5 canescens Lois. in nouv. Duh. V, 154. Patria ignota.
 30. 5 Milleri Steud. nomencl. bot. II, 477. Lusitania.
 Spartium hirsutum Mill. dict.
 31. 5 glabratus Lk in Spreng. syst. veget. III, 225. Lusitania.
 ? Spartium glabrum Mill. dict.

XCVIII. Calycótome (Calycotomon Hoffmssg) Lk.
 (καλύξ, calyx, Kelch et τέμνειν, scindere, spalten.)

- * 1. 5 spinosa Lk enum. pl. hort. Berol. II, 225. Terrae maris medit.
 Cytisus spinosus Lam. enc. méth. II, 247. bot. reg. XXXII, t. 55. et caspii orientales.
 Spartium spinosum L. cod. Nro. 5199.
 2. 5 infesta Guss. syn. fl. sic. II, 247. Dalmatia, Sicilia.
 spinosa Presl fl. sic. I, p. XIX.
 Cytisus infestus Guss. prodr. II, 372.
 - spinosus Koch syn. ed. 2. 170. nec Lam. (teste Vis.)
 Genista infesta Steud. nom. bot. ed. 2. 670.
 Spartium infestum Presl del. Prag. 33.
 - sericeum Presl in Steud. nom. bot. ed. 1.
 - spinosum Ueria hort. Pan. 298. et Host fl. austr. II, 314. nec L.
 3. 5 villosa Lk pl. enum. hort. Berol. II, 225. Hispania, Corsica,
 Cytisus laniger DC. fl. franç. IV, 504. Creta, ins. Archipel,
 - spinosus Sav. due cent. 132. Rumelia, Asia minor,
 Spartium lanigerum Desf. fl. atl. II, 135. Africa borealis.
 - spinosum Brot. fl. lusit. II, 85.

Spartium villosum Poir. Voy. en Barb. II, 207. S. et Sm. fl. gr. t. 673.

β) *rigidum* Viv. fl. lyb. p. 40. t. 17. f. 1. (sub *Spartio*.)

4. 5 *cretica* Presl in Abh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge III, 481. Creta.

XCIX. *Laburnum* Medik.

(vox jam a Romanis usurpatum et L. vulgarem *Gris*. significans.)

- * 1. 5 *vulgare* *Gris*. spic. fl. Rum. et Bith. I, 7. Imperium austriacum,
Cytisus *Laburnum* L. cod. Nro. 5437. Gu. Abb. d. deutsch. Italia super. et media,
Holzart. t. 127. Helvetia Gallia.
- *alpinus* Lam. fl. franc. II, 621.
- Spartium *Laburnum* Cav. (sed ubi?)
- β) *angustifolium* Hort.
- γ) *bullatum* Hort.
- δ) *falcatum* Hort.
- ε) *flore albo*, Flora XIII, 241.
- ζ) *intermedium* Hort.
- η) *involucratum* Hort.
- θ) *pendulum* Hort.
- ι) *quercifolium* Hort.
- κ) *serotinum* Hort.
- λ) *sessilifolium* Hort.
- μ) *sordidum* Lindl. in bot. reg. t. 1965. the bot. I, t. 7. (sub *Cytiso*.)
Cytisus *Adami* Poit. (*Laburnum* β. *purpurascens* Hort.)
- ν) *variegatum* Hort.
- 2. 5 *alpinum* *Gris*. spic. fl. Rum. et Bith. I, 7. Imperium austriacum,
Cytisus *Laburnum* β. Ait. hort. Kew. ed. 2. IV, 319. Italia super. et media,
- *alpinus* Mill. dict. Gu. Abb. d. deutsch. Holzart. t. 128. Helvetia, Gallia orient.,
β) *angustifolium* Munch meth. 145. Spach hist. d. vég. Scotia.
phan. I, 208. (sub *Cytiso*.)
Cytisus *alpinus* W. et K. pl. Hung. rar. t. 260.
- γ) *pendulum* Hort.
- δ) *purpurascens* Hort.
- * 3. 5 *fragrans* *Gris*. spic. fl. Rum. et Bith. II, 495. Dalmatia, Istria,
Cytisus *fragrans* Weld. in Flora XV, 328. Litorale.
- *ramentacea* Sieb. in Flora V, 242.
- *Weldenii* Vis. in Flora XIII, 52. fl. dalm. t. 39. bot. reg. XXIX, t. 40.
Petteria ramentacea Presl in Abh. d. boehm. Ac. d. Wiss. 5. Folge III, 569.
- * 4. 5 *Alschingeri* C. Koch. Dalmatia.
Cytisus *Alschingeri* Vis. ind. sem. hort. Patav. a. 1840.

C. *Argyrolobium* Spach.

(ἀργυρος, argentum, Silber et λοβός, legumen, Huelse.)

- * 1. η *calycinum* Jaub. et Sp. in ann. d. sc. nat. 2. sér. XIX, 44. Dalmatia, Krim,
lotoides Benth. in Flora XXVI, 396. isthmus caucasicus,
Chasmona *calycina* E. Mey. Comm. pl. Afr. austr. in adn. I, 74. Asia minor.
Cytisus *calycinus* Bieb. fl. taur. cauc. II, 166. Lodd. bot. cab. t. 673.
- *lotoides* Willd. sp. pl. III, 1127.
- *nanus* Willd. enum. pl. hort. Berol. 769. Wats. dendr. brit. t. 81.
- *pauciflorus* Willd. sp. pl. III, 1126.
- ? *Lotus Trifolium* Desrouss. in enc. méth. III, 612.
Trichasma calycinum Walp. in Linn. XIII, 510.
- 2. η *gracile* Fenzl in Flora XXVI, 394. Syria.
- * 3. η *Linnaeanum* Walp. in Linn. XIII, 506. Eur. austr., Afr. bor.
Cajanus argenteus Spreng. syst. veg. III, 248. Sturm. Deutschl. Flora Heft 59.
Chasmona argentea E. Mey. comm. de pl. Afr. 74.
Cytisus *argenteus* L. cod. Nro. 5447.
- *Zanoni* Turr. fl. it. prodr. 66.
Genista argentea Noulet in ann. d. sc. nat. IX, 120.
Lotus argenteus Brot. fl. lusit. II, 119.
Lotophyllus argenteus Link Handb. z. Kennntn. d. Gew. II, 156.
β) *pygmaeum* Willd. sp. pl. III, 1127. (sub *Cytiso*.)

CI. *Podocytisus* Boiss.

(πους, pes, Fuss et κυτίος, cytissus, Geisklee.)

- 1. 5 *caramanicus* Boiss. et Heldr. in Boiss. diagn. pl. orient. IX, 7. Asia minor austr.

CII. *Tellina* (Telinaria Presl) Medik.

(verisimiliter a v. τηλις, foenum graecum, nec origine austro-africana.)

- * 1. 5 *cándicans* Medik. phil. Bot. I, 203. Europa austr., Oriens,
ins. canar., Madera.
Cytisus cándicans Lam. enc. méth. II, 248.
 - *hirsútus* Jacq. observ. IV, t. 96.
 - *Monspessulanus* Gouan hort. Monsp. 375. L. sp. pl. 1. édit. 740.
 - *pubescens* Mneh meth. suppl. 43.
Genista canariensis bot. reg. t. 217.
 - *cándicans* L. cod. Nro. 5201. Grtn. de fr. et sem. II, t. 151. f. 7.
 β) *Colmeiroi* Willk. in bot. Zeit. V, 427.
 γ) *subspicata* Lam. enc. méth. II, 248.
- 2. 5 *eriocarpa* C. Koch. Hispania.
Genista eriocarpa Kunze in Flora XXIX, 736.
- * 3. 5 *bracteolata* C. Koch 5. Pfl. u. Blum. Ausst. in Potsd. 11. Patria ignota,
ins. canarienses.
Cytisus chrysobotrys Otto et Dietr. allg. Gartenz. V, 122.
 - *bracteolatus* Hort. angl.
 - *racemosus* Marn. flor. magaz.
Genista bracteolata Lk enum. pl. hort. Berol. II, 224. bot. reg. t. 23.
 - *racemosa* Hort.
- * 4. 5 *Atleyana* C. Koch 5. Pfl. u. Blum. Ausst. in Potsd. 11. Patria ignota.
Cytisus Atleyanus Hort.
- * 5. 5 *linifolia* Bark. Webb phyt. canar. II, p. 41. Insulae canarienses,
Africa boreali-occid.,
Hispania, Graecia,
Gallia (ins. Stochades),
Oriens.
Cytisus linifolius Lam. fl. franc. 605.
Genista linifolia L. cod. Nro. 5202. bot. mag. t. 442.
 - *nitens* Lk in Buch Besch. d. can. Ins.
Genistoides linifolia Mneh meth. suppl. 44.
Spartium linifolium Dsf. fl. atl. II, 134. t. 181.
 - *nitens* Willd. in Spreng. syst. veget. III, 177.
 β) *latifolia* Bark. Webb phytogr. canar. II, 41.
Cytisus pallidus Poir. enc. méth. suppl. I, 442.
Genista splendens Bark. Webb phyt. canar. II, t. 43.

CIII. *Sarothamnus* Wimm.

(σαρπον, scopae, Kehrbesen et θαρμος, virgultum, Gestraeuch.)

- * 1. 5 *vulgaris* Wimm. Fl. v. Schles. 2. Ausg. 148. Europa media et austr.,
Suecia australis,
insulae azoricae.
scoparius Koch syn. ed. 1. 152. Deutschl. Fl. V, 82.
Cytisus scoparius Lk enum. pl. hort. Berol. II, 241.
Genista hirsuta Moench meth. 144.
 - *junceae* Eichw. naturh. Sk. v. Litth., Volh. u. Pod. 165.
 - *scoparia* Lam. enc. méth. II, 623.
Spartium angulosum Gilib. fl. lithuan. V, 79.
 - *scoparium* L. cod. Nro. 5197. Gu. Abb. d. deutsch.
 Holzart. II, 116. engl. bot. t. 1339.
 β) *flore albo* (pallide flavescente).
 γ) *flore pleno.*
 δ) *grandiflorus* Lk Handb. z. Erk. d. Gew. II, 153. (sub *Cytiso*.)
- 2. 5 *virgatus* Bark. W. it. hisp. 52. Penins. pyrenaica.
affinis Boiss. voy. d. le mid. de l'Esp. 397. t. 40. f. A.
grandiflorus Bark. W. ot. hisp. (1853.) 45. t. 39.
Cytisus affinis Boiss. elench. pl. hisp. 31.
 - *grandiflorus* DC. prodr. II, 154.
 - *virgatus* Steud. nom. bot. ed. 2. I, 478.
Spartium grandiflorum Brot. fl. lusit. II, 80.
 - *lusitanicum* Mill. dict.
- 3. 5 *patens* Bark. Webb iter hisp. 51. Boiss. voy. dans le mid.
 d'Esp. t. 40. f. B. Lusitania, ? Hispania.
Cytisus patens L. cod. Nro. 5441.
 - *pendulinus* L. fl. suppl. 328.
Genista patens DC. prodr. II, 145.
 - *tomentosa* Poir. enc. méth. suppl. II, 719.
Spartium patens L. cod. Nro. 5195. Cav. icon. II, 58. t. 176.
- 4. 5 *baeticus* Bark. W. it. hisp. 52. ot. hisp. (1853.) 45. t. 40. Hispania, Africa bor.
Cytisus baeticus Steud. nomencl. bot. ed. 2. I, 477.
- 5. 5 *arboreus* Bark. Webb it. hisp. 52. Hispania, Pyrenaeus,
Barbaria.
Cytisus arboreus DC. prodr. II, 154.

Genista arborea Poir. in enc. meth. suppl. II, 719.

- *pendulina* Poir. voy. en Barb. II, 206. nec Lam.

Spartium arboreum Desf. fl. atl. II, 131. t. 177.

6. 5 *catalaunicus* Bark. Webb in ann. d. sc. nat. 3. sér. IX, 63.
 7. 5 *Malacitanus* Boiss. voy. d. le mid. de l'Esp. 399. t. 40. f. A.
Cytisus Malacitanus Boiss. elench. pl. nov. hisp. Nro. 52.
 8. 5 *Gaditanus* Boiss. et Reut. diagn. pl. nov. hisp. Nro. 15.
 9. 5 *eriocarpus* Boiss. et Reut. diagn. pl. nov. hisp. Nro. 16.

Hispania.
Hispania.

Hispania.
Hispania.

CIV. *Spartium* L.

(σπάρτον, spartium, Pfriemenstrauch.)

- * 1. 5 *júnceum* L. cod. Nro. 4189. S. et Sm. fl. gr. t. 671. Europa austr., Oriens,
Genista júncea Scop. fl. carn. 2. ed. II, 50. nouv. Duh. II, t. 70. Africa borealis,
 - *odorata* Mnch meth. 144. insulae azoricae.
Spartianthus júnceus Lk enum. hort. Ber. II, 223.
 β) *acutifolium* Lindl. in bot. reg. t. 1974.
 γ) *glabratum* Bark. Webb phyt. canar. II, 56.
 δ) *odoratissimum* Sweet brit. fl. gard. II, ser. IV, t. 390.
 ε) *plenum* Ait. hort. Kew. ed. 2. IV, 244.

Species dubiae, sine dubio e genere expellendae.

2. 5 *alpinum* Host (teste Steud. nom. bot. II, 615., ubinam?) Alpes.
 3. 5 *apétalum* Labill. (teste Steud. nom. bot. II, 615., ubinam?) Alpes.
 4. 5 *ellipticum* Willd. in Spreng. syst. veget. III, 177. (an *Spartocytisus* sp.?) Hispania.
Genista elliptica Steud. nom. bot. I, 669.
 5. 5 *parvisórum* Willd. enum. pl. hort. Berol. suppl. 60. Lk enum. II, 223. Patria ignota.
 6. 5 *persicum* Willd. sp. pl. III, 931. Persia.
Cytisus persicus Burm. fl. ind. 163. t. 51. f. 1. DC. prodr. II, 157.
 7. 5 *procérum* Willd. enum. pl. hort. Berol. 742. (an *Genistae* sp.?) Lusitania.
Cytisus procérus Lk enum. pl. hort. Berol. II, 241.
 8. 5 *stylosum* Spreng. syst. veget. III, 176. Lusitania.
Genista bracteolata Willd. herb. nec Lk.
 - *stylosa* Steud. nom. bot. I, 671.
 9. 5 *valentinum* W. in Spreng. syst. veget. III, 157. Hispania (Valencia).
valentina Steud. nom. bot. ed. 2. I, 671.

CV. *Retáma* Boiss.

(in libris sacris „rathem“ arbor incerta, apud Arabes ratham *Retamae* species.)

- * 1. 5 *monosperma* Boiss. voy. d. le mid. de l'Esp. II, 144. Penins. pyrenaica,
Genista defoliáta β. Lam. fl. frang. II, 619. Africa boreali-occid.
 - *monosperma* Lam. enc. méth. II, 616. bot. reg. t. 1918.
Spartium Clusii Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. XIX, 295. t. 16. f. 3.
 - *monospermum* L. syst. veg. Murr. 681. bot. mag. t. 683.
 - α. Bark. W. in ann. d. sc. nat. 2. sér. XX, 276.
 - β. L. cod. Nro. 5190.
 2. 5 *Raetam* Bark. W. phyt. canar. II, 56. Arabia, Aegyptus,
Genista monosperma Del. fl. l'Egypte 21. Syria.
 - β. *rigidula* DC. prodr. II, 150.
Raetam Forsk. fl. arab. aeg. 214.
Spartium monospermum L. cod. Nro. 5190.
 - *Raetam* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. XIX, 288. t. 16. f. 1.
 3. 5 *Gussónei* Bark. Webb. in ann. d. sc. nat. 2. sér. XX, 280. Sicilia.
Duriaei Guss. fl. sic. syn. II, 253.
Genista monosperma Guss. fl. sic. prodr. II, 363.
 - *Gussonei* Bert. fl. it. VII, 330.

CVI. *Boelia* Bark. Webb.

(Guil. Boel, Belgus, ineunte saec. XVII penins. pyrenaicam et Africam borealem permigravit.)

1. 5 *sphaerocárpa* Bark. W. ot. hisp. ed. nov. (1853) 21. t. 15. 16. Penins. pyrenaica.
Genista sphaerocarpa Lam. enc. méth. II, 616.
Retama sphaerocarpa Boiss. voy. d. le mid. de l'Esp. II, 144.
Spartium sphaerocarpum L. cod. Nro. 5191.

CVII. *Stauracanthus* Lk.

(σταυρος, crux, Kreuz et άξανθα, spina, Dorn.)

1. 5 *aphyllus* Lk in Schrad. n. Journ. II, p. 52. bot. reg. t. 1452.

Lusitania.

- Ulex genistoides* Brot. lusit. II, 78.
- *mitis* Hort.
2. *h* *spartioides* Bark. Webb ot. hisp. (1853) 27. t. 19. Hispania.
 Ulex genistoides Clem. ens. de la vid. 291.
 β) *Willkommii* Bark. W. ot. hisp. (1853) 27.
 Ulex genistoides Willk. pl. nov. et rar. 19.
3. *h* *spectabilis* Bark. W. ot. hisp. (1853) 27. t. 29. Lusitania.

CVIII. *Nepa* Bark. W.

(nepa, Scorpion, ob ramulos spinaeformes.)

1. *h* *lurida* Bark. W. ot. hisp. (ed. nov. 1853). 28. t. 21. Lusitania.
2. 5 *Webbiana* Bark. W. ot. hisp. 29. t. 22. Hispania.
 Ulex Webbiana Coss. not. s. quelqu. pl. d'Esp. 32.
3. 5 *Cossoni* Bark. W. ot. hisp. 29. t. 23. Hispania.
4. 5 *Boivini* Bark. W. ot. hisp. 30. t. 24. Hispania.
 Ulex Boivini Bark. W. it. hisp. 51.
5. 5 *Vaillantii* Bark. W. ot. hisp. 31. t. 27. Lusitania.
6. 5 *Escayracii* Bark. W. ot. hisp. 32. t. 28. Lusitania.

CIX. *Erinacea* Link.

(Erinaceus, Igel, ob spinas horridas.)

- * 1. 5 *Anthyllis* Lk Handb. z. Erk. d. nutz. Gew. II, 156. Africa borealis,
 pungens Boiss. voy. d. le mid. de l'Esp. II, 416. penins. pyrenaica,
 Anthyllis Erinacea L. cod. Nro. 5302. Corsica.

CX. *Ulex* L.

(apud Plinium fruticulus Rosmarino similis.)

- * 1. 5 *europaeus* L. cod. Nro. 5243. Gu. Abb. d. d. Holzart. t. 123. Italia superior et
 compositus Mach meth. 289. mediâ, Corsica.
 grandiflorus Pourr. in hist. et mém. de l'acad. roy. Helvetia, Germania,
 d. sc. Toul. III, 333. Dania, Scania, ? Anglia,
 vernalis Thore ess. d'une chlor. du départ. d. Land. 299. Gallia, Hispania,
 β) *flore pleno.* Africa borealis,
 γ) *ligusticus* Not. prosp. della fl. lig. 23. ins. canariensis.
 δ) *strictus* Mack. in transact. of the r. irish acad. XIV, fl. hibern. 74.
 hibernicus G. Don. dichl. pl. II, 148.
 fastigiatus Hort.
2. 5 *nanus* Forst. in Symond. syn. pl. ins. brit. ind. 160. Lusitania, Gallia,
 autumnalis Thore ess. d'une chlor. du départ. d. Land. 209. Britannia.
 europaeus Brot. fl. lusit. II, 78.
 - β. L. cod. Nro. 5243.
 minor Roth cat. bot. I, 83.
- * 3. 5 *parviflorus* Pourr. in hist. et mém. de l'ac. roy. de sc. de
 Toul. III, 334. Bark. W. ot. hisp. t. 29 C. Hispania et Gallia austr.
 australis Clem. ens. de la vid. 291.
 provincialis Lois. not. s. quelq. pl. à ajout. à la fl. de Fr. 105. t. 6. f. 2.
 β) *elachistanthos* Bark. W. ot. hisp. (1853) 38.
- 4) 5 *Gallii* Planch. in ann. d. sc. nat. 3. sér. XI, 213. t. 9. f. 1. Gallia occidentalis,
 ? *autumnalis* Bab. sched. crit. 12. Anglia borealis.
 β) *Babingtonii* Bark. W. ot. hisp. (1853) 35.
 nanus β. *major* Babingt. in ann. of the nat. hist. V, 302.
 γ) *humilis* Planch. in ann. d. sc. nat. 3. sér. XI, 213. t. 9. f. 2.
5. 5 *scaber* Kunze in Flora 1846 II, 696. Bark. W. ot. hisp. t. 32. Africa boreali-occid.,
 β) *congestus* Bark. W. ot. hisp. (1853) 40. Hispania.
 γ) *glabrescens* Bark. Webb ot. hisp. (1853) 40.
 δ) *parviflorus* Bark. Webb ot. hisp. (1853) 40.
6. 5 *Bourgaeanus* Bark. W. ot. hisp. (1853) 39. t. 31. Hispania.
7. 5 *baeticus* Boiss. elench. pl. nov. hisp. 30. voy. d. le mid. d'Esp. II, 132. Hispania.
8. 5 *Welwitschianus* Planch. in ann. d. sc. nat. sér. XI, 216. Bark.
 W. ot. hisp. t. 34. Lusitania.
9. 5 *janthocladius* Bark. W. ot. hisp. (1853) 40. t. 33. Hispania australis.
 β) *calycotomoides* Bark. W. ot. hisp. (1853) 41. t. 35 B.
10. 5 *Willkommii* Bark. W. ot. hisp. (1853) 42. t. 35 A. Hispania australis.
 β) *Funkii* Bark. W. ot. hisp. (1853) 42.
11. 5 *Jussiaei* Bark. W. ot. hisp. (1853) 42. t. 36. Lusitania.
12. 5 *opisthólepis* Bark. W. ot. hisp. (1853) 43. t. 36 A. Hispania.

13. 5 *densus* Welw. in ann. d. sc. nat. 3. sér. XI, 215. Bark.
W. ot. hisp. t. 37. Lusitania.
14. 5 *argenteus* Welw. in Bark. W. ot. hisp. 44. t. 38A. Lusitania.
15. 5 *erinaceus* Welw. in Bark. W. ot. hisp. 44. t. 38B. Lusitania.
- CXI. Adenocarpus DC.**
(δδρυ, glandula, Druese et καρπος, fructus, Frucht.)
1. 5 *hispanicus* DC. fl. franç. suppl. 549. Hispania.
Cytisus anagyrius l'Her. stirp. aut min. cogn. 184.
- *hispanicus* Lam. enc. méth. II, 248.
2. 5 *intermedius* DC. fl. franç. suppl. 549. Italia, penins. pyren.,
Cytisus complicatus Brot. fl. lusit. II, 92. Madera.
3. 5 *commutatus* Guss. fl. sic. prodr. II, 537. Sicilia, Gallia.
intermedius B. Ten. fl. nap. V, 97.
parvifolius γ. Bert. fl. it. VII, 566.
Telonensis DC. fl. franç. V, 550.
cebennensis Del. ind. sem. Monsp. 1838.
4. 5 *Bivonii* Presl fl. sic. I, p. XIX. Sicilia.
parvifolius β. *humilis* Bert. fl. it. VII, 566.
Genista Bivonii Presl del. Prag. 33.
5. 5 *parvifolius* DC. fl. franç. suppl. 549. Gallia, penins. pyren.,
complicatus Gay in Dur. pl. astur. 350. Italia.
divaricatus Lk Handb. z. Erk. d. Gew. II, 155.
intermedius Ten. fl. Napl. V, 96.
Cytisus complicatus DC. fl. franç. IV, 2. 533. nouv. Duh. V, t. 47. f. 2.
- *divaricatus* l'Her. stirp. nov. aut min. cogn. 184. S. et Sm. fl. gr. t. 704.
- *parvifolius* Lam. fl. franç. II, 248.
Genista divaricata Lk enum. pl. hort. Berol. II, 224.
Spartium complicatum L. cod. Nro. 5196.
6. 5 *Telonensis* Rob. cat. pl. Toul. 24. Boiss. voy. d. le mid. de Hispania.
l'Esp. bot. 418. t. 43.
grandiflorus Boiss. in bibl. univ. de Gén. 1836.
Cytisus Telonensis Lois. fl. gall. 446.
Spartium complicatum Gouan hort. Monsp. 356.
7. 5 *Boissieri* Bark. Webb it. hisp. 53. otia hisp. t. 4. Hispania.
decorticans Boiss. in bibl. univ. de Gén. Fevr. et voy. d. le
mid. de l'Esp. bot. 417. t. 41.
8. 5 *graeus* Gris. spic. fl. Rum. et Bith. I, 10. Rumelia, Graecia.
Cytisus divaricatus Sibth. et Sm. fl. gr. t. 704.
9. 5 *villosus* Boiss. diagn. pl. orient. II, 14. Asia minor.

INDEX.

Acacia Willd. V.
arrofula Don 3 et VII, 1.
Cooleyi Eat. II, 1.
Coronja Ham. III, 1.
elata Grab. VI, 1.
frutescens Steud. 2.
Julibrissin Willd. VI, 6.
Lebbek Willd. VI, 8.
macrophylla Bge VI, 8.
megaladena Desv. 3.
mollis Wall. VI, 2.
Nemu Willd. VI, 5.
obliquifolia Mart. et Gal. VII, 3.
pennata Willd. 3.

Acacia *prensans* Lowe 3.
procera Willd. VI, 1.
Smithiana Wall. VI, 7.
Stephaniana Willd. I, 1.
stipulata DC. VI, 7.
texensis Torr. and Gr. 1.
Adenocarpus DC. CXI.
Bivonii Presl 4.
Boissieri Bark. Webb. 7.
cebennensis Del. 3.
complicatus Gay 5.
commutatus Guss. 3.
divaricatus Lk. 5.
decorticans Boiss. 7.

- Adenocarpus** *graeus* Gris. 8.
grandiflorus Boiss. 6.
hispanicus DC. 1.
intermedius DC. 2.
 - Ten. 5.
 - B. Ten. 3.
parvifolius DC. 5.
 - β . *humilis* Bert. 4.
 - γ . Bert. 3.
Telonensis DC. 3.
 - Rob. 6.
villosus Boiss. 9.
Wolgensis Spreng. LXXI, 1.
Aeschynomene *hispidula* LXIX, 4.
Agastianis Raf. XXXI.
secundiflora Raf. 1.
Albizzia Dur. VI.
Julibrissin Boiv. 6.
 - β . *mollis* Dur. 2.
latifolia Boiv. 8.
Lebbek Benth. 8.
lucida Benth. 3.
Milletti Benth. 4.
mollis Benth. 2.
Nemu Benth. 5.
procera Benth. 1.
stipulata Benth. 7.
Algarobia *glandulosa* Torr. and Gr. 1, 2.
Alhagi Desv. LIX.
mannifera Desv. 1.
maurorum DC. 1.
Nepalensium DC. 2.
Ammodendron Fisch. XXVII.
caspium Eichw. 1.
Eichwaldii Led. 1.
Karelini F. et M. 3.
Sieversii Fisch. 2.
Ammothamnus Bge XXIV.
Lehmanni Bge 1.
Amorpha L. LX.
californica Nutt. 8.
canescens Nutt. 6.
caroliniana Croom 7.
coerulea Lodd. 1 β .
croceo-lanata Wats. 5.
cyanostachya Curt. 7.
elata Hort. ad fin.
fragrans Sweet 4.
fruticosa L. 1.
glabra Dsf. 7.
herbacea Walt. 3.
humilis Tausch 4.
laevigata Nutt. 11.
Lewisii Lodd. 2.
microphylla Pursh 4.
nana Nutt. 4.
ornata Wender. 1 γ .
paniculate Torr. and Gr. 12.
pubescens Willd. 3.
pumila Pursh 3.
Tenassensis Shuttlew. 9.
Roemeriana Scheele 10.
Anagyris L. XXXII.
cretica Mill. 2.
foetida L. 1.
 - Lour. XXXV, 1.
Anagyris *foetida* β . Bert. 2.
glauca Hort. 1 β .
neapolitana Ten. 2.
nepalensis Grah. XXXIV, 1.
sinensis Steud. XXXV, 1.
Anonis *arvensis* Moench LXXXII, 14.
fruticosa Medik. LXXXII, 8.
spinosa Moench LXXXII, 17.
Anthyllis L. LXXV.
argentea Duf. LXXIX, 2.
Aspalathi DC. LXXXIV, 4.
barba Jovis L. 1.
cretica Lam. LVI, 1.
cuneata Dum. C. LVII, 3.
cytisoides L. LXXXIV, 1.
Erinacea L. CIX, 1.
Genistae Duf. LXXXIV, 2.
Hermaniae L. LXXXIV, 3.
podocephala Boiss. 4.
Pseudo-Cytisus Walp. LXXIX, 2.
sericea Lag. 3.
splendens Willd. 2.
tragacanthoides Dsf. LXXVI, 19.
 - Lab. LXXVI, 104.
Apios *frutescens* Pursh XLIII, 1.
Argyrolobium Spach C.
calycinum Jaub. et Sp. 1.
gracile Fenzl 2.
Linneanum Walp. 3.
lotoides Benth. 1.
Aspalathoides DC. LXXXIV.
Aspalathi C. Koch 4.
Cytisi C. Koch 1.
Genistae C. Koch 2.
Hermaniae C. Koch 3.
Aspalathus *cretica* LXXXIV, 4.
cuneata Don LVII, 3.
erinacea Lam. LXXXIV, 3.
indica L. LXVI, 6.
Aspalathium *bituminosum* Medik. LXV, 1.
Astragalus L. LXXXVI.
Ammodendron Bge 147.
Ammodytes Pall. 136.
andrachnaefolius Fenzl 67.
angustifolius Lam. 101.
 - S. et Sm. 101.
Antabicus Boiss. 27.
arborescens Bge 143.
Arbuscula Pall. 152.
arouatus Kar. et Kir. 151.
argyrostachys Boiss. 151.
argyrothamnus Boiss. 59.
aristatus l'Her. 87.
 - S. et Sm. 49.
 β) *australis* Boiss. 88.
armatus Willd. 19.
Arnacantha Bieb. 32.
aureus Willd. 40.
barba Jovis DC. 7.
Bethlehemiticus Boiss. 55.
brachycalyx Fisch. 73.
brachypodus Boiss. 113.
brachypus Schrenk 141.
bracteolatus DC. 127.
breviflorus DC. 13.
 - β . DC. 12.

Astragalus Bruguieri Boiss. 18.
bunophilus Boiss. et Hoh. 116.
campylanthus Boiss. 115.
Caraganae F. et M. 89.
caspius Bieb. 45.
caucasicus Pall. 74.
cephalanthus DC. 122.
cephalonicus Presl 26.
chromolepis Boiss. et Hoh. 41.
chrysostachys Boiss. 124.
Clusii Boiss. 91.
coluteoides Willd. 104.
compactus C. A. Mey. 34.
 - Lam. 33.
 - β . Lam. 39.
 - β . Willd. 32.
condensatus Led. 60.
crenophilus Boiss. 72.
cretensis Pall. 45.
creticus DC. 53.
 - Lam. 45.
 - Willd. 83.
cruentiflorus Boiss. 53.
cryptocarpus DC. 4.
curviflorus Boiss. 94.
cystocalyx Led. 131.
Damascenus DC. 104.
deinacanthus Boiss. 64.
dendroides Kar. et Kir. 133.
denudatus Stev. 35.
diphtherites Fenzl 28.
Drusorum Boiss. 30.
ebenoides Boiss. 120.
echinoides l'Herit. (echioides W.) 83.
Echinus DC. 45.
Eremothamnus Kar. et Kir. 155.
erianthus Willd. 61.
erinaceus Presl 21.
eriocaulos DC. 9.
eriocephalus Willd. 13.
erythrolepis Boiss. 112.
fasciculifolius Boiss. 20.
flagineus Boiss. 36.
flavescens Boiss. 102.
floccosus Boiss. 75.
Forskalei Boiss. 16.
fruticosus Pall. 154.
 - Asso 91.
Gebleri Fisch. 140.
Genargenteus Moris 101 γ .
genistoides Boiss. 25.
Gerardianus Grah. LXXIII, 18.
globiflorus Boiss. 51.
glumaceus Boiss. 114.
gossypinus Boiss. 37.
Grahamianus Royle 82.
granatensis Lam. 84.
gummifer Labill. 68.
 - β . hispidulus DC. 76.
Hasbeyanus Boiss. 65.
Hermoneus Boiss. 98.
Hohenackeri Boiss. 117.
horizontalis Kar. et Kir. 153.
horridus Boiss. 93.
hyrcanus Pall. 139.
infestus Boiss. 10.

Astragalus intermedius Boiss. 134.
jodotropis Boiss. 90.
jubatus Boiss. 80.
Karakugensis Bge 146.
kurdicus Boiss. 70.
lagopodoides Vahl 126.
lagopoides Lam. 125.
 - β . Lam. 126.
Lagurus Willd. 125.
 - Eichw. 126.
Lamarckii Boiss. 39.
lasiosemius Boiss. 24.
leiocladus Boiss. 3.
lepidanthus Boiss. 56.
leptocaulis Led. 144.
leucacanthus Boiss. 22.
leucophyllus Willd. 6. 45 β .
longifolius Lam. 66.
lycioides Boiss. 92.
macrosemiis Boiss. 100.
maritimus Mor. 137.
Massiliensis Lam. 86.
 - β . montanus Mut. 101 γ .
melanotrichus Led. 132.
mesoleios Boiss. 2.
mesopotamicus Boiss. 128.
Meyeri Boiss. 34.
Michauxianus Boiss. 12.
microcephalus Willd. 35.
microphysus Boiss. 106.
Mitchellianus Boiss. 62.
mollissimus Presl 44.
mucronifolius Boiss. 103.
multiceps Wall. 95.
murinus Boiss. 105.
myriacanthus Boiss. 38.
Nevadensis Boiss. 88.
ochrochlorus Boiss. 54.
Odessanus Bess. 154.
oleaefolius DC. 63.
oligophyllus Schrenk 17.
olympicus Pall. 6.
ovigerus Boiss. 79.
Parnassi Boiss. 49.
paucijugus Schrenk 142.
persicus F. et M. 126.
physocalyx Kar. et Kir. 131.
plumosus Willd. 43.
 - β . tomentosus Boiss. 48.
polyacanthos Wall. LXXIII, 19.
 - Royle 81.
polyceras Kar. et Kir. 149.
Poterium Pall. 32.
 - Vahl 84.
Prusianus Boiss. 58.
Pseudo-Tragacantha d'Urv. 50.
 - Pall. 42.
psilacanthus Boiss. 78.
psilodonticus Boiss. 71.
psoraleoides Lam. 138.
ptilodes Boiss. 52.
ptychophyllus Boiss. 108.
pugniformis l'Her. 66.
 - Willd. 63.
pungens Willd. 127.
pycnophyllus Stev. 33 γ .

- Astragalus pycnophyllus* var. *Hohenack.* 35.
radicatus Dne 23.
raphiodontus Boiss. 5.
Rauwolfii Vahl 15.
remotiflorus Boiss. 107.
retusus DC. 104.
- Willd. 85.
Reuterianus Boiss. 119.
Roussaeanus Boiss. 76.
Royleanus C. Koch 77.
Russelii Boiss. 15.
sciureus Boiss. 110.
scleropodius Led. 129.
scleroxylon Bge 148.
Scorpius Boiss. 14.
sempervirens Lam. 87.
setifer DC. 47.
siculus Biv. 45.
- DC. 87.
- β . *Nebrodenis* Guss. 43.
Sieberi DC. 23.
Sirinicus Tenor 101 γ .
songaricus C. Koch 17.
spinosissimus Wall. LXXIII, 20.
strictifolius Boiss. 29.
strobilifer Lindl. 69.
- Royle 77.
submitis Boiss. 97.
suffruticosus DC. 150.
Susianus Boiss. 111.
taeniolepis Boiss. 126 β .
Talagonicus Boiss. 57.
thracicus Gris. 50.
Tmoleus Boiss. 48.
tortuosus DC. 96.
Tournefortii Boiss. 8.
Tragacantha L. 86.
- Ucria 45.
- Vill. 87.
- β . L. 84.
tricholobus DC. 118.
trigonus DC. 1.
tumidus Willd. 16.
- Willk. 19.
Turezinanowii Kar. et Kir. 135.
Tymphresteus Boiss. 99.
unifoliatus Bge 145.
vaginans DC. 123.
verus Oliv. 46.
- DC. 76.
vestitus Boiss. 109.
vimineus Pall. 154.
xanthotrichos Led. 130.
Bactyrolobium Fistula Willd. XV, 1.
Baptisia nepalensis Hook. XXXIV, 1.
Barba jovis argyrophylla Mnch LXXV, 1.
linearifolia Moench LXXXIV, 3.
Bauhinia L. XVI.
candida Rxb. 1 β .
chinensis Hk. et Arn. 1 γ .
- Vog. 2.
corymbosa Roxb. 6.
emarginata Roxb. 8.
Lingua DC. 7.
parviflora Vahl 4.
purpurea Wall. 1.
- Bauhinia racemosa* Lam. 4.
- Vahl 5.
retusa Roxb. 3.
scandens Burm. 6.
- L. 7.
spicata Koen. 4.
Vahlil W. et Arn. 5.
variegata L. 1.
- β . *chinensis* 6.
Boelia Bark. W. CVI.
sphaerocarpa Bark. W. 1.
Bonaga antiquorum Medik. LXXXII, 13.
arvensis L. Medik. LXXXII, 17.
- β . Medik. LXXXII, 18.
hircina Medik. LXXXII, 14.
Bonjeania Rchb. LXXXVIII.
recta Rchb. 1.
Broussonetia secundiflora Ort. XXXI, 1.
Caesalpinia L. X.
Bonducella L. XI, 1.
chinensis Roxb. 3.
Crista Thunb. 1.
japonica Sieb. et Zucc. 1.
lebbekoides DC. 4.
Millettii Hk. and Arn. 2.
pulcherrima Sw. XII, 1.
Cajanus argenteus Spreng. C, 3.
Callerya Endl. XIII.
tomontosa Endl. 1.
Calophaca Fisch. LXXI.
Hovenii Schrenk 2.
songarica Kar. et Kir. 2.
Wolgarica Fisch. 1.
Calycotome XCVIII.
cretica Presl 4.
infesta Guss. 2.
spinosa Lk 1.
- Presl 2.
villosa Lk 3.
Campylotropis Bge LVIII.
chinensis Bge 1.
Caragana Lam. LXXXIII.
Altagana Poir. 1.
arborescens Lam. 2.
arenaria Fisch. 6 β .
argentea Lam. LXXII, 1.
brevispina Royle 17.
Bungei Led. 3.
Chamlagu Lam. 8.
cuneata Mnch 4.
digitata Lam. 4.
- β . *angustifolia* Lam. 6 β .
ferox Lam. 13.
flava Poir. 21.
frutescens DC. 4.
fruticosa Bess. 2 β .
Gerardiana Royle 18.
gracilis Hort. 6 β .
grandiflora DC. 5.
inermis Moench 2.
jubata Poir. 15.
microphylla Lam. 1.
mollis Bess. 4 β .
mongolica Fisch. 2 β .
Moorkroftiana Benth. 16.
parvifolia Hoffmsng 11.

- Caragana polyacantha* Royle 19.
purpurea Hort. angl. 9.
pygmaea DC. 6.
Redowskii DC. 7.
spinosa DC. 13.
spinosissima Benth. 20.
tenuis Hoffmegg 12.
tragacanthoides Poir. 14.
versicolor Benth. 10.
- Cassia* L. XV.
Acalpulsensis H. B. K. 5 α.
bauhinoides A. Gr. 6.
bicapsularis L. 4.
biflora L. 5.
caroliniana Walt. 3.
chinensis Jacq. 3 α.
 - Lam. 2.
ciliata Raf. 3.
coromandelica Jacq. 3 α.
Crista Jacq. 5 β.
esculenta Roxb. 3 α.
Fistula L. 1.
frondosa Ait. 5 β.
galegaefolia L. 5.
geminiflora Schrank 3 γ.
grandiflora Pers. 2.
indica Poir. 3 α.
linearis Mich. 3.
occidentalis (L.) Vog. 3.
pallida Vahl 5 α.
planiflora L. 3.
purpurea Roxb. 3 α.
rhombifolia Roxb. 1 β.
sennoides Jacq. 4.
Sophera L. 3 α.
sopheroides Collad. 3 α.
tenuissima L. 5 β.
torosa Cav. 3 α.
torulosa Poir. 3 α.
- Cathartocarpus* *Fistula* Pers. XV, 1.
rhombifolius G. Don XV, 1 β.
- Ceratonia* L. XVII.
Siliqua L. 1.
- Cercis* L. XXXVII.
canadensis L. 3.
chinensis Bge 2.
occidentalis Torr. 4.
Siliquastrum L. 1.
 - var. Benth. 4.
- Chamaecytisus* Vis. XC.
austriacus Lk XCVII, 1.
biflorus Lk XCVII, 17.
capitatus Lk XCVII, 2.
dalmaticus Vis. 1.
elongatus Lk XCVII, 18.
hirsutus Lk XCVII, 21.
leucanthus Lk XCVII, 1 β.
purpureus Lk XCVII, 12.
supinus Lk XCVII, 3.
- Chamaefistula* *coromandelica* G. Don XV, 3 α.
chinensis G. Don XV, 2.
Sophera G. Don XV, 3 α.
torosa G. Don XV, 3 α.
- Chasmona* *argentea* E. Mey. C, 3.
calycina E. Mey. C, 1.
- Chronanthos* DC. LXXXVIII.
- Chronanthos* *liparioides* C. Koch 1.
pulchella C. Koch 2.
Villarsii C. Koch 3.
- Cladrastis* Raf. XXVIII.
tinctoria Raf. 1.
- Colutea* L. LXX.
aperta Moench 2.
arborescens L. 1.
cruenta Ait. 2.
Halepica Lam. 3.
hirsuta Roth 1.
humilis Scop. 2.
istria Mill. 3.
media Willd. 5.
melanocalyx Boiss. et Heldr. 4.
nepalensis Sims 6.
orientalis Lam. 2.
persica Boiss. 7.
Pocockii Ait. 3.
procumbens Mill. 3.
sanguinea Pall. 2.
spinosa Forsk. LXXXVI, 16.
Wolgarica Lam. LXXI, 1.
- Cornicina* *Pseudo-Cytisus* Boiss. LXXIX, 2.
- Corniola* Presl LXXXVII.
Amsantica Presl 6.
corsica Presl 21.
depressa C. Koch 4.
diffusa C. Koch 11.
dracunculoides C. Koch 15.
ferox C. Koch 17.
lucida C. Koch 22.
Mantica Presl 8.
Melia C. Koch 20.
microphylla Presl 18.
ovata Presl 7.
pontica C. Koch 3.
scariosa Presl 1.
Scorpius Presl 19.
sibirica Medik. 14.
tenella C. Koch 16.
tinctoria Presl 10.
triangularis Presl 1 γ.
virgata Presl 13.
- Coronilla* L. XLVIII.
argentea L. 6.
coronata Ucria 7.
emeroides Boiss. 1.
Emerus L. 2.
glauca L. 7.
hispanica Mill. 4.
juncea L. 3.
multiflora DC. 8.
pauciflora Lam. 2.
pentaphylla Desf. 5.
stipularis Lam. 4.
valentina Lam. 4.
 - Ucria 7 β.
- Corothisma* Presl LXXXIX.
diffusa Presl 1.
Halleri Presl 2.
myrtifolius Presl 3.
- Crotalaria* L. LXXXIII.
cytisoides Roxb. 3.
elliptica Rxb. 2.
oriantha S. et Z. 1.

Crotalaria macrostyla D. Don LXVII, 1.
psoraleoides D. Don 3.
Cyrtolobus ellipticus Wall. LXXXIII, 2.
Cytisopsis Jaub. et Sp. XCI.
dorycniifolia J. et Sp. 1.
Cytisus XCVII.
acutangulus Jaub. et Sp. XCV, 2.
Adami Poir. XCIX, 1 μ .
aeolicus Guss. 18.
affinis Boiss. CIII, 2.
 - Presl. XCVI, 3.
albus Lk XCV, 3.
alpinus Mill. 3. XCIX, 2.
 - Lam. XCIX, 1.
Alschingeri Vis. XCIX, 4.
anagyrius l'Her. CXI, 1.
angustifolius Spach XCIX, 2 β .
apulus Ten. 20 β .
arbores DC. CIII, 5.
argenteus L. C, 3.
argyreus Rehb. 20.
aspalathoides Spreng. LXXXVI, 55.
 - Vis. LXXXVI, 57.
Atleyanus Hort. CII, 4.
austriacus L. 1.
baeticus Steud. CIII, 4.
biflorus l'Hérit. 17.
 - bot. reg. 18.
bisfloreus Host 146.
bracteolatus Hort. angl. CII, 3.
calycinus Bieb. C, 1.
candicans Lam. CII, 1.
candidus Presl 16.
canescens Loisel. 29.
 - Maly 1.
capitatus Jacq. 2.
 - β . DC. 3.
 - β . pauciflorus Ebel 4.
Cassius Boiss. 9.
chrysobothrys O. et Dietr. CII, 3.
chrysotrichus Boiss. 3.
cinereus Host 17 γ .
 - Vis. LXXXVI, 60.
complicatus Brot. CXI, 2.
 - DC. CXI, 5.
creticus Boiss. 25.
decumbens Spach LXXXIX, 2.
diffusus Vis. LXXXIX, 1.
divaricatus l'Hér. CXI, 5.
 - Sbh. et Sm. CXI, 8.
drepanolobus Boiss. 8.
elongatus W. et K. 18.
eriocarpus Boiss. 7.
emeriflorus Rehb. 24.
falcatus Hort. 13.
 - W. et K. 21.
flaccidus Benth. 10.
fragrans Weld. XCIX, 3.
germanicus Vis. LXXXVI, 29.
glaber L. 17.
 - α . Lam. XCVI, 1.
 - β . Lam. XCV, 4.
glabratus Lk 31.
glabrescens Sart. 24.
græcus L. LXXXIV, 3.
grandiflorus Lk CIII, 1 δ .

Cytisus grandiflorus DC. CIII, 2.
heterophyllus Lapeyr. LXXXVI, 82.
hirsutissimus C. Koch 23.
hirsutus Jacq. CII, 1.
 - L. 21.
 - Pall. et Lam. 17.
 - Ucria XCVI, 2.
hispanicus Lam. CXI, 1.
holopetalus Fleischm. LXXXVI, 3.
infestus Guss. XCVIII, 2.
Kitabelii Vis. LXXXIX, 2.
Laburnum L. XCIX, 1.
 - β . Ait. XCIX, 1 β .
Lamarckii Ten. 21.
laniger DC. XCVIII, 3.
leucanthus W. et K. 1 β .
linifolius Lam. CII, 5.
Lobelii Tsch XCV, 4.
lotoides Pourr. 3.
 - Willd. C, 1.
Malacitanus Boiss. CIII, 7.
Malyei Steud. 1.
Milleri Steud. 30.
mollis Willd. XCVI, 2 β .
Monspessulanus Gouan CII, 1.
multiflorus Lindl. 18 β .
nanus Willd. C, 1.
nigricans L. XCV, 1 et 2.
 - Pall. LXXI, 1.
obscurus Roch. 1 γ .
onustus Tausch 2 β .
orientalis Loisel. LXXXVIII, 1.
pallidus Poir. CII, β .
parvifolius Lam. CXI, 5.
parviflorus Boiss. XCIV, 1 β .
patens L. CIII, 3.
pauciflorus Willd. C, 1.
pendulinus L. fl. CIII, 3.
persicus Burm. CIV, 6.
pilosus Vis. LXXXVI, 63.
pinnatus Pall. LXXI, 1.
polycephalus Tausch 1 γ .
polytrichus Bieb. 22.
ponticus Willd. 14.
procerus Lk CIV, 7.
procumbens Spreng. LXXXIX, 2 δ .
 - Borkh. 6 δ .
prostratus Scop. 6.
pterocladus Boiss. XCIV, 2.
pubescens Gilib. 3.
 - Mnch CII, 1.
pulchellus Vis. LXXXVIII, 2.
pumilus Not. 21.
purpureus Scop. 12.
 - Lam. 17.
 - β . Lam. 14.
pygmaeus Willd. C, 3 β .
racemosus Marnock CII, 3.
radiatus Koch LXXXVI, 2.
ramentaceus Sieb. CXIX, 3.
ramosissimus Ten. 20 β .
Ratisbonensis Schaeff. 17.
rufulus Presl 3.
ruthenicus Fisch. 17.
sagittalis Koch XCII, 4.

- Cytisus scoparius** Lk CIII, 1.
sericeus Vis. LXXXVI, 71.
serotinus Kit. 21 δ .
sessilifolius L. XCV, 4.
Smyrnaeus Boiss. 5.
sordidus Lindl. XCIX, 1 ζ .
speciosus Presl 13.
spinescens Sieb. 20.
spinus Koch XCVIII, 2.
 - Lam. XCVIII, 1.
 - Sav. XCVIII, 3.
 - Sieb. 20.
sulphureus Tausch 2 γ .
supinus Alsch. 21.
 - Bert. 6 γ .
 - DC. 6.
 - Jacq. 17.
 - L. 3.
 - Ten. 20 β .
 - Vill. 2.
 - β . L. 17.
 - β . Wahlenb. 17 γ .
 - *Wolgensis* Fisch. 17.
sylvestris Vis. LXXXVI, 24.
 - β . *pungens* Vis. LXXXVI, 26.
Telonensis Loisel. CXI, 6.
Thirkeanus C. Koch 15.
tinctorius Vis. LXXXVII, 10.
Tmoleus Boiss. 11.
Tommasinii Vis. 4.
Tournefortianus Loisel. 14. et 22.
triangularis Vis. LXXXVII, 1.
tribracteolatus Webb. 26.
triflorus l'Herit. XCVI, 2.
 - Lam. 21.
 - β . *siculus* Guss. XCVI, 3.
Uralensis Hort. 2.
Villarsii Vis. LXXXVIII, 3.
villosus Pourr. XCVI, 2.
 - Presl 2 δ .
virgatus Steud. CIII, 2.
 - Vest 21.
virgulatus Rehb. 28.
viscosus Hill 27.
Weldenii Vis. XCIX, 3.
Wolgaricus L. LXXI, 1.
Zanoni Turr. C, 3.
Dalbergia L. fil. XX.
Diphaca Pers. XLIX, 1.
japonica G. Don 3.
latifolia Roxb. 1.
sericea G. Don 2.
Dalea L. LXIII.
formosa Torr. 1.
frutescens A. Gr. 2.
Dendrospartum XCIII.
Aetnense Spach 1.
purgans Spach XCV, 1.
sardoum Spach 2.
Dermatophyllum *speciosum* Scheele XXV, 1.
Derris Lour. XXIII.
trifoliata Lour. 1.
Desmanthus Willd. II.
depressus Humb. et Bonpl. 2.
diffusus Willd. 3.
Jamesii Torr. and Gr. 1.
Desmodium Desv. LI.
angulatum DC. 19 β .
arborescens Sweet L, 2.
capitatum DC. 19 γ .
collinum Wall. 2.
concinnum DC. 11.
confertum DC. 9.
dioicum DC. 18.
dubium Lindl. 4.
elegans DC. 6.
floribundum G. Don 16.
heterocarpum DC. 19 δ .
Hippocrepis DC. 19 ϵ .
latifolium DC. 2.
laxiflorum DC. 5.
laxum DC. 12.
lutescens Dsv. LII, 2.
microphyllum DC. 20.
multiflorum DC. 16.
nutans Hook. 7.
oxyphyllum DC. 14.
pendulum Wall. 8.
podocarpum DC. 13.
polycarpum DC. 19.
pseudotriquetrum DC. 1.
purpureum Hk. et Arn. 19.
retusum G. Don 19 β .
Sambuense (Suëmbuëse) DC. 10.
sequax Wall 15.
serpens Wall. 19.
tenue Grah. 19.
tiliaefolium G. Don 17.
triquetrum DC. 3.
Dicerma DC. LII.
elegans DC. 2.
pulchellum DC. 1.
Diphaca Lour. XLIX.
cochinchinensis Lour. 1.
Diplonyx Raf. XLIV.
elegans Raf. 1.
Dolichos L. XLV.
frutescens Ham. 1.
japonicus Spreng. XLIII, 4.
polystachyus Thunb. XLIII, 4.
Dorycnium L. (Dorychnium Mch) LXXIX.
angustifolium Moench LXV, 1.
ibericum Willd. 1.
latifolium Willd. 1.
Pseudo-Cytisus C. Koch 2.
rectum Ser. LXXXVIII, 1.
Drymosparton *Aetnense* Presl XCIII, 1.
purgans Presl XCV, 1.
sardoum Presl XCVI, 2.
Dumasia DC. XXXI.
truncata Sieb. et Zucc. 1.
Ebenus L. LVI.
barbigera Boiss. 3.
cretica L. 1.
hirsuta Jaub. et Sp. 5.
laguroides Boiss. 2.
macrophylla Jaub. et Sp. 4.
Montbretii Jaub. et Sp. 2.
pogonotropis Jaub. et Sp. 3.
Edwardsia Salisb. XXVI.
mollis Royle 1.
Emerus *major* Mill. XLVIII, 2.

- Emerus minor* Mill. XLVIII, 2.
Erinacea Lk CIX.
 Anthyllis Lk. 1.
 pungens Boiss. 1.
Erythrina arborescens Roxb. L, 2.
Eversmannia Bge LXXIV.
 hedysaroides Bge 1.
Eysenhardtia LXII.
 amorphoides H. B. K. 1.
 Drummondii Torr. et Gr. 1.
 spinosa Engelm. 2.
 texana Scheele 1.
Flemingia Roxb. XLVII.
 semialata Roxb. 1.
Galactia R. Br. XL.
 marginalis Benth. 1.
Genista L. LXXXVI.
 acanthoclada DC. 14. 15.
 aegyptiaca Spreng. 44.
 Aelnensis DC. XCIII, 1.
 - Mor. XCIII, 2.
 alba Lam. XCV, 3.
 albida Bess. LXXXVII, 4 γ.
 - Bieb. 62. 70.
 algarbiensis Brot. 32.
 Alpini Spach 14.
 Amsantica (Anxantica) Ten. LXXXVII, 6.
 anatolica Boiss. 38.
 ancistrocarpa Sp. 54.
 anglica L. 53.
 angulata Lk XCIV, 1.
 Antiochia Boiss. LXXXVII, 2.
 aprutica Walp. 43.
 arborea Poir. CIII, 5.
 arcuata Koch 25.
 argentea Noul. C, 3.
 aristata Presl 28.
 armeniaca Spach 68.
 aspalathoides Boiss. 58.
 - Poir. 55.
 - β. confertior Mor. 57.
 atlantica Sp. 35.
 Aucheri Boiss. 4.
 baetica Spach 58.
 biflora DC. 10.
 barbara Munby 1.
 Bivonii Presl CXI, 4.
 Boissieri Spach 22.
 bracteolata Lk CII, 3.
 - Willd. CIV, 8.
 britannica Hort. 53.
 Broteri Poir. 83.
 Bruguieri Spach 15.
 canariensis bot. reg. CII, 1.
 caespitosa C. Koch 67.
 candicans L. CII, 1.
 cantabrica Spach LXXXV, 4.
 cappadocica Spach 5.
 carinalis Gris. LXXXVII, 12.
 Cassia Boiss. 40.
 cephalantha Sp. 7.
 cinerea DC. 60.
 clavata Poir. XCII, 1.
 commixta Spach LXXXVII, 5.
 corsica DC. LXXXVII, 21.
 Cupani Guss. 51.
Genista cuspidata Steud. 31.
 dahurica Hort. ad fin.
 dalmatica Bartl. et Wendl. 26.
 - Ten. 27.
 decipiens Spach 42.
 decumbens Ait. LXXXIX, 2.
 defoliata β. Lam. CV, 1.
 Delarbrei Lec. et Lam. LXXXVII, 9.
 depressa Bieb. LXXXVII, 4.
 - Ten. LXXXVII, 11.
 diffusa Willd. LXXXIX, 1.
 - Ten. LXXXVII, 11.
 divaricata Lk CXI, 5.
 dracunculoides Spach LXXXVII, 15.
 Duriaei Spach 45.
 Echinus Spach 17.
 elata Wender. (elatior Koch) LXXXVII, 13.
 elliptica Steud. CIV, 4.
 ephedroides DC. 13.
 - Guss. 12.
 equisetiformis Spach XCII, 2.
 ericetorum Hffmssg 50.
 erinacea Gilib. 20.
 eriocarpa Kze CII, 2.
 eriodada Spach 34.
 exaltata Lk 74.
 falcata Brot. 52.
 fasselata Dne 19.
 ferox Poir. LXXXVII, 7.
 filipes Hort. ad fin.
 Friedrichsthaliana Walp. 16.
 florida Asso 60.
 - L. 75.
 galioides Spach 50 β.
 Gasparrini Spach 12.
 Genuensis Pers. LXXXVII, 1.
 germanica Brot. 42.
 - L. 29.
 Gibraltaria DC. 47.
 Godetii Spach 64.
 gracilis Spach LXXXVII, 12.
 Gussonei Bark. W. CV, 3.
 gymnoptera Dub. 13.
 Haenseleri Boiss. 56.
 Halléri Reyn. LXXXIX, 2.
 heterophylla DC. 82.
 hirsuta DC. 33.
 - β. *Cuspidata* DC. 31.
 - γ. *orientalis* DC. 36.
 - δ. *algarbiensis* DC. 32.
 - Moench CIII, 1.
 - Ten. 27.
 - Vahl 31.
 hispanica L. 44.
 - Wulff. 24.
 - Host 26.
 holopetala Rehb. 3.
 horrida DC. 20.
 - Bark. Webb 21.
 humifusa L. 70.
 - Thore 63.
 - Vill. LXXXVIII, 3.
 - Wulff. LXXXIX, 1.
 humilis Ten. LXXXVII, 11.
 inermis Gilib. LXXXVII, 10.
 infesta Steud. XCVIII, 2.

Genista involucrata Spach 69.

- italica* Lodd. 77.
- Januensis* Viv. LXXXVII, 1.
- Jaubertii* Spach 6.
- juncea* Eichw. CIII, 1.
 - Scop. CIV, 1.
- juniperina* Spach 48.
- lamprophylla* Spach LXXXVII, 6.
- lanuginosa* Spach 33.
- lasiantha* Spach LXXXV, 1.
- lasiocarpa* Spach LXXXVII, 8.
- leptoclada* Gay 78.
- leptophylla* Spach LXXXVII, 10 β.
- libanotica* Boiss. 8.
- linifolia* L. CII, 5.
 - Vill. 60.
- liparioides* Boiss. LXXXVIII, 1.
- Lobelii* DC. 57.
 - d'Urv. 14.
- lucida* Camb. LXXXVII, 22.
- lusitanica* Andrews 50.
 - Brot. 23.
 - Boiss. 22.
 - Desf. 20.
 - L. 23 β.
- lydia* Boiss. LXXXVII, 1 β.
- Mantica* Poll. LXXXVII, 8.
- Melia* Boiss. LXXXVII, 20.
- Michelii* Spach 27.
- micanantha* Ort. 84.
- microphylla* Mor. LXXXVII, 18.
- minor* Lam. 53.
- mollis* DC. 78.
- monosperma* Del. CV, 2.
 - Guss. CV, 3.
 - Lam. CV, 1.
 - β. *rigidula* DC. CV, 2.
- montana* Hort. ad fin.
- Montbretii* Spach 65.
- Morissii* Colla LXXXVII, 18.
- murcica* Coss. 73.
- multibracteata* Tausch LXXXVII, 13 β.
- multicaulis* Lam. 66.
- multiflora* Lois. XCV, 3.
- nervata* Kit. LXXXVII, 7 β.
- nitens* Lk CII, 5.
- nodosa* Tausch 63 γ.
- numidica* Spach 11.
- obtusiramea* Gay 61.
- Olivieri* Spach 36.
- odorata* Moench CIV, 1.
- orientalis* Spach 37.
- ovata* Mut. LXXXVII, 8.
 - W. et K. LXXXVII, 7.
 - β. *humilior* Bert. LXXXVII, 8.
- parviflora* Brot. 83.
 - DC. XCIV, 1.
- parvifolia* G. Don LXXXVII, 18.
- patens* DC. CIII, 3.
- patula* Bieb. LXXXII, 10 β.
- peloponnesiaca* Spach 18.
- pedunculata* l'Her. LXXXIX, 2.
- pendulina* Gilib. 23.
 - Poir. CIII, 5.
- Perreymondi* LXXXVII, 8 β.
- Pestalozzæ* Boiss. 80.

Genista pilocarpa Lk 79.

- pilosa* L. 63.
 - β. *humifusa* Lap. LXXXVIII, 3.
- polygalaephylla* (*polygalaefolia*) Brot. 74.
- polytricha* Spach LXXXVII, 4.
- pontica* Spach LXXXVII, 3.
- procumbens* W. et K. LXXXIX, 2 δ.
 - B. *elata* Ten. LXXXIX, 2.
- prostrata* Lam. LXXXIX, 2.
- pseudopilosa* Coss. 72.
- ptilophylla* Spach LXXXVII, 4 β.
- pubescens* Lange LXXXVII, 10 γ.
- pulchella* Vis. LXXXVIII, 2.
- purgans* ? L. et Lam. XCV, 1.
- racemosa* Hort. CII, 3.
- radiata* Scop. 2.
 - Vill. 20.
 - β. *nana* Sp. 3.
- Raetam* Forsk. CV, 2.
- ramosissima* Boiss. 60.
 - Poir. 59.
- repens* Lam. 63.
- rigens* Presl 51.
- rostrata* Poir. 50.
- sagittalis* L. XCII, 4.
- Salzmanni* DC. 57 β.
- scariosa* Viv. LXXXVII, 1.
- scolopendria* Spach LXXXV, 2.
- scoparia* Lam. CIII, 1.
 - Vill. 60.
- scorpioides* Spach 49.
- Scorpius* DC. LXXXVII, 19.
- sericea* Wulff. 70.
 - Alsch. LXXXVIII, 2.
- sessilifolia* DC. 85.
- sibirica* Falk LXXXVII, 10 et 14.
 - L. LXXXVII, 10. 14.
 - Rehb. LXXXVII, 13.
- spartioides* Spach 9.
- spathulata* Spach LXXXVII, 10 e.
- sphacelata* Spach 19.
- sphaerocarpa* Lam. CVI, 1.
- spiniflora* Lam. LXXXVII, 19.
- splendens* Bark. Webb CII, 5 β.
- stenoptera* Spach LXXXV, 3.
- striata* Hill 81.
- stylosa* Steud. CIV, 8.
- svlvestris* Scop. 24.
- Tenorei* Steud. LXXXVII, 11.
- tenella* Willk. LXXXVII, 16.
- terniflora* LXXXIV, 2.
- tetragona* Bess. LXXXVIII, 4 γ.
- tenuifolia* LXXXVII, 11.
- Tiberiana* hort. ad fin.
- tinctoria* Hayne LXXXVII, 13.
 - L. LXXXVII, 10.
 - β. Poll. LXXXVII, 11.
 - β. *decumbens* Led. LXXXVII, 4.
 - β. *lasiocarpa* Gr. et G. LXXXVII, 8.
 - β. *latifolia* DC. LXXXVII, 9.
 - β. *sibirica* Lam. LXXXVII, 14.
 - δ. *alpestris* Bert. LXXXVII, 11.
- Tournefortii* Spach 41.
- tomentosa* Poir. CIII, 3.
- triacanthos* Brot. 50.
- triangularis* Willd. LXXXVII, 1 γ.

- Genista* β. *ciliata* Roch. LXXXVII, 7 β.
tricuspidata Dsf. 46.
 - var. *villosa* Dsf. 31.
tridentata L. LXXXV, 5.
 - β. L. LXXXV, 3.
 - Bark. Webb. LXXXV, 1.
triquetra Waldst. et Kit. LXXXVII, 1 γ.
ulicina Spach 39.
umbellata Loisel. 57 γ.
 - β. *capitata* DC. XCII, 1.
 - Poir. XCII, 3.
 - Bark. Webb XCII, 2.
undulata Lk LXXXV, 5 β.
versiflora Tausch LXXXVII, 1 δ.
Villarsii Clem. LXXXVIII, 3.
Villarsiana Jord. LXXXVIII, 3.
villosa Poir. 44.
 - β. Lam. 44.
virgata Willd. LXXXV, 13.
Webbii Spach 21.
Welwitschii Spach 30.
Genistella Moench XCII.
capitata C. Koch 1.
equisetiformis C. Koch 2.
racemosa Mneh 4.
umbellata C. Koch 3.
Genistoides *elata* Mneh LXXXVII, 13.
linifolia Mneh CII, 5.
tinctoria Mneh LXXXVII, 10.
tuberculata Mneh LXXXVI, 63.
Gleditschia L. XVIII.
aquatica Marsh. 9.
brachycarpa Pursh 8.
carolinensis Lam. 9.
caspiaca Dsf. 1.
chinensis Hort. 3.
ferox Dsf. 4. 5.
flava Hort. 7.
Fontanesii Spach 5.
heterophylla Bge 2.
horrida Willd. 3.
japonica Lodd. 3.
indica Pers. 6.
inermis L. 7 β.
 - Mill. 9.
laevis Hort. 7 β.
latisiliqua Hort. 7.
macroacantha Dsf. 5.
 - Willd. 4.
macrostachya Hort. 10.
meliloba Walt. 7.
micrantha Lodd. 11.
monosperma Walt. 9.
orientalis Bosc 4.
sinensis Lam. 3.
spinosa Marsh 7.
triacanthos Grtn. 9.
 - L. 7.
 - β. Mich. 8.
 - β. *monosperma* Ait. 9.
Glycine DC. XLI.
chinensis Sims. XLIII, 4.
flaccida Wall. XLVII, 10.
floribunda Willd. XLIII, 4.
frutescens L. XLIII, 1.
javanica Thunb. 1.
Glycine *sinensis* Sims XLIII, 4.
 Soja Sieb. et Zucc. 1.
Glycyrrhiza *aculeata* Forsk. XI, 1.
Gonocytisus XCIV.
angulatus Spach 1.
pterocladus Spach 2.
Guilandina L. XI.
Bonduc L. 1.
Bonducella L. 1 β.
dioica L. IX, 1.
Gussonea *recta* Parl. LXXXVIII, 1.
Gymnocladus Lam. IX.
canadensis Lam. 1.
Halimodendron (*Halodendron* DC.) Fisch.
 LXXII.
argenteum Fisch. 1.
 - β. *subvirescens* DC. 2.
cuspidatum Jaub. et Spach 3.
emarginatum Jaub. et Sp. 4.
subvirescens G. Don 2.
Hallia *argentea* Spreng. XXVII, 2.
 - *juncea* Otto LVII, 1.
Hedysarum (L.) Jaume LIV.
alatum Roxb. LI, 3.
Alhagi L. LIX, 1.
arboreum Ham. L. 2.
concinnum Spreng. LI, 11.
conicum Poir. LI, 19 δ.
cornutum L. LV, 1.
crinitum L. L, 3.
dioicum Ham. LI, 18.
elegans Lour. LII, 2.
floribundum Don LI, 16.
frutescens Pall. 1.
fruticosum L. 1.
Hamiltonii Spreng. LIX, 2.
heterocarpum L. LI, 19 δ.
junceum L. LVII, 1.
 - Roxb. LVII, 3.
latifolium Roxb. LI, 2.
laxum Spreng. LI, 12.
lutescens Poir. LII, 2.
nutans Wall. LI, 7.
orientalis Jaume LV, 1.
oxyphyllum Spreng. LI, 14.
polycarpum Lam. LI, 19.
pulchellum L. LII, 1.
pumilum L. LV, 3.
purpureum Roxb. LI, 19.
racemosum Thunb. LI, 20.
retusum Ham. LI, 19.
Sambuense Don LI, 10.
scoparium F. et M. 2.
sericeum Thunb. LVII, 4.
Spartium Burm. LIII, 3.
subspinulosum Fisch. LXXIV, 1.
syriacum Boiss. 3.
tiliaefolium Don LI, 17.
trichocarpum Willd. LVII, 2.
triquetrum L. LI, 3.
Wallichianum Spreng. LI, 19.
Hippocrepis *barbata* Lour. LI, 19 ε.
Hoffmannseggia Cav. XIV.
caudata A. Gr. 3.
Drummondii Torr. et Gr. 1.
Jamesii Torr. et Gr. 2.

- Hosackia** Dougl. LXXV.
crassifolia Nutt. 5.
cytisoides Benth. 1.
juncea Benth. 4.
prostrata Nutt. 3.
scoparia Nutt. 6.
sericea Benth. 2.
- Indigofera** L. LXVI.
Arghawan Royle 8.
aspalathoides (*aspalathifolia* Rxb.) Vahl 6.
atropurpurea Ham. 11.
Bungeana Walp. 1.
chinensis Vog. 3.
coccinea Lour. 2.
decora Lindl. 5.
Dosua (nec *Dojua*) Ham. 12.
heterantha Wall. 6.
hirsuta L. 4.
Lindheimeriana Scheele 10.
macrostachya Vent. 13.
micrantha Bge 1.
tinctoria L. 9.
virgata Roxb. 7.
- Ingaga** Willd. VIII.
annularis Grah. VII, 1.
bigemina Hk. et Arn. VII, 2.
 - Willd. VII, 1.
dimidiata Hk. et Arn. 1.
dulcis Willd. VII, 3.
javana DC. VII, 3.
lucida Wall. VI, 3.
lucidior Steud. VI, 3.
pungens Willd. VII, 3.
purpurascens Hassk. VI, 7.
- Laburnum** Medik. XCIX.
alpinum Gris. 2.
Alschingeri C. Koch 4.
fragrans Gris. 3.
vulgare Gris. 1.
- Lagonychium** *Stephanianum* Bieb. I, 1.
Laya emarginata Hk. et Arn. XXXV, 2.
- Lembotropis** Gris. XCVI.
affinis Presl 3.
nigricans Gris. 1.
triflora Presl 2.
- Lespedeza** Mich. XVII.
argyraea S. et Zucc. 4.
Caraganae Bge 5.
chinensis G. Don 4.
ciliata Benth. LVIII, 2.
cuneata G. Don 3.
eriocarpa DC. 7.
floribunda Bge 6.
juncea DC. 3.
 - Pers. 1.
 - Wall. LXVI, 6.
macrocarpa Bge LVIII, 1.
Pallasii G. Don 1 β.
trichocarpa Pers. 2.
viatorum Champ. LVIII, 3.
- Leucaena** Benth. III.
frondosa C. Koch 1.
glauca var. 1.
- Lotophyllus** *argenteus* Lk. C. 3.
Lotus argenteus Brot. C, 3.
glomeratus Lam. LXXVIII, 1.
- Lotus latifolius** Sm. LXXIX. 1.
rectus L. LXXVIII, 1.
Trifolium *Desrousse*. C, 1.
- Lupinus** L. LXXXI.
albifrons Benth. 1.
decumbens Torr. 6.
Douglasii Ag. 3.
flexuosus Lindl. 4.
holosericeus Nutt. 2.
macrocarpus Hook. et Arn. 7.
- Macrotropis**, DC. XXXV.
emarginata Walp. 2.
foetida DC. 1.
- Manna hebraica** Don LIX, 1.
nepalensis Don LIX, 2.
- Marquartia tomentosa** Vog. XIII, 1.
- Medicago** L. LXXVII.
arborea L. 1.
arborescens Presl 2.
- Milletia** W. et Arn. XXII.
nitida Benth. 1.
- Millingtonia semialata** Roxb.
- Mimosa** L. IV.
agrestis Sieb. I, 1 β.
arborea Forsk. VI, 6.
 - Thunb. VI, 5.
bigemina Vahl VII, 1.
borealis A. Gr. 1.
coriacea Blanco VI, 1.
corniculata Lour. 5.
depressa Poir. II, 2.
dulcis Roxb. VII, 3.
elata Roxb. VI, 1.
fera Lour. 6.
ferruginea Rottl. V, 3.
fragrans A. Gr. 3.
fruticosa Roxb. V, 2.
Julibrissin Scop. VI, 6.
Lindheimeri A. Gr. 2.
lucida Roxb. VI, 3.
malacophylla A. Gr. 4.
Pernambucana L. II, 3.
procera Roxb. VI, 1.
Sirissa Roxb. VI, 8.
speciosa Thunb. VI, 5.
Stephaniana Bieb. I, 1.
stipulata Roxb. VI, 7.
torta Roxb. V, 3.
Unguis cati Blanco VII, 3.
- Mucuna** Ad. XLII.
macrocarpa Wall. 1.
- Natrix** *crispa* Moench LXXXII, 1.
fruticosa Moench LXXXII, 8.
rotundifolia Moench LXXXII, 6.
- Nepa** Bark. W. CVIII.
Boivini Bark. W. 4.
Cossoni Bark. W. 3.
Eseayracii Bark. W. 6.
lurida Bark. W. 1.
Vaillantii Bark. W. 5.
Webbiana Bark. W. 2.
- Onobrychis** Gaertn. LV.
cornuta Desv. 1.
crinita Spreng. L, 3.
pumila Desv. 3.
tragacanthoides DC. 2.

- Ononis* L. LXXXII.
altissima Lam. 14.
angustifolia G. Don 12.
angustissima Lam. 12.
antiquorum L. 13.
 - J. et Sp. 19.
 - Lindl. 17.
 - β . Bert. 18.
aragonensis Asso 3.
 - β . Lam. 20.
Arbuscula Dsv. 9.
arvensis All. 13 γ .
 - Bert. 17.
 - Lam. 18.
 - Retz 14.
 - β . Sm. 17.
caduca Vill. 18 γ .
campestris Keh et Ziz 17.
cicerifolia DC. 21.
crassifolia Duf. 11.
crispa L. 1.
diacantha Sieb. 19.
dumosa Lapeyr. 3.
foetens All. 13 β .
fruticosa L. 8.
hircina Jcq. 14.
hispanica L. fl. 2.
juncea Asso 5.
latifolia Asso 6.
macracantha Clarke 15.
mitis Gmel. 18 β .
nitricata Willk. 11 β .
procurrens Wallr. 18.
purpurea Mill. 8.
quinata Forsk. LXXIX, 1.
repens Koch 18.
 - L. 18 δ .
rigida Kze 10.
rosaefolia DC. 20.
rotundifolia L. 6 et 7.
senescens Lap. 17.
speciosa Lag. 4.
spinosa Bert. 13.
 - L. 17.
 - var. α . *mitis* L. 14.
tribracteata DC. 7.
tridentata L. 9.
 - β . *canescens* DC. 11.
violacea Peterm. 16.
Ormosia Jacks. XXXVI.
*glauc*a Wall. 1.
Ototropis sambuënsis N. v. E. LI, 10.
Oxyramphis Wall. LXVII.
macrostyla Wall. 1.
Petteria ramentacea Presl XCIX, 3.
Phaca aristata Clairv. LXXVI, 87.
ovigera Boiss. LXXVI, 79.
Tragacantha All. LXXVI, 87.
Phyllodium pulchellum Dsv. LII, 1.
Pickeringia Nutt. XXXIII.
montana Nutt. 1.
Piptanthus Don XXXIV.
nepalensis D. Don 1.
Pithecolobium Mart. VII.
bigeminum Mart. 1.
dulce Benth. 3.
Pithecolobium lucidum Benth. 2.
Podalyria argentea Willd. XXVII, 2.
Podocytisus Boiss. CI.
caramanicus Boiss. et Heldr. 1.
Poinciana L. XII.
pulcherrima L. 1.
Pomaria glandulosa Torr. XIV, 2.
Jamesii Walp. XIV, 2.
Pongamia L. XXI.
chinensis DC. 1.
Priotropis cytisoides W. et Arn. LXXXIII, 3.
Prosopis L. 1.
glandulosa Torr. 2.
odorata Torr. et Frém. 4.
reptans Benth. 3.
Stephaniana Kth 1.
Pseudacacia Halodendron Munch LXXII. 1.
*hispid*a Munch LXIX, 4.
odorata Munch LXIX, 1.
Psoralea L. LXIV.
bituminosa L. LXV, 1.
drupacea Bge 1.
frutescens Poir. LXV, 1 β .
palaestina Mor. LXV, 1 γ .
Pterocarpus L. XIX.
flavus Lour. 1.
Pterospartum Spach LXXXV.
cantabricum C. Koch 4.
lasianthum C. Koch 1.
scolopendrium C. Koch 2.
stenopterum C. Koch 3.
tridentatum C. Koch 5.
Pueraria DC. XXXVIII.
Wallichii DC. 1.
Retama Boiss. CV.
angulata Gris. XCIV, 1.
Duriaei Guss. 3.
Gussonei Bark. Webb 3.
monosperma Boiss. 1.
Raetam Bark. Webb 2.
sphaerocarpa Boiss. CVI, 1.
Rhynchodium Presl LXV.
bituminosum Presl 1.
Rhynchosia Lour. XLVI.
Pseudo-Cajan Cambess. 1.
Robinia LXIX.
Altagana Pall. LXXIII, 1. 2.
amara Lour. 5.
ambigua Poir. 2.
amorphaefolia Lk 1 β .
argentea Sievers XXVII, 2.
Bessoniana Hort. ad fin.
bullata Hort. 1 γ .
candida Rxb. LXVIII, 1.
Caragana LXXIII, 2.
Chamlaju Lam. LXXIII, 8.
chinensis Pers. LXXIII, 8.
cornigera Hort. 1 δ .
crispa DC. 1 ϵ .
cylindrica Hort. 1 ζ .
Dordonii Hort. ad fin.
dubia Fouc. 2.
echinata Mill. 2.
ferox Pall. LXXIII, 13.
flava Lour. LXXIII, 21.
floribunda Hort. 1 η .

Robinia formosa Hort. 1 ♂.
frutescens L. (Frutex Pall.) LXXIII, 4.
gigantea Hort. 1 ♂.
glutinosa Sims 3.
grandiflora Bieb. LXXIII, 5.
Halodendron L. LXXII, 1.
heterophylla Hort. 1 ♀.
hispida L. 4.
hybrida Audib. 2.
inermis DC. 1 x.
 - *Dum. Cours.* 1 v.
 - *rubra* Hort. ad fin.
jubata Pall. LXXIII, 15.
microphylla Pall. LXXIII, 1.
mitis L. LXXXVI, 2.
 - *Lour.* XXI, 1.
mollis Bieb. LXXIII, 4 β.
mongolica Fisch. LXXIII, 2 β.
monstrosa Loud. 1 μ.
montana Bartr. 4.
nigra nana Hort. ad fin.
Parasol Hort. 1 v.
procera Hort. 1 ♂.
Pseud-Acacia L. 1.
pseudopendula Hort. ad fin.
pygmaea L. LXXIII, 6.
pyramidata Hort. 1 o.
rosea Lois. 4.
sophoraefolia Lk 1 π.
speciosa Hort. 1 p.
 - *Sw.* LXXIII, 2 β.
spectabilis Dum. Cours. 1 x.
spinosa L. LXXIII, 13.
spinosissima Laxm. LXXIII, 13.
stricta Lk 1 o.
suberosa Hfmsgg 6.
tomentosa Fisch. LXXIII, 4 β.
tortuosa Hort. 1 τ.
tragacanthoides Pall. LXXIII, 14.
triflora l'Her. LXXII, 2.
umbraculifera Hort. 1 v.
viscosa Vent. 3.
volubilis Hort. 1 γ.
Saltzwedelia sagittalis Fl. d. Wett. XCII, 4.
Sarothamnus Wimm. CIII.
affinis Boiss. 2.
arboreus Bark. Webb 5.
baeticus Bark. Webb 4.
catalaunicus Bark. Webb 6.
eriocarpus Boiss. et Reut. 9.
Gaditanus Boiss. et Reut. 8.
grandiflorus Bark. Webb. 2.
Malacitanus Boiss. 7.
patens Bark. Webb 3.
purgans Gr. et Godr. XCV, 1.
scoparius Koch 1.
virgatus Bark. Webb 2.
vulgaris Wimm. 1.
Scorpius spinosus Mneh LXXXVI, 29.
Senna bicapsularis Roxb. XV, 4.
esculenta Roxb. XV, 3 a.
orientalis Roxb. XV, 3.
purpurea Roxb. XV, 3 a.
Sophora Roxb. XV, 3 a.
Siliquastrum cordatum Moench XXXVII, 3.
orbiculatum Moench XXXVII, 1.

Sophora L. XXV.
affinis T. et Gr. XXIX, 2.
argentea Pall. XXVII, 2.
bifolia XXVII, 2.
chinensis Lodd. XXIX, 1.
crassifolia Jaume 2.
Houghiana Wall. XXVI, 1.
japonica L. XXIX, 1.
littoralis Schrad. 3.
mollis Wall. XXVI, 1.
nitens Schum. et Th. 3.
occidentalis L. 3.
secundiflora Lag. XXXI, 1.
sinica Rosier XXIX, 1.
speciosa Benth. 1.
tomentosa L. 3.
truncata T. et Gr. 3 β.
velutina Lindl. 2.
Spartianthus junceus Lk CIV, 1.
Spartium L. CIV.
acanthocladum Spreng. LXXXVI, 14.
Aetnense Biv. XCIII, 1.
album Dsf. XCV, 3.
alpinum Host. 2.
angulatum L. XCIV, 1.
angulosum Gilib. CIII, 1.
apetalum Labill. 3.
arboreum Dsf. CIII, 5.
aspalathoides Dsf. LXXXVI, 55.
biflorum Dsf. LXXXVI, 10.
cinereum Vill. LXXXVI, 60.
clavatum Cav. XCI, 1.
Clusii Spach CV, 1.
complicatum Gouan CXI, 6.
 - *L.* CXI, 5.
corsicum Loisel. LXXXVII, 21.
creticum Dsf. LXXXIV, 4.
Cupani Spreng. LXXXVI, 51.
cuspidatum Cav. LXXXVI, 31.
dalmaticum Spreng. LXXXVI, 26.
decumbens Dur. LXXXIX, 2.
 - *Jaqc.* LXXXIX, 1.
dispermum Mneh XCV, 3.
ellipticum Willd. 4.
ephedroides Spreng. LXXXVI, 13.
erinacoides Loisel. LXXXVI, 57.
ferox Dsf. LXXXVII, 17.
Gasparrini Guss. LXXXVI, 12.
glabrum Mill. XCVII, 31.
grandiflorum Brot. CIII, 2.
gymnopterum Viv. LXXXVI, 13.
Halleri Jaqc. LXXXIX, 2.
heterophyllum l'Her. LXXXVII, 17.
hirsutum Mill. XCVII, 30.
hispanicum Coll. LXXXVI, 44.
horridum Sibth. et Sm. LXXXVI, 14 et 57.
 - *Vahl* LXXXVI, 20.
infestum Presl XCVIII, 2.
interruptum Cav. LXXXVI, 50 γ.
junteum L. 1.
Laburnum Cav. XCIX, 1.
lanigerum Dsf. XCVIII, 3.
linifolium Dsf. CII, 5.
lusitanicum Mill. CIII, 2.
molle Cav. LXXXVI, 78.
monospermum L. CV, 1. 2.

- Spartium Morisii* Bert. LXXXVII, 18.
multicaule Dsf. LXXXVI, 66.
multiflorum Ait. XCV, 3.
nitens Willd. CII, 5.
odoratissimum Sweet 1 ♂.
parviflorum Vent. XCIV, 1.
 - Willd. 5.
patens L. CIII, 3.
persicum Willd. 6.
pilosum Rth LXXXVI, 63.
procerum Willd. 7.
purgans L. XCV, 1.
radiatum L. LXXXVI, 2.
Raetam Spach CV, 2.
ramosissima Dsf. LXXXVI, 59.
rigidum Viv. XCVIII, 3 β.
sagittale Rth XCII, 4.
scoparium L. CIII, 1.
Scorpius L. LXXXVII, 19.
sericeum Presl XCVIII, 2.
 - Vent. XCII, 1.
sessilifolium Spreng. LXXXVI, 85.
sphaerocarpum Lap. LXXXVI, 60.
 - L. CVI, 1.
spinosa Brot. XCVIII, 3.
 - L. XCVIII, 1.
 - *Ueria* XCVIII, 2.
stylosum Spreng. 8.
tinctorium Roth LXXXVII, 10.
trispermum Sm. XCIII, 1.
umbellatum Dsf. XCII, 3.
valentinum Willd. 9.
villosum Poir. XCVIII, 3.
- Spartocytisus* XCV.
acutangulus C. Koch 2.
albus Bark. W. 3.
purgans Bark. W. 1.
sessilifolius Bark. W. 4.
triflorus Bark. W. XCVI, 2.
- Sparthoanthus albus* Presl XCV, 3.
Stauracanthus Lk CVII.
aphyllus Lk 1.
spartioides Bark. Webb 2.
spectabilis Bark. Webb 3.
- Styphnolobium* XXIX.
affine Walp. 2.
japonicum, Schott 1.
- Syrmatium glabrum* Vog. LXXX, 6.
Sysbone sagittalis Gris. XCII, 4.
Taverniera DC. LIII.
conoclada Jaub. et Sp. 1.
ephedroides Jaub. et Sp. 2.
glabra Boiss. 2.
incana Boiss. 1.
spartea DC. 3.
- Teline* (*Telinaria* Presl) CII.
albida Presl LXXXVI, 62.
anglica Presl LXXXVI, 53.
aprutia Presl LXXXVI, 38.
Atleyana C. Koch 4.
biflora Presl LXXXVI, 10.
bracteolata C. Koch 3.
candicans Medik. 1.
cinerea Presl LXXXVI, 60.
eriocarpa C. Koch 2.
Friedrichsthaliana Presl LXXXVI, 16.
- Teline hispanica* Presl LXXXVI, 44.
holopetala Presl LXXXVI, 3.
horrida Presl LXXXVI, 20.
humifusa Presl LXXXVI, 70.
linifolia Bark. Webb 5.
Lobelii Presl LXXXVI, 57.
pilosa Presl LXXXVI, 63.
radiata Presl LXXXVI, 2.
ramosissima Presl LXXXVI, 59.
sagittalis Presl XCII, 4.
sericea Presl LXXXVI, 71.
umbellata Presl XCII, 3.
- Tephrosia* LXI.
brachystachya DC. 4.
candida DC. LXVIII, 1.
chinensis Lindl. 2.
sophoroides DC. 3.
vestita Vog. 1.
- Thermia nepalensis* Spreng. XXXIV, 1.
Thermopsis laburnifolia Don XXXIV, 1.
nepalensis XXXIV, 1.
- Thyranthus frutescens* Ell. XLIII, 1.
- Trichasma calycinum* Walp. C, 1.
- Trifolium cytisoides* Pall. LVII, 1.
dahuricum Laxm. LVII, 2.
hedysaroides Pall. LVII, 1.
- Ulex* L. CX.
argenteus Welw. 14.
australis Clem. 3.
autumnalis Bub. 4.
 - *Thore* 2.
baeticus Boiss. 7.
Boivini Bark. Webb CVIII, 4.
Bourgaeanus Bark. W. 6.
compositus Moench 1.
densus Welw.
erinaceus Welw. 15.
europaeus Brot. 2.
 - L. 1.
 - β. L. 2.
fastigiatus Hort. 1 ♂.
Galli Planch. 4.
geistoides Brot. CVII, 1.
 - Clem. CII, 2.
grandiflorus Pourr. 1.
hibernicus G. Don 1 ♂.
janthocladus Bark. W. 9.
Jussiaei Bark. W. 11.
ligusticus Not. 1 γ.
minor Roth 2.
mitis Hort. CVII, 1.
nanus Forst. 2.
 - β. *major* Bab. 4 β.
opistholepis Bark. W. 12.
parviflorus Pourr. 3.
provincialis Loisel 3.
scaber Kunze 5.
strictus Mack. 1 ♂.
vernalis Thore 1.
Webbianus Coss. CVIII, 2.
Welwitschianus Planch. 8.
Willkommii Bark. W. 10.
- Uraria* Desv. L.
arborea G. Don 2.
crinita Desv. 3.
Lagopus DC. 1.

- Virgilia argentea* Poir. XXVII, 2.
Kentuckea Dum. Cours. XXVIII, 1.
lutea Mich. XXXVIII, 2.
secundiflora Cav. XXXI, 1.
Viborgia austriaca Mneh XCVII, 1.
capitata Mneh XCVII, 2.
purpurea Mneh XCVII, 12.
supina Mneh XCVII, 3.
Voglera spinosa Fl. d. Wett. LXXXVI, 29.
Vulneraria argentea Lam. LXXV, 1.
Wistaria Nutt. XLIII.
brachybotrys S. et Z. 3.
chinensis DC. 4.
- Wistaria Consequana* Loud. 4.
floribunda DC. 4.
frutescens DC. 1.
japonica S. et Z. 2.
speciosa Nutt. 1.
Xiphocarpus Presl LVIII.
candidus Presl 1.
Zanthyrus Raf. XXX.
aurea Collins 1.
paniculata Raf. 1.
Zornia elegans Pers. LII, 2.
lutescens Steud. LII, 2.
pulchella Pers. LII, 1.

ORDO XIII.

Bacciferae.

Fam. 86. Cappariðeae.

I. Cápparis L.

(καππαρίς, nomen jam a Graecis usurpatum, a voce arabica „cabar“ derivandum.)

1. \bar{h} rupestris S. et Sm. prodr. fl. gr. I, 355. fl. gr. t. 487. Creta, Italia.
orientalis Lois. in nouv. Duh. I, 142.
spinosa Curt. in bot. mag. t. 291.
peduncularis Presl delic. Prag. 21.
- * 2. \bar{h} spinosa L. cod. Nro. 3817. Rehb. ic. fl. Germ. III, 4487. Terrae maris medit.
- * 3. \bar{h} sicula Lois. in nouv. Duh. I, 159. Africa borealis, Italia,
Fontanesii Presl fl. sic. I, 111. Graecia, Rumelia.
ovata Guss. prodr. fl. sic. II, 4.
spinosa β . S. et Sm. fl. gr. prodr. I, 355. fl. gr. t. 486 (teste Bert.).
4. \bar{h} heteracantha DC. prodr. I, 246. Syria, Mesopotamia.
5. \bar{h} leucophylla DC. prodr. I, 246. Syria, Mesopotamia.
6. \bar{h} mucronifolia Boiss. diagn. pl. or. nov. I, 3. Persia australis.
7. \bar{h} parvifolia Boiss. diagn. pl. or. nov. I, 4. Persia australis.
8. \bar{h} nepalensis (napaulensis) DC. prodr. I, 246. Nepal.
9. \bar{h} obovata Royle ill. of the him. mount. 73. Himalaya.
10. \bar{h} membranacea Gardn. et Champ. in Hook. Kew. gard. misc. I, 241. China (Hongkong).
11. \bar{h} chinensis G. Don dichl. pl. I, 279. China.
acuminata Lindl. bot. reg. t. 1320.
12. 5 Cantonensis Lour. fl. coch. I, 404. China (Canton).

II. Cadába Forsk.

(Quadhb, nomen arabicum a voce qadhaba, desecare abschneiden.)

1. 5 trinervia DC. prodr. I, 244. Persia.

III. Crataeva L.

(Crataevas, rhizotomus celebr tempore Mithridatis magni.)

1. 3 falcata DC. prodr. I, 243. China (Canton).
Cápparis falcata Lour. fl. coch. 405.

Fam. 87. Passifloreae.

IV. Passiflora L.

(passio, Leiden et flos, Bluethé.)

- * 1. \S incarnata L. cod. Nro. 6940. amoen. I, t. 10. f. 19 a—e. Virginia, America trop.
Granadilla incarnata Moench meth. 48.
 β) integriloba bot. reg. t. 332.
Kerii Spreng. syst. veget. III, 39.
2. \S angustifolia Sw. nov. gen. et sp. pl. 97. bot. reg. t. 180. India occid.; Florida.
heterophylla Mias Lawr. Passionsfl. Jacq. hort. Schoenbr. t. 181.
longifolia Lam. enc. méth. III, 40.
Cieca heterophylla Moench meth. suppl. 101.
3. \S Warei Nutt. in Sill. journ. V, 297.

4. § *tenuiloba* Engelm. Bost. journ. of nat. hist. VI, 192. Texas.
 5. § *nepalensis* (*nipaulensis*) Wall. tent. fl. nep. 20. t. 11. Nepal.
 6. § *Lourei* G. Don dichl. pl. III, 54. China, Japonia.
coerulea Lam. fl. coch. 644. et forte S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 168.
chinensis Sweet hort. brit. 3. edit. 258.

Fam. 88. Cucurbitaceae.**V. *Muricia* Lour.**

(a bacca muricata, purpurea.)

1. § *cochinchinensis* Lour. fl. coch. 733. Cochinchina, China,
Momordica cochinchinensis Spreng. syst. veg. III, 14. ? India orientalis.
 ? - *mixta* Rxb. fl. ind. III, 609 (teste Rxb. et W. et Arn.,
 sed caule herbaceo certe distincta).

Fam. 89. Begoniaceae.**VI. *Begonia* L.**

(Begon, praefectus Franco-gallicus ineunte saeculo XVIII insulis americanis et botanici Plumieri, insulam Domingo permigrantis fautor, † 1710 in urbe Rochefort.)

1. 5 *grandis* Dryandr. in transact. of the Linn. soc. I, 163. Japonia.

Fam. 90. Onagrariaceae.**VII. *Gaura* L.**

(γαυρος, superbus, stoltz, ob pulchritudinem florum.)

1. ♀ *fruticulosa* Benth. bot. of Beech. voy. of the Sulph. 15. California.
 2. ♀ *Roemeriana* Scheele in Linn. XXI, 579. California.

Fam. 91. Ribesiaceae (Grossulariaceae).**VIII. *Ribes* L.**

(Saeculo XI et XII Arabes Rheum Ribes L. plantam fructibus acidulis Ribas nominarunt.)

A. Plerumque armatum; Pedunc. 2—3 flori; Stam. longe exserta (Robsonia).

- * 1. 5 *speciosum* Pursh fl. Amer. sept. II, 732. bot. reg. t. 1557. California.
fuchsioïdes Moq. et Sess. in mém. de la soc. de phys. et d'hist. nat. III, 2. 43. t. 3.
stamineum Smith in Rees cyclop.
Robsonia speciosa Spach in hist. d. végét. phan. VI, 181.
 β) spectabile.

B. Armatum; Ramuli abbreviati; Pedunc. 2—5 flori intermedii; Stamina inclusa aut vix exserta (Grossularia).

2. 5 *occidentale* H. et Arn. in bot. of Beech. voy. 346. California.
 3. 5 *californicum* H. et Arn. bot. of Beech. voy. 346. California.
 4. 5 *microphyllum* H. B. K. nov. gen. et sp. am. VI, 62. Mexico.
 5. 5 *leptanthum* A. Gray pl. Fendler. 53. Nova Mexico.
 6. 5 *subvestitum* Hook. et Arn. in bot. of Beech. voy. 346. California.
 7. 5 *Menziesii* (Menziesianum R. et S.) Pursh fl. Am. sept. II, 732. California.
 bot. reg. XXXIII, t. 56.
ferox Smith in Rees cyclop.
 * 8. 5 *niveum* Lindl. in bot. reg. t. 1692. America boreali-occid.
Grossularia nivea Spach hist. d. végét. phanér. VI, 179.
 9. 5 *Missouriense* (*Missouriense*) Nutt. in T. et Gr. fl. of N. Am. 548. America foed. media.
 * 10. 5 *irriguum* Dougl. in transact. of the hort. soc. VII, 516. Loud.
 arb. brit. III, f. 721. America boreali-occid.
Grossularia irrigua Spach hist. d. végét. phanér. VI, 179.
 11. 5 *tomentosum* C. Koch. California.
villosum Nutt. in T. et Gr. fl. of N. Am. I, 547. (nec Wall. et Gay.)
 * 12. 5 *divaricatum* Dougl. in transact. of the hort. soc. VII, 515. America boreali-occid.
 bot. reg. t. 1359.
Grossularia divaricata Spach hist. d. végét. phanér. VI, 177. Digitized by Google

- * 13. 5 rotundifolium Mich. fl. bor. amer. I, 110. America foed. borealis
et media, California.
gracile Pursh fl. Am. sept. I, 165.
stamineum Horn. en. pl. hort. Hafn. 237.
triflorum Willd. hort. Ber. t. 61. Gu. et H. fr. Holzart. t. 3.
Grossularia triflora Spach in hist. d. végét. phan. VI, 176.
- * 14. 5 gracile Mich. fl. bor. amer. I, 111. Tennessee, Texas.
15. 5 hirtellum Mich. fl. bor. amer. I, 111. America britannica et
foed. boreal., Virginia.
saxosum Hook. fl. bor. am. I, 230.
? triflorum Big. fl. Bost. ed. 2. 90.
Grossularia hirtella Spch hist. d. végét. phan. VI, 180.
- * 16. 5 oxyacanthoides L. cod. Nro. 1632. Dill. hort. Elth. t. 139. America brit. orient.
? lacustre DC. prodr. III, 478.
Grossularia oxyacanthoides Mill. dict. Spach hist. d. végét. phan. VI, 175.
β) setosum Dougl. in bot. reg. t. 1237.
γ) acute-serratum; Cynosbati γ. Hook. fl. bor. amer. I, 230.
- * 17. 5 Cynosbati (nec cinosbati Lam.) L. cod. Nro. 1634. America britannica et
foeder. bor., ? Japonia.
gracile Torr. fl. of the n. and m. sect. of the un. st. I, 269. foeder. bor., ? Japonia.
Grossularia Cynosbati Mill. dict. Spach hist. d. végét. phan. VI, 178.
β) fructu inermi; oxyacanthoides Richards. in Frankl. I. journ. ed. 2. app. p. 7.
18. 5 alpestre Wall. in Jacquem. voy. dans l'Inde IV, 64. t. 75. Himalaya.
19. 5 longispinum C. Koch. India orientalis.
Grossularia Roxb. fl. ind. (ed. 1824) II, 616.
20. 5 Stakori Fisch. in Sweet hort. brit. ed. 3. 288. Siberia.
* 21. 5 aciculare Sm. in Rees cyclop. Led. fl. ross. t. 230. Altai, Caucasus.
Uva crispa Pall. Reis. n. versch. Prov. d. russ. Reich. III, 317. in fl. ross. II, 37.
Grossularia acicularis Spach hist. d. végét. phan. VI, 173.
* 22. 5 vulgare C. Koch Fl. v. Jen. 36. ? Africa borealis,
? Europa australis.
Grossularia Koch syn. ed. 2. 292.
spinosum Lam. fl. franç. III, 470.
Uva crispa DC. prodr. III, 478.
Grossularia Uva Scop. fl. carn. I, 168.
- vulgaris Spach hist. d. végét. phan. VI, 174.
α) bracteatum Berl. in G. Don dichl. pl. III, 179.
* β) glabrum; reclinatum L. cod. Nro. 1630.
Uva crispa γ. reclinatum Berl. in DC. prodr. III, 478.
Grossularia reclinata Mill. dict.
* γ) glanduloso-setosum; Grossularia L. cod. Nro. 1631.
Uva crispa ζ. sativum DC. fl. fr. IV, 408.
Grossularia hirsuta Mill.
δ) hybridum Bess. prim. fl. Galic. 186.
Uva crispa δ. Besseriana Berl. in DC. prodr. III, 478.
* ε) macra(c)anthum Lodd. in Steud. nomencl. bot. ed. 2. II, 458.
ζ) macrocarpum DC. prodr. III, 478 (sub Uva crispa).
* η) orthantha; caucasicum Adams in R. et Sch. syst. veget. V, 507.
* θ) pubescens; Uva crispa L. cod. Nro. 1633.
Uva crispa α. sylvestre DC. fl. fr. IV, 408.
Grossularia Uva crispa Mill. dict.
- vulgaris Erndt virid. Warsaw. 57.
* ι) spinosissimum Berl. in DC. prodr. III, 478 (sub Uva crispa).
* ξ) subinermis Berl. in DC. prodr. III, 478 (sub Uva crispa).
- C. Armatum; Ramuli abbreviati, racemis intermediis; Stam. vix exserta.
- * 23. 5 lacustre Poir. enc. meth. suppl. II, 856. America britannica et
foederata borealis.
echinatum Dougl. in bot. reg. not. ad. tab. 1349. transact. of the hort. soc. VII, 517.
oxyacanthoides Mich. fl. bor. amer. I, 111.
- β. lacustre Pers. syn. pl. I, 252.

D. Inermis; Flores fasciculati, breviter pedunculati.

24. 5 fasciculatum S. et Z. Abh. d. math. phys. Kl. d. baier. Ac. d. W. IV, 2. 189. Japonia.

E. Inermis; Racemi praecoces; Calyx infundibuliformis.

25. 5 tortuosum Benth. bot. of Beech. voy. of the Sulph. 17. California.

F. Inerme; Ramuli laterales abbreviati aut praesertim racemiferi; Calyx campani-
aut tubiformis; Baccae nigrae.

26. 5 melanocarpum C. Koch. Nepal, Himalaya.
glaciale Wall. num. list. Nro. 6833. G. Don dichl. pl. III, 189.
27. 5 americanum Pall. fl. ross. II, 34. America rossica,
Dikuscha Fisch. in bull. de la soc. d. nat. de Mosc. XVII, 2. 254. Sibiria maxime orient.
- * 28. 5 floridum l'Her. stirp. nov. aut min. descr. I, 4. Gu. et H. Canada, Kentucky,
fr. Holzart. t. 1. Virginia.
- americanum Mill. dict.
- nigrum Moench Verz. ausl. B. u. St. d. Lustschl. Weiss. 104.
campanulatum Moench meth. 683.
Dillenii Medik. philos. Bot. I, 122.
nigrum β. L. cod. Nro. 1629.
pennsylvanicum Lam. enc. méth. bot. III, 49.
- Coreosma florida Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. IV, 2. 22.
β) intermedium Tausch in Flora XXI, 720.
γ) parviflorum Loud. arb. et frut. brit. II, 986.
δ) recurvatum Mich. fl. bor. amer. I, 110.
ε) sessiliflorum; Schmidtianum Tausch in Flora XXI, 719.
- * 29. 5 nigrum L. cod. Nro. 1629. Gu. et H. Abbild. deutsch. Europa media et borealis,
Holzart. t. 22. Sardinia, Sibiria, Tataria.
- olidum Moench meth. 683.
Botryocarpum nigrum Rich. bot. méd. II, 490.
Grossularia nigra Mill. dict.
β) asplenifolium Hort.
γ) foliis variegatis, marginatis et punctatis.
δ) fructu flavido et viridi.
ε) spectabile Hort.
30. 5 bracteosum Dougl. in mém. de l'ac. de St. Pét. 6. sér. II, 138. America bor. rossica.
31. 5 Hudsonianum Richards. app. to Frankl. 1. journ. ed. 2. 6. America boreali-occident.
nigrum Richards. app. to Frankl. journ. ed. 1.
β) petiolare Dougl. in transact. of the hort. soc. VII, 514.

G. Inerme aut armatum eglandulosum; Ramuli abbreviati, Racemis lateralibus
erectis; Calyx pelviformis.

32. 5 magellanicum Poir. in enc. méth. II, 856. Terra magellanica.
33. 5 cuneifolium R. et P. fl. per. III, 13. t. 233 c. Peru, Chili.
34. 5 cucullatum H. et Arn. in Hook. bot. misc. III, 340. Chili.
35. 5 chilense C. Koch. Chili.
villosum Gay fl. chil. III, 35.
36. 5 cuneatum Kar. et Kir. in mém. de la soc. d. nat. de Mosc. XIV, 356. Songaria.
- * 37. 5 Diacantha Pall. Reis. n. versch. Prov. d. russ. R. III, 320. Sibiria, Mongolia.
app. 722. t. 1. f. 2.
- Grossularia Diacantha Mill. dict.
- * 38. 5 saxatile Pall. in nov. act. Petrop. X, 376. Led. ill. fl. ross. t. 239. Sibiria altaica.
alpinum Siev. in Pall. n. nord. Beitr. VII, 345.
β) baccis minoribus rubris Kar. et Kir. in mém. de la
soc. d. nat. de Mosc. XV, 356.
39. 5 pulchellum Turcz. in mém. de la soc. d. nat. d. Mosc. V, 101. Mongolia chinensis.
Trautv. imag. et descr. fl. ross. illustr. I, t. 8. Syria.
40. 5 orientale Desf. hist. d. arb. et arbr. II, 88. nec Led.
- * 41. 5 alpinum L. cod. Nro. 1628. Gu. et H. d. Holzart. t. 21. Europa, Oriens, Sibiria.
album Gilib. fl. lith. V, 137.
dioicum Moench meth. 683.
β) bacciferum Wallr. sched. crit. 106.
γ) Fleischmanni Rehb. fl. Germ. exsicc. Nro. 2246.
δ) grossulariaefolium Rehb. fl. Germ. exsicc. Nro. 2240.
ε) leucocladon Rehb. fl. Germ. exsicc. Nro. 2243.
ζ) pilosum Rehb. fl. Germ. exsicc. Nro. 2244.
η) pumilum Lindl. in transact. of the hort. soc. VII, 244.
θ) Scopoli Hladn. (sed ubi?).
Grossularia Scop. fl. earn. I, 167.
Hladnikianum Freyer in Rehb. fl. Germ. exsicc. Nro. 2245.
ι) sterile Wallr. sched. crit. 106.
κ) tortuosum Rehb. fl. Germ. exsicc. Nro. 2241.

- λ) variegatum Loud. arb. et frut. brit. II, 979.
 μ) viridissimum Rehb. fl. Germ. exsicc. Nro. 2242.
42. 5 glaciata Wall. in Roxb. fl. ind. (ed. 1824) II, 513. nec num. list. Himalaya.
 43. 5 acuminatum Roxb. fl. ind. (ed. 1824) II, 514. Himalaya.
 44. 5 monticolum C. Koch. Mexico.
 leptostachyum Benth. pl. Hartw. 186.
- H. Inerme, raro armatum resiniferum; Gemmae laterales mixtae; Baccae virescentes aut rubrae.**
45. 5 prostratum l'Her. stirp. nov. aut min. cogn. I, 3. t. 2. America borealis
 canadense Lodd. cat. britannica et foederata
 glandulosum Ait hort. Kew. I, 279. septentr.
 laxiflorum Richards. in Frankl. journ. ed. 2. p. 6.
 trifidum Mich. fl. bor. amer. I, 110.
 β) rigens Mich. fl. bor. amer. I, 110.
46. 5 laxiflorum Pursh fl. Amer. sept. II, 731. America boreali-occid.
 affine Dougl. in Bong. veg. mém. de l'ac. d. sc. de Pét. 6. sér. II, 138.
 prostratum β. Hook. fl. bor. amer. I, 232.
47. 5 viscosissimum Pursh fl. Amer. sept. I, 163. Hk. fl. bor. am. I. t. 74. America bor.-occid.
 Coreosma viscosissima Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. IV, 23.
- * 48. 5 cereum Dougl. in transcript. of the hort. soc. VII, 312. bot. mag. 3008. America
 Cerophyllum Douglasii Spach in hist. d. végét. phan. VI, 153. boreali-occidentalis.
 β) mēbrians Lindl. in bot. reg. t. 1471.
 Cerophyllum inebrians Spach in hist. d. vég. phan. VI, 154.
 γ) reniforme Nutt. in journ. acad. Phil. VII, 26.
- * 49. 5 punctatum R. et P. fl. per. III, 12. t. 233. f. a. *) Chili.
 Rebis punctata Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. IV, 30.
50. 5 glandulosum R. et P. fl. per. III, 13. t. 233. f. b. Chili.
 51. 5 resinousum Pursh fl. Amer. sept. I, 163. America foed. austr.
 * 52. 5 villosum Roxb. fl. ind. (ed. 1824) II, 614 et Don dichl. pl. III, 187. Transcaucasia,
 alpinum C. A. Mey. Verz. kauk. Pl. 154 (teste Ledeb.). Armenia, Asia minor,
 orientale Led. fl. ross. II, 197. nec Dsf. Himalaya.
 ? punctatum Lindl. in bot. reg. 1278 (excl. descr. et patr.).
 resinousum bot. mag. t. 1583 (teste Spach).
53. 5 melananthum Boiss. et Hoh. in Boiss. diagn. pl. nov. or. X, 19. Persia media.
 * 54. 5 heterotrichum C. A. Mey. in Led. fl. alt. I, 270. Led. icon. pl. fl.
 ross. illustr. t. 235. Songaria.
 55. 5 fragrans Pall. in nov. Petrop. X, 377. t. 8. Sibiria.
 peneobalsamum Siev. in Pall. n. nord. Beitr. VII, 218.
 β) infraeanum; graveolens Bge in mém. d. sav. étrang. de Pét. II, 535.
56. 5 leptostachyum Dne in Jacquem. voy. aux Ind. IV, 65. t. 75. Cashmiria.
- I. Inerme; Ramuli laterales praesertim racemiferae: Calyx pelvi-, vel campaniformis; Baccae rubrae aut albae.**
- * 57. 5 rubrum L. ood. Nro. 1627. Gu. et H. d. Holzart. t. 19. ? Europa, Africa
 officinarum Dum. Cours. bot. cult. V, 303. borealis, Oriens, Sibiria,
 vulgare β. Lam. enc. méth. III, 47. Tataria.
 Grossularia rubra Mill. dict. et (teste Koch) Scop. fl. carn. I, 167.
 β) acerifolium Hort.
 γ) foliis variegatis et marginatis.
 δ) fructu albo (albidum et leuocarpum Hort.) et roseo.
 * ε) fructu maximo; cerasiforme Hort.
 * ζ) fructu albo et rubro-striato.
 * η) sylvestre DC. fl. franç. IV, 406.
58. 5 carpathicum Kit. in Schult. oesterr. Fl. 2. Aufl. I, 432. Montes Carpathi.
 59. 5 propinquum Turez. in mém. de la soc. d. nat. de Mosc. XIV, 70. Sibiria austr. orient.
 * 60. 5 spicatum Robs. in transcript. of the Linn. soc. III, 240. t. 21. Britannia, Italia,
 bullatum Otto et Dietr. allgem. Gartenz. X, 267. Dalmatia, Croatia,
 petraeum Mor. stirp. sard. elench. I, 20. et (teste Vis.) montes Carpathi.
 Sm. engl. bot. t. 705.
 - β. densiflorum Bert. fl. ital. II, 680.
 β) multiflorum Kit. in R. et S. syst. veget. V, 493. engl. bot. t. 2368.
 holosericeum Otto et Dietr. allgem. Gartenz. X, 266.
 γ) acutilobum; vitifolium Host. fl. austr. I, 308.

*) icones hujus plantae in bot. reg. t. 1278 et 1658 diversae aut falsae non conveniunt.

- * 61. 5 *caucasicum* Bieb. fl. taur. cauc. III, 160. Oriens borealis, Sibiria.
Biebersteinii Berl. in DC. prodr. III, 282.
ciliatum C. Koch in Linn. XVI, 355.
rubrum Pall. fl. ross. II, 35.
sibiricum Hort.
62. 5 *albinervium* Mich. fl. bor. amer. I, 110. America borealis
rubrum Richards. app. to Frankl. 1. journ. ed. 2. p. 6. T. et
 Gr. fl. of N. Amer. I, 550. britannica.
- * 63. 5 *petraeum* Wulf. in Jcq. misc. II, 36. ic. pl. rar. I, t. 49. Gallia, Alpium tractus,
alpinum Delarbre fl. d'Auvergn. 166. Sudetae, Ungaria,
vinosum Dum. Cours. catal. d. plant. cult. à Cours. 37.
 β) *eciliatum* Koch syn. ed. 2. 293.
 γ) ? *omnino glabrum* Lam. enc. méth. III, 48.
 δ) *urceolatum* Tausch in Flora XXI, 720.
pallidum Otto et Dietr. allem. Gartenz. X, 293.
- * 64. 5 *triste* Pall. in nov. act. ac. Petr. X, 738. Sibiria orientalis,
 β) *atropurpureum* C. A. Mey. in Led. fl. alt. I, 268. Mongolia.
 Led. ic. pl. fl. ross. III, t. 231.
 γ) *callibotrys* Wender. ind. sem. hort. Marburg. a. 1832. Anal. kr. Bem. Nro. 12.
65. 5 *procumbens* Pall. fl. ross. II, 35. t. 65. Sibiria australis.
polycarpum Gmel. syst. veg. 419.
66. 5 *Takare* G. Doñ prodr. fl. nepal. 208. Nepal.
- K. *Racemi subterminales; Calyx tubulosus aut campanulatus.*
- * 67. 5 *sanguineum* Pursh fl. bor. am. I, 164. bot. mag. t. 3335. America boreali-occid.
Calobotrya sanguinea Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. IV, 21.
Coreosma sanguinea Spach hist. d. végét. phan. VI, 154.
 β) *flore albo, atropurpureo et pleno.*
 γ) *aureo-sanguinea; Gordonii et Gordoniana* Hort.
- * 68. 5 *malvaceum* Sm. in Rees cycl. br. fl. gard. 2. sér. IV, t. 340. California, Chili.
alceaefolium Kze in Poepp. coll. pl. chil. 73.
sanguineum H. et Arn. in bot. of Beech. voy. 141.
trilobum Meyen Reise um d. Erde I, 314.
tubulosum Eschsch. in mém. de l'ac. de Pét. X, 283.
tubiflorum C. A. Mey. in mém. de l'ac. de Mosc. VII, 141.
69. 5 *glutiniosum* Benth. in transact. of the hort. soc. new ser. I, 475. California.
 70. 5 *viscosum* R. et P. fl. per. III, 13. Peru.
Coreosma Dombeyana Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. IV, 25.
71. 5 *albiflorum* R. et P. fl. per. III, 12. t. 232. f. b. Peru.
Rebis discolor Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. IV, 28.
- * 72. 5 *macrobotrys* R. et P. fl. per. III, 12. t. 232. f. a. Peru.
Rebis macrobotrys Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. IV, 27.
73. 5 *Jorullense* (Xorullense Spr.) H. B. et K. nov. gen. et sp. am. VI, 61. Mexico.
ciliatum Willd. in R. et S. syst. veg. V, 500.
74. 5 *multiflorum* H. B. K. n. gen. et sp. amer. VI, 60. Mexico.
Kunthii Berl. in DC. prodr. III, 482.
mexicanum Spreng. syst. veg. IV, 2. 100.
Coreosma multiflora Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. IV, 24.
75. 5 *affine* H. B. K. n. gen. et sp. amer. VI, 60. Mexico.
campanulatum Humb. et Bonpl. in R. et S. syst. veg. V, 500.
Coreosma affinis Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. IV, 24.
76. 5 *frigidum* H. B. K. n. gen. et sp. amer. VI, 62. Quito.
hirtum H. et Bonpl. in R. et S. syst. veg. V, 501. mém. de la soc. de
 phys. et d'hist. nat. de Gén. III, t. 2. f. 13.
- Rebis frigida* Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. IV, 29.
77. 5 *Gayanum* Walp. repert. bot. syst. II, 360. Chili.
Rebis Gayana Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. IV, 29.
78. 5 *alpinoides* Domb. in ann. d. sc. nat. 2. sér. IV, 31. Chili.
ebracteolatum Gay fl. chil. III, 34.
Rebis ebracteolata Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. IV, 31.

L. *Rami laterales abbreviati; Calyx infundibuliformis, flavus aut aureus.*

- * 79. *aureum* Pursh fl. Amer. sept. I, 164. bot. reg. t. 125. America foeder. media.
palmatum Dsf. cat. pl. hort. Par.
Chrysobotrya revoluta Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. IV, 2. 19. t. 1. f. A.

- β) flavum Colla ill. et ic. hort. Ripul. III, 4. t. 1. f. B.
 ? tenuiflorum Lindl. in bot. reg. t. 1274.
 ? fragrans Lodd. bot. cab. t. 1533.
 ebraectatum Berl. in mém. de la soc. de phys. de Gén. III, t. 24.
 Chrysobotrya intermedia Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. IV, 19. t. 1. f. B.
 γ) sanguineum Ldl. in transact. of the hort. soc. VII, 241.
 δ) serotinum Ldl. in transact. of the hort. soc. VII, 282.
 ε) villosum DC. prodr. III, 483.
 odoratum Wendl. (ubinam?)
 longiflorum Nutt. in Fras. cat. 1813.
80. 5 inodorum Lk Handb. z. Erk. d. Gew. II, 7. America foeder. media.
 aureum Wendl. teste Lk, sed ubi descriptum ?
- * 81. 5 tenuiflorum Lindl. in transact. of the hort. soc. VII, 242. America foeder. media
 aureum Colla ill. et ic. hort. Ripul. III, t. 1. f. A. et austr., Nova Mexico.
 flavum Berl. in mém. de la soc. phys. et d'hist. nat. de Gén. III, 2. 60. t. f. 24.
 Chrysobotrya Lindleyana Spach in ann. d. sc. nat. 2. sér. IV, 20. t. 1. f. C.
 β) fructu luteo G. Don dichl. pl. III, 191.
- Not. Praeterera in horto dendrologico nostro coluntur species mihi minus cognitae:
 1) floribundum; 2) fulvum; 3) lathraeum; 4) molle. Quae sunt species hortorum: 1) angustifolium; 2) Beatonii; 3) Bridgesii; 4) callibotrys Wendl. (an Wender. ?); 5) ? cotrinatum; 6) decumbens Led.; 7) Jeffersonii; 8) strictum; 9) trifoliatum.

Fam. 92. Cacteae (Opuntiaceae s. Nopaleae).

Trib. 1. Melocacteae (Flores tubulosi; Germen inclusum, laeve).

IX. Mamillaria (nec Mamillaria) Haw. (mamma, die Warze.)

1. 5 Nuttallii A. Gr. pl. Fendl. 49. adn. America foed. media
 simplex T. et Gr. fl. of N. Am. I, 553. (Missouri).
 2. 5 vivipara Haw. syn. pl. succ. suppl. 72. America foed. media
 Cactus viviparus Nutt. gen. of N. Amer. I, 295. (Missouri).
 3. 5 Heydéri A. Dietr. in Otto et D. Gartenz. XVI, 20. Texas.
 4. 5 declivis A. Dietr. in Otto et D. Gartenz. XVIII, 235. Texas.
 5. 5 papyracantha A. Gr. pl. Fendl. 49. Nova Mexico.
 6. 5 tetrancistra Engelm. in Sillim. amer. journ. n. ser. XIII, 337. Texas.
 7. 5 Goodrichii Scheer in Emory repos. 158. Texas.

Trib. 2. Echinocacteae (Flores breviter tubulosi, in vertice caulis; Germen exsertum).

X. Echinocactus Salm D. (ἐχινος, erinaceus, Igel et ζακτος, cactus, Fackeldistel.)

1. 5 viridescens Engelm. in Sillim. amer. journ. n. ser. XIII, 338. Texas.

Trib. 3. Cereastreae (Flores tubulosi; Germen exsertum).

XI. Echinopsis Zucc. (ἐχινος, erinaceus, Igel et ὄψις, visus, Ansehen.)

1. 5 octacantha Muehlenpf. in Otto et D. Gartenz. XVI, 19. Texas.

XII. Cereus Haw.

(cereus, Wachskerze, quia plantae exsiccatae et oleo perfusae in patria quasi cereos praebent.)

1. 5 procumbens Engelm. in Bost. journ. of nat. hist. VI, 203. Texas.
 2. 5 Fendleri A. Gr. pl. Fendl. 51. Nova Mexico.
 β) pauperculus A. Gr. in pl. Fendl. 51.
 3. 5 californicus T. et Gr. fl. of N. Am. I, 555. California, Texas.
 4. 5 giganteus Engelm. in Sillim. amer. journ. n. ser. XIII, 338. Texas.
 5. 5 Emoryi Engelm. in Sillim. amer. journ. n. ser. XIII, 338. Texas.
 6. 5 Engelmanni Parry in Sillim. amer. journ. n. ser. XIII, 338. Texas.
 7. 5 Greggii Engelm. in Sillim. amer. journ. n. ser. XIII, 446. Texas.

XIII. *Echinocereus* Engelm.

(ἔχινος, erinaceus, Igel et cereus hoc loco Cactearum genus.)

1. 5 coccineus Engelm. in A. Gr. pl. Fendl. 51. Nova Mexico.
 β) cylindricus Engelm. in A. Gr. pl. Fendl. 51.
 γ) melanacanthus Engelm. in A. Gr. pl. Fendl. 51.
 2. 5 triglochidiatus Engelm. in A. Gr. pl. Fendl. 51. Nova Mexico.

Trib. 4. *Opuntieae* (Flores rotati, laterales).XIV. *Opuntia* Tourn.(quia planta prope Opuntem, Graeciae urbem quasi spontanea inventa dicitur, *Opuntia* nominatur; melius sine dubio nomen a voce „όπος, succus, Saft,“ derivandum ?)

1. 5 mesacantha Nutt. in Ser. bull. botan. 214. Amer. foed. (Kentucky).
 2. 5 caespitosa Nutt. in Ser. bull. bot. 214. Amer. foed. (Kentucky).
 * 3. 5 fragilis Haw. syn. pl. succ. suppl. 82. Missouri.
 Sabinii Hort.
 Cactus fragilis Nutt. gen. of N. Amer. pl. I, 296.
 4. 5 intermedia S. Dyck hort. Dyck. 364. ? Europa australis.
 vulgaris γ. major S. Dyck obs. bot. 1822. p. 9.
 * 5. 5 Ficus indica Mill. dict. ed. 8. Nro. 2. America foed. et trop.,
 vulgaris Ten. syll. fl. neap. 239. Cochinchina, Japonia,
 ? Cactus Ficus Thunb. fl. jap. 198. et nunc spontanea in
 - Ficus indica L. cod. Nro. 3585. Lusitania, Gallia austr.,
 - Opuntia Guss. prodr. fl. sic. 559. Italia, Valesia inferiori
 α) fructu albido Guss. fl. sic. syn. I, 550. (Helvetia).
 β) - aspermo Guss. fl. sic. syn. I, 550.
 γ) - lutescente Guss. fl. sic. syn. I, 550.
 δ) - sanguineo Guss. fl. sic. syn. I, 550.
 6. 5 chinensis C. Koch. China.
 Cactus chinensis Roxb. fl. ind. II, 476.
 * 7. 5 elongata Blum. bijdr. III, 1136. Japonia.
 * 8. 5 vulgaris Mill. dict. t. 191. Haw. syn. pl. succ. 190. Amer. foed. et tropica.
 ? humifusa Nutt. in Pfeiff. enum. diagn. Cact. 146.
 Cactus humifusus Raf. in ann. of nat. 15 (teste T. et Gr.).
 - Opuntia L. cod. Nro. 3584.
 9. 5 nana Vis. fl. dalm. III, 143. India occid. et nunc
 Cactus Opuntia Alsch. fl. Jadr. 108. sponte sua in Italia,
 - Opuntia β. nana Tuss. fl. d. Ant. II, 112. t. 30. DC. Dalmatia.
 pl. crass. t. 138.
 - vulgaris Haw. syn. pl. succ. 190.
 10. 5 Missuriensis DC. prodr. III, 472. Missouri, Arkansas,
 polyacantha Haw. syn. pl. succ. suppl. 82. Rocky mountains.
 Cactus ferox Nutt. gen. of N. Amer. pl. I, 296.
 11. 5 media Haw. syn. pl. succ. 82. Missouri.
 * 12. 5 Amyclaea Ten. syll. fl. neap. 240. fl. nap. t. 236. Italia inferior, Sicilia.
 Cactus maximus Guss. prodr. fl. sic. I, 240.
 13. 5 rutila Nutt. in T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 555. America boreali-occid.
 14. 5 phaeacantha A. Gr. pl. Fendl. 51. Nova Mexico.
 15. 5 Lindheimeri Engelm. in Bost. journ. of nat. hist. VI, 207. Texas.
 16. 5 Engelmanni S. Dyck. in Bost. journ. of nat. hist. VI, 207. Texas.
 * 17. 5 Dillenii Haw. in DC. prodr. III, 472. Dill. hort. Elth. t. 562. America tropica,
 Tuna β. Haw. syn. pl. succ. 188. ? Sicilia.
 Cactus Dillenii Ker. bot. reg. t. 255.
 * 18. 5 Tuna Mill. dict. Haw. syn. pl. succ. 188. America tropica, Texas.
 coccinellifera DC. plant. grass. t. 137.
 Cactus Tuna L. cod. Nro. 3586.
 - Bonplandii H. B. et K. nov. gen. et sp. amer. VI, 69.
 β) laevior Salm D. hort. Dyck. 186 (O. flexibilis Hort.).
 19. 5 prolifera Engelm. in Sillim. amer. journ. n. ser. XIII, 338. Texas.
 20. 5 serpentina Engelm. in Sillim. amer. journ. n. ser. XIII, 338. Texas.
 21. 5 ramosissima Engelm. in Sillim. amer. journ. n. ser. XIII, 339. Texas.
 22. 5 Parryi Engelm. in Sillim. amer. journ. n. ser. XIII, 339. Texas.

INDEX.

- Begonia* L. VI.
grandis Dryand. 1.
Botryocarpum nigrum Rich. VIII, 29.
Cactus Bonplandii H. B. et K. XIV, 18.
chinensis Roxb. XIV, 6.
Dillenii Haw. XIV, 17.
ferox Nutt. XIV, 10.
Ficus Thunb. XIV, 5.
- *indica* L. XIV, 5.
fragilis Nutt. XIV, 3.
humifusus Raf. XIV, 8.
maximus Guss. XIV, 12.
Opuntia Alsch. XIV, 9.
- Guss. XIV, 9.
- L. XIV, 8.
Tuna L. XIV, 18.
viviparus Nutt. IX, 1.
vulgaris Haw. XIV, 9.
Cadaba Forsk. II.
trinervia DC. 1.
Calobotrya sanguinea Spach VIII, 67.
Capparis L. I.
acuminata Lindl. 11.
Cantonensis Lour. 12.
chinensis G. Don 11.
falcata Lour. III, 1.
Fontanesii Presl 3.
heteracantha DC. 4.
leucophylla DC. 5.
membranacea Gardn. et Ch. 10.
mucronifolia Boiss. 6.
nepalensis DC. 8.
obovata Royle 9.
orientalis Lois. 1.
ovata Guss. 3.
parvifolia Boiss. 7.
peduncularis Presl 1.
rupestris S. et Sm. 1.
sicula Lois. 2.
spinosa Curt. 1.
- L. 2.
- β . S. et Sm. 3.
Cereus Haw. XII.
californicus T. et Gr. 3.
Emoryi Engelm. 5.
Engelmanni Parry 6.
Fendleri A. Gr. 2.
giganteus Engelm. 4.
Greggii Engelm. 7.
procumbens Engelm. 1.
Cerophyllum Douglasii Spach VIII, 48.
inebrians Spach VIII, 48 β .
Chrysobotrya intermedia Spach VIII, 79 β .
Lindleyana Spach VIII, 81.
revoluta Spach VIII, 79.
Cieca heterophylla Moench IV, 2.
Coreosma affinis Spach VIII, 75.
Dombeyana Spach VIII, 70.
florida Spach VIII, 28.
multiflora Spach VIII, 74.
sanguinea Spach VIII, 67.
viscosissima Spach VIII, 47.
Crataeva L. III.
falcata DC. 1.
Echinocactus Salm-D. X.
viridescens Engelm. 1.
Echinocereus Engelm. XIII.
coccineus Engelm. 1.
triglochidiatus Engelm. 2.
Echinopsis Zucc. XI.
octacantha Muehlplf. 1.
Gaura L. VII.
fruticulosa Benth. 1.
Roemeriana Scheele 2.
Granadilla incarnata Munch IV, 1.
Grossularia acicularis Spach VIII, 21.
Cynosbati Mill. VIII, 17.
Diacantha Mill. VIII, 37.
divaricata Spach VIII, 12.
hirsuta Mill. VIII, 22 γ .
hirtella Spach VIII, 15.
irrigua Spach VIII, 10.
nigra Mill. VIII, 29.
nivea Spach VIII, 8.
oxyacanthoides Mill. VIII, 16.
reclinata Mill. VIII, 22 β .
rubra Mill. VIII, 57.
triflora Spach VIII, 13.
Uva Scop. VIII, 22.
- *crispa* Mill. VIII, 22 δ .
vulgaris Erndt VIII, 22 θ .
- Spach VIII, 22.
Mammillaria Haw. IX.
declivis A. Dietr. 4.
Goodrichii Scheer 7.
Heyderi A. Dietr. 3.
Nuttallii A. Gr. 1.
papyracantha A. Gr. 5.
simplex T. et Gr. 1.
tetrancistra Engelm. 6.
viripara Haw. 2.
Muricia Lour. V.
cochinchinensis Lour. 1.
Momordica cochinchinensis Spreng. V, 1.
mixta Roxb. V, 1.
Opuntia Tourn. XIV.
Amyclaea Ten. 12.
caespitosa Nutt. 2.
chinensis C. Koch 6.
coccinellifera DC. 18.
Dillenii Haw. 17.
elongata Blume 7.

Opuntia Engelmanni Salm D. 16.

- Ficus indica* Mill. 5.
- flexibilis* Hort. 18 β.
- fragilis* Haw. 3.
- humifusa* Nutt. 8.
- intermedia* Salm D. 4.
- Lindheimeri* Engelm. 15.
- media* Haw. 11.
- mesacantha* Nutt. 1.
- Missouriensis* DC. 10.
- nana* Vis. 9.
- Parryi* Engelm. 22.
- phaeacantha* A. Gr. 14.
- polyacantha* Haw. 10.
- prolifera* Engelm. 19.
- ramosissima* Engelm. 21.
- rutila* Nutt. 13.
- Sabinii* Hort. 3.
- serpentina* Engelm. 20.
- Tuna* Mill. 18.
- β. Haw. 17.
- vulgaris* Mill. 8.
- Ten. 5.
- γ. *major* Salm D. 4.

Passiflora L. IV.

- angustifolia* Sw. 2.
- chinensis* Sweet 6.
- coerulea* Lam. 6.
- heterophylla* Lawr. et Jacq. 2.
- incarnata* L. 1.
- Kerii* Spreng. 1 β.
- longifolia* Lam. 2.
- Loureiroy* G. Don 6.
- nepalensis* Wall. 5.
- tenuiloba* Engelm. 4.
- Warei* Nutt. 3.

Rebis discolor Spach VIII, 71.

- ebracteolata* Spach VIII, 78.
- frigida* Spach VIII, 75.
- Gayana* Spach VIII, 77.
- macrobotrys* Spach VIII, 72.
- punctata* Spach VIII, 50.

Ribes L. VIII.

- aciculare* Sm. 21.
- acuminatum* Wall. 43.
- affine* Dougl. 46.
- H. B. et K. 75.
- albifolium* R. et P. 71.
- albinervium* Mich. 62.
- album* Gilib. 41.
- alceaefolium* Kze 68.
- alpestre* Wall. 18.
- alpinoides* Domb. 78.
- alpinum* C. A. Mey. 52.
- *Delarbrey* 63.
- L. 41.
- Pall. 38.
- americanum* Mill. 28.
- Pall. 27.
- *nigrum* Moench 28.
- angustifolium* Hort. ad fin.
- atropurpureum* C. A. Mey. 64 β.
- aureum* Colla 81.
- Pursh 79.
- Wendl. 80.
- Beatoni* Hort. ad fin.

Ribes Biebersteinii Berland. 61.

- bracteosum* Dougl. 30.
- Bridgesii* Hort. ad fin.
- bullatum* O. et Dietr. 60.
- californicum* H. et Arn. 3.
- callibotrys* Wender. 64 γ.
- campanulatum* H. B. et K. 75.
- Moench 28.
- canadense* Lodd. 45.
- carpathicum* Kit. 58.
- caucasicum* Adams 22 γ.
- Bieb. 61.
- cerasiforme* Hort. 57 s.
- cereum* Dougl. 48.
- chilense* C. Koch. 35.
- ciliatum* C. Koch 61.
- Willd. 73.
- cotrinatum* Hort. ad fin.
- cucullatum* H. et Arn. 34.
- cuneatum* Kar. et Kir. 36.
- cuneifolium* R. et P. 33.
- Cynosbati* L. 17.
- γ. Hook. 16. γ.
- decumbens* Led. ad fin.
- Diacantha* Pall. 37.
- Dikuseha* Fisch 27.
- Dillenii* Medik. 28.
- dioicum* Moench 41.
- divaricatum* Dougl. 12.
- ebracteatum* Berland. 79.
- Gay 78.
- echinatum* Dougl. 23.
- fasciculatum* S. et Z. 24.
- ferox* Smith 7.
- flavum* Berl. 81.
- Colla 79 β.
- Fleischmanni* Rehb. 41 γ.
- floribundum* Hort. ad fin.
- floridum* l'Her. 28.
- fragrans* Lodd. 79 β.
- Pall. 55.
- frigidum* H. B. et K. 76.
- fulvum* Hort. ad fin.
- fuchsoides* Mog. et Sess. 1.
- Gayanum* Walp. 77.
- glaciale* Wall. 26 et 42.
- glandulosum* Ait. 45.
- R. et P. 50.
- glutinosum* Benth. 69.
- Gordoni* (*Gordoniana*) Hort. 67 γ.
- gracile* Mich. 14.
- Pursh 13.
- Torr. 17.
- graveolens* Bge 55 β.
- Grossularia* Koch. 22.
- L. 22. γ.
- Roxb. 19.
- Scop. 41 ♂.
- grossularioides* Mich.
- heterotrichum* C. A. Mey. 54.
- hirtellum* Mich. 15.
- hirtum* H. et Bonpl. 76.
- Hladnikianum* Freyer 41 ♂.
- holosericum* O. et Dietr. 60 β.
- Hudsonianum* Rich. 31.
- Jeffersonii* Hort. ad fin.

- Ribes inebrians* Lindl. 48 β.
inodorum Lk 80.
intermedium Tausch 28 β.
Jorullense H. B. et K. 72.
irriguum Dougl. 10.
Kunthii Berland. 73.
lacustre DC. 16.
 - Poir. 23.
lathraeum Hort. ad fin.
laxiflorum Pursh 46.
 - Richards. 45.
leptanthum A. Gr. 5.
leptostachyum Benth. 44.
 - Dne 56.
longiflorum Nutt. 79 ε.
longispinum C. Koch 19.
macra(ca)anthum Lodd. 22 ε.
macrobotrys R. et P. 72.
magellanicum Poir. 32.
malvaceum Sm. 68.
melananthum Boiss. 53.
melanocarpum C. Koch 26.
Menziesii Pursh 7.
mexicanum Spreng. 74.
microphyllum H. B. et K. 4.
Missouriense Nutt. 9.
molle Hort. ad fin.
monticolum C. Koch 44.
multiflorum Kit. 60 β.
 - H. B. et K. 74.
nigrum L. 29.
 - Rich. 31.
 - β. L. 28.
niveum Lindl. 8.
occidentale H. et Arn. 2.
odoratum Wendl. 79 ε.
officinatum Dum C. 57.
olidum Moench 29.
orientale Dsf. 40.
 - Led. 52.
oxyacanthoides L. 16.
 - Mich. 23.
 - Richards. 17 β.
pallidum O. et Dietr. 63 β.
palmatum Dsf. 79.
pensylvanicum Lam. 28.
petiolare Dougl. 31 β.
petraeum Mor. 60.
 - Wulf. 63.
pneobalsamum Stev. 55.
polycarpum Gmel. 65.
probinquum Turcz. 59.
procumbens Pall. 65.
prostratum l'Her. 45.
 - β. Hook. 46.
- Ribes pulchellum* Turcz. 39.
punctatum Lindl. 52.
punctatum R. et P. 49.
reclinatum L. 22 β.
recurvatum Mich. 28 γ.
resinosum bot. mag. 52.
 - Pursh 51.
rigens Mich 45 β.
rotundifolium Mich. 13.
rubrum L. 57.
 - Pall. 61.
 - Richards. 62.
sanguineum Pursh 67.
 - H. et Arn. 68.
 - Richards. 62.
saxatile Pall. 38.
saxosum Hook. 15.
Schmidtianum Tausch 28 ε.
Scopolii Hladn. 41 θ.
setosum Dougl. 16 β.
sibiricum Hort. 61.
speciosum Pursh 1.
spicatum Robs. 60.
spinosum Lam. 22.
Stakori Fisch. 20.
stamineum Horn. 13.
 - Smith 1.
strictum Hort. ad fin.
subvestitum H. et Arn. 6.
Takare G. Don 66.
tenuiflorum Lindl. 79 β.
tomentosum C. Koch 11.
tortuosum Benth. 25.
trifidum Mich. 45.
triflorum Big. 15.
 - Willd. 13.
trifoliatum Hort. ad fin.
trilobum Meyen 68.
triste Pall. 64.
tubiflorum Mey. 68.
tubulosum Eschsch. 66.
urceolatum Tausch 63 β.
Uva crispa DC. 22.
 - - L. 22 θ.
 - Pall. 21.
villosum Gay 36.
 - Nutt. 11.
 - Roxb. 52.
vinosum Dum. Cours. 63.
viscosissimum Pursh 47.
viscosum R. et P. 70.
vitifolium Host 60 γ.
vulgare C. Koch 22.
 - Lam. 57.
Xorullense Spreng. 73.
Robsonia speciosa Spach VIII, 1.

ORDO XIV.

Umbelliflorae.

Fam. 93. Umbelliferae.

I. Bupleurum L.

(apud Graecos tempore scholae Alexandrinae βουπλευρον hujus generis species.)

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. 5 Sibthorpiatum S. et Sm. prodr. fl. gr. 179. fl. gr. 264. | Graecia. |
| 2. 5 elatum Guss. prodr. fl. sic. I, 116. | Sicilia. |
| 3. 5 dianthifolium Guss. prodr. fl. sic. suppl. 71. | Sicilia et ins. proximae. |
| 4. 5 frutescens L. cod. Nro. 1923. Cav. ic. ét descr. t. 106. | Marocco, peninsula |
| Buprestis frutescens Spreng. in d. Ges. naturf. Fr. zu Berl. | pyrenaica, Gallia austr. |
| Mag. VI, 259. | |
| Tenoria frutescens Spreng. in R. et S. syst. veget. VI, 376. | |
| * 5. 5 spinosum Gouan ill. et obs. bot. 8. t. 2. f. 3. | Mauritania, Corsica, |
| Buprestis spinosa Spreng. in d. Ges. naturf. Fr. zu Berl. | peninsula pyrenaica. |
| Mag. VI, 259. | |
| Tenorea spinosa Spreng. in R. et S. syst. veget. VI, 377. | |
| * 6. 5 fruticosum L. cod. Nro. 1922. S. et Sm. fl. gr. t. 263. | Africa bor., Graecia, |
| Buprestis fruticosa Spreng. in d. Ges. naturf. Fr. zu Berl. | Rumelia, Italiae insul. |
| Mag. VI, 259. | majores, peninsula |
| Tenorea fruticosa Spreng. in R. et S. syst. veget. VI, 375. | pyrenaica. |
| 7. 5 Gibraltaricum Lam. enc. méth. I, 520. | Peninsula pyrenaica, |
| arborescens Jacq. ic. pl. rar. II, 351. | Africa borealis, |
| coriaceum l'Her. stirp. nov. aut min. cogn. VI, t. 67. | Libanon. |
| obliquum Vahl symb. bot. I, 24. | |
| Buprestis coriacea Spreng. in d. Ges. naturf. Fr. zu Ber. Mag. VI, 259. | |
| Tenorea coriacea Spreng. in R. et S. syst. veget. VI, 375. | |

Fam. 94. Araliaceae.

II. Panax L.

(a. v. παν, totum, ganz et άζος, medicamentum, Heilmittel, apud Veteres planta quaedam saluberrima.)

A. Aculeata.

- | | |
|---|---------------------------|
| * 1. 5 hórridum Sm. in Rees cyclop. XXVI. Hk. fl. bor. am. I, 273. t. 98. | America boreali- |
| Aralia erinácea Hk. in Edinb. phil. journ. 1827. 64. | occidentalis, California. |
| 2. 5 ricinifolium S. et Z. Abh. d. baier. Acad. phys. Kl. IV, 2. 199. | Japonia. |
| 3. 5 divaricatum S. et Z. Abh. d. baier. Acad. phys. Kl. IV, 2. 200. | Japonia. |
| 4. 5 Loureiroanum DC. prodr. IV, 252. | China (Canton). |
| Plectronia chinensis Lour. fl. coch. 201. | |
| 5. 5 aculeatum Ait. hort. Kew. III, 448. Jcq. ic. rar. t. 634. | China. |
| Zanthóxylum trifoliatum L. cod. Nro. 7422. | |
| 6. 5 Hainla DC. prodr. IV, 253. | Nepal. |
| Hedera Hainla Ham. in Don prodr. fl. nep. 187. | |

B. Inermia.

- | | |
|--|--------|
| 7. 5 serratum Wall. in DC. prodr. IV, 254. | Nepal. |
| 8. 5 tomentosum Wall. in DC. prodr. IV, 255. | Nepal. |

9. 5 *innovans* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 198. Japonia.
 10. 5 *fragrans* Roxb. hort. beng. 21. fl. ind. II, 76. Nepal, Himalaya.
 Aralia fragrans Don prodr. nep. fl. 187.
 Hedera fragrans Syr. syst. veget. IV, 2. 102.
 11. 5 *bijugum* Wall. num. list. Nro. 4937. Nepal.

III. *Toricellia* DC.

(Toricelli, matheos professor Florentinus et thermometri inventor; † 1647.)

1. *h. tiliaefolia* DC. prodr. IV, 257. Nepal.

IV. *Aralia* L.

(origine ignota, certe canadensi?)

- 1. 5 *canescens* S. et Z. Abh. d. baier. Acad. phys. Kl. IV, 2. 202. Japonia.
 • 2. 5 *japonica* Thunb. fl. jap. 128. Japonia.
 3. 5 *pentaphylla* Thunb. fl. jap. 128. Japonia.
 Panax spinosa L. fl. suppl. 441 (teste Lam.).
 • 4. *h. hispida* Mich. fl. bor. am. I, 185. bot. mag. t. 1041. Canada, Terra nova,
 Muehlenbergiana Schult. in R. et S. syst. veg. VI, 704. America foed. borealis.
 5. 5 *spinosa* L. cod. Nro. 2182. Pluk. almag. t. 20. America foederata.
 ? *Chaerophyllum arborescens* L. cod. Nro. 2072 (teste T. et Gr.)
 β) *glabra* Nutt. in T. et Gr. fl. of N. Am. I, 647.
 γ) *inermis* Pursh fl. am. sept. I, 209.

V. *Dimorphanthus* Miq.

(dic, duplex, doppelt, μορφη, forma, Gestalt et ἀθος, flos, Bluethe.)

1. 5 *elatus* Miq. comm. phytogr. 95. t. 12. China, Java.
 ? *Aralia chinensis* L. cod. Nro. 5182.
Leea spinosa Spreng. syst. veget. I, 670.

VI. *Hedera* L.

(origine dubia, ? celtica dicitur, vox a Romanis jam usurpata.)

A. Folia simplicia.

- * 1. § *Helix* L. cod. Nro. 1637. Japonia, India orientalis.
 * β) *algeriensis* Hort. Oriens, Africa borealis.
 * γ) *aureo- et argenteo-variegata* Hort. ins. canarienses.
 * δ) *canariensis* Willd. in Mag. naturf. Fr. in Berl. II, 170. t. 5. f. 1.
 * ε) *chrysocharpa* Req. in Gr. et Godr. fl. de Fr. II, 2.
 * ζ) *digitata* Lodd. cat. (palmata Hort.).
 * η) *elliptica* S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. d. Wiss. phys. Kl. IV, 2. 210.
 * θ) *hibernica, scotica et canadensis* Hort.
 * ι) *laciniata* Hort.
 * κ) *leucocarpa* Hort.
 * λ) *major* Cup. hort. Cath. 92 (arborea et arborescens Hort.).
 * μ) *vitifolia* Hort.
 2. § *poëtarum* Bert. prael. rei herb. 78. fl. ital. II, 688. Italia, Bosphorus.
 Helix β. L. cod. Nro. 1637.
 - β. *chrysocharpa* Ten. sulla fl. Virg. 13.
 chrysocharpa Walsh in transact. of the hort. soc. VI, 42.
 3. § *rhombica* S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. d. Wiss. phys. Kl. IV, 2. 202. Japonia.
 * 4. § *colchica* C. Koch in Linn. XVI, 365. Colchis.
 Roegneriana Hort.
 5. § *nepalensis* C. Koch. Nepal.
 Helix Don prodr. fl. nep. 187. et Wall. in Roxb. fl. ind. II, 515.
 6. § *japonica* Jungh. nov. gen. et sp. pl. fl. Jav. 25. Japonia.
 7. § *polyacantha* Wall. num. list. Nro. 4907. Nepal.
 8. § *scandens* DC. prodr. IV, 264. China.
 Aralia palmata Lour. fl. coch. I, 233.
 - *scandens* Poir. enc. méth. suppl. I, 419.
 9. 5 *parviflora* Champ. in journ. of bot. a. Kew g. misc. IV, 122. America foeder. occid.
 10. 5 *protea* Champ. in journ. of bot. a. Kew g. misc. IV, 122. America foeder. occid.

B. Folia digitata aut palmata.

11. 5 *elata* Ham. in Don prodr. fl. nep. 187. Nepal.
 12. 5 *aesculifolia* Wall. num. list. Nro. 4913. Nepal, Himalaya.
 13. 5 *tomentosa* Ham. in Don prodr. fl. nep. 187. Nepal.

14. ♂ *aculeata* Ham. in Don prodr. fl. nep. 187. Nepal.
 15. ♂ *terebinthacea* Vahl symb. III, 42. Rh. hort. mal. VII, t. 28. Ceylon, India orientalis,
Aralia digitata Roxb. (sed ubi?)

C. Folia pinnata.

16. § *hypoglauca* Hance in Wanp. bot. syst. II, 724. China (Hongkong).
 17. § *parastica* Don prodr. fl. nep. 188. Nepal, Himalaya.
 18. § *glauca* Wall. num. list. Nro. 4921. Nepal.

D. Species vix nota (an *Ampelopsis* species?)

19. § *arborea* Bartr. Reise d. Car. 134 (s. descr.). Carolina.

VII. *Paratropia* Bl.

(παράτροπη, declinatio, Ablenkung, ob petiolos declinatos aut geniculatos.)

1. ♂ *Cantonensis* H. et Arn. bot. of Beech. voy. 189. China (Canton).
Aralia octophylla Lour. fl. coch. I, 233.

Fam. 95. *Corneae*.VIII. *Quadriala* S. et Z.

(quatuor, 4 et ala, Fluegel, ob fructum quadrialatum.)

1. 5 *lanceolata* S. et Z. Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 195. t. 2 B. Japonia.

IX. *Benthamia* Lindl.

(Georg Bentham societatis horticulturae Londinensis secretarius, Labiatarum, Scrophularinearum etc. monographus celeberrimus.)

- * 1. 5 *japonica* S. et Z. fl. jap. I, 38. t. 16. Japonia.
Cornus japonica Thunb. fl. jap. 63.
Viburnum Awabuki Hort.
 - *japonicum* Spr. syst. veget. I, 934.
 * 2. ♂ *fragifera* Lindl. in bot. reg. t. 1579. Nepal, Himalaya.
Cornus capitata Wall. in Roxb. fl. ind. I, 434.
 β) *sinensis* Champ. in Journ. of bot. a. Kew g. misc. IV, 165.
 3. ♂ *disciflora* C. Koch. Mexico.
Cornus disciflora DC. prodr. IV, 273.
 ? - *grandis* Cham. et Schl. in Linn. V, 171.

X. *Cornus* L.

(vox jam apud Latinos C. masculam significans.)

A. Flores involucrati.

- * 1. ♂ *florida* L. cod. Nro. 959. bot. mag. t. 526. Gu. et H. fr. Holzart. t. 19. America borealis.
Benthamia florida Spach hist. d. vég. phanér. VI, 106.
 2. ♂ *Nuttallii* Audub. birds of Amer. t. 367. Oregon.
 3. 5 *polygama* Raf. fl. Ludov. 78. America foed. media.
 4. 5 *officinalis* S. et Z. fl. jap. I, 100. t. 50. Japonia (nec Java Walp.).
 * 5. 5♂ *mas* (mascula R. et S.) L. cod. Nro. 960. Gu. et H. Europa media australis.
 d. Holzart. t. 2.
 * β) fructu albo et luteo (flava Dsf. hort. Paris.)
 γ) - majori; macrocarpa Hort.
 * δ) foliis argenteo- et aureo-variegatis et punctatis.
 ε) - lanceolatis.

B. Flores nudi; Foliorum pagina inferior strigosa.

- * 6. 5♂ *alternifolia* (alternata Marsh.) L. fl. suppl. 125. Gu. et H. Canada, America foed. borealis et media.
 fr. Holzart. t. 43.
 β) *plicata* Tsch in Flora XXI, 733.
 * 7. *paniculata* l'Her. Corn. 9. t. 5. Canada, America foed. borealis et media.
racemosa Lam. enc. méth. bot. II, 116.
femina (foemina) Mill. dict. Nro. 4.
citrifolia Dsf. hort. Paris.
candidissima Marsh. arbust. 62.
 β) *albida* Ehrh. Beitr. IV, 16.
 γ) *radiata* Pursh fl. Am. sept. I, 109.
 8. 5 *glabrata* Benth. bot. of Beech. voy. of the Sulph. 18. California.

9. 5 *Drummondii* C. A. Mey. in ann. d. sc. nat. 3. sér. IV, 59. America foed. austr.
- * 10. 5 *stricta* (nec *striata* DC.) l'Her. Corn. 8. t. 4. America foed. media.
coerulea Meerb. pl. select. icon. 3.
cyanocarpos Gm. syst. veg. I, 257.
fastigiata Mich. fl. bor. amer. I, 92.
paniculata Schmidt oestr. Baumz. t. 68 (teste Tausch).
? *sanguinea* Walt. fl. carol. 88.
β) *asperifolia* Lodd. cat. 1836.
γ) *sempervirens* Lodd. cat. 1836.
- * 11. 5 *sericea* L. cod. Nro. 963. l'Her. Corn. Nro. 6. t. 2. America borealia.
? *alba* Walt. fl. car. 88.
Amomum Dur. Harbk. Baumz. I, 165.
candidissima Mill. dict.
? *coerulea* Lam. enc. méth. bot. II, 116.
cyanocarpus Mch. meth. 108.
lanuginosa Mich. fl. bor. am. I, 92.
obliqua Raf. ann. of nat. 13.
rubiginosa Ehrh. Beitr. 2. Naturk. IV, 15.
β) *latifolia* Tausch in Flora XXI, 732.
γ) *Schuezeana* C. A. Mey. in ann. d. sc. nat. 3. sér. IV, 2. 67.
δ) *foliis albo- et aureo-variegatis et marginatis*.
12. 5 *asperifolia* Mich. fl. bor. am. I, 93. America foederata
sericea γ. *asperifolia* DC. prodr. IV, 272. media et australis.
- * 13. 5 *alba* L. cod. Nro. 962. Schm. oestr. Baumz. t. 65. Terra nova, Canada,
stolonifera Mich. fl. bor. amer. I, 92. America foederata
tatarica Mill. dict. (teste Tausch). borealis et media.
β) *angustifolia* C. A. Mey. in ann. d. sc. nat. 3. sér. IV, 2. 60.
γ) *Purshii* Don diehl. pl. III, 399.
sanguinea Pursh fl. Am. sept. I, 109. Schm. oestr. Baumz. t. 66.
- * δ) *fol. variegatis*.
- * 14. 5 *sibirica* Lodd. in Loud. hort. brit. 50. Sibiria.
alba Pall. fl. ross. I, 51. t. 34.
purpurea Tausch in Flora XXI, 731.
15. 5 *brachypoda* C. A. Mey. in ann. d. sc. nat. 3. sér. IV, 2. 74. Japonia.
alba Thunb. fl. jap. 63.
16. 5 *oblonga* Wall. in Roxb. fl. ind. I, 432. Nepal, Himalaya.
paniculata Ham. in Don prodr. fl. nep. 140.
17. 5 *nervosa* Royle ilk. of the him. mount. 235. Himalaya.
18. 5 *macrophylla* Wall. in Rxb. fl. ind. I, 433. Nepal, Himalaya.
- * 19. 5 *citrifolia* (? *citrina* Hort.) Wahlb. in Ok. Isis XXI, 982. Oriens, Bosporus,
australis C. A. Mey. in ann. d. sc. nat. 3. sér. IV, 2. 65. Krim, Sibiria.
β) *sempervirens*.
20. 5 *latifolia* de Bray in Zigr. dendr. Fl. I, 172. Livonia.
- C. Flores nudi; Foliorum pagina inferior hirta.
- * 21. 5 *sanguinea* L. cod. Nro. 961. Gu. et H. d. Holzart. t. 3. Europa, Oriens, Japonia.
β) *latifolia* C. A. Mey. in ann. d. sc. nat. 3. sér. IV, 2. 68.
γ) *pluricostata* S. et Z. in Abh. d. baier. Ac. phys. Kl. IV, 2. 194.
δ) *foliis variegatis et marginatis*.
- * 22. 5 *excelsa* H. B. K. nov. gen. et sp. am. III, 335. Mexico.
β) *Beyrichiana*; *Toluccensis* H. B. K. nov. gen. et sp. am. III, 430.
γ) *Hartwegiana* C. A. Mey. in ann. d. sc. nat. 3. sér. IV, 2. 69.
- * 23. 5 *circinata* l'Her. Corn. 9. t. 3. Gu. et H. fr. Holzart. t. 86. Canada, America foed.
? *circinalis* Hfmagg Nachtr. VIII. d. Verz. 41. borealis et media.
rugosa Lam. enc. méth. bot. II, 115.
tomentulosa Mich. fl. bor. amer. I, 91.
verrucosa Hort.
β) *grandiflora*.
24. 5 *californica* C. A. Mey. in ann. d. sc. nat. 3. sér. IV, 2. 72. California,
alba β. Hk. fl. bor. am. I, 276. America boreali-occid.
? *circinata* Schlecht in Linn. III, 139.
sericea β. *occidentalis* T. et Gr. fl. of N. Am. I, 652.

D. Species incerta.

25. ? *ferulaefolia* Nocc. synonym. pl. (ferulacea Jacq. teste R. et S., sed ubi?) Patria ignota.
Not. Quae species hortulanorum: americana nigra.

XI. Aucuba Thunb.
(nomen japonicum.)

- * 1. *p. japonica* Thb. fl. jap. 64. bot. mag. t. 1197. Japonia.
Eúbasis dichótoma Salisb. prodr. 68.
β) latimaculata Hort.

Fam. 96. Loranthaceae.

XII. Phoradendron Nutt.

(φωρα, furtum, Diebstahl et δειδρον, arbor, Baum.)

1. p. *) *flavescens* Nutt. in Bost. journ. of nat. hist. VI, 212. adn. America borealis.
β) *pubescens* A. Gr. in Bost. journ. of nat. hist. VI, 212.
γ) *orbiculatum* A. Gr. in Bost. journ. of nat. hist. VI, 212.
2. p. *tomentosum* Nutt. in Bost. journ. of nat. hist. VI, 212. Mexico,
Viscum tomentosum DC. prodr. IV, 670. America foed. australis.
3. p. *villosum* Nutt. in Bost. journ. of nat. hist. VI, 212. America borealis.
4. p. *lanceolatum* A. Gr. pl. Fendl. 59. adn. Texas.
5. p. *orbiculatum* A. Gr. pl. Fendl. 59. adn. Texas.
6. p. *californicum* Nutt. in Bost. journ. of nat. hist. 212. adn. California.
7. p. *juniperinum* Engelm. in pl. Fendl. 58. America borealis.

XIII. Arceuthobium Bieb. (nec Arceutobium Gr. et Godr.)

(ἀρχευθός, juniperus, Wachholder et βίον, vivere, leben.)

1. p. *americanum* Nutt. in Bost. journ. of nat. hist. VI, 214. adn. America bor. occident.
2. p. *campylópodum* A. Gr. in Bost. journ. of nat. hist. VI, 214. adn. America borealis.
β) *brachyarthron* A. Gr. in Bost. journ. of nat. hist. VI, 214.
3. p. *cryptopodium* A. Gr. in Bost. journ. of nat. hist. VI, 214. adn. California.
4. p. *Oxycedri* Bieb. fl. taur. cauc. III, 629. Hispania, Gallia austr.,
Razoumowskia caucasica Hoffm. hort. Mosqu. intr. Nro. 1. f. l. Italia, Krim, Caucasia,
Viscum Oxycedri DC. fl. franq. 901. (ed. 3. IV, 274.) America borealis.

XIV. Viscum L.

(viscum apud Graecos ἕξος, Mistel, a voc. ἔχειν, ἔχειν, h. l. tenere, halten.)

A. Foliosum.

1. p. *album* L. cod. Nro. 7402. Europa, Oriens, Sibiria.
dichótomum Gilib. exerc. phytol. II, 394.
β) *polycoccon* Gaud. fl. helv. VI, 278.
2. p. *laxum* Boiss. et Reut. diagn. pl. nov. Hisp. 16. Hispania.
3. p. *orientale* Willd. sp. pl. IV, 737. China, India orient.
4. p. *stellatum* Ham. in Don prodr. fl. nep. 142. Nepal.
5. p. *Kaempferi* DC. prodr. IV, 285. Japonia.
6. p. *platyphyllum* Spreng. syst. veg. IV, 2. 47. Nepal.
latifolium Ham. in Don prodr. fl. nep. 142.
7. p. *flavescens* Pursh fl. Amer. sept. I, 114. America foederata.
album Walt. fl. carol. 241.
leucocarpum Raf. fl. Ludov. 79.
verticillatum Nutt. gen. of N. Amer. pl. II, 235.

B. Aphyllum.

8. p. *dichótomum* Ham. in Don prodr. nep. 147. Nepal.
nepalense Spreng. syst. veget. IV, 2. 47.
9. p. *moniliforme* Blume bijdr. 667. Java, China.
10. p. *japonicum* Thunb. (teste Steud., sed ubi ?) DC. prodr. IV, 283. Japonia.
Opuntia Thunb. fl. jap. 64.
opuntioides var. Spreng. syst. veget. I, 487.

XV. Tristérix Mart.

(τρι, triplo et στειρηξ, fulcrum, Stuetze, ob bracteas ternas.)

1. p. *viridiflora* Mart. in Flora XIII, 109. G. Don dichl. pl. III, 418. Nepal.
Elytranthe viridiflora G. Don dichlam. pl. III, 426.
Loranthus viridiflorus Wall. in Roxb. fl. ind. II, 219.
Macrosolen viridiflorus Blume fl. jav. Loranth. 16.

*) *Signum p.*: planta parasitica.

XVI. *Scurrula* G. Don.

(scurra, Possenreisser, Schmarotzer.)

1. *p. chinensis* G. Don dichl. pl. III, 421. China, ? India orient.
Dendrophthoë Scurrula Blume fl. jav. 14.
Loranthus chinensis DC. coll. mem. VI, t. 7.
Scurrula L. cod. Nro. 2558. nec Roxb.
2. *p. pulverulenta* G. Don dichl. pl. III, 421. Nepal.
Dendrophthoë pulverulenta Blume fl. jav. Loranth. 14.
Loranthus pulverulentus Wall. in Roxb. fl. ind. II, 221.
3. *p. umbellifera* G. Don dichl. pl. III, 421. Nepal.
Dendrophthoë umbellifera Blume fl. jav. Loranth. 14.
Loranthus umbellatus (umbellifer Schult.) Wall. in Roxb. fl. ind. II, 222.
4. *p. vestita* G. Don dichl. pl. III, 422. Nepal.
Loranthus vestitus Wall. in Roxb. fl. ind. II, 218.
Dendrophthoë vestita Blume fl. jav. Loranth. 14.
5. *p. elata* Edgew. in transact. of the Linn. soc. XX, 58 (sub *Lorantho*). Himalaya.
6. *p. imbricata* Edg. in transact. of the Linn. soc. XX, 59 (sub *Lorantho*). Himalaya.
7. *p. lineata* Edgew. in transact. of the Linn. soc. XX, 59. (sub *Lorantho*). Himalaya.

XVII. *Dendrophthoë* Mart.

(δενδρον, arbor, Baum et φθειν, i, e. φθειραειν, destruere, zerstoeren.)

1. *p. ligustrina* Mart. in Flora XIII, 110. India orientalis.
Loranthus ligustrinus Wall. in Roxb. fl. ind. II, 219.

XVIII. *Loranthus* L.

(λωρον, lorum, Riemen et άνθος, flos, Bluethe.)

1. *p. europaeus* L. cod. Nro. 2560. Jacq. fl. austr. t. 94. Europ. austr., Sibir. ural.
2. *p. odoratus* Wall. in Roxb. fl. ind. II, 215. Nepal.
Elytranthe odorata Blume (teste Steud., ubinam? in flora jav. sub *Lorantho*).
3. *p. Lambertianus* Schult. in R. et S. syst. veget. VII, 118. Nepal.
Elytranthe Lambertiana Blume (teste Steud., ubinam?).

INDEX.

Aralia L. IV.

- canescens* S. et Z. 1.
 - chinensis* L. V, 1.
 - digitata* Roxb. VI, 15.
 - erinacea* Hook. II, 1.
 - fragrans* Don II, 10.
 - hispida* Mich. 4.
 - japonica* Thunb. 2.
 - Muehlenbergiana* Schult. 4.
 - octophylla* Lour. VII, 1.
 - palmata* Lour. VI, 8.
 - pentaphylla* Thunb. 3.
 - scandens* Poir. VI, 8.
 - spinosa* L. 5.
- Arceuthobium Bieb. XIII.
- americanum* Nutt. 1.
 - campylopodum* A. Gr. 2.
 - cryptopodium* A. Gr. 3.
 - Oxycedri* Bieb. 4.
- Aucuba Thunb. XI.
- japonica* L. 1.

Benthamia Lindl. IX.

- disciflora* C. Koch 3.
 - fragifera* Lindl. 2.
 - japonica* S. et Z. 1.
- Benthamidia florida Spach X, 1.
- Bupleurum L. I.
- arborescens* Jacq. 7.
 - coriaceum* l'Her. 7.
 - dianthifolium* Guss. 3.
 - elatum* Guss. 2.
 - frutescens* L. 4.
 - fruticosum* L. 6.
 - Gibraltarium* Lam. 7.
 - obliquum* Vahl 7.
 - Sibthorpiatum* S. et Sm. 1.
 - spinosum* Gouan 5.
- Buprestis coriacea Spreng. 7.
- frutescens* Spreng. 4.
 - fruticosa* Spreng. 6.
 - spinosa* Spreng. 5.
- Chaerophyllum arborescens L. IV, 5.

Cornus L. X.

- alba L. 13.
 - Pall. 14.
 - Thunb. 15.
 - β . Hook. 24.
- albida Ehrh. 7 β .
- alternifolia L. fil. (alternata Marsh.) 6.
- americana rubra Hort. ad fin.
- Amomum Mill. 11.
- asperifolia Lodd. 10 β .
 - Mich. 12.
- australis C. A. Mey. 19.
- brachypoda C. A. Mey. 15.
- californica C. A. Mey. 24.
- candidissima Marsh. 7.
 - Mill. 11.
- capitata Wall. IX, 2.
- circinata l'Her. (circinalis Hoffmgg.) 23.
 - Schlecht. 24.
- citrifolia Dsf. 7.
 - Wahlenb. (? citrina Hort.) 19.
- coerulea Lam. 11.
 - Meerb. 10.
- cyanocarpos Gmel. 10.
 - Moench 11.
- disciflora Moq. et Sessé IX, 3.
- Drummondii C. A. Mey. 9.
- excelsa H. B. K. 22.
- fastigiata Mich. 10.
- femina (foemina) Mill. 7.
- ferruginea Hort. Par.
- ferulaefolia Nocca (ferulacea Jacq.) 25.
- flava Dsf. 5 β .
- florida L. 1.
- glabrata Benth. 8.
- grandis Cham. et Schl. IX, 3.
- japonica Thunb. IX, 1.
- lanuginosa Mich. 11.
- latifolia Bray 20.
- macrophylla Wall. 18.
- mas L. (mascula R. et S.) 5.
- nervosa Royle 17.
- Nuttallii Audub. 2.
- obliqua Raf. 11.
- oblonga Wall. 16.
- oblongifolia Raf.
- officinalis S. et Z. 4.
- paniculata Ham. 16.
 - l'Herit.
 - Schmidt 10.
- plicata Tausch 6 β .
- polygama Raf. 3.
- purpurea Tausch 14.
- racemosa Lam. 7.
- radiata Pursh 7 γ .
- rubiginosa Ehrh. 11.
- rugosa Lam. 23.
- sanguinea L. 21.
 - Pursh 13 γ .
 - Walt. 10.
- sempervirens Lodd. 10 γ .
- sericea L.
 - β . occidentalis T. et Gr. 24.
 - γ . asperifolia DC. 12.
- sibirica Lodd. 14.
- stolonifera Mich. 13.

Cornus stricta l'Her. (striata DC.) 10.

- tatarica Mill. 13.
- Toluccensis H. B. K. 22 β .
- tomentulosa Mich. 23.
- verrucosa Hort. 23.
- Dendrophthoe Mart. XVII.
 - ligustrina Mart. 1.
 - Scurrula Blume XVI, 1.
 - pulverulenta Blume XVI, 2.
 - umbellifera Blume XVI, 3.
 - vestita Blume XVI, 4.
- Dimorphanthus Miqu. V.
 - elatus Miqu. 1.
- Elytranthe Lambertiana Blume XVIII, 3.
- odorata Blume XVIII, 2.
- viridiflora G. Don XV, 1.
- Eubasis dichotoma Salisb. XI, 1.
- Hedera L. VI.
 - aesculifolia Wall. 12.
 - aculeata Ham. 14.
 - algeriensis Hort. 1 β .
 - arborea Bartr. 19.
 - (arborescens) Hort. 1 λ .
 - canadensis Hort. 1 δ .
 - canariensis Willd. et Hort. 1 δ .
 - chrysocarpa Walsh 2.
 - colchica C. Koch 4.
 - elata Ham. 11.
 - fragrans Don II, 10.
 - glauca Wall. 18.
 - Hainla Ham. II, 6.
 - Helix Don 5.
 - L. 1.
 - β . L. 2.
 - hibernica Hort. 1 δ .
 - hypoglauca Hance 16.
 - japonica Jungh. 6.
 - nepalensis C. Koch 5.
 - palmata Hort. 1 ζ .
 - parasitica Don 17.
 - parviflora Champ.
 - poëtarum Bert. 2.
 - polyacantha Wall. 7.
 - protea Champ. 10.
 - rhombea S. et Z. 3.
 - Roegneriana Hort. 4.
 - scandens DC. 8.
 - scotica Hort. 1 δ .
 - tomentosa Ham. 13.
 - vitifolia Hort. 1 μ .
- Leea spinosa Spreng. V, 1.
- Loranthus L. XVIII.
 - chinensis DC. XVI, 1.
 - elatus Edgew. XVI, 5.
 - europaeus L. 1.
 - imbricatus Edgew. XVI, 6.
 - ligustrinus Wall. XVII, 1.
 - lineatus Edgew. XVI, 7.
 - odoratus Wall. 2.
 - pulverulentus Wall. XV, 2.
 - Scurrula L. XVI, 1.
 - umbellatus (umbellifer) Blume XIV, 3.
 - vestitus Wall. XIV, 4.
 - viridiflorus Wall. XV, 1.
- Macrosolen viridiflorus Blume XV, 1.
- Panax L. II.

- Panax aculeatum* Ait. 5,
bijugum Wall. 11.
divaricatum S. et Z. 3.
fragrans Roxb. 10.
Hainla DC. 6.
horridum Smith 1.
innovans S. et Z. 9.
Loureiroanum DC. 4.
ricinifolium S. et Z. 2.
serratum Wall. 7.
spinosa L. IV, 3.
tomentosum Wall. 8.
Paratropia Bl. VII.
Cantonensis H. et Arn.
Phoradendron Nutt. XII.
californicum Nutt. 6.
flavescens Nutt. 1.
juniperinum Engelm. 7.
lanceolatum A. Gr. 4.
orbiculatum A. Gr. 5.
tomentosum Nutt. 2.
villosum Nutt. 3.
Plectronia chinensis Lour. II, 4.
Quadriala S. et Z. VIII.
lanceolata S. et Z. 1.
Razoumowskya caucasica Hoffm.
Scurrula G. Don XVI.
chinensis G. Don 1.
pulverulenta G. Don 2.
umbellifera G. Don 3.
vestita G. Don 4.
Tenorea coriacea Spreng. I, 7.
frutescens Spreng. I, 4.
fruticosa Spreng. I, 6.
spinosa Spreng. I, 5.
Toricellia DC. III.
tilliaefolia DC. 1.
Tristerix Mart. XV.
viridiflora Mart. 1.
Viburnum Awabuki Hort. IX, 1.
- *japonicum* Spreng. IX, 1.
Viscum L. XIV.
album L. 1.
- Walt. 7.
dichotomum Gilib. 1.
- Ham. 8.
flavescens Pursh 7.
japonicum Thunb. 10.
Kaempferi DC. 5.
latifolium Haw. 6.
laxum Boiss. 2.
leucocarpum Raf. 7.
moniliforme Blume 9.
nepalense Spreng. 8.
Opuntia Thunb. 10.
opuntioides var. Spreng. 10.
orientale Willd. 3.
Oxycedri DC. XIII, 4.
platyphyllum Spreng. 6.
stellatum Ham. 4.
verticillatum Nutt. 7.
Zanthoxylum trifoliatum. L. II, 5.

CLASSIS SECUNDA.

Monopetalae.



ORDO XV.

Caulocarpae.

Fam. 97. Caprifoliaceae.

Trib. 1. Lonicereae (Cor. tubulosa; Styl. filiformis).

I. Caprifolium Juss.

(caprá, Ziege, Geiss et folium, Blatt.)

A. Flores ringentes (limbo irregulari).

- * 1. § hortense Lam. fl. franc. III, 365. Austria, Italia, Tauria,
Caucasus.
 ? italicum R. et S. syst. veg. V, 260.
 perfoliatum Roehl. Deutschl. Fl. II, 175.
 rotundifolium Moench meth. 501.
 Xylósteum Gaertn. de fruct. et sem. I, 135.
 Lonicera Caprifolium L. cod. Nro. 1371. Jacq. fl. austr. t. 357.
 - pallida Host fl. austr. I, 298. Rehb. fl. exc. I, 202 (teste Tausch).
 ? Periclymenum italicum Mill. dict.
 β) alba Jacq. fl. austr. t. 357 (praecox Lam. enc. meth. I, 727).
 γ) rubra Tausch in Flora XXI, 735.
- * 2. § italicum Duh. traité d. arbr. et arb. I, 124. Tausch in Flora XXI, 736. Austria, Italia.
 Lonicera Caprifolium Host fl. austr. I, 297. Rehb. fl. exc. I, 202 (teste Tausch).
 - β) rubra (rubella DC.) Ait. hort. Kew. I, 377.
 - italica Schmidt oestr. Baumz. t. 106. Tausch in Flora XXI, 736.
 β) quercifolium Schmidt oestr. Baumz. ad tab. 106 (erosum DC., sub Lonicera).
 γ) rubellum Tausch in Flora XXI, 736 (sub Lonicera).
- * 3. § etruscum R. et S. syst. veg. V, 261. Illyria, Dalmatia, Tyrolia,
Hispania.
 Lonicera etrusca (hetrusca Host) Sant. viagg. al Montan. I, 113. t. 1.
 - Periclymenum Gouan hort. Monsp. 101. Uer. hort. Panorm. 94.
 γ) Brownii Hort. in Reg. Gartenfl. II, 3 (sub Lonicera).
 γ) dimorpha Tausch in Flora XXI, Beibl. 49. Ten. flor.
 neap. syll. app. V, 54 (sub Lonicera).
- 4. § adenocarpum Guss. suppl. ad fl. sic. prodr. 58 (sub Lonicera). Sicilia.
- * 5. § implexum R. et S. syst. veg. V, 261. bot. mag. t. 640. Illyria, Dalmatia, Italia,
Hispania, ins. balear.,
Africa borealis.
 Lonicera implexa Ait. hort. Kew. I. ed. 2. 378. bot. mag. t. 640.
 β) cordatum; balearicum Dum. Cours. bot. cult. ed. 2. IV, 338.
 Lonicera balearica Viv. fl. cors. 4.
 - Caprifolium Dsf. fl. atl. I, 183.
 γ) major; latifolium Guss. fl. sic. syn. I, 259.
 δ) ternifolium Guss. fl. sic. syn. I, 259.
- * 6. § splendidum Boiss. voy. d. le mid. d'Esp. I, t. 81. II, 801 (sub Lonic.). Hispania australis.
- 7. § cyrenaicum Viv. fl. Lib. spec. 12. t. 8. f. 1 (sub Lonicera). Africa boreal.-orient.
- * 8. § sylvaticum Lam. fl. franc. III, 365. Europa media (Rossia
excepta) et australis,
? Camtschatca.
 distinctum Moench meth. 501.
 Periclymenum R. et S. syst. végét. V, 260.
 Lonicera germanica Dietr. Fl. v. Weini. 94.
 - etrusca Lej. fl. d. env. de Spa II, 299.
 - Periclymenum L. cod. Nro. 1374.
 Periclymenum vulgare Mill. dict.

- a) ochroleucum; germanicum Hort. et Roehl. Deutschl. Fl. II, 175.
- β) rubicundum; belgicum Ait. hort. Kew. ed. 2. I, 378 (sub Lon. Pericl.).
- γ) quercifolium Ait. hort. Kew. ed. 2. I, 378.
- δ) serotinum Ait. hort. Kew. ed. 2. I, 378. Periclymenum germanicum Mill. dict.
- ε) variegatum Hort.
- 9. § albiflorum T. et Gr. fl. of N. Amer. II, 6 (sub Lonicera). Amer. foed. (Arkansas).
- * 10. § Fraseri Pursh fl. Amer. sept. I, 160. America foederata, praesertim australis.
flavum Ell. sk. of the bot. of Flor. Car. I, 271.
Lonicera flava Sims in bot. mag. t. 1318.
- Fraseri Poir. (ubinam?)
β) magis glauca; Lonicera rupestris Raf. new fl. a. bot. of N. Am. III, 17.
- * 11. § pubescens Gold. in Edinb. phil. journ. a. 1822. p. 323. America anglica orient. et foederata borealis.
Lonicera Goldii Spr. syst. veg. I, 758.
- hirsuta Eat. man. of bot. for N. Amer. ed. 3. 341. bot. mag. t. 3103.
- pubescens Sweet hort. brit. 194. DC. prodr. IV, 332.
- villosa Muehlenb. cat. pl. Amer. sept. 22.
β) Eriensis Raf. new fl. a. bot. of N. Amer. III, 18.
- * 12. § glaucum Moench meth. 502. America borealis anglica ei foederata.
bracteosum Mich. fl. bor. amer. I, 185.
dioicum R. et S. syst. veget. V, 260.
parviflorum Pursh fl. Amer. sept. I, 161.
Lonicera dioica L. cod. Nro. 1373.
? - elliptica Raf. new fl. a. bot. of N. Amer. III, 18.
? - glauca Hill. hort. Kew. 446 (sed frutex et diversa videtur).
- media Murr. comm. Goett. 1776. 28. t. 3.
- parviflora Lam. enc. méth. I, 728.
β) acutifolia Raf. new fl. a. bot. of N. Amer. III, 19.
γ) Fol. subtus tomentosa; Douglasii Lindl. in transact. of the hort. soc. VII, 244.
Lonicera Douglasii DC. prodr. IV, 332.
- * 13. § americanum Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. IV, 338. America foederata.
gratum Pursh fl. Amer. sept. I, 161.
Lonicera grata Ait. hort. Kew. ed. 1. 231.
? - virginiana Marsh. arb. amer. 136.
? Periclymenum americanum Mill. dict.
β) reticulatum Raf. new fl. a. bot. of N. Amer. III, 18.
- 14. § californicum T. et Gr. fl. of N. Amer. II, 7 (sub Lonicera). California.
Lonicera ciliosa Hook. et Arn. bot. of Beech. voy. 349.
- 15. § hispidulum Lindl. in bot. reg. t. 1761. America boreali-occid.
Lonicera hispida Dougl. in T. et Gr. fl. of N. Amer. II, 8.
- microphylla Hook. fl. bor. amer. I, 283.
- 16. § dumosum A. Gr. pl. Wright. Tex. et Neo-Mex. II, 66 (s. Lonic.). Nova-Mexico.
- 17. § subspicatum Hook. et Arn. bot. of Beech. voy. 349 (sub Lonicera). California.
- 18. § verticillatum Mill. dict. (sub Periclymeno). India occidentalis (Jamaica).
Lonicera verticillata Steud. nom. bot. ed. 2. II, 67.

B. Flores subregulares (Periclymenum).

- * 19. § sempervirens Mich. fl. bor. amer. I, 105. bot. mag. t. 781. America foederata.
Lonicera sempervirens L. cod. Nro. 1372.
Periclymenum sempervirens Mill. dict.
β) floribus coccineis et superbis; coccineum et superbum Hort.
γ) floribus aureis; Lonicera flava nova Hort. Reg. Gartenfl. II, 3.
δ) minor Ait. bot. mag. t. 1753; oblongifolium Sweet hort. brit. ed. 3. 315.
? Lonicera connata Meerb. pl. sel. ict. pict. t. 11.
ε) salicifolium Hort.
- * 20. § occidentale Lindl. in bot. reg. t. 1457. America boreali-occid.
Lonicera occidentalis Hook. fl. bor. amer. I, 282.
- 21. § ciliosum Pursh fl. amer. sept. I, 160. America foederata.
Lonicera ciliosa (ciliata Dietr. Lex.) Poir. enc. méth. suppl. V, 612.
- * 22. § pilosum H. B. et K. nov. gen. et sp. amer. 427. t. 298. Nova Granada.
Lonicera pilosa Willd. in DC. prodr. IV, 333.
- 23. § tubulosum Benth. pl. Hartw. 292 (sub Lonicera). Mexico.
Not. In horto nostro dendrologico praeterea coluntur species dubiae sequentes:
1) grandiflorum et 2) Magnevilleae; in aliis hortis autem: 3) aurantiacum; 4) atrosanguineum; 5) Epsoneis; 6) odoratissimum; 7) purpureum.
Quae sunt species: Lonicera ovata, dentata et angustifolia Raf. new fl. a. bot. of N. Amer. III, 18 et 19, et Caprifolium rubrum Raf. fl. Ludov. 248. ?

II. *Lonicera* L.

(Ad. *Lonicera* s. *Lonicerus*, medicus Francofurti ad M., librum „Krauterbuch“ 1557 in lucem edidit, † 1586.)

A. *Nintooa* (Flores irregulares, Ovaria distincta; Caulis plerumque scandens.)

- * 1. § *japonica* Thunb. fl. jap. 89. Japonia, China, Nepal,
chinensis Wats. dendr. brit. t. 117. bot. mag. t. 3316. Himalaya.
flexuosa Lodd. in bot. cab. t. 1037. bot. reg. t. 712.
Caprifolium chinense Loud. hort. brit. 79.
- japonicum R. et S. syst. veg. V, 260.
Nintooa japonica Sweet hort. brit. ed. 3. 315.
β) flore coccineo.
γ) *confusa* DC. prodr. IV, 333.
japonica Andr. in bot. repos. t. 583. bot. reg. t. 70.
Nintooa confusa Sweet hort. brit. ed. 3. 315.
2. § *multiflora* Champ. in Journ. of bot. a. Kew gd. misc. IV, 167. China (Hongkong).
3. § *affinis* Hook. et Arn. bot. of Beech. voy. 264. Insulae chin. et japon.
- * 4. § *longiflora* DC. prodr. IV, 331. et denuo 333. China, Nepal, Himalaya.
Caprifolium japonicum Don prodr. fl. nepal. 140.
- longiflorum Sab. et Lindl. in bot. reg. t. 1232.
Nintooa longiflora Sweet hort. brit. ed. 3. 315.
5. § *Telfairii* G. Don dichlam. pl. III, 447. China, Cochinchina.
Periclymenum Lour. fl. coch. 185.
β) *cochinchinensis* G. Don dichl. pl. III, 447 (sub *Lonicera*).
Lonicera Xylosteum Lour. fl. coch. 186.
6. § *Loureiroy* DC. prodr. IV, 334. Java.
Caprifolium Loureiroy Blum. bijdr. 653 (teste G. Don).
7. § *javanica* DC. prodr. IV, 334. Java.
Caprifolium javanicum Blume bijdr. 653.
8. § *macrantha* DC. prodr. IV, 333. India orientalis,
japonica Wall. in Roxb. fl. ind. (ed. 1824.) II, 174. Himalaya.
scandens Ham. in prodr. fl. nep. 140 (teste Roxb.).
Caprifolium macranthum Don prodr. fl. nep. 140.
- nepalense G. Don in Loud. hort. brit. 79.
9. § *Leschenaultii* Wall. in Roxb. fl. ind. (ed. 1824.) II, 178. Wight
ill. of Ind. bot. II. t. 120. India orient., Nepal.
Nepal.
10. § *acuminata* Wall. in Roxb. fl. ind. II, 177. Nepal.
11. § *glabrata* Wall. in Roxb. fl. ind. (edit. 1824.) II, 175. India orient., Himalaya.
- * 12. § *diversifolia* Wall. in Roxb. fl. ind. (ed. 1824.) II, 169. Nepal, Himalaya.
β) *Royleana* Wall. num. list. 478.
- * 13. § *ligustrina* Wall. in Roxb. fl. ind. (ed. 1824.) II, t. 1025. Nepal, India orientalis.
β) *mollis* Wall. num. list. Nro. 630.
14. § *lanceolata* Wall. in Roxb. fl. ind. (ed. 1824.) II, 177. Nepal.
15. § *interrupta* Benth. pl. Hartweg. 313. California.
16. § *hirtiflora* Champ. in Journ. of bot. a. Kew gd. misc. IV, 166. China (Hongkong).
17. § *reticulata* Champ. in Journ. of bot. a. Kew gd. misc. IV, 167. China (Hongkong).
- * 18. § *canescens* Schousb. Beob. ueb. d. Gew. R. in Mar. I, 88. Africa borealis,
biflora Dsf. fl. atl. I. 184. 52. Sicilia, Hispania.
Nintooa canescens Webb. (ubinam?)

B. *Xylosteum*; (Bractae parvae; Baccae liberae aut basi adhaerentes.)

19. § *arborea* Boiss. elench. pl. hisp. 96. voy. a. le mid. d'Esp. I, t. 82. Hispania.
Xylosteum arboreum Bark. W. it. hisp. 42.
- * 20. § *Xylosteum* L. cod. Nro. 1377. Gu. et H. Abb. deutsch. Holzart. t. 9. Europa, Oriens,
rubra Gillb. fl. lith. I, 6. Sibiria australis.
Caprifolium dumetorum Lam. fl. franc. III, 367.
Chamaecerasus *Xylosteum* Medik. philos. Bot. I, 126.
Xylosteum dumetorum Moench meth. 502.
- vulgare Roehl. Deutschl. Fl. II, 176.
β) *cotinifolia* C. A. Mey. Beitr. z. Pflanzenk. Russl. V, 51.
γ) fructu albo, flavo et nigro Nouv. Duh. I, 52. et Loud.
arb. et frut. br. II, 1055.
21. § *quadrifolia* Willd. sp. pl. I, 986. Patria ignota.
22. § *chrysantha* Turcz. in bull. de la soc. d. nat. de Mosc. XVIII, 304. Dahuria.

- * 23. 5 tatarica L. cod. Nro. 1376. Pall. fl. ross. t. 36. **Rossia media australis, Sibiria.**
 Chamaecerasus tatarica Med. phil. Bot. I, 126.
 Xylósteum cordatum Moench meth. 502.
 - tataricum Dum. Cours. bot. cult. ed. 2. IV, 335.
 β) albiflora; pyrenaica Willd. Berl. Baumz. 181.
 γ) angustifolia (nec angustata Hort.) Wend. in Schr. d. Ges. z. Befoerd. d. Nat. W. z. Marb. II, 247.
 δ) foliis latis; latifolia Lodd. cat.
 ε) flore lutea et rubro; lutea et grandiflora Lodd. cat. (sibirica Hort.).
 ζ) xylosteoides Tausch in Flora XXI, 736.
- * 24. 5 pyrenaica L. cod. Nro. 1378. nouv. Duh. I, t. 15. **Pyrenaeus.**
 Caprifolium pyrenaicum Lam. fl. frang. III, 366.
 Xylósteum pyrenaicum Dum. Cours. bot. cult. 2. ed. IV, 337. **Canada.**
25. 5 punicea Sims in bot. mag. t. 2469. **Canada.**
 Symphoricarpos puniceus Sweet in Loud. arb. et frut. brit. II, 1054.
 Xylósteum puniceum Raf. new fl. a. bot. of N. Amer. III, 21.
26. 5 humilis Kar. et Kir. in bull. de la soc. d. nat. de Mosc. XV, 396. **Sibiria altaica.**
 27. 5 nummulariaefolia J. et Sp. ill. pl. orient. I, 133. t. 70. **Asia minor, Syria.**
 28. 5 persica J. et Sp. ill. pl. orient. I, 132. t. 69. **Persia australis, Tataria.**
 turcomanica F. et M. in bull. de la soc. d. nat. de Mosc. XII, 149.
29. 5 Chamissoi Kir. Lonic. d. russ. R. 26. **Sibiria orient. Camtschatca, ins. curilenses.**
 nigra Led. fl. ross. II, 389.
 Xylósteum var. baccis nigris Pall. fl. ross. I, 56.
- * 30. 5 nigra L. cod. Nro. 1375. Jacq. fl. austr. t. 314. Gu. et H. **Italia, Alpes, Silesia.**
 Abbild. deutsch. Holzart. t. 8.
 Caprifolium roseum Lam. fl. frang. III, 368.
 Chamaecerasus nigra Medik. philos. Bot. I, 126.
 Xylósteum nigrum Mill. dict. et Dum. Cours. bot. cult. 2. ed. IV, 335.
 β) campaniflora (campanulata Hort.) Lodd. bot. cat. t. 1361 (sub Xylósteo).
- * 31. 5 flexuosa Thunb. in transact. of the Linn. soc. II, 330. **Japonia.**
 brachypoda DC. prodr. IV, 335 (in hortis nonn. Caprifolii species dicitur?).
 nigra Thunb. fl. jap. 89.
- * 32. 5 ciliata Muehlenb. cat. pl. amer. sept. 22. Torr. fl. of N.-Y. t. 42. **America brit. orientalis et foeder. borealis.**
 canadensis R. et S. syst. veget. V, 260.
 Xylósteum ciliatum Pursh fl. amer. sept. I, 161.
 - tataricum Mich. fl. bor. Amer. I, 166.
 β) alba Pursh fl. Am. sept. I, 161.
 ? Vaccinium album L. cod. Nro. 2703.
33. 5 asperifolia Dne in Jacq. voy. d. l'Inde IV, 77. t. 85 (s. Xylósteo). **Himalaya.**
 affinis Jacquem. voy. d. l'Inde IV, 77.
34. 5 spinosa Jacquem. voy. d. l'Inde IV, 78. **Himalaya.**
 Xylósteum spinosum Dne in Jacquem. voy. d. l'Inde IV, 78. t. 86.
- * 35. 5 purpurascens Walp. rept. bot. syst. II, 449. **Himalaya.**
 Xylósteum purpurascens Dne in Jacquem. voy. d. l'Inde IV, 79. t. 87.
 B. Cuphántha (Bract. magnae; Bacc. liberae aut basi cohaer.).
36. 5 gibbosa Willd. in R. et S. syst. veg. V, 257. **Mexico.**
 Xylósteum mexicanum H. B. et K. nov. gen. et sp. amer. III, 426. t. 297.
37. 5 Mociniana DC. prodr. IV, 336. **Mexico.**
38. 5 involucreta Banks in Spr. syst. veget. I, 759. bot. reg. t. 1179. **America borealis.**
 Distegia nutans Raf. new fl. a. bot. of N. Amer. III, 21.
 Xylósteum involucretum Richards. in Frankl. Journ. I. ed. app. 6.
- * 39. 5 Ledebourii Eschsch. in mém. de l'ac. de Pétr. X, 284. Reg. Gart. Fl. II, t. 64. **California.**
- * 40. 5 hispida Pall. in R. et S. syst. V, 258. Led. ic. pl. fl. ross. t. 212. **Sibiria altaica.**
 ? alpigena Schang. in Pall. nord. Beitr. VI, 93.
41. 5 Karelini Bge in Kir. Lonic. d. russ. R. 33. **Sibiria altaica.**
 nigra Kar. et Kir. in bull. de la soc. d. nat. de Mosc. XV, 371.
 sibirica Vest in Schult. syst. veget. V, 259 (teste Kirill.).
 alpigena β. sibirica DC. prodr. IV, 336.
 C. Isica (Baccae ad medium aut omnino connatae).
42. 5 oblongifolia Hook. fl. bor. amer. I, 284. t. 100. **America borealis brit. et foeder. borealis.**
 Xylósteum oblongifolium Gold. in Edinb. phil. Journ. VI, 232.
- * 43. 5 coerúlea L. cod. Nro. 1390. bot. mag. t. 1975. **Europa media, Sibiria, America britannica et foederata borealis.**
 altaica Pall. fl. ross. t. 37 (fig. infer.).
 Caprifolium coeruleum Lam. fl. frang. III, 366.
 Isica (nec Iskia) coerulea Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1043.

Xylosteum canadense Duh. traité d. arbr. et arb. II, 373.

- *coeruleum* Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. IV, 336.

- *Solonis* Eat. man. of bot. for N. Amer. 518.

- *villosum* Mich. fl. bor. amer. I, 106.

β) *Baccae globosae, glabrae; coeruleae*, DC. prodr. IV, 337.

altaica Pall. fl. ross. t. 36 (fig. sup.).

pyrenaica Pall. Reis. d. versch. Statth. d. russ. R. II, 568.

Pallasii Led. fl. atl. I, 247. ic. pl. fl. ross. ill. t. 131.

γ) *Baccae globosae, circa umbilicum ciliatae; velutina* DC. prodr. IV, 337.

δ) - *oblongo-ovatae, dulces; dulcis* Turcz. in Led. fl. ross. II, 390 (*edulis* Hort.)

* 44. 5 *Bungeana* Led. fl. ross. II, 391.

Siberia altaica.

microphylla DC. prodr. IV, 336. Willd. in R. et S. syst. veg. V, 256 (teste Kirill.).

- β. *gracilior* Led. fl. atl. I, 249. ic. pl. fl. ross. ill. t. 213. f. 2 et 6.

* 45. 5 *microphylla* Led. fl. ross. II, 391 (nec Willd.).

Siberia altaica.

Sieversiana Bgein mém. d. sav. étrang. de l'ac. de Pétersb. II, 534.

microphylla α. *robustior* Led. fl. atl. I, 249. ic. pl. fl. ross. illustr. t. 213. f. 1. et a.

* 46. 5 *alpigena* L. cod. Nro. 1379. f. austr. t. 274.

Europa, Siberia,

Caprifolium alpigenum Gaertn. de fr. et sem. I, 136.

insulae Americae

- *alpinum* Lam. fl. franc. III, 367.

arcticae.

Chamaecerasus alpigena Medik. philos. Bot. I, 126.

Isica (nec *Iskia* Bechst.) *alpigena* Borkh. Handb. d. Forstbot. u. Forsttechn. II, 1042.

- *lucida* Moench meth. 504.

Xylosteum alpinum (*alpinum* Lodd.) Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. IV, 336.

* 47. 5 *discolor* Lindl. in bot. reg. XXXIII, t. 44.

India orientalis.

48. 5 *Webbiana* Wall. in DC. prodr. IV, 336.

India orient., Himalaya.

49. 5 *Govaniana* Wall. in DC. prodr. IV, 337.

India orient., Himalaya.

50. 5 *angustifolia* Wall. in journ. of the hort. soc. III, 138. c. ic.

India orient., Himalaya.

51. 5 *bracteata* Royle ill. of the him. mount. 237. t. 33. f. 2.

Himalaya.

* 52. 5 *orientalis* Lam. enc. méth. I, 731. J. et Sp. ill. pl. or. t. 71.

Armenia, Transcauc.

* 53. 5 *caucasica* Pall. fl. ross. I, 59. J. et Sp. ill. pl. or. t. 72.

Isthmus caucasicus.

orientalis Bieb. fl. taur. cauc. III, 396.

β) *hortensis* Kze in ind. sem. hort. Lips. 1847.

D. *Chlamydocarpus* (*Baccae involucri campaniformi arcte inclusae*).

54. 5 *Auchéri* J. et Sp. illustr. pl. orient. 135. t. 73.

55. 5 *hypoleuca* Dne in Jacq. voy. aux Ind. orient. IV, 81. t. 89.

Himalaya.

* 56. 5 *iberica* Bieb. fl. taur. cauc. I, 158.

Isthmus caucasicus,

Xylosteum ibericum Fisch. catal. hort. Gorenk. a. 1812. p. 44.

Armenia, Pontus.

57. 5 *chlamydophora* C. Koch in Linn. XXIV, 478.

Asia minor, Pontus.

Not. In horto dendrologico nostro species dubiae coluntur sequentes: 1) *diantha*; 2) *macrophylla*; in aliis hortis autem: 3) *camtschatica*; 4) *hybrida*; 5) *hybrida nova*; 6) *jaspidea*; 7) *melanocarpa*; 8) *multiflora*; 9) *rotundifolia* Gmel. hort. Carlsruh. 162.; 10) *speciosa* Wender. in ind. sem. hort. Marburg. 1825; 11) *vaccinifolia*. — Quae L. *sericea* Royle ill. of the him. mount. 236?, L. *ovata* Wall. num. list. Nr. 6300 et *Finlaysoniana* Wall. num. list. Nro. 6302?

III. *Symphoricarpos* (*Symphoria* Pers.) Juss.

(συμφορπιον, accumulare, aufhaeuften et ζαπρος, fructus, Frucht.)

* 1. 5 *orbiculatus* Moench meth. Dill. hort. Eltham. t. 278. f. 360. *America foederata*.

conglomeratus Pers. syn. pl. I, 214 (*glomeratus* Pursh fl. Am. sept. I, 162.).

parviflorus Desf. tabl. de l'éc. de bot. 114.

vulgaris Mich. fl. bor. amer. I, 106.

Lonicera Symphoricarpos L. cod. Nro. 1381.

β) *fol. variegatis*.

γ) *fructu rubro; erythrocarpus* Hort.

2. 5 *imberbis* Tausch in Flora XXI, 734.

Hortorum filia.

3. 5 *occidentalis* R. Br. in Richards. app. to Frankl. journ. ed. 2. 6. *America bor.-occid.*

4. 5 *mollis* Nutt. in Torr. et Gr. fl. of N. Amer. II, 4.

California.

5. 5 *rotundifolius* A. Gr. pl. Wright. Tex. Neo-Mex. II, 66.

Nova-Mexico.

6. 5 *ciliatus* Nutt. in Torr. et Gr. fl. of N. Am. II, 4.

California.

7. 5 *spicata* Engelm. in Bost. journ. of nat. hist. VI, 215. adn.

Texas.

* 8. 5 *racemosus* Mich. fl. bor. amer. I, 107. bot. mag. t. 2211.

America britannica

alba Raf. new fl. of bot. of N. Amer. III, 21.

et foederata borealis.

Lonicera racemosa Aut.

β) *Baccis crebris congestis; leuocarpus* Hort.

γ) *Foliis variegatis*.

δ) *heterophylla* Raf. new fl. a. bot. of N. Amer. III, 21.

- * 9. 5 *montanus* H. B. et K. nov. gen. et sp. amer. III, 425. t. 295. Mexico.
Symphoria mexicana Lodd. in bot. cab. (ubinam?)
- 10. 5 *microphyllus* H. B. et K. nov. gen. et sp. amer. IH, 424. Mexico.
Anisanthus microphyllus Willd. in Schult. syst. veget. V, 223.
- 11. 5 *glaucescens* H. B. et K. nov. gen. et sp. amer. III, 424. t. 295. Mexico.
Not. Qui sunt 1) *S. gracilis* et 2) *Pollucensis* in horto nostro dendrologico culta?

IV. *Diervilla* L.

(Dierville in Normannia natus, chirurgus, sed teste Halleri, negociator, a. 1700 in American borealem permigravit, fruticem *D. trifidae* in Gallia introduxit.)

- * 1. 5 *trifida* Moench meth. 492. America britannica et foederata borealis mediaeque; ? Scotia (teste Gard. chron.)
Acadiensis (nec Arkadiensis) Duh. hist. d. arbr. et arb. I, t. 87.
canadensis Willd. enum. pl. hort. Berol. I, 122.
humilis Pers. syn. pl. I, 214.
Lonicera Mill. dict.
lutea Pursh fl. Amer. sept. I, 162.
Tournefortii Mich. fl. bor. amer. I, 107.
Lonicera *Diervilla* L. cod. Nro. 1382.
β) *longifolia* Raf. new fl. a. bot. of N. Amer. III, 21.
γ) *parvifolia* Raf. new fl. a. bot. of N. Amer. III, 22.
- * 2. 5 *sessilifolia* Buckl. in Sill. amer. journ. VII, 406. Linn. XX, 25. America foederata (Carolina).
trifida β. Torr. et Gr. fl. of N. Amer. II, 11.
- 3. 5 *splendens* (Weigela) Hort. in fl. d. serr. VIII, 292. Patria ignota.

V. *Weigela* (*Weigelia* Pers. Lindl.) Thunb.

(Christ. a Weigel, chem. et pharm. professor Gryphiswaldae, † 1831.)

- 1. 5 *hortensis* S. et Z. fl. japon. I, 70. t. 29 (sub *Diervilla*). Japonia.
β) *albiflora* S. et Z. fl. japon. I, 70. t. 30.
- 2. 5 *grandiflora* S. et Z. fl. japon. I, 71. t. 31 (sub *Diervilla*). Japonia.
coraeensis (*coracensis*) Thunb. in transact. of the Linn. soc. II, 331.
Diervilla coraeensis DC. prodr. V, 330.
- * 3. 5 *japonica* Thunb. fl. jap. 90. t. 16. Japonia.
rosea Lindl. in journ. of the hort. soc. I, 65. adn. t. 6. fl. d. serr. III, t. 211.
Diervilla japonica DC. prodr. IV, 330.
- *versicolor* S. et Z. fl. japon. I, 76. t. 33.
- *rosea* Walp. in ann. botan. system. I, 365.
- 4. 5 *floribunda* S. et Z. fl. jap. 73. t. 32 (sub *Diervilla*). Japonia.
- 5. 5 *florida* DC. in ann. d. sc. nat. 2. sér. XI, 241. China borealis.
Calysphyrum floridum Bge in mém. d. sav. étr. de St. Pétersb. II, 107.
Diervilla florida S. et Z. fl. japon. I, 75.
- 6. 5 *pauciflora* DC. in ann. d. sc. nat. 2. sér. XI, 241. China.
Calysphyrum pauciflorum Bge in Waip. repert. bot. syst. II, 450.
- * 7. 5 *amabilis* van H. fl. d. serr. VIII, t. 855. Japonia.
Diervilla amabilis Carr. in rev. hortie. et in fl. d. serr. VIII, 289.
- * 8. 5 *Middendorffiana* (sub *Diervilla*) Carr. in fl. d. serr. VIII, 289. Sibiria austr., Mongolia.

VI. *Abelia* R. Br.

(Clerk Abel medicus legatum Angliae a. 1816 in Chinam comitatus, † Calcuttae 1826.)

- * 1. 5 *uniflora* R. Br. in Wall. pl. rar. asiat. I, 15. mag. t. 4794. China.
- 2. 5 *chinensis* R. Br. in Ab. narr. of a journ. in the inter. of China 377. c. ic. China.
- 3. 5 *biflora* Turcz. in bull. de la soc. d. nat. de Mosc. XI, 152. China borealis.
- 4. 5 *serrata* S. et Z. fl. japon. I, 76. t. 34. Japonia.
- 5. 5 *spathulata* S. et Z. fl. japon. I, 77. t. 34. Japonia.
- * 6. 5 *rupestris* Lindl. in journ. of the hort. soc. I, 63. bot. reg. 1846. t. 8. India orientalis.
- * 7. 5 *triflora* R. Br. in Wall. pl. asiat. rar. I, 14. t. 15. Himalayae montes.
- * 8. 5 *floribunda* Dne in fl. d. serr. II, t. 4. bot. mag. t. 4316. Mexico.
Vesalia floribunda Mart. et Gal. in bull. de l'ac. de Brux. XI, 242.
- 9. 5 *hirsuta* Walp. repert. bot. system. VI, 3. Mexico.
Vesalea hirsuta Mart. et Gal. in bull. de l'ac. de Brux. XI, 242.

VII. *Linnæa* Gron.

(Car. ab Linné in villa Smalandiae Rashult natus 1707, † 1778.)

- * 1. ♀ *borealis* L. cod. Nro. 4581. Sturm Deutschl. Fl. Heft 17. Europa bor. et media.
β) *australis* Hofmeist. in Flora VI, Intell. Bl. 30.

VIII. *Leycesteria* Wall. (nec *Leycesteria* Walp.)

(Leycester, summi tribunalis in Bengalia longo tempore praeses et Roxburghii fautor.)

- * 1. 5 formosa Wall. in Roxb. fl. ind. II, 182. bot. mag. t. 3699. Nepal, Himalaya.
- 2. 5 quinquelocularis Hardw. in asiat. res. VI, 351. Roxb. fl. ind. India orientalis.
II, 174 (sub Lonic.).

Trib. 2. *Sambuceae* (Corolla rotata aut vix tubulosa; Stylus nullus).IX. *Sambucus* L.(origine dubia, vox jam a Latinis ad significationem *S. nigri* adhibita.)

- 1. \bar{h} adnata Wall. numer. list. Nro. 482. Nepal, Cashmiria.
 - * 2. \bar{h} canadensis L. cod. Nro. 2143. Schm. oestr. Baumz. t. II, 142. America borealis.
 - β) hirta Tausch in Flora XXI, 737.
 - γ) lucida Tausch in Flora XXI, 737.
 - * 3. 5 nigra L. cod. Nro. 2144. fl. dan. t. 545. Europa, Oriens borealis,
arborescens Gilib. exerc. phytol. I, 5. montes uralenses,
medullosa Gilib. fl. lith. I, 2. Himalaya, Japonia.
vulgaris Lam. fl. franç. III, 369.
 - β) elegans et floribunda Hort.
 - * γ) flore pleno.
 - * δ) foliis argenteo et aureo-variegatis.
 - ϵ) - aureo-punctatis.
 - ζ) - maculatis.
 - η) - pubescentibus et hirtis; pubescens et hirta Hort.
 - * θ) - pulverulentis; pulverulenta Hort.
 - * ι) - linearibus et rotundioribus; linearis Hort.
rotundifolia Sweet hort. brit. 3. ed. 313.
 - * κ) - heteromorphis et laciniatis; heterophylla Hort. et laciniata Mill. dict.
 - * λ) fructu albo et virescente; albida (leucocarpa) Hort. et virescens Desf.
 - * μ) hybrida Jac. in Sweet hort. brit. 3. edit. 313.
 - * ν) monstrosa Hort. in Sweet hort. brit. 3. edit. 313 et Don dichl. pl. III, 437.
 - * ξ) semperflorens Hort.
 - * 4. 5 racemosa L. cod. Nro. 2145. Jacq. ic. pl. rar. t. 59. Europa media et austr.,
Oriens, Sibiria.
 - β) foliis variegatis.
 - γ) fructu luteo.
 - * δ) laciniata Koch in DC. fl. franç. suppl. 500.
 - 5. 5 glauca Nutt. in T. and Gr. fl. of N. Amer. II, 13. Amer. foed. occid.
 - β) foliis anguste lanceolatis A. Gr. pl. Wright. Tex. Neo-Mex. II, 66.
 - 6. 5 mexicana Presl in DC. prodr. IV, 322. Mexico, Neo-Mexico.
 - bipinnata Ch. et Schl. (testo Steud., ubinam?)
 - * 7. 5 pubens (pubescens Pers.) Mich. fl. bor. amer. I, 181. America borealis
sup. et media.
 - racemosa Hook. fl. bor. amer. I, 279.
 - β) arborescens Nutt. in T. and Gr. fl. of N. Amer. II, 13.
 - γ) heptaphylla G. Don dichlam. pl. III, 438.
 - δ) leucocarpa T. and Gr. fl. of N. Amer. II, 13.
 - 8. 5 Loureiroana DC. prodr. IV, 323. China.
 - nigra Lour. fl. cochinch. 226.
 - 9. 5 Thunbergii G. Don dichl. pl. III, 438.
 - canadensis Thunb. fl. japon. 126.
 - 10. 5 ebuloides Desv. in DC. prodr. IV, 323. China (Canton).
 - Phyteuma bipinnata Lour. fl. cochinch. 172.
- Quae *Sambucus* coerulea Raf. new fl. a. bot. of N. Amer. 95?

X. *Viburnum* L.

(a Latinis jam usurpatum et a voce „viere“, i. e. nectere, flechten, derivandum dicitur.)

A. Lentago (Flores omnes fertiles, rotati).

a) *Folia integra, serrata, dentata aut crenata, decidua.*

- * 1. 5 Lantana L. cod. Nro. 2133. Jacq. fl. austr. t. 341. Europa, Oriens.
tomentosum Lam. fl. franç. III, 363.
- * β) foliis argenteo- et aureo-variegatis.
- γ) - aureo-marginatis.
- ρ) - crispis.

- * 2. 5 *lantanoïdes* Mich. fl. bor. amer. I, 176. bot. cab. t. 1570. America britannica et
grandifolium Sm. in Rees cyclop. foederata borealis
Lantana β . *canadensis* Pers. syn. pl. I, 327. et media.
- β . *grandifolium* (neo *grandiflorum* in edit. 2.) Ait. hort. Kew. I, 392.
3. 5 *ellipticum* Hook. fl. bor. amer. I, 280. America occid. bor.
- * 4. 5 *pubescens* Pursh fl. amer. sept. I, 202. Torr. fl. of N.-Y. t. 43. America brit. et foed.
dentatum β . *pubescens* Ait. hort. Kew. I, 168. (Jacq. hort. Vindob. I, t. 36. teste Tausch).
Rafinesqueanum Schult. in R. et S. syst. veget. VI, 630.
semi-tomentosum Mich. fl. bor. amer. I, 179.
tomentosum Rafin. med. repos. XI, 360.
villosum Rafin. in Dsv. journ. I, 228 (teste G. Don).
- * 5. 5 *dentatum* L. cod. Nro. 2132. Traw et Ehr. pl. sel. t. 87. America foederata,
Mexico.
 β) *longifolium* et *acuminatum* Lodd. cat.
 γ) *montanum* Lodd. catal.
 δ) *scabrellum*; *dentatum* Mich. fl. bor. amer. I, 179.
 ϵ) *variegatum*.
6. 5 *Lentago* L. cod. Nro. 2136. Schm. oesterr. Baumz. t. 178. America borealis.
- * 7. 5 *nudum* L. cod. Nro. 2130. bot. mag. t. 2281. America borealis.
 β) *angustifolium*; *nitidum* Ait. hort. Kew. I, 371.
oleaeifolium Tausch in Flora XXI, 733.
 γ) *cassinoides* L. cod. Nro. 2137.
pyrifolium Pursh fl. amer. sept. I, 201.
squamatum Willd. enum. pl. hort. Berol. I, 337. Wats. dendr. brit. t. 24.
 δ) *purpureum* Hort. (an fr. atro-coerulei?).
- * 8. 5 *prunifolium* L. cod. Nro. 2131. Gu. et H. Abb. fr. Holz. t. 101. America borealis.
Lentago Dur. Harbk. Baumz. 485.
pyrifolium Poir. enc. méth. V, 658.
 β) *ferrugineum* Torr. et Gr. fl. of N. Amer. II, 14.
 γ) *variegatum* Hort.
- * 9. *obovatum* Walt. fl. carol. 116. bot. cab. t. 1476. America foederata.
carolinianum Hort. angl.
cassinoides Dur. Harbsch. Baumz. II, 486.
laevigatum Ait. hort. Kew. I, 371.
lanceolatum Hill hort. Kew. 456. t. 19.
Cassine caroliniana Lam. enc. méth. I, 163 (teste R. et S.).
- *corymbosa* Mill. illustr. genr. t. 83. f. 1.
- *Peragua* L. cod. Nro. 2139.
 β) *punicifolium* Dsf. hist. d. arbr. et arbriss. I, 345.
- * 10. 5 *chinense* Hook. et Arn. in bot. of Beech. voy. 190. China.
- * 11. 5 *punctatum* Ham. in Don prodr. fl. nepal. 142. Nepal.
12. 5 *cordifolium* Wall. num. list. Nro. 462. DC. prodr. IV, 327. Nepal.
13. 5 *involveratum* Wall. num. list. Nro. 458. DC. prodr. IV, 327. Nepal.
14. 5 *stellulatum* Wall. num. list. Nro. 463. pl. as. rar. II, t. 169. Nepal.
15. 5 *Mullaha* Ham. in Don prodr. fl. nepal. 141. Nepal.
16. 5 *nervosum* Don prodr. fl. nepal. 141. Nepal.
- * 17. 5 *cotinifolium* Don prodr. fl. nepal. 141. bot. reg. t. 1650. Nepal.
- * 18. 5 *macrocephalum* Fort. in bot. reg. 1847. t. 43. fl. d. serr. t. 263. 264. China (Tschusan).
19. 5 *erosum* Thunb. fl. japon. 124. Japonia.
20. 5 *dilatatum* Thunb. fl. japon. 124. Japonia.
21. 5 *phlebótrichum* S. et Z. in Abh. d. math. phys. Kl. d. baier. Ac. IV, 3. 173. Japonia.

b) *Folia subintegra, perennantia.*

22. 5 *sempervirens* C. Koch. China.
nervosum Hook. et Arn. bot. of Beech. voy. 190.
23. 5 *odoratissimum* H. et Arn. bot. of Beech. voy. 190. ? Ker
bot. reg. t. 456. China, Japonia.
- * 24. 5 *Tinus* L. cod. Nro. 2129. bot. mag. t. 38. Peninsula pyrenaica,
lauriforme Lam. fl. franç. III, 363. Gallia australis, Istria,
lucidum Mill. dict. et Pers syn. plant. I, 326. Africa borealis.
Laurus Tinus Hort.
Tinus laurifolius Borkh. in Roem. Arch. f. d. Bot. I, 2. 20.
 β) *latifolium* Hort.
 γ) *lucidum* Ait. hort. Kew. ed. 2. II, 266.
 δ) *strictum* Loud. arbor. brit. II, 1033.

- e) *virgatum* Ait. hort. Kew. II, 266.
 f) *variegatum* Hort.
- * 25. 5 *rugosum* Pers. syn. pl. I, 326. bot. mag. t. 2062. *Insulae canarienses,*
latifolium Hort. ? *Europa australis.*
rigidum Vent. jard. de la Malm. t. 89. Willd. enum. pl. hort. Berol. suppl. 14.
strictum Lk. enum. pl. hort. Berol. I, 288.
Tinus s. *strictum* Ait. hort. Kew. 2. edit. II, 167.
- c) *Folia trilobata, decidua.*
- * 26. 5 *orientale* Pall. fl. ross. I, t. 58. f. H. *Oriens.*
 27. 5 *pauciflorum* Pyl. in T. et Gr. fl. of N. Amer. II, 17. *America bor. - occid.*
 28. 5 *acerifolium* L. cod. Nro. 2134. Vent. jard. du Cels. t. 72. *Amer. angl. et foed. bor.*
- B. *Opúlus* (Flores cymae externi steriles, radiantes; Corolla rotata).
- * 29. 5 *Opulus* L. cod. Nro. 2135. Sturm Deutschl. Fl. Heft 27. *Europa, Oriens,*
lobatum Lam. fl. franç. III, 363. *Sibiria, ? Chile (s. dub.*
Opulus glandulosa Moench meth. 505. *allata).*
 - *vulgaris* Borkh. teste Steud. (ubinam?)
 β) *foliis aureo- et argenteo-variegatis.*
 γ) - *punctatis.*
 δ) *fructu luteo.*
 ε) *nanum.*
 ζ) *rigidum.*
 η) *sterile; roseum (rosaceum Hort.)* L. cod. Nro. 2135 β. et *grandiflorum* Hort.
- * 30. 5 *euspidatum* Thunb. fl. jap. 125. *Japonia.*
 31. 5 *tomentosum* Thunb. fl. jap. 123. S. et Z. fl. jap. t. 38. *Japonia.*
 β) *sterile; plicatum* Thunb. in *transact. of the Linn. soc. II, 332.*
dentatum Thunb. fl. jap. 122.
32. 5 *molle* Mich. fl. bor. amer. I, 180. *America foed. borealis*
alnifolium Marsh. arb. amer. 162. *et media.*
- * 33. 5 *Oxycoccus* Pursh fl. amer. sept. I, 203. *America britannica et*
americanum Mill. dict. *foederata borealis.*
opuloídes Muehlb. cat. pl. amer. sept. 32.
Opulus americana Ait. hort. Kew. I, 373.
 - *Pimina* Mich. fl. bor. amer. I, 180.
trilobum Marsh. arb. amer. 162.
 β) *édule* Pursh fl. amer. sept. I, 203.
 γ) *subintegrifolium* Hook. fl. bor. amer. I, 281.
- C. *Solenotinus* (Flores omnes fertiles; Corolla urceolata aut tubulosa).
34. 5 *urceolatum* S. et Z. Abh. d. math. ph. Kl. d. baier. Acad.
 d. Wiss. IV, 3, 172. *Japonia.*
 35. 5 *erubescens* Wall. num. list. Nro. 459. pl. rar. asiat. II, 29, t. 134. *Nepal.*
 36. 5 *grandiflorum* Wall. num. list. Nro. 464. DC. prodr. IV, 329. *Nepal.*
 * 37. 5 *cylindricum* Ham. in Dou prodr. fl. nep. 142. *Nepal.*
 38. 5 *polycarpum* Wall num. list. Nro. 455. *Nepal.*
 39. 5 *foetens* Dne in Jacquem. voy. dans l'Ind. IV, 75, t. 84. *Caschmiria.*
 40. 5 *fragrans* Bge in mém. d. sav. étr. de St. Pétersb. II, 107. *China borealis.*
 41. 5 *dahuricum* Pall. fl. ross. II, 30, t. 38. *Sibiria orientali-*
sibiricum Hort. *australis.*
Lonicéra dahurica Siev. in Pall. n. nord. Beitr. VII, 196.
 - *mongolica* Pall. fl. ross. I, 59.

Fam. 96. Rubiaceae.

Trib. 1. Cinchonaceae (Capsula; Semina alata aut caudata, in loculis plura).

XI. Nauclea L.

(naucula, navicula, Schiffchen, ob olinanthii formam.)

1. ♂ *orientalis* Lam. illustr. d. genr. t. 153. f. 1. Rumph. herb. *India orientalis*
 amboin. III, t. 55. f. 1. *cum insulis, China.*
 2. ♂ *racemosa* S. et Z. in Abh. d. math. phys. KJ. IV, 3, 176. *Japonia.*

XII. Adina Salisb.

(δένος, densus, dicht, ob flores capitatos.)

1. 5 globiflora Salisb. parad. Londin. t. 115. China.
 Nauclea Adina Sm. in Rees cyclop. XXIV. bot. reg. t. 895. bot. mag. t. 2613.
 2. 5 peduncularis DC. prodr. IV, 349. China.
 Nauclea adinoïdes Lindl. in bot. reg. ad tab. 895.

XIII. Uncaria Schreb.

(uncus, Hacken, ob pedunculos inferiores serius uncinatos.)

1. § Uncaria pilosa Wall. in Roxb. fl. ind. II, 130. et pl. rar. Nepal, India orientalis, asiat. II, t. 170. Java.
 ? Nauclea pilosa Blume bijdr. 1013.
 - scandens Sm. in Rees cycl. (teste Wall.)

XIV. Luculia Sweet.

(Luculi-swa, nomen apud Nepalenses.)

- * 1. 55 gratissima Sweet in brit. fl. gard. II, t. 145. bot. mag. t. 3946. India orientalis, Nepal.
 Cinchona gratissima Wall. in Roxb. fl. ind. II, 154. Roxb. tent. fl. nep. I, t. 21.
 Mussaenda Luculia Ham. in Don prodr. fl. nepal. 139.
 * 2. 5 Pinciana Hook. in bot. mag. t. 4132; fl. d. serr. I, t. 63. Nepal.

XV. Pinckneya (nec Pinkneya) Mich.

(origine incerta; an a Pinckneyo quodam, cive americano de botanice merito?)

1. § pubens (pubescens Pers.) Mich. fl. bor. am. I, 103. t. 13. Georgia, Carolina.
 Cinchona caroliniana Poir. in enc. méth. VI, 40.

XVI. Thysanosperrum Benth.

(θυσανος, fimbriae, Franzen et στεμμα, semen, Samen.)

1. 5 diffusum Champ. in journ. of bot. a. Kew. g. misc. IV, 168. China (Hongkong).

XVII. Exostemma DC.

(εξ αυτ εξ, extra, ausserhalb et στεμμα, corona, Kranz, rectius Exostémon, a v. στεμμα, stamen, Staubgefaess, ob stamina exserta.)

1. 5 caribaeum R. et S. syst. v. get. V, 18. bot. rep. t. 481. Mexico, India occident.
 Cinchona jamaicensis Wright in phil. transact. LXVII, 504. t. 10. Florida.

Trib. 2. Hedyotideae (Capsula; Semina aptera et ecaudata, in oculis plura).

XVIII. Wendlandia Bartl.

(Joh. Christ. Wendland, horti Herrenhusiensis praefectus, iconum Ericarum autor bene meritus, † 1828.)

1. § exserta DC. prodr. IV, 411. India orientalis, Nepal.
 Rondeletia exserta Roxb. fl. ind. II, 135.
 - ? Heynei R. et S. syst. veget. V, 235.
 - Oryssensis Roth nov. pl. sp. praes. Ind. orient. 142.
 - proxima Wall. in Don prodr. fl. nepal. 139.
 - ? thyrsoïflora Roth nov. pl. sp. praes. Ind. orient. 141.
 2. § cinerea DC. prodr. IV, 412. Nepal.
 Rondeletia cinerea Wall. in Roxb. fl. ind. II, 141.
 3. § coriacea DC. prodr. IV, 412. Nepal.
 Rondeletia coriacea Wall. in Roxb. fl. ind. II, 142.
 4. § puberula DC. prodr. IV, 412. Nepal.
 5. 5 Kotschyi Boiss. et Hoh. diagn. pl. orient. III, 55. Kurdistan.
 6. 5 pëndula DC. prodr. IV, 412. Nepal.
 Rondeletia pëndula Wall. in Roxb. fl. ind. II, 140.

XIX. Adenosacme Wall.

(δένος, glandula, Druese et άκμη, apex, Spitze, ob calycis laciniis apice glanduliferas.)

1. 55 longifolia Wall. in num. list. Nro. 6280. India orientalis, Nepal.
 Rondeletia longifolia Wall. in Roxb. fl. ind. ed. 1824. II, 138.
 Wendlandia longifolia DC. prodr. IV, 412.
 2. 5 nepalensis Wall. numer. list. Nro. 6281. Nepal.

XX. *Hedyotis* L.

(ἡδύς, dulcis, suess et ὄσος, auris, Ohr, ob formam foliorum, ut dicitur.)

1. *h* uncinella Hook. et Arn. in bot. of Beech. voy. 192. China, India orientalis.
? cephalophora R. Br. in Wall. num. list. Nro. 842.
2. *§* recurva Benth. in Lond. journ. of bot. I, 486. China (Hongkong).
3. *h* acutangula Champ. in journ. of bot. a. Kew gd. misc. IV, 171. China (Hongkong).
? Lawsoniae Benth. in Lond. journ. of bot. I, 496.

Trib. 3. Gardeniaceae (Fructus carnosus, 2-ocularis, loculis plispermis; Stigma indivisum, aut 2-lobum).

XXI. *Gardenia* L.

(Alex. Garden in urbe caroliniana Charlestown medicus, cum naturae scrutatoribus Linné et Ellis per literas collocutus.)

- * 1. 5 florida L. cod. Nro. 1709. bot. reg. t. 449. China, ? Japonia, India orientalis.
jasminoides Sol. in Edinb. philos. transact. LII, t. 20.
Jasminum capense Mill. dict. et fig. t. 180.
- * β) flore pleno; jasminoides Ell. in philos. transact. LI, t. 23.
- * γ) angustifolia Lodd. in bot. cab. t. 512.
- * δ) Fortuneana Lindl. in bot. reg. XXXII, t. 43.
- * 2. *h* radicans Thunb. dissert. de Gard. t. I. f. I. bot. reg. t. 73. China (Hongkong).
Japonia.
3. 5 daphnoides Hance in Walp. ann. system. II, 796. Japonia.
4. 5 Maruba Sieb. in Blume bijdr. 1013. Japonia.
5. 5 pictorum Hask. in Flora XXVIII, 234. China.
6. 5 densa Wall. in Roxb. fl. ind. (ed. 1824) II, 559. Nepal.
7. 5 amoena Sims in bot. mag. t. 1904. ? India orientalis, China.
Genipa flava Lour. fl. cochinch. I, 184 (teste Spreng.).
8. 5 turgida Roxb. fl. ind. ed. 1820 II, 557; Wight ic. pl. II, t. 579. Nepal.
9. 5 ? volubilis Lour. fl. cochinch. I, 184. China (Canton).
10. 5 scandens Thunb. diss. de Gard. Nro. 9. t. 2. f. 2. China.
jasminoides Retz observ. bot. II, 14.

XXII. *Mussaenda* L.

(nomen ceylanicum *M. frondosae* L.)

1. 5 hispida Don prodr. fl. nep. 139. Nepal.
2. 5 pubescens Ait. hort. Kew. ed. 2. I, 372. bot. mag. t. 2099. China.
frondosa Lour. fl. cochinch. 186.
3. 5 erosa Champ. in journ. of the bot. a. Kew gd. misc. IV, 193. China (Hongkong).
- * 4. 5 macrophylla Wall. in Roxb. fl. ind. II, 228. bot. reg. n. ser. XIX, t. 24. Nepal.
5. *h* incana Wall. in Roxb. fl. ind. II, 229. Nepal.
6. 5 cuneifolia Don prodr. fl. nepal. 139. Nepal.
Luculia cuneifolia Don (teste Steud. nomencl. bot. ed. 2. II, 76.).
7. 5 chinensis Lour. fl. cochinch. I, 189. China (Canton).

XXIII. *Eyptianthéra* W. et Arn.

(ἔπιος, transversus, schrägliegend et anthera, Staubbeutel.)

1. 5 stricta W. et Arn. fl. penins. Ind. or. I, 399. India orientalis, Nepal.
Randia stricta Wall. in Roxb. fl. ind. ed. 1824, II, 140; ed. 1832, I, 526.
Rondeletia stricta Roth nov. sp. pl. praes. Ind. orient. 140.

XXIV. *Randia* Houst.

(Js. Rand, horti Chelseani a. 1722—1793 praefectus.)

1. 5 rigida DC. prodr. IV, 386. Nepal.
Posoqueria rigida Wall. in Roxb. fl. ind. ed. 1824, II, 570.
- * 2. 5 triflora Ham. in Don prodr. fl. nepal. 138. Nepal.
Gardenia esculenta Spreng. syst. veget. I, 762.
3. 5 dumetorum Lam ill. d. genr. t. 156. f. 4. India orientalis China.
spinosa Blume bijdr. 981.
Canthium coronatum Lam. enc. méth. I, 602.
Ceriscus malabaricus Gaertn. de fr. et sem. I, 140. t. 28. fig. 4.
Pluk. almag. t. 98. f. 6.
Gardenia dumetorum Retz observ. bot. II, 14. Roxb. pl. of the coast of Cor. t. 136.
- spinosa L. fl. suppl. 164. Thunb. diss. de Gard. Nro. 7. t. 2. f. 4.
Posoqueria dumetorum Roxb. fl. ind. II, 564.

4. ? *leucocarpa* Champ. in *journal of the bot. a. Kew. gd. misc. IV, 194.* China (Hongkong).
 5. ? *canthioides* Champ. in *journal of the bot. a. Kew. gd. misc. IV, 194.* China (Hongkong).
 6. 5 *chinensis* (sinensis) R. et S. *syst. veget. V, 248.* China (Canton).
 ? *longiflora* Lam. *illustr. d. genr. t. 156. f. 3.*
 Oxyceros sinensis Lour. *fl. cochinch. I, 187.*

XXV. Menestoria DC.

(*Menestor, rhizotomus tempore Theophrasti.*)

1. 5 *Tocoyenae* DC. *prodr. IV, 390.* Nepal.
 2. 5 *Hamelliae* DC. *prodr. IV, 390.* Nepal.
 3. 5 *Mussaendae* DC. *prodr. IV, 390.* Nepal.
 4. 5 *rigida* DC. *prodr. IV, 390.* Nepal.
 Gardenia rigida Ham. in *Don prodr. fl. nep. 138.*

XXVI. Cupia DC.

(*Malabari dicunt plantam hujus generis Cupi.*)

- * 1. 5 *corymbosa* DC. *prodr. IV, 394. Rheede hort. mal. II, t. 23.* India orientalis,
 Canthium corymbosum Pers. *syn. pl. I, 200. Roxb. fl. Ceylon, China.*
 ind. II, 533.
 Pavetta Wightiana Wall. *num. list. Nro. 6167.*
 Polydus maderaspatana DC. *prodr. IV, 395.*
 Rondeletia asiatica L. *cod. Nro. 1352. Pluk. almag. t. 171. f. 3.*
 Stylocoryne Webera Rich. in *mem. de la soc. d'hist. nat. de Par. V, 248.*
 Tareuna zeylanica Gaertn. *de sem. et fruct. I, 139. t. 28. DC. prodr. IV, 395.*
 Webera corymbosa Willd. *sp. pl. I, 1224. bot. reg. t. 126.*
 2. 5 *mollissima* Hook. et Arn. in *bot. of Beech. voy. 192.* China.
 Stylocoryne mollissima Walp. *repert. bot. syst. II, 517.*

Trib. 4. *Iserticae* (Fr. *polyspermus, drupaceus, 2—6 pyrenus aut exsuccus 2—4 coccus; Stigmata 4—6.*)

XXVII. Anthocéphalus A. Rich.

(*άνθος, flos, Blüthe et κεφαλή, caput, Kopf.*)

1. 5 *indicus* A. Rich. in *nouv. ann. de Mus. d'hist. nat. V, 237.* India orientalis,
 chinensis Walp. *repert. botan. syst. II, 491.* China.
 Cephalanthus chinensis Lam. in *enc. méth. I, 678.*
 Nauclea purpurea Roxb. *pl. of the coast. of Corom. I, 41. t. 54.*

Trib. 5. *Hamelieae* (Fr. *polysp. baccatus; Stigma 2—7 fid.*)

XXVIII. Hamelia (Duhamelia Pers.) Jacq.

(*Du Hamel du Monceau rerum maritimarum praeses francogallicus, operum gravissimum praecipue ad pomologiam et dendrologiam pertinentium autor, † 1782.*)

- * 1. 5 *patens* Jacq. *sel. stirp. amer. hist. 72. t. 50. Sm. ex. bot. t. 24.* Mexico Ind. occid.
 coccinea Swartz *n. gen. et sp. pl. Ind. occid. 46.* Florida.

Trib. 6. *Guettardaceae* (Fr. *drupaceus, 2—10 pyrenus, loculis 1, raro 2-spermis.*)

XXIX. Vangueria Commers.

(*Voa-Vanguer, nomen madagariense V. edulis Vahl.*)

1. 5 *spinosa* Roxb. *fl. ind. II, 172.* India orientalis, China.
 Meynia spinosa Lk in *Jahrb. d. Gew. K. I, 3. 32.*

XXX. Morinda Vaill.

(*i. e. Morus indica, indischer Maulbeerbaum.*)

1. 5 *umbellata* L. *cod. Nro. 1386. Rheede hort. mal. VII, t. 27.* India orientalis,
 Padavara Juss. in *enc. méth. suppl. IV, 5.* Ceylon, China.
 scandens Roxb. *fl. ind. ed. 1824 II, 202. ed. 1832 I, 548.*
 * 2. 5 *Roioe* L. *cod. Nro. 1388. Jacq. hort. Vindob. t. 16.* Ind. occid. Mex. Flor.

XXXI. Mephitida (nec Memphitidea Walp.) Reinw.

(Mephitis, dea vaporum perniciosorum, male olentium atque terra exhalantium, ob folia foedentia.)

1. 5 chinensis Champ. in journ. of bot. a. Kew gard. misc. IV, 196. China.

XXXII. Guettardella Champ.

(Joa. Steph. Guettard, academiae Parisiensis socius, de botanice bene meritus, † 1786.)

1. 5 chinensis Champ. in journ. of the Kew. gard. misc. IV, 196. China.

XXXIII. Erithalis P. Browne.

(επιθαλις apud Veteres planta sempervirens, sine dubio Sempervivi species.)

1. 5 fruticosa L. cod. Nro. 1393. P. Br. the hist. of Jam. t. 17. f. 3. India occid. Florida.
odorifera Jacq. sel. stirp. am. hist. 72. t. 173. f. 23.
β) inodora Jacq. sel. stirp. am. hist. 72. R. et S. syst. veg. V, 268.

XXXIV. Hamiltonia Roxb.

(Guil. Hamilton, in pago Woodlands prope Philadelphiam natus, de botanice americana bene meritus, a. 1825 prodromum plantarum Indiae occidentalis in lucem edidit.)

1. 5 scabra Don prodr. fl. nep. 137. Nepal.
azúrea Wall. in Roxb. fl. ind. II, 215.
Spermaryction azúreum Lindl. in bot. reg. t. 1235.
- scabrum Spreng. syst. veget. IV, 2. 73.
2. 5 suaveolens Wall. in Roxb. hort. Beng. 15. fl. ind. II, 223. India orientalis.
Lasianthus tubiflorus Blume bijdr. 990.
Spermaryction suaveolens Roxb. pl. of the coast of Corom. III, 72. t. 236.
3. 5 probrinqua Dne in Jacquem. voy. dans l'Inde IV, 83. t. 91. Himalaya.

XXXV. Leptodermis Wall.

(λεπτος, tenuis, duenn et δερμα; cutis, Haut.)

- * 1. 5 lanceolata Wall. in Roxb. fl. ind. II, 191. Jacquem. voy. IV, t. 90. Himalaya, Nepal.
Hamiltonia fruticosa Don prodr. fl. nepal. 137.
2. 5 oblonga Bge in mém. d. sav. étrang. de St. Pét. II, 108. China borealis.

Trib. 7. Paederieae (Fr. subsiccus, a dorso compressus; 2-coccus 1-sp.)**XXXVI. Paederia L.**

(a paedore totius plantae, quem redolet.)

- * 1. 5 foetida L. cod. Nro. 1703. Lam. ill. d. gener. t. 166. f. 1. India orientalis,
Apocynum foetidum Burm. fl. ind. II. Kaenapf. ic. sel. t. 9. ins. moluccanae,
? Gentiana scandens Lour. fl. coch. 213 (teste Poir.). Japonia, China.
? Crawfordia paniculata Gris. gen. et sp. Gent. 306.
- Loureirói Don dichl. pl. IV, 200.

Trib. 8. Coffeaceae (Fr. baccatus aut dupraceus, loc. 2 mono-, raro dispermis).**XXXVII. Polyósus Lour.**

(πολυς, multus, viel et οζος, ramus, Zweig; arbor ramosissima.)

1. 5 lanceolata Lour. fl. cochinch. I, 94. China (Canton).

XXXVIII. Canthium Lam.

(Canthi nomen malabaricum speciei hujus generis.)

1. 5 chinense Pers. syn. pl. I, 200. China (Macao).
Gardenia spinosa Thunb. diss. de gard. Nro. 7. t. 2. f. 4.
Randia spinosa Poir. enc. méth. II, 829.
2. 5 undulatum Champ. in journ. of the bot. a. Kew gd. misc. IV, 198. China (Hongkong).

XXXIX. Chiococcea P. Browne.

(χιον, nix, Schnee et κοκκος, coccus, hoc loco Beere, ob baccarum colorem.)

- * 1. 5 racemosa Jacq. sel. stirp. amer. hist. 68. bot. rep. t. 294. India occid. Mexico.
Lonicera alba L. cod. Nro. 1368. sp. pl. ed. 1. 175.
β) floridanum DC. prodr. IV, 482.

XL. Pavetta L.

(nomen indicum P. indicæ L.)

1. 5 arenosa Lour. fl. cochinch. 1, 92. China (Canton).
indica Ker in bot. reg. t. 190. et ? Champ. in Kew. gd. misc. IV, 196.
Ixora arenosa Poir. in enc. méth. suppl. III, 209.

XLI. Diplóspera DC.

(διπλοος, duplex, doppelt et σπέρμα, semen, Samen, ob locula 2 sperma.)

1. 5 viridiflóra DC. prodr. IV, 477. China.
Canthium dubium Lindl. in bot. reg. t. 1026.
- viridiflórum D. Dietr. syn. pl. I, 780.

XLII. Coffea L.

(Qahwe nomen arabicum potus et plantæ.)

1. 5 bengalensis Roxb. hort. Bengal. 15. fl. ind. II, 194 (ed. 1824). Ind. orient., Nepal.

XLIII. Ixóra L.

(teste Jones Iswara [nec Ixora], nomen dei indicæ Shivæ.)

- * 1. 5 coccinea L. cod. 897. Roxb. fl. ind. I, 375. 385. India orientalis,
grandiflóra Ker. bot. reg. t. 154. Ceylonia, China.
probinqua R. Br. in Wall. num. list. Nro. 6119.
Pavetta coccinea Blume bijdr. 950. Rumph herb. amb. IV, 105. t. 46.
* 2. 5 stricta Roxb. hort. Beng. 10. et fl. ind. I, 384. China, ins. molucca et
coccinea Lour. fl. cochinch. 75. Curt. in bot. Mag. t. 169. philipp., Java.
flammea Salisb. prodr. stirp. 62. Rumph herb. amb. IV, 47.
speciosa Willd. enum. pl. hort. Berol. I, 157.
Pavetta stricta Blume bijdr. 950.
β) incarnata Roxb. in Rees cyclop. R. et S. syst. veg. III, 179.
* 3. 5 crocata Lindl. in bot. reg. t. 782. China.
chinensis Lam. enc. méth. III, 344.
Pavetta chinensis R. et S. syst. veget. III, 526.
4. 5 blanda Ker. bot. reg. t. 100. India orientalis, China.
alba Roxb. fl. ind. I, 389 (ed. 1824).
dubia Schult in R. et S. syst. veget. mant. in vol. III, 121.

XLIV. Psychotria L.

(rectius Psychotrophium teste P. Browne.)

1. 5 lanceolata Nutt. in Sillim. amer. Journ. V, 290. Florida.
* 2. ♀ elliptica Ker in bot. reg. t. 607. nec Brasilia, sed China.
Reevesii Wall. in Roxb. fl. ind. II, 164 (teste Benth.).
Grumilia Reevesii H. et Arn. in bot. of Beech. voy. 193.
3. ♀ denticulata Wall. in Roxb. fl. ind. II, 166. Nepal.
4. ♀ polyneura DC. prodr. IV, 520. Nepal.
5. ♀ Wallichiana Spreng. syst. veg. IV, 2. 79. Nepal.
nervosa Don prodr. fl. nepal. 137.
6. § serpens L. cod. Nro. 1363. China.
- scandens H. et Arn. bot. of Beech. voy. 193 (teste Benth.).

Trib. 9. Spermaceæ (Fr. subsiccus 2—4 pyrenus aut 2 coccus,
loc. 1 sp.; Stigm. lamellata).

XLV. Cephalanthus L.

(κεφαλή, caput, Kopf et ἀνθή, flos, Blüethe.)

- * 1. 5 occidentalis L. cod. Nro. 793. Schk. bot. Handb. t. 21. et t. 5 b. America borealis,
oppositifolius Moench meth. 487. Mexico.
β) brachypodus DC. prodr. IV, 539.
γ) californicus Benth. pl. Hartw. 314.
2. 5 obtusifolius Raf. new fl. a. bot. of N. Amer. III, 25. America borealis.
3. 5 orientalis R. et S. syst. veget. III, 105. nec L. China.
occidentalis Lour. fl. cochinch. I, 83.
Acrodrion orientale Spreng. syst. veget. I, 384. et 386.
4. 5 montanus Lour. fl. cochinch. I, 84. China.

XLVI. *Democritea* DC.

(Democritos, philosophus Abderensis, etiam de plantis disseruit, † 356 a. Ch.)

- 1.
- h serissoïdes*
- DC. prodr. IV, 540. China.

XLVII. *Gallonia* A. Rich.

(Benj. Gallon, urbe Rouen natus, primus exactor vectigalium in urbe Boulogne ad mare, de Confervis plura disseruit, † 1839.)

- 1.
- h Aucheri*
- Jaub. et Sp. in ann. d. sc. nat. 2. sér. XX, 87. Persia, Arabia.
-
- Jaubertia Aucheri Guill. in ann. d. sc. nat. 2. sér. XVI, 60.
-
- J. et Sp. ill. pl. or. I, t. 8.

XLVIII. *Serissa* Commers.

(derivatione plane obscura.)

- * 1.
- h foetida*
- Commers. in Juss. gen. pl. (1789) 209. China, Japonia,
-
- japonica Thunb. teste Steud.; ubinam? Cochinchina,
-
- Buchozia coprosmoides l'Her. diss. de Buch. c. ic. India orientalis.
-
- Dysodia foetida Salisb. prodr. stirp. hort. Chap. Allert. 60.
-
- fasciculata Lour. fl. cochinch. 181.
-
- Lycium foetidum L. fl. suppl. 150.
-
- japonicum Thunb. fl. japon. 93. t. 17. bot. mag. t. 361.
-
- indicum Retz observ. bot. II, 12.

XLIX. *Putoria* Pers.

(putor, Gestank, ob folia male otenia.)

- * 1.
- h calabrica*
- Pers. syn. pl. I, 524. Syria, Creta,
-
- Asperula calabrica L. fl. suppl. 120. l'Her. stirp. nov. I, t. 32. Africa borealis,
-
- Ernodéa montana S. et Sm. fl. gr. II, t. 143. Italia inferior.
-
- Lonicéra steula Ucr. in Roem. Arch. f. d. Bot. I, 67.
-
- Pavetta foetidissima Cyr. pl. neap. I, 8. t. 1.
-
- Sherardia foetida (foetidissima Cyr. char. pl. 54.) Lam. enc. méth. IV, 326.

L. *Ernodéa* Swartz.

(ἐρνωδής, valde ramosus, sehr aestig.)

- 1.
- h littoralis*
- Swartz n. gen. sp. pl. 29. fl. ind. occ. I, t. 4. India occid., Florida.

INDEX.

- | | |
|---|---|
| <p><i>Abelia</i> R. Br. VI.
biflora Turcz. 3.
chinensis R. Br. 2.
floribunda Dne 8.
hirsuta Walp. 9.
rupestris Lindl. 6.
serrata S. et Z. 4.
spathulata S. et Z. 5.
triflora R. Br. 7.
uniflora R. Br. 1.
<i>Acanthocephalus</i> A. Rich. XXVII.
chinensis Walp. 1.
indicus A. Rich. 1.
<i>Aerodryon orientale</i> Spreng. XLV, 2.
<i>Adenosacme</i> Wall. XIX.
longifolia Wall. 1.
nepalensis Wall. 2.
<i>Adina</i> Salisb. XII.
globiflora Salisb. 1.
peduncularis DC. 2.
<i>Anisanthus microphyllus</i> Willd. III, 10.
<i>Apocynum foetidum</i> Burm. XXXVI, 1.
<i>Asperula calabrica</i> L. fl. XLIX, 1.</p> | <p><i>Buchozia coprosmoides</i> l'Her. XLVIII, 1.
<i>Calysphyrum floridum</i> Bge V, 5.
pauciflorum Bge V, 6.
<i>Canthium</i> Lam. XXXVIII.
chinense Pers. 1.
coronatum Lam. XXIV, 3.
corymbosum Pers. XXVI, 1.
dubium Lindl. XLI, 1.
undulatum Champ. 2.
viridiflorum D. Dietr. XLI, 1.
<i>Caprifolium</i> Juss. 1.
alpigenum Gaertn. II, 46.
alpinum Lam. II, 46.
americanum Dum. C. 13.
atrosanguineum Hort. ad fin.
aurantiacum Hort. ad fin.
balearicum Dum. C. 5 β.
belgicum Hort. 8 β.
bracteosum Mich. 12.
chinense Loud. II, 1.
ciliosum Pursh 21.
coeruleum Lam. II, 43.
dioicum R. et S. 12.</p> |
|---|---|

Caprifolium distinctum Moench 8.
Douglasii Lindl. 12 ♀.
dumetorum Lam. II, 20.
Epsonense Hort. ad fin.
etruscum R. et S. 3.
flavum Ell. 12.
Fraseri Pursh 10.
germanicum Roehl. 8 a.
glaucum Moench 12.
grandiflorum Hort. ad fin.
gratum Pursh 13.
hispidulum Lindl. 15.
hortense Lam. 1.
japonicum Don II, 4.
 - R. et S. II, 1.
javanicum Blume II, 7.
implexum R. et S. 5.
italicum Duh. 2.
 - R. et S. 1.
longiflorum Sabin. II, 4.
Loureiroy Blume II, 6.
macranthum Don II, 8.
Magnevilliae Hort. ad fin.
nepalense Don II, 8.
oblongifolium Sweet 19 ♂.
occidentale Lindl. 20.
odoratissimum Hort. ad fin.
parviflorum Pursh 12.
perfoliatum Roehl. 1.
Perilymenum R. et S. 8.
pilosum H. B. et K. 22.
pubescens Gold. 11.
purpureum Hort. ad fin.
pyrenaicum Lam. II, 24.
quercifolium Hort. 8 γ.
roseum Lam. II, 30.
rotundifolium Moench 1.
sempervirens Mich. 19.
serotinum Hort. 8 ♂.
superbum Hort. 19 ♀.
sylvaticum Lam. 8.
Xylosteum Gaertn. 1.
Cassine caroliniana Lam. X, 9.
corymbosa Mich. X, 9.
Paragua L. X, 9.
Cephalanthus L. XLV.
occidentalis L. 1. et Lour. 2.
obtusifolius Raf. 2.
chinensis Lam. XXVII, 1.
montanus Lour. 3.
oppositifolius Moench 1.
orientalis R. et S. 2.
Ceriscus malabaricus Gaertn. XXIV, 3.
Chamaecerasus alpigena Medik. II, 46.
nigra Medik. II, 30.
tatarica Medik. II, 23.
Xylosteum Medik. II, 20.
Chiococca P. Browne XXXIX.
racemosa Jacq. 1.
Cinchona caroliniana Polr. XV, 1.
gratissima Wall. XIV, 1.
jamaicensis Wright XVII, 1.
Coffea L. XLII.
bengalensis Roxb. 1.
Crawfordia Loureiroy Don XXXVI, 1.
paniculata Gris. XXXVI, 1.

Cupia DC. XXVI.
corymbosa DC. 1.
mollissima H. et Arn. 2.
Democritea DC. XLVI.
serissoides DC. 1.
Diervilla L. IV.
Acadiensis Dum. C. 1.
amabilis van H. 7.
canadensis Willd. 1.
coracensis DC. V, 2.
floribunda S. et Z. V, 4.
florida S. et Z. V, 5.
grandiflora S. et Z. V, 2.
hortensis S. et Z. V, 1.
humilis Pers. 1.
japonica DC. V, 3.
Lonicera Mill. 1.
lutea Pursh 1.
Middendorffiana Garr. V, 8.
rosea Walp. V, 3.
sessilifolia Buckl. 2.
splendens Hort. 3.
Tournefortii Mich. 1.
trifida Moench 1.
versicolor S. et Z. V, 3.
Diplospora DC. XLI.
viridiflora DC. 1.
Distegia nutans Raf. II, 38.
Duhamelia Pers. v. *Hamelia*.
Dysodia fasciculata Lour. XLVIII, 1.
foetida Salisb. XLVIII, 1.
Erithalis P. Browne XXXIII.
fruticosa L. 1.
inodora Jacq. I ♀.
odorifera Jacq. 1.
Ernoidea Swartz L.
littoralis Swartz 1.
montana S. et Sm. XLIX, 1.
Exostemma DC. XVII.
caribaeum R. et S. 1.
Gaillonia A. Rich. XLVII.
Aucherii J. et Sp. 1.
Gardenia L. XXI.
amoena Sims 7.
daphnoides Hance 3.
densa Walf. 6.
dumetorum Retz XXIV, 3.
esculenta Spreng. XXIV, 2.
florida L. 1.
jasminoides Retz 10. et Sol. 1.
Maruba Sieb. 4.
pietorum Hassk. 5.
radicans Thunb. 2.
rigida Ham. XXV, 4.
scandens Thunb. 10.
spinosa L. fl. XXIV, 3.
 - Thunb. XXXVIII, 1.
turgida Roxb. 8.
vulubilis Lour. 9.
Genipa flava Lour. XXI, 7.
Gentiana scandens Lour. XXXVI, 1.
Grumila Reevesii H. et Arn. XLIV, 2.
Guettardella Champ. XXXII.
chinensis Champ. 1.
Hamelia Jacq. XXVIII.
coccinea Swartz 1.

- Hamelia patens* Jacq. 1.
Hamiltonia Roxb. XXXIV.
 azurea Wall. 1.
 fruticosa Don XXXV, 1.
 probinqua Dne 3.
 scabra Don 1.
 suaveolens Wall. 2.
Hedyotis L. XX.
 acutangula Champ. 3.
 cephalophora R. Br. 1.
 Lawsoniae Benth. 3.
 recurva Benth. 2.
 uncinella Hook. 1.
Hyptianthera W. et Arn. XXIII.
 stricta W. et Arn. 1.
Jasminum capense Mill. XXI, 1.
Jaubertia Aucheri Guill. XLVII, 1.
Isika (*Iskia*) *alpigena* Borkh. II, 46.
 coerulea Borkh. II, 43.
 lucida Moench II, 46.
Ixora L. XLIII.
 alba Roxb. 4.
 arenosa Poir. XL, 1.
 blanda Ker 4.
 chinensis Lam. 3.
 coccinea L. 1.
 - Lour. 2.
 crocata Lindl. 3.
 dubia Schult. 4.
 flammea Salisb. 2.
 grandiflora Ker 1.
 incarnata Roxb. 2 β.
 probinqua R. Br. 1.
 stricta Roxb. 2.
Lasianthus tubiflorus Blume XXXIV, 2.
Laurus Tinus Hort. X, 25.
Leptodermis Wall. XXXV.
 lanceolata Wall. 1.
 oblonga Bge 2.
Leycesteria Wall. VIII.
 formosa Wall. 1.
Linnaea Gron VII.
 borealis L. 1.
Lonicera L. II.
 acuminata Wall. 10.
 acutifolia Raf. I, 12 β.
 adenocarpa Guss. 1, 4.
 affinis H. et Arn. 3.
 - Jacquem. 33.
 alba L. XXXIX, 1.
 albiflora T. et Gr. I, 9.
 alpigena L. 46.
 - β. *sibirica* DC. 41.
 altaica Pall. 43.
 angustata Hort. 23 γ.
 angustifolia Wender. 23 γ.
 - Wall. 50.
 arborea Boiss. 19.
 asperifolia C. Koch 33.
 Aucheri J. et Sp. 54.
 balearica Viv. I, 5 β.
 biflora Dsf. 18.
 brachypoda DC. 31.
 bracteata Royle 51.
 Brownii Hort. 3 β.
 Bungeana Led. 44.
 californica T. et Gr. I, 14.
 camtschatica Hort. ad fin.
 canadensis R. et S. 32.
 canescens Schousb. 18.
 Caprifolium Desf. I, 5 β.
 - Host I, 2.
 - L. I, 1.
 caucasica Pall. 53.
 Chamissoi Kir. 28.
 chinensis Wats. 1.
 chlamydophora C. Koch 57.
 chrysantha Turcz. 22.
 ciliata Muehbl. 32.
 ciliosa (*ciliata* Dietr.) Pursh I, 21.
 - Hook. et Arn.
 cochinchinensis G. Don 5 β.
 coerulea L. 43.
 confusa DC. 1 β.
 connata Meerb. I, 19 δ.
 cyrenaica Viv. I, 7.
 dahurica Siev. X, 41.
 dentata Raf. I. ad fin.
 Diervilla L. IV, 1.
 dimorpha Tausch I, 3 γ.
 dioica L. I, 12.
 discolor Lindl. 47.
 diversifolia Wall. 12.
 Douglasii DC. I, 12 β.
 dumosa A. Gr. I, 16.
 elliptica Raf. I, 12.
 Eriensis Raf. I, 11 β.
 etrusca Santi (nec Savit) I, 3.
 Finlaysoniana Wall. ad fin.
 flava Sims I, 10.
 flava nova Hort. I, 19 γ.
 flexuosa Lodd. 1.
 - Thunb. 31.
 Fraseri Poir. I, 10.
 germanica Dietr. I, 8.
 gibbosa Willd. 36.
 glabrata Wall. 11.
 glauca Hill I, 12.
 Goldii Spreng. I, 11.
 Govaniana Wall. 49.
 grandiflora Lodd. 23 ζ.
 grata Ait. I, 13.
 hetrusca Host I, 3.
 hirsuta Eat. I, 11.
 hirtiflora Champ. 16.
 hispidula Pall. 40.
 hispidula Dougl. I, 15.
 humilis Kar. et Kir. 26.
 hybrida Hort. ad fin.
 hypoleuca Dne 55.
 japonica Thunb. 1.
 - Wall. 8.
 jaspidea Hort. ad fin.
 javanica DC. 7.
 iberica Bieb. 56.
 implexa Ait. I, 5.
 interrupta Benth. 15.
 involutrata Banks 38.
 italica Schmidt I, 2.
 Karelini Bge 41.
 lanceolata Wall. 14.
 latifolia Lodd. 23 γ.

Lonicera Ledebourii Eschsch. 39.
Leschenaultii Wall. 9.
ligustrina Wall. 13.
longiflora DC. 4.
Loureiroyi DC. 6.
lutea Lodd. 23 8.
macrantha Spreng. 8.
macrophylla Hort. ad fin.
media Murr. 1, 12.
melanocarpa Hort. ad fin.
microphylla DC. 44.
 - Led. 45.
 - Willd. 1, 15.
Mociniiana DC. 37.
mollis Wall. 13 8.
mongolica Pall. X, 41.
multiflora Champ. 2.
 - Hort. ad fin.
nigra Kar. et Kir. 41.
 - Led. 29.
 - L. 30.
 - Thunb. 31.
nummulariaefolia J. et Sp. 27.
oblongifolia Hook. 42.
occidentalis Steud. 1, 20.
orientalis Lam. 52.
 - Bieb. 53.
ovata Wall. ad fin.
Pallasii Led. 43 8.
pallida Host 1, 1.
parviflora Lam. 1, 12.
Periclymenum L. 1, 8.
 - Lour. 5.
persica J. et Sp. 28.
pilosa Willd. 1, 22.
praecox Lam. et Hort. 1, 1 8.
pubescens Sweet 1, 11.
punicea Sims 25.
purpurascens Walp. 35.
pyrenaica L. 24.
 - Pall. 43 8.
 - Willd. 23 8.
quadrifolia Willd. 21.
quinquelocularis Hardw. VIII, 2.
racemosa Aut. III, 8.
reticulata Champ. 17.
 - Raf. 1, 13 8.
rotundifolia Hort. ad fin.
Royleana Wall. 12 8.
rubella Tausch 1, 2 7.
rupestris Raf. 1, 10 8.
scandens Ham. 8.
sempervirens L. 1, 19.
sericea Royle ad fin.
sibirica Hort. 23 7.
 - Vest 41.
sicula Ucria XLIX, 1.
Sieversiana Bge 45.
speciosa Wender. ad fin.
spinosa Jacquem. 34.
splendida Boiss. 1, 6.
subspicata H. et Arn. 1, 17.
Symphoricarpos L. III, 1.
tatarica L. 23.
 - Mich. 32.
Telfairii Hook. 5.

Lonicera tubulosa Benth. 1, 23.
turcomanica F. et M. 28.
vacciniifolia Hort. ad fin.
velulina DC. 43 7.
verticillata Steud. 1, 18.
villosa Muehbl. 1, 11.
virginiana Marsh. 1, 13.
Webbiana Wall. 48.
xyleostoioides Tausch 23 7.
Xylosteum L. 20.
 - Lour. 5 8.
Luculia Sweet XIV.
cuneifolia Don XXII, 6.
gratissima Sweet 1.
Pinciana Hook. 2.
Lycium foetidum L. fl. XLXIII, 1.
japonicum Thunb. XLVIII, 1.
indicum Retz XLVIII, 1.
Menestoria DC. XXV.
Hameliae DC. 2.
Mussaendae DC. 3.
rigida DC. 4.
Tocoyena DC. 1.
Mephitidea Reinw. XXXI.
chinensis Champ. 1.
Meynia spinosa Link. XXIX, 1.
Morinda Vaill. XXX.
Padavara Juss. 1.
Roioe L. 2.
scandens Roxb. 1.
umbellata L. 1.
Mussaenda L. XXII.
chinensis Lour. 7.
cuneifolia Don 6.
erosa Champ. 3.
frondosa Lour. 2.
hispida Don 1.
incana Wall. 5.
Luculia XIV, 1.
macrophylla Wall. 4.
pubescens Ait. 2.
Nauclea L. XI.
Adina Sm. XII, 1.
adinoides Lindl. XII, 2.
orientalis Lam. 1.
pilosa Blume XIII, 1.
purpurea Roxb. XXVII, 1.
racemosa S. et Z. 2.
scandens Sm. XIII, 1.
Nitooa canescens Bark. W. II, 18.
confusa Sweet II, 1 8.
japonica Sweet II, 1.
longiflora Sweet II, 4.
Opulus glandulosa Moench X, 29.
vulgaris Borkh. X, 29.
Oxyceros sinensis Lour. XXIV, 6.
Paederia L. XXXVI.
foetida L. 1.
Pavetta L. XL.
arenosa Lour. 1.
chinensis Lam. XLIII, 3.
coccinea Blume XLIII, 1.
foetidissima Cyr. XLIX, 1.
indica Ker 1.
stricta Blume XLIII, 2.
Wightiana Wall. XXVI, 1.

- Periclymenum americanum* Mill. I, 13.
germanicum Mill. I, 8 &.
italicum Mill. I, 1.
sempervirens Mill. I, 19.
verticillatum Mill. I, 18.
vulgare Mill. I, 8.
Phyteuma bipinnatum Lour. IX, 1.
Pinckneya Mich. XV.
pubens (pubescens) Mich. 1.
Polyozus Lour. XXXVII.
lanceolata Lour. 1.
maderaspatana DC. XXVI, 1.
Posoqueria dumetorum XXIV, 3.
rigida Wall. XXIV, 1.
Psychotria L. XLIV.
denticulata Wall. 3.
elliptica Ker 2.
lanceolata Nutt. 1.
nervosa Don 5.
polynura DC. 4.
Reevesii Wall. 2.
scandens H. et Arn. 6.
serpens L. 6.
Wallichiana Spreng. 5.
Putoria Pers. XLIX.
calabrica Pers. 1.
Randia Houst. XXIV.
canthioides Champ. 5.
chinensis R. et S. 6.
dumetorum Lam. 3.
leucocarpa Champ. 4.
longiflora Lam. 6.
rigida DC. 1.
spinosa Blume 3.
- Poir. XXXVIII, 1.
stricta Wall. XXIII, 1.
triflora Ham. 2.
Rondeletia asiatica L. XXVI, 1.
cinerea Wall. XVIII, 2.
coriacea Wall. XVIII, 3.
exserta Roxb. XVIII, 1.
Heynei R. et S. XVIII, 1.
longifolia Wall. XIX, 1.
Oryssensis Roth XVIII, 1.
pendula Wall. XVIII, 6.
proxima Wall. XVIII, 1.
stricta Roth XXIII, 1.
thyrsiflora Roth XVIII, 1.
Sambucus L. II.
adnata Wall. 1.
bipinnata Ch. et Schi. 6.
canadensis Thunb. 9.
- L. 2.
coerulea Raf. ad fn.
ebuloides Dsv. 10.
elegans Hort. 3 β.
floribunda Hort. 3 β.
glauca Nutt. 5.
heterophylla Hort. 3 α.
hirta Hort. 3 η.
- Tausch 2 β.
hybrida Jac. 3 μ.
laciniata Mill. 3 α.
linearis Hort. 3 α.
Loureiroana DC. 8.
lucida Tausch 2 γ.
Sambucus medullosa Gillb. 3.
mexicana Hort. 6.
monstrosa Presl. 3 v.
nigra L. 3.
- Lour. 8.
pubens (pubescens) Mich. 7.
pubescens Hort. 3 η.
pulverulenta Hort. 3 β.
racemosa Hook. 7.
- L. 4.
rotundifolia Sweet 3 α.
semperflorens Hort. 3 ε.
Thunbergii G. Don 9.
virescens Dsf. 3 λ.
vulgaris Lam. 3.
Serissa Commers. XLVIII, 1.
foetida Commers. 1.
japonica Thunb. 1.
Sherardia foetida Lam. XLIX, 1.
Spermadiction azureum Lindl. XXXIV, 1.
scabrum Spreng. XXXIV, 1.
suaveolens Roxb. XXXIV, 2.
Stylocoryne mollissima Walp. XXVI, 2.
Webera Rich. XXVI, 1.
Symphoricarpos (Symphoria) Juss. III.
albus Raf. 8.
ciliatus Nutt. 6.
conglomeratus Pers. 1.
erythrocarpus Hort. 1 γ.
glaucescens H. B. et K. 11.
glomeratus Pursh 1.
heterophyllus Presl et Raf. 8 δ.
imberbis Tausch 2.
leucocarpus Hort. 8 β.
mexicanus Lodd. 9.
microphyllus H. B. et K. 10.
mollis Nutt. 4.
montanus H. B. et K. 9.
occidentalis R. Br. 3.
orbicularis Moench 1.
parviflorus Dsf. 1.
pollucensis Hort. ad fn.
pumilus Hort. ad fn.
punicus Steud. II, 25.
racemosus Mich. 8.
rotundifolius A. Gr. 5.
spicatus Engelm. 7.
vulgaris Mich. 1.
Tarenna zeylanica Gaertn. XXVI, 1.
Thyanospermum Benth. XVI.
diffusum Champ. 1.
Tinus laurifolius Borkh. X, 24.
Uncaria Schreb. XIII.
pilosa Wall. 1.
Vaccinium album L. II, 32 β.
Vangueria Commers. XXIX.
spinosa Roxb. 1.
Vesalia floribunda Mart. et Gal. VI, 8.
hirsuta Mart. et Gal. VI, 9.
Viburnum L. X.
acerifolium L. 28.
acuminatum Lodd. 5 β.
alnifolium Marsh. 32.
americanum Mill. 33.
carolinianum Hort. 9.
cassinoides L. 7 γ.

Viburnum cassinoides Dur. 9.
 chinense H. et Arn. 10.
 - Zeyh. 23.
 cordifolium Wall. 12.
 cotiniifolium Don 17.
 cuspidatum Thunb. 30.
 cylindricum Ham. 37.
 dahuricum Pall. 41.
 dentatum L. 5.
 - Thunb. 31 β.
 - β. *pubescens* Ait. 4.
 dilatatum Thunb. 20.
 edule Pursh 33 β.
 ellipticum Hook. 3.
 erosum Thunb. 19.
 erubescens Wall. 35.
 foetens Dne 39.
 fragrans Bge 40.
 grandiflorum Wall. 36.
 grandifolium Hort. 29 γ.
 - Sm. 2.
 - Wall. 36.
 involutatum Wall. 13.
 laevigatum Ait. 9.
 lanceolatum Hil. 9.
 Lantana L. 1.
 - β. *canadensis* Pers. 2.
 lantanoideis Mich. 2.
 latifolium Hort. 25.
 lauriforme Lam. 24.
 Lentago Dur. 8.
 - L. 6.
 lobatum Lam. 29.
 longifolium Lodd. 5 β.
 lucidum Mill. 24.
 macrocephalum Fort. 18.
 molle Mich. 32.
 montanum Lodd. 5 γ.
 Mullaha Ham. 15.
 nervosum Don 16.
 - Hook. 22.
 nitidum Ait. 7 β.
 nudum L. 7.
 obovatum Wall. 9.
 odoratissimum Ker 23.
 oleaeifolium Tausch 7 β.
 opuloides Muehlb. 33.
 Opulus L. 29.
 - β. *americana* Ait. 33.
 orientale Pall. 26.
 Oxycoecus Pursh 33.
 pauciflorum Pyl. 27.
 phlebotrichum S. et Z. 21.
 plicatum Thunb. 31 β.
 polycarpum Wall. 38.
 prunifolium L. 8.
 pubescens Pursh 4.
 punctatum Ham. 11.
 punicifolium Dsf. 9 β.
 pyrifolium Pursh 7 β.

Viburnum pyrifolium Poir. 8.
 Rafinesqueanum Schult. 4.
 rigidum Vent. 25.
 roseum (*rosaceum*) Hort. 29 γ.
 rugosum Pers. 25.
 semitomentosum Mich. 4.
 sempervirens C. Koch 22.
 sibiricum Hort. 41.
 sinense Zeyh. 22.
 squamatum Willd. 7 γ.
 stellulatum Wall. 14.
 strictum Link 25.
 Tinus L. 24.
 - δ. *strictum* Ait. 25.
 tomentosum Lam. 1.
 - Rafn. 4.
 - Thunb. 31.
 trilobum Marsh 33.
 urceolatum S. et Z. 34.
 villosum Raf. 4.
Webera corymbosa Willd. XXVI, 1.
Weigela (*Weigelia*) Thunb. V.
 amabilis v. H. 7.
 coracensis Thunb. 2.
 florida DC. 5.
 japonica Thunb. 3.
 pauciflora DC. 6.
 rosea Lindl. 3.
 splendens Hort. IV, 3.
Wendlandia Bartl. XVIII.
 cinerea DC. 2.
 coriacea DC. 3.
 exserta DC. 1.
 Kotschyi Boiss. et Hoh. 5.
 longifolia DC. XIX, 1.
 pendula DC. 6.
 puberula DC. 1.
Xylosteum alpinum Dum. C. II, 46.
 arborescens Bark. Webb. II, 19.
 asperifolium Dne II, 33.
 campaniflorum Lodd. II, 30 β.
 canadense Duh. II, 43.
 ciliatum Pursh II, 32.
 coeruleum Dum. C. II, 43.
 cordatum Moench II, 23.
 dumetorum Moench II, 20.
 ibericum Fisch. II, 56.
 involutatum Rich. II, 38.
 mexicanum H. B. K. II, 36.
 nigrum Mill. et Dum. C. II, 30.
 oblongifolium Gold. II, 42.
 puniceum Raf. II, 25.
 purpurascens Dne II, 35.
 pyrenaicum Dum. C. II, 24.
 Solonis Eat. II, 43.
 spinosum Dne II, 34.
 tataricum Dum. C. II, 23.
 - Mich. II, 32.
 villosum Mich. II, 43.
 vulgare Roehl. II, 20.

ORDO XVI.

Compositae.

Fam. 99. Synanthereae.

Subfam. 1. *Cynarocéphalae*.

I. *Centaurea* L.

(κενταυριον et κενταυρια apud veteres planta medicinalis et agrestis.)

1. *h* spinosa L. cod. Nro. 6594. bot. mag. t. 2493. Graecia, Oriens.
2. *h* hórrida Badaro giorn. fisic. 1824, p. 363. Pedemontium, Sardinia.
? spinosa Willd. sp. pl. III, 2293.
3. *h* intybácea Lam. enc. méth. I, 671. Barr. icon. t. 211. Hispania, Gallia.
Cheirólophus pinnatifidus Cass. in dict. d. sc. nat. LI, 56.
β) flore albo; leucantha Pourr. act. Toul. III, 308.
4. *h* sempervirens L. cod. Nro. 6559. Bocc. ic. pl. rar. Sic. t. 39. f. 3. Italia, Gallia,
Cheirólophus laneolatus Cass. in dict. d. sc. nat. LI, 56. penins. pyrenaica.
Cyanus hastatus Moench meth. 561.

II. *Centrophylum* (Centrophylum) Neck.

(κεντρον, calcar, Sporn h. I. Stachel et φυλλον, folium, Blatt.)

1. *h* arborescens Hook. in bot. mag. t. 3302. Hispania.
? Atráctylis rigida Poir. enc. méth. suppl. IV, 637.
Cárthamus arborescens L. cod. Nro. 6010.
? - rigidus Willd. enum. pl. hort. Berol. 845.
Onobróma arborescens Spreng. syst. veget. III, 391.

III. *Ptilostémon* Cass.

(πιλον, pluma, Feder et στημων, filamentum, h. I. Staubfaden.)

1. *h* míticus Cass. in dict. d. sc. nat. XLIV, 59. Graecia, ins. Archipel
Chamaepeuce mítica DC. prodr. VI, 657. Alpin. de pl. exot. t. 76.
Cnicus Chamaepeuce Dsf. hist. d. arbr. et d. arbr. 280.
Pteronia Chamaepeuce Spreng. syst. veget. III, 340.
Stachelina Chamaepeuce L. cod. Nro. 6092. S. et Sm. fl. gr. t. 847.
2. *h* appendiculatus Cass. in dict. d. sc. nat. XLIV, 44. Graecia.
Chamaepeuce fruticosa DC. prodr. VI, 658.
Carduus fruticosus Desf. tabl. du mus. d'hist. nat. 91.
Cnicus fruticosus Desf. d. arbr. et arbr. I, 280.
3. *h* polycéphalus (sub Chamaepeuce) DC. prodr. VI, 658. Oriens.
4. *h* gnaphaloídes (sub Carduo) Cyr. pl. rar. neap. I, 27. t. 9. Italia inferior.
Cirsium gnaphalódes Spreng. syst. veget. III, 375
Cnicus Chamaepeuce Ten. prodr. fl. neap. 48.
Meronia Chamaepeuce Ten. syll. pl. vasc. fl. Neap. 417.

IV. *Stechmannia* DC.

(Joh. Paul Stechmann dissertationem de Artemisiis a. 1775 Goettingae scripsit.)

1. *h* Stachelinae DC. prodr. VI, 534. Syria (Libanon).

V. *Stachelina* L.

(Joa. Henr. Stachelin medicus Basileae, theses anatomico-botanicas a. 1711 in lucem edidit, † 1721; cujus filius Benedictus, discipulus botanici celeb. Parisiensis Vaillantii cum Scheuchzerio multum disseruit, † 1750.)

1. *h* baetica DC. prodr. VI, 544.

2. *h* dubia L. cod. Nro. 6079. Penins. pyrenaica, Hispania, Italia.
 Serrátula conica Lam. illustr. d. gener. t. 666. f. 4.
 - dubia Brot. fl. lusit. I, 350.
 - rosmarinifolia Cass. in dict. d. sc. nat. L, 439.
3. *h* fruticosa L. cod. Nro. 6081. Creta, Chero.
 Centauréa fruticosa L. sp. pl. 1286.
 Hirtéllina lanceolata Cass. in dict. d. sc. nat. L, 441.
 Serrátula fruticosa Lam. illustr. d. gener. t. 666. f. 3.
4. *h* arborescens L. cod. Nro. 660. S. et Sm. fl. gr. t. 845. Creta.
 Barbéllina sericea Cass. dict. d. sc. nat. L, 440.
5. *h* tenuifolia Presl fl. sic. I, p. XXX, Guss. syn. fl. sic. II, 448. Sicilia.

Subfam. 2. *Corymbiferae*.A. *Antherae exappendiculatae*.Trib. 1. *Vernoniaceae* (*Clinanth. nudum*; *Styli rami hispidi*).VI. *Vernonia* Schreb.

(Guil. Vernon exeunte saeculo XVII Virginiam et Maryland permigravit.)

1. *5* arbórea Ham. in transact. of the Linn. soc. IV, 218. Nepal, India orientalis
 Conýza arborea Wall. num. list. Nro. 2.
2. *5* volcameriaefolia DC. prodr. V, 32. Nepal.
 Conýza volcamerifolia Wall. num. list. Nro. 3001.
3. *h* extensa DC. prodr. V, 33. Nepal.
 Conýza extensa Wall. num. list. Nro. 3016.

VII. *Borrchia* Adans.

(Olaus Borrich, prof. botanices et chemiae Hafniae, † 1690.)

1. *5* frutescens DC. prodr. V, 489. Dill. hort. Elth. I, t. 38, f. 44. Mexico, India occid.,
 Buphthalmum frutescens L. cod. Nro. 6527. America foederata.
 - incanum Mill. dict.
 Diomedea bidentata Cass. dict. d. sc. nat. XIII, 283.
2. *5* arborescens DC. prodr. V, 479. Mexico, India occid.,
 Buphthalmum arborescens L. cod. Nro. 6528. Dill. hort. Florida.
 Elth. I, t. 38, f. 43.
 Diomedea glabrata H. B. et K. n. gen. et sp. amer. IV, 213.
 - indentata Cass. in dict. d. sc. nat. XIII, 284.

Trib. 2. *Eupatoriaceae* (*Anthodium discoideum*; *Clinanthium nudum*;
Styli rami intus seriebus stigm. ante medium desinentes).VIII. *Mikania* Willd.

(J. C. Mikan, prof. botanices Pragensis, Brasiliam permigravit, † 1844.)

1. *5* clematidea Wall. num. list. 3171. DC. prodr. V, 191. Nepal.
2. *5* scandens Willd. sp. pl. III, 1743. Pluk. almag. t. 163. f. 3. America borealis,
 angulosa Raf. in fl. Ludov. 82. Mexico.
 Eupatorium scandens L. cod. Nro. 6053. Jacq. ic. pl. rar. t. 169.
5) pubescens Muehlb. cat. pl. Amer. sept. 71.

IX. *Liatris* Schreb.

(origine mihi plana dubia.)

1. *h* fruticosa Nutt. in Sillim. amer. journ. V, 299. Florida.

X. *Brikkellia* (Ell.) A. Gr.

(Brickell, urbis Georgiae Savannah exeunte saeculo XVIII incola, cum Frasero et Muehlenbergio multas plantas communicavit.)

1. *h* Riddellii A. Gr. pl. Wright I, 83. Texas.
 Clavigera dentata DC. prodr. V, 128 (teste A. Gr.).
 - Riddellii T. et Gr. fl. of N. Amer. 77.
2. *h* laciniata A. Gr. in pl. Wright I, 84. Nova-Mexico.
3. *h* Coulteri A. Gr. in pl. Wright I, 83. California.

4. *h. californica* A. Gr. pr. Fendl. 64. California, Nova-Mexico.
 Bulbostylis californica T. a. Gr. fl. of N. Amer. II, 79.
 5. *h. Wrightii* A. Gr. pl. Wright. II, 72. Nova Mexico.

XI. Eupatorium L.

(*εὐπατόριον* planta medicinalis apud Veteres, sine dubio Agrimonia Eupatorium L.)

1. *h. Eupatorium Wrightii* A. Gr. in pl. Wright. I, 67. Nova Mexico.
 2. *h. solidaginifolium* A. Gr. in pl. Wright. I, 87. Nova Mexico.
 3. *h. ageratifolium* DC. prodr. V, 173. India occidentalis,
 β) *texense* T. a. Gr. fl. of N. Amer. II, 90. Texas.

Triib. 3. Asteroideae (Clinanthium nudum; Styli rami, intus stigm. crebris undique instructi, Achaenia saepe compressa).

XII. Bacccharis L.

(*βακχαρίς* apud Veteres planta olens, sine dubio Helichrysum sanguineum DC.)

1. *h. glomeruliflora* Pers. syn. pl. II, 423. America foederata.
 sessiliflora Mich. fl. bor. amer. II, 135.
 2. *h. salicina* T. et Gr. fl. of N. Amer. II, 258. America foed. media.
 salicifolia Nutt. in transact. Amer. phil. soc. n. ser. VII, 337.
 3. *h. viminea* DC. prodr. V 400. California.
 4. *h. consanguinea* DC. prodr. V, 408. California.
 5. *h. angustifolia* Mich. fl. bor. amer. II, 125. America foed. austr.
 6. *h. brachyphylla* A. Gr. pl. Wright. II, 83. Nova Mexico.
 7. *h. halimifolia* L. cop. Nro. 6212. nouv. Duh. I, t. 60. Amer. foeder. borealis.
 cuneifolia Moench meth. 574.

XIII. Lindsyris Cass.

(i. e. planta, quae habitum generum Lini et Osyris refert.)

1. *h. montana* DC. prodr. V, 352. Syria, Arabia.
 Chrysocoma montana Vahl symb. bot. I, 70.
 2. *h. heterophylla* A. Gr. in pl. Wright. I, 95. Nova Mexico.
 3. *h. Wrightii* A. Gr. in pl. Wright. I, 95. Nova Mexico.
 4. *h. pulchella* (Chrysothamnus) A. Gr. in pl. Wright. I, 96. Nova Mexico.
 5. *h. pluriflora* T. et Gr. fl. of N. Amer. II, 232. America foed. media.
 Chrysocoma graveolens Torr. in ann. luc. of New-Y. II, 211.
 6. *h. lanceolata* T. et Gr. fl. of N. Amer. II, 233. America foed. occid.
 Chrysothamnus lanceolatus Nutt. in transact. Amer. phil. soc. n. ser. VII, 324.
 7. *h. graveolens* T. et Gr. fl. of N. Amer. pl. II, 234. America foederata
 Bigelowia dracunculoides DC. prodr. V, 329. media et occidentalis.
 Chrysocoma dracunculoides Pursh fl. Amer. sept. II, 517 (excl. char.).
 ? *graveolens* Nutt. gen. of N. Amer. pl. II, 136.
 Chrysothamnus dracunculoides Nutt. in transact. amer. phil. soc. n. ser. VII, 324.
 β) *tomentoso-pubescens*; Bigelowia Missouriensis DC. prodr. V, 329.
 Chrysothamnus speciosus Nutt. in transact. amer. phil. soc. n. ser. VII, 324.
 8. *h. albicaulis* T. et Gr. fl. of N. Amer. pl. II, 234. America foeder. occid.
 Chrysothamnus speciosus β. albicaulis Nutt. in transact. VII, 324.

XIV. Duhaldea DC.

(Du Halde, Pater jesuita, Chinam permigravit, † 1743.)

1. *h. chinensis* DC. prodr. V, 366. China.

XV. Amphipappus T. et Gr.

(*ἀμφί*, circum, herum et *πᾶπιος*, pappus, Haarkrone, ob pappos heteromorphos.)

1. *h. Fremontii* T. et Gr. in Bost. journ. of nat. hist. V, 4. t. 9. California.

XVI. Solidago L.

(solidus, fest, et agere, thun, quia planta Veteres medicamento vulnerario utuntur.)

1. *h. pauciflosculosa* Mich. fl. bor. amer. II, 116. America foeder. austr.
 Chrysooma solidaginoides Nutt. in journ. acad. Phil. VII, 67.

XVII. Gymnosperma (nec Gymnospermum) Less.

(*γυμνός*, nudus, nackt et *σπέρμα*, semen, Samen.)

1. *h. corymbosum* DC. prodr. V, 312.

Mexico, Texas.

VIII. *Ericameria* Nutt.

(ἐρεμχη, erica, Haide, et μερων, pars, Antheil, ob similitudinem ericarum.)

1. *h* *microphylla* Nutt. in transact. of the amer. philos. soc. n. ser. VII, 318. America foeder. occid.
Aplopappus ericoides H. et Arn. in bot. of Beech. voy. 146.
Diplopappus ericoides Less. in Linn. VI, 117.
2. *h* *nana* Nutt. in transact. of the Amer. phil. soc. n. ser. VII, 318. America foeder. occid.
3. *h* *resinosa* Nutt. in transact. of the Amer. phil. soc. n. ser. VII, 318. America foeder. occid.
4. *h* *laricifolia* A. Gr. in pl. Wright. II, 80 (sub *Aplopappo*). Nova Mexico.

IX. *Diplopappus* (Cass.) DC.

(διπλος, duplex, doppelt, et παππος, pappus, Haarkrone.)

1. *h* *baccharioides* Benth. in Lond. journ. of bot. I, 487. China (Hongkong).

X. *Haplopappus* (*Aplopappus*) Cass.

(ἁπλος, simplex, einfach, et παππος, pappus, h. l. Haarkrone.)

1. 5 *sphaerocephalus* A. Gr. pl. Fendl. 76. adn. California.
2. *h* *rubiginosus* T. et Gr. fl. of N. Amer. II, 240. Texas.
3. *h* *arenarius* Benth. bot. of Beech. voy. of the Sulph. 24. California.
4. *h* *Menziesii* T. et Gr. fl. of N. Amer. II, 243. California.
Isocoma vernonioides Nutt. in transact. of am. phil. soc. n. ser. VII, 320.
Pyrrhocoma Menziesii H. et Arn. in bot. of Beech. voy. 351.

XI. *Aster* L.

(ἀστρον, stella, Stern, ob formam calathii.)

1. *h* *Wrightii* A. Gr. pl. Wright. I, 112. Nova Mexico.
2. *h* ? *tomentellus* Hook. et Arn. bot. of Beech. voy. 146. California.
3. *h* *ignoratus* Kth et Bouch. ind. sem. hort. Berol. 1845. p. 11. Nepal.
Conyza solidaginoides Wall. num. list. Nro. 3086.

XII. *Kalimeris* (*Calimeris*, nec *Callimeris*) Cass.

(*Kaliumeris*; nomen plantae aevi medii, sine dubio a v. καλοξ, calyx, Kelch, et μέρος, pars, Antheil.)

1. *h* *alysoides* DC. prodr. V, 259. Mongolia.

Trib. 4. *Chrysanthemaeae* (*Clinanthium nudum*, *Antherae apice nudae*:
Achenia calva; *Styli rami penicillati*).

XIII. *Pyrethrum* Gaertn.

(πυρ, ignis, Feuer et ἄθροος, densus dicht, ob radicem mordentem; apud Veteres
Anthemis Pyrethrum L.)

- * 1. *h* *indicum* Cass. dict. d. sc. nat. XLIV, 149. Rumph. herb. India orientalis, China.
 amb. V, t. 92. f. 1. Cochinchina, Japonia.
Chrysanthemum japonicum Thunb. fl. japon. 321.
 - *indicum* L. cod. Nro. 6440. Rheede hort. mal. X, t. 44.
 - ? *procumbens* Lour. fl. cochinch. II, 610.
 - *tripartitum* Sweet brit. fl. gard. 2. ser. t. 193.
 β) *purpureum* Pers. syn. pl. II, 461 (sub *Chrysanthemo*).
- * 2. *h* *chinense* (sinnse) Sabin. in transact. of the hortie. soc. IV, 330. t. 14. Japonia.
Anthemis artemisiaefolia Willd. sp. pl. III, 2184.
 - *stipulacea* Moench meth. suppl. 258.
 - *grandiflora* Ramatuelle in journ. d'hist. nat. II, 233.
Chrysanthemum indicum Thunb. fl. jap. 320. bot. mag. t. 327. et 2042.

XIV. *Tanacetum* L.

(origine incerta; vox teste Bauhini transmutatione v. *Athanasiae* orta.)

1. *h* *Tanacetum capitatum* T. et Gr. fl. of N. Amer. II, 415. America foeder. occid.
Sphaeromeria capitata Nutt. in transact. amer. phil. soc. n. ser. VII, 402.
- * 2. *h* *Nuttallii* T. et Gr. fl. of N. Amer. II, 415. America foeder. occid.
Sphaeromeria argentea Nutt. in transact. amer. phil. soc. n. ser. VII, 402.
3. *h* *VahlII* DC. prodr. VI, 129. ? Hispania.
Achillea pauciflora Willd. sp. pl. III, 2204.

XXV. *Santolina* L.(an idem nomen, quod *Santonica* ? Herba apud Latinos medicalis, an *Artemisiae* species ?)

- * 1. *h* *Chamae-Cyparissus* L. cod. Nro. 6100. Europa australis.
incana Lam. fl. franc. II, 42.
villosissima Poir. enc. méth. VI, 505.
 β) *squarrosa* Willd. sp. pl. III, 1798. Moris. pl. hist. univ. Oxon. VI, t. 3. f. 17.
ericoides Poir. enc. méth. VI, 104.
villosa Mill. dict.
 γ) *tomentosa* Pers. syn. pl. II, 406.
- * 2. *h* *viridis* (virens Mill.) Willd. spec. pl. III, 1798. Europa austr. occident.
 3. *h* *pectinata* Lag. nov. gen. et sp. 25. Barr. ic. t. 422. Mons pyrenaeus.
 4. *h* *pinnata* Viv. fl. ital. fragm. I, 1. t. 1. Italia.
leucantha Bertol. amoen. ital. 43.
5. *h* *elegans* Boiss. in DC. prodr. prodr. VII, 296. Hispania.
 6. *h* *viscosa* Lag. nov. gen. et sp. 25. Hispania.
 7. *h* *rosmarinifolia* L. cod. Nro. 6101. Sm. ex. bot. II, t. 62. Hispania, Gallia, Italia.
 8. *h* *canescens* Lag. nov. gen. et sp. 25. Hispania australis.
 9. *h* *fragrantissima* Forsk. fl. arab. aeg. 147. Del. fl. d'Eg. t. 42. f. 3. Aegyptus, Arabia, Syria,
 β) *ptarmicoides* Lam. enc. méth. VI, 507. ill. d. genr. t. 671. f. 5. Persia.

Trib. 5. *Artemisiae* (Anth. apice appendiculatae; Styli rami apice penicillati, *Achaenia* calva).XXVI. *Artemisia* L.(apud Veteres herba emmenagoga; nomen ab *Artemide* [*Ilithya*] deriv.)

- A. *Dracunculus* Bess. (Clinanth. nudum; flos. radii fem. fert., disci ster.)
1. *h* *lanata* Lam. enc. méth. I, 267. Bess. in mém. d. sav. étr. de Pét. IV, t. 4. Hispania.
variabilis β. *canescens* DC. prodr. VI, 213.
2. *h* *Jussiaeana* Gay in bull. de la soc. d. nat. de Mosc. VIII, Nro. 9. Hispania.
 3. *h* *glutinosa* Gay in bull. de la soc. d. nat. de Mosc. VIII, Nro. 8. Gallia, Italia inferior.
campestris var. *glutinosa* Ten. syn. fl. neap. 420.
4. *h* *paniculata* Lam. enc. méth. I, 265. Barr. ic. pl. t. 447. Italia, Gallia austr.
 5. *h* *variabilis* Ten. fl. neap. prodr. V, 128. Italia, Hispania,
neapolitana Ten. prodr. fl. nap. app. V, 28. Pyrenaeus, Gallia,
 β) *canescens*; *saligna* Ten. prodr. fl. nap. suppl. I, 63. ? America borealis.
 γ) *americana* Bess. in mém. d. sav. étr. de l'ac. de St. Pét. IV, 466.
6. *h* *salsoloides* Willd. sp. pl. III, 1832. Rossia media et austr.
 7. *h* *Trautvetteriana* Bess. in mém. d. sav. étr. de l'ac. de
 St. Pét. IV, 464. t. 5. Rossia australis.
pauciflora β. et γ. Bess. in bull. de la soc. d. nat. de Mosc. VIII, 21.
arenaria β. et γ. DC. prodr. VI, 94.
8. *h* *arenaria* DC. prodr. VI, 94. Rossia australis,
 Transcaucasia.
pauciflora Bieb. fl. taur. cauc. II, 290.
9. *h* *Tschernijeviana* Bess. in bull. de la soc. d. nat. de Mosc. VIII, Nr. 12. Rossia austr.-orient.
 10. *h* *Koelreuteriana* Bess. in bull. d. la soc. d. nat. de Mosc. VIII, 16. Sibiria orientalis.
 11. *h* *Halodendron* Turcz. in bull. de la soc. d. nat. de Mosc. XI, 1. 94. Sibiria australis.
 12. *h* *songarica* Schrenk enum. pl. nov. 49. Sibiria australis.
 13. *h* *pycnocéphala* DC. prodr. VI, 99. California.
Oligósporus pycnocéphalus Less. in Linn. VI, 524.
- B. *Seriphidium* Bess. (*Clinanthium nudum*; *Calathium homogamum*).
14. *h* *Barrelieri* Bess. suppl. 87. DC. prodr. VI, 104. Barr. ic. t. 485. Hispania.
 15. *h* *aragonensis* (nec *aragonensis*) Lam. enc. méth. I, 269. Gallia, Hispania.
Herba alba Ass. syn. stirp. indig. Arag. 117.
Valentina Willd. sp. pl. III, 1816.
- * 16. *h* *coerulescens* L. cod. Nro. 6142. Ten. fl. Napl. t. 248. f. 2. Europa australis.
 β) *latifolia*; *rubella* Moench meth. 572.
 γ) *angustifolia*; *Sipontina* Ten. fl. Napl. t. 248. f. 1.
palmata et *Santonica* Lam. enc. méth. I, 268.
17. *h* *Sieberi* Bess. suppl. p. 80 (in bull. de la soc. d. mat. de Mosc. IX.). Palaestina,
glomerata Sieb. Herb. palest. et Spr. syst. veget. III, 489. terrae maris caspii
 ? *Contra* L. cod. Nro. 6126 (teste Sieb.). occident. et orient.
fragrans Eichw. pl. nov. casp. cauc. 6.

18. *h* nitrosa Web. in Stechm. de Artem. 24. Gmel. fl. sib. II, t. 50. f. 1. Sibiria.
 19. *h* cana Pursh fl. Amer. septentr. II, 621. America borealis
 Columbiensis Nutt. gen. of N. amer. pl. II, 142. media et occident.
 20. *h* tridentata Nutt. in transact. amer. phil. soc. n. ser. VII, 398. America foed. occid.
 21. *h* Arbúscula Nutt. in transact. amer. phil. soc. n. ser. VII, 398. America foed. occid.
 22. *h* trifida Nutt. in transact. amer. phil. soc. n. ser. VII, 398. America foed. occid.
 β) rigida Nutt. in transact. of the am. phil. sc. n. ser. VII, 398.
- C. *Abrótanum* Bess. (Clinanthium nudum; Flosc. radii fem., omnes fertiles).
 23. *h* hispanica Lam. enc. méth. I, 263. Hispania.
 * 24. *h* procéra Willd. sp. pl. III, 1818. Rossia, Sibiria,
 β) Sieberiana Bess. in nouv. mém. de la soc. d. nat. Transcaucasia,
 de Mosc. III, 31. Italia, Dalmatia.
 γ) Visianiana Bess. in nouv. mém. de la soc. d. nat. de Mosc. III, 31.
 * 25. *h* Abrotanum L. cod. Nro. 6127. Eur.austr., Oriens, China.
 26. *h* vestita Wall. num. list. Nro. 411. Kashmir, Himal., Nepal.
 27. *h* judaica L. cod. Nro. 6124. Afr. bor., Arab., Syr., China.
 28. *h* Kruhsiana Bess. in nouv. mém. de la soc. d. nat. de Mosc. III, 22. Sibiria orientalis.
 29. *h* rutaefolia Steph. in Spreng. syst. veg. III, 488. Sibiria orientalis.
 30. *h* Adamsii Bess. in nouv. mém. de la soc. d. nat. de Mosc. III, 27. Sibiria australis.
 31. *h* glabella Kar. et Kir. in bull. de la soc. d. nat. de Mosc. XIV, 441. Sibiria orientalis.
 obtusiloba β. glabra Led. fl. alt. IV, 70.
 32. *h* Turczinawia Bess. in nouv. mém. de la soc. d. nat. de Mosc. III, 23. t. I. Sibiria australis.
 β) dasyantha Schrenk enum. pl. nov. 50.
 33. *h* Lindleyana Bess. in nouv. mém. de la soc. d. nat. de Mosc. III, 35. America bor.-occid.
 β) Coronopus Bess. in nouv. mém. de la soc. d. nat. de Mosc. III, 36.
 34. *h* californica Less. in Linn. VI, 523. California.
 abrotanoides Nutt. in transact. amer. phil. soc. n. ser. VII, 399.
 35. *h* Fischeriana Bess. in nouv. mém. de la soc. d. nat. de Mosc. III, 21. California.
 β) vegetior; foliosa Nutt. in transact. amer. phil. soc. n. ser. VII, 397.
- D. *Absinthium* Bess. (Clinanthium pilosum; Calathium heterogamum).
 36. *h* argentea l'Her. sert. angl. 22. Italia inferior, Madeira.
 Absinthium argenteum Bess. in bull. de la soc. d. nat. de Mosc. 1829.
 * 37. *h* arborescens L. cod. Nro. 6128. Africa bor., Eur. austr.,
 Absinthium arborescens Bess. in bull. de la soc. d. nat. Oriens.
 de Mosc. 1829.
 β) floribus abortivis Guss. syn. fl. sic. II, 1. 456.
 38. *h* Moxa DC. prodr. VI, 121. China.
 Absinthium Moxa Bess. in bull. de la soc. d. nat. de Mosc. 1829.
 39. *h* grandiflora DC. prodr. VI, 122. Sibiria uralensis.
 Absinthium grandiflorum Bieb. in bull. de la soc. d. nat. de Mosc. 1829.

Trib. 6. Senecioneae (Clinanth. nudum; Styli rami penicill.; Papp. pilosus).

XXVII. Senecio L.

(senex, Greis, apud Latinos herba coloris cinerei, an Erigerontis species?)

1. *h* ambiguus DC. prodr. VI, 356. Sicilia.
 alpinus Ucr. hort. reg. Panorm. 360.
 Cineraria ambigua Biv. Bern. stirp. rar. in Sic. spont. prov. III, 5.
 * 2. *h* bicolor Willd. sp. pl. III, 20-5 (sub Cineraria). Sicilia.
 * 3. *h* gibbosus DC. prodr. VI, 365. Cup. panphyt. sic. 1. t. 3. Sicilia, Italia inferior.
 Cineraria gibbosa Guss. pl. hort. in Boccadif. 1821. p. 17 et 71.
 - canadensis Ucr. hort. reg. Panorm. 360.
 * 4. *h* candidus DC. prodr. VI, 355. Cup. panphyt. sic. 1. t. 189. Sicilia.
 Cineraria candida Presl del. Prag. 95.
 - nebrodensis Guss. cat. pl. hort. in Boccadif. a. 1821. p. 17 et 72.
 * 5. *h* Cineraria DC. prodr. VI, 355. Europa australis,
 maritimus Rehb. fl. exc. II, 244. (néc. L.) Africa borealis.
 Cineraria maritima L. cod. Nro. 6368. S. et Sm. fl. gr. t. 871.
 - ceratophylla Ten, syll. pl. vasc. fl. neap. 439 (teste Guss.).
 Jacobaea tomentosa Moench meth. 587.
 6. *h* chinensis DC. prodr. VI, 363. China (Canton).

Cineraria chinensis Spreng. syst. veg. III, 549.

- *repanda* Lour. fl. cochinch. II, 613.

7. § *Buimalia* Ham. in Don prodr. fl. nep. 178.

8. ḥ *Kunthianus* Wall. num. list. Nro. 3118.

9. ḥ *filifolius* Nutt. in transact. amer. phil. soc. n. ser. VII, 414. America foed. occid.

Nepal.

Nepal, Himalaya.

XVIII. *Tetradymia* DC.

(τετραδυμος, quatuor simul pariens, ob calathium quadriflorum.)

1. ḥ *inermis* Nutt. in transact. amer. phil. soc. n. ser. VII, 415. America foed. occid.

2. ḥ *Nuttallii* T. et Gr. of N. Amer. fl. II, 447. America foed. occid.

3. ḥ *spinosa* Nutt. transact. amer. phil. soc. n. ser. VII, 415.

3. ḥ *spinosa* H. et Arn. in bot. of Beech. voy. suppl. 360. America foed. occid.

Lagothermus microphyllus Nutt. transact. n. ser. VII, 416.

β) *ambigua* Nutt. transact. amer. phil. soc. n. ser. VII, 416 (sub *Lagothermo*).

Trib. 7. *Helenieae* (Clinanth. nudum; Styli rami penicillati; Pappus aristatus aut squamellatus.)

XXIX. *Xinnia* L.

(Joh. Zinn, prof. medic. Goettingensis, descript. pl. horti et agri Goett. edidit, † 1750.)

1. ḥ *juniperifolia* A. Gr. pl. Wright. I, 105.

Mexico, Nova-Mexico.

Diplothrix juniperifolia DC. prodr. V, 612.

2. ḥ *acerosa* A. Gr. pl. Wright. I, 106. 107.

Nova-Mexico.

Diplothrix acerosa DC. prodr. V, 612.

XXX. *Hemizonia* DC.

(ἡμισζονος, semicinctus, halb umgeben, alludit ad achenia phyllis anth. semicincta.)

1. ḥ *alipes* H. et Arn. bot. of Beech. voy. suppl. 356.

California.

2. ḥ *macradenia* DC. prodr. V, 693.

California.

XXXI. *Gutierrezia* (nec *Guttierrezia* et *Guttierrhezia*) Lag.

(origine mihi dubia; an a viro hispano derivanda?)

1. ḥ *divaricata* T. et Gr. fl. of N. Amer. II, 194.

Amer. bor. occid.

XXXII. *Bahia* (Lag.) DC.

(origine mihi plana dubia.)

1. ḥ *artemisiaefolia* Less. in Linn. V, 160.

California.

β) *stoechadifolia* β. *californica* DC. prodr. V, 656.

2. ḥ *confertiflora* DC. prodr. V, 657.

California.

3. ḥ *trifida* Nutt. in transact. amer. phil. soc. n. ser. VII, 37.

California.

4. ḥ *achilleoides* DC. prodr. V, 637.

California.

XXXIII. *Porophyllum* Vaill.

(πορος, foramen, Loch, et πολλων, folium, Blatt, ob folia pellucido-punctata.)

1. ḥ *Cusimbua* DC. prodr. V, 650.

Nepalia.

Cacalia Cusimbua Don prodr. fl. nepal. 179.

Kleinia Cusimbua Less. in Linn. 1831, 133.

Trib. 8. *Heliantheae* (Clinanth. paleaceum; Styli rami penicillati; Pappus nullus, coroniformis aut aristatus.)

XXXIV. *Lipochaete* DC.

(λειπαιεν, inopia laborare. Mangel haben et χαιτη, pilus, Haar h. l. Borste der Haarkrone.)

1. ḥ *texana* T., et Gr. fl. of N. Amer. II, 357.

Texas.

XXXV. *Xizmenia* Lall. et Lex.

(transmutatione literarum verbi *Ximenesia* [generis proximi]; sed *Ximenes* exeunte saeculo XVIII pharmacopola, qui *Castulonis* floram conficere aggressus est 4 voluminibus.)

1. ḥ *brevifolia* A. Gr. pl. Wright. I, 112.

Nova-Mexico.

Trib. 9. *Melampodiaceae* (Flores omnes unisexuales, Pappus nunquam setosus aut nullus).

XXXVI. Iva L.

(i. e. Abiga, planta medicinalis apud Latinos graveolens, sine dubio, Ajuga Iva L.)

- * 1. *h. frutescens* L. cod. Nro. 7164. Lam. ill. d. gener. t. 166. f. 2. Amer. foed. occid.

XXXVII. Picrothamnus Nutt.

(πικρος, amarus, bitter et θάμνος, virgultum, Gestraeuch.)

1. 5 desertorum Nutt. in transact. of the am. phil. soc. n. ser. VII, 417. Amer. foed. occid.

XXXVIII. Hymenoclea T. et Gr.

(ἄμην, membrana, Haut et κλειν, claudere, schliessen.)

1. 5 Salsola T. et Gr. in Emor. repos. 143. pl. Fremont. 14. t. 8. Texas, California.
2. 5 monogyra T. et Gr. pl. Fendl. 79. Nova-Mexico.

XXXIX. Berlandiera DC.

(Berlandier plagas mexicanas permigravit et monographiae Grossulariacearum autor.)

- * 1. *h. texana* DC. prodr. V, 517. Texas.

XL. Franseria Cav.

(D. Ant. Franzer, medicus-Madritensis exeunte saeculo XVIII et Cavanillesii amicus.)

1. *h. tenuifolia* Harv. et Gr. pl. Fendler 80. Nova-Mexico.
β) *tripinnatifida* Gr. pl. Lindheim. II, 227.
Ambrosia fruticosa DC. prodr. V, 525 (teste A. Gr.)
- confertiflora DC. prodr. V, 526 (teste A. Gr.)
γ) *latisecta* A. Gr. pl. Wright. I, 104.
2. *h. deltoidea* Torr. in pl. Fremont. 15. California.
3. *h. dumosa* Torr. et Freym. in rapp. s. l. voy. d'explor. de Frem. 317. California.
4. 5 *albicaulis* Torr. in pl. Fremont. 16. California.

XLI. Melampodium Cav.

(μελαμπόδιον, a. v. μελας, niger, schwarz et ποός, pes, Fuss, apud Veteres radix nigra Hellebori.)

1. *h. leucanthum* T. et Gr. fl. of N. Amer. II, 271. Texas.

B. *Antherae basi appendiculatae.*

Trib. 10. *Inuleae* (Calath. radiata aut discoidea homogama; Styli rami pubescentes).

XLII. Varthemia DC.

(Lud. de Varthemus ineunte saeculo decimo sexto Orientem fere totum peragravit.)

1. *h. persica* DC. prodr. V, 473. Persia.

Trib. 11. *Gnaphalieae* (Calathia discoidea, saepe heterogama et pauciflora).

XLIII. Blumea DC.

(C. L. Blume, professor botanices Lugduni Batavorum, per multos annos Javam permigr.)

1. 5 *Arnottiana* H. et Aru. bot. of Beech voy. 195. China.
chinensis DC. prodr. VII, 283 (nec V, 444).
? *Baccharis chinensis* Lour. fl. cochinch. 604.

XLIV. Tessaria R. et P.

(L. Tessari, exeunte saeculo XVIII professor historiae naturalis et botanices Anconensis, libros de materia medica et chemia scripsit.)

1. 5 *borealis* T. et Gr. in Emory repos. 143. Nova-Mexico.
Polypappus sericeus Nutt. pl. Gamb. in journ. acad. Philad. (n. ser.) I, 178.

XLV. Helichrysum (L.) DC.

(ἑλικρύσσος, an a v. ἐλισσαιεν, nectere, winden, et χρύσσος, aurum, Gold? Apud Veteres H. Stoechas DC.)

1. *h* caespitosum DC. prodr. VI, 182. Gallia, Italia, Libya.
 conglobatum Steud. nomencl. bot. ed. 2. I, 738.
 elegans Presl. fl. sic. I, p. XXIX.
 Gnaphalium caespitosum Presl. del. Prag. 98. neo Lam.
 - conglobalum Viv. fl. Lib. spec.
 - siculum Spreng. syst. veget. III, 476.
 β) corymbo compacto; Gnaph. microphyllum Ten. append. ad fl. neap. V, 28.
 γ) longifolium Guss. syn. fl. sic. II, I, 468.
2. *h* Nebrodense Heldr. ann. degli Asp. Natur. I, 286. Guss.
 syn. fl. sic. II, I, 466. Sicilia.
3. *h* Panormitanum Tin. in Guss. syn. fl. sic. II, I, 467. Sicilia.
4. *h* stramineum Guss. syn. fl. sic. II, I, 467. Cup. panph. sic. II, t. 239. Sicilia.
5. *h* pendulum Presl. fl. sic. I, XXIX, Guss. syn. fl. sic. II, I, 467. Sicilia.
6. *h* serotinum Boiss. voy. d. le mid. de l'Esp. 328. Gallia et Hispania austr.
7. *h* angustifolium DC. prodr. VI, 183. Barr. ic. pl. t. 1125. Europa australls,
 italicum Guss. syn. fl. sic. II, I, 469. Oriens.
 Gnaphalium italicum Roth catal. bot. I, 115.
 - rosmarinifolium Lois. fl. gall. II, 224. Salzm. in Flora IV, 111.
 - siculum Tin. cat. pl. hort. Panorm. 278.
 - Stoechas S. et Sm. fl. gr. t. 837 (teste Guss.).
8. *h* microphyllum Cambess. in mém. du Mus. d'hist. nat.
 XIV, 272. Ins. balear. Sardinia,
 Creta.
9. *h* rupestre DC. prodr. VI, 182. Italia inferior, Sardinia
 Gnaphalium glutinosum Ten. cat. sem. hort. Neap. 1830, p. 14. ins. balearicae,
 - rupestre Rafin. prec. d. decouv. et Trav. semiolog. 14. nec Pourr.
 β) Folia supra glabriuscula; Gnaph. Stoechas β. inodorum
 Dsf. fl. atl. II, 266.
 γ) - supratomentosa; Gnaph. Fontanesii Camb. in mém. du Mus. XIV, 270.
10. *h* Stoechas DC. fl. franç. éd. 3. IV, 132. Europa australis,
 Gnaphalium citrinum Lam. fl. franç. II, 62. Africa borealis.
 - Stoechas L. cod. Nro. 6157. Barr. icon. t. 278. 409 et 410.
11. *h* littóreum Guss. syn. fl. sic. II, I, 468. Europa australis.
 Gnaphalium angustifolium Lam. enc. méth. II, 746.
12. *h* Errerae Tin. pl. rar. Sicil. 27. Sicilia.

Subfam. 3. Labiatiflorae.

XLVI. Leucómeris Don.

(λευκος, albus, weiss et μέρος, pars, Theil, ob folia subtus cano-tomentosa.)

1. 5 spectabilis Don prodr. fl. nepal. 170. Nepal, Himalaya.
 Gochnatia spectabilis Less. in Linn. V, 261.

XLVII. Moquinia DC.

(Moquin-Tandon, cl. autor monographiae Chenopodiacearum et Parisiis academiae socius.)

1. 5 eriosematoides Walp. repert. bot. syst. 679. China.
 Vernonia eriosematoides Walp. in nov. ac. Leop. Caes. XIX, suppl. I, 254.

Subfam. 4. Cichoraceae.

XLVIII. Sonchus L.

(σonχος, apud Veteres Sonchi species.)

1. 5 spinosus DC. prodr. VI, 189. Park. theatr. 804. t. 7. Ins. canar. Hispania,
 Lactuca spinosa Lam. enc. méth. III, 408. Africa borealis,
 Prenanthes spinosa Forsk. fl. aeg. arab. 144. Arabia Persia.
 Phoenicopus (male Phoenixopus) spinosus Cass. in dict. d.
 sc. nat. XLVIII, 426.

INDEX.

- Absinthium arborescens** Bess. XXVI, 37.
argenteum Bess. XXVI, 36.
grandiflorum Bess. XXVI, 39.
 Moxa Bess. XXVI, 38.
Achillea pauciflora Willd. XXIV, 3.
Ambrosia consertiflora DC. XL, 1 β.
fruticosa DC. XL, 1 β.
Amphipappus T. et Gr. XV.
Fremontii T. et Gr. 1.
Anthemis artemisiaefolia Willd. XXIII, 2.
grandiflora Ramat. XXIII, 2.
stipulacea Moench XXIII, 2.
Aplopappus v. *Haplopappus*.
Artemisia L. XXVI.
abrotanoides Nutt. 34.
Abrotanum L. 25.
Adamsii Bess. 30.
americana Bess. 5 γ.
aragonensis Lam. 15.
arborescens L. 37.
Arbuscula Nutt. 21.
arenaria DC. 8.
 - β. et γ. DC. 7.
argentea l'Her. 36.
Barrelieri Bess. 14.
californica Less. 34.
campestris var. *glutinosa* Ten. 3.
cana Pursh 19.
coerulescens L. 16.
Columbiensis Nutt. 19.
Contra L. 17.
Czernijeviana Bess. 9.
dasyantha Schrenk 32 β.
Fischeriana Bess. 35.
fragrans Eichw. 17.
glabella Kar. et Kir. 31.
glutinosa Gay 3.
grandiflora Bieb. 39.
Helodendron Turcz. 11.
Herba alba Ass. 15.
hispanica Lam. 23.
judaica L. 27.
Jussiaeana Gay 2.
Koelreuteriana Bess. 10.
Kruhsiana Bess. 28.
lanata Lam. 1.
Lindleyana Bess. 33.
 Moxa DC. 38.
neapolitana Ten. 5.
obtusiloba β. *glabra* Led. 31.
pauciflora Bieb. 8.
 - β. et γ. Bess. 7.
procera Willd. 24.
pycnocephala DC. 13.
rigida Nutt. 22 β.
rubella Moench 16 β.
Artemisia rutaefolia Steph. 29.
saligna Ten. 5 β.
salsoloides Willd. 6.
Santonica Lam. 16 γ.
Sieberi Bess. 17.
Sipontina Ten. 16 γ.
songarica Schrenk 12.
Trautvetteriana Bess. 7.
tridentata Nutt. 20.
trifida Nutt. 22.
Tschernijeviana Bess. 9.
Turczinanowiana Bess. 32.
Valentina Willd. 15.
variabilis Ten. 5.
 - β. *canescens* DC. 1.
vestita Wall. 26.
Aster L. XXI.
ignoratus Kth et Bouché 3.
tomentellus H. et Arn. 2.
Wrightii A. Gr. 1.
Atractylis rigida Poir. II, 1.
Baccharis L. XII.
angustifolia Mich. 5.
brachyphylla A. Gr. 6.
chinensis Lour. XLIII, 1.
consanguinea DC. 4.
cuneifolia Moench 7.
glomeruliflora Pers. 1.
hallimifolia L. 7.
salicina (*salicifolia*) Nutt. T. et Gr. 2.
sessiliflora Mich. 1.
viminea DC. 3.
Bahia (Lag.) DC. XXXII.
achilleoides DC. 4.
artemisiaefolia Less. 1.
confertiflora DC. 2.
stoechadifolia β. *californica* DC. 1 β.
trifida Nutt. 3.
Barbellina sericea Cass. V, 4.
Berlandiera DC. XXXIX.
texana DC. 1.
Bigelovia dracunculoides DC. XIII, 7.
Miasuriensis DC. XIII, 7 β.
Blumea DC. XLIII.
Arnottiana H. et Arn. 1.
chinensis DC. 1.
Borrichia Adans. VII.
arborescens DC. 2.
frutescens DC. 1.
Brickellia (Ell.) A. Gr. X.
californica A. Gr. 4.
Coulteri A. Gr. 3.
laciniata A. Gr. 2.
Riddellii A. Gr. 1.
Wrightii A. Gr. 5.
Bulbostylis californica T. et Gr. X, 4.

- Buphthalmum arborescens* L. VII, 2.
frutescens L. VII, 1.
incanum Mill. diet. VII, 1.
Cacalia Cusimbua Don XXXIII, 1.
Calimeris (Callimeris) v. *Kalimeris*.
Carduus fruticosus Desf. II, 2.
Carthamus arborescens L. II, 1.
rigidus Willd. II, 1.
Centaurea L. I.
fruticosa L. V, 3.
horrida Bad. 2.
intybaea Lam. 3.
leucantha Pourr. 3 β.
sempervirens L. 4.
spinosa L. 1.
- Willd. 2.
Chamaepeuce fruticosa DC. III, 2.
mutica DC. III, 1.
polycephala DC. III, 3.
Cheirolophus lanceolatus Cass. I, 4.
pinnatifidus Cass. I, 3.
Chrysanthemum japonicum Thunb. XXIII, 1.
indicum L. XXII, 1.
- Thunb. XXIII, 2.
procumbens Lour. XXIII, 1.
purpureum Pers. XXIII, 1 β.
tripartitum Sweet XXIII, 1.
Chrysocoma dracunculoides Pursh XIII, 7.
graveoleas Nutt. 7.
- T. et Gr. XIII, 5.
nauseosa Pursh XIII, 7 β.
montana Vahl XIII, 1.
Chrysoma solidaginoides Nutt. XVI, 1.
Chrysothamnus dracunculoides Nutt. XIII, 7.
lanceolatus Nutt. XII, 6.
pulchellus A. Gr. XIII, 4.
speciosus Nutt. XIII, 7 β.
- β. *albicaulis* Nutt. XIII, 8.
Cineraria ambigua Biv. XXVII, 1.
bicolor Willd. XXVII, 2.
canadensis Ueria XXVII, 3.
candida Presl XXVII, 4.
ceratophylla Ten. XXVII, 5.
chinensis Spreng. XXVII, 6.
gibbosa Guss. XXVII, 3.
maritima L. XXVII, 5.
Nebrodensis Guss. XXVII, 4.
repanda Lour. XXVII, 6.
Cirsium gnaphaloides Spreng. III, 4.
Clavigeria dentata DC. X, 1.
Riddellii T. et Gr. X, 1.
Cnicus Chamaepeuce Desf. III, 1.
- Ten. III, 4.
fruticosus Desf. III, 2.
Conyza arborea Wall. VI, 1.
extensa Wall. VI, 3.
solidaginoides Wall. XXI, 3.
volkameriaefolia VI, 2.
Cyanus hastatus Mnoh I, 4.
Diomedea bidentata Cass. VII, 1.
glabrata Cass. VII, 2.
indentata H. B. et K. VII, 2.
Diplopappus (Cass.) DC. XIX.
baccharioides Benth. 1.
ericoides Less. XVIII, 1.
Duhaldea DC. XIV.
Duhaldea chinensis DC. 1.
Diplothrix acerosa DC. XXIX, 2.
juniperifolia DC. XXIX, 1.
Ericameria Nutt. XVIII.
laricifolia A. Gr. 4.
microphylla Nutt. 1.
nana Nutt. 2.
resinosa Nutt. 3.
Eupatorium L. XI.
agerataefolium DC. 3.
scandens L. VIII, 2.
solidaginifolium A. Gr. 2.
texense T. et Gr. 3 β.
Wrightii A. Gr. 1.
Franseria Cav. XL.
albicaulis Torr. 4.
deltoides Torr. 2.
dumosa Torr. et Freym. 3.
tenuifolia Harv. et Gr. 1.
Gnaphalium angustifolium Lam. XLV, 11.
caespitosum Presl XLV, 1.
citrinum Lam. XLV, 10.
Fontanesii Camb. XLV, 9 γ.
glutinosum Ten. XLV, 9.
italicum Roth XLV, 7.
microphyllum Ten. XLV, 1 β.
- Willd. XLV, 8.
rosmarinifolium Lois. XLV, 7.
rupestre Raf. XLV, 9.
siculum Spreng. XLV, 1.
- Tin. XLV, 1.
Stoechas L. XLV, 10.
- S. et Sm. XLV, 7.
- β. *inodorum* Desf. XLV, 9 β.
Gochnatia spectabilis Less. XLVI, 1.
Gutierrezia Lag. XXXI.
divaricata T. et Gr. 1.
Gymnosperma Less. XVII.
corymbosum DC. 1.
Haplopappus Cass. XX.
arenarius Benth. 3.
ericoides H. et Arn. XVIII, 1.
Menziesii T. et Gr. 5.
rubiginosus T. et Gr. 2.
sphaerocephalus A. Gr. 1.
tortifolius T. et Gr. 4.
Helichrysum (L.) DC. XLV.
angustifolium DC. 7.
caespitosum DC. 1.
elegans Presl 1.
Errerae Tin. 12.
italicum Guss. 7.
littoreum Guss. 11.
microphyllum Cambess. 8.
Nebrodense Heldr. 2.
Panormitanum Tin. 3.
pendulum Presl 5.
rupestre DC. 9.
serotinum Boiss. 6.
Stoechas DC. 10.
stramineum Guss. 4.
Hemizonia DC. XXX.
flipes H. et Arn. 1.
macradenia DC. 2.
Hirtellina lanceolata Cass. V, 3.
Hymenoclea T. et Gr. XXXVIII.

- Hymenoclea monogyra** T. et Gr. 2.
Salsola T. et Gr. 1.
Jacobaea tomentosa Moench XXVII, 5.
Isocoma vernonioides Nutt. XX, 5.
Iva L. XXXVI.
 frutescens L. 1.
Kalimeris Cass. XXII.
 alyssoides DC. 1.
Kentrophyllum Neck. II.
 arborescens Hook. II.
Kleinia Cusimbua Less. XXXIII, 1.
Lactuca spinosa Lam. XLVIII, 1.
Lagothermus ambiguus Nutt. XXVIII, 3 β.
 microphyllus Nutt. XXVIII, 3.
Leucomeris Don XLVI.
 spectabilis Don 1.
Liatris Schreb. IX.
 fruticosa Nutt. 1.
Linosyris Cass. XIII.
 albicaulis T. et Gr. 8.
 graveolens T. et Gr. 7.
 heterophylla A. Gr. 2.
 lanceolata T. et Gr. 6.
 montana DC. 1.
 pluriflora T. et Gr. 5.
 Wrightii A. Gr. 3.
Lipochaete DC. XXXIV.
 texana T. et Gr. 1.
Melampodium Cav. XLI.
 leucanthum T. et Gr. 1.
Meronia Chamaepeuce Tem III, 4.
Mikania Willd. VIII.
 angulosa Raf. 2.
 clematidea Wall. 1.
 pubescens Muehb. 2 β.
 scandens Willd. 2.
Moquinia DC. XLVII.
 eriosematoides Walp. 1.
Oligosporus pycnocephalus Less. XXVI, 13.
Onobroma arborescens Spreng. II, 1.
Phoenicopus spinosus Cass. XLVIII, 1.
Picrothamnus Nutt. XXXVII.
 desertorum Nutt. 1.
Polypappus sericeus Nutt. XLIV, 1.
Porophyllum Vail. XXXIII.
 Cusimbua DC. 1.
Prenanthes spinosa Forsk. XLVIII, 1.
Pteronia Chamaepeuce Spreng. III, 1.
Ptilostemon Cass. III.
 appendiculatus Cass. 2.
 muticus Cass. 1.
Pyrethrum Gaertn. XXIII.
 chinense (sinense) Sab. 2.
 indicum Cass. 1.
Pyrrhcoma Menziesii H. et Arn. XX, 5.
Santolina L. XXV.
 canescens Lag. 8.
 Chamaecyparissus L. 1.
 elegans Boiss. 5.
 ericoides Poir. 1 β.
 incana Lam. 1.
 leucantha Bert. 4.
 pectinata Lag. 3.
Santolina planata Viv. 4.
 ptarmicoides Lam. 9 β.
 rosmarinifolia L. 7.
 squarrosa Willd. 1 β.
 tomentosa Pers. 1 γ.
 villosa Mill. 1 β.
 villosissima Poir. 1.
 viridis (virens Mill.) Willd. 3.
 viscosa Lag. 6.
Senecio L. XXVII.
 alpinus Ucr. 1.
 ambiguus DC. 1.
 Bulmalia Ham. 7.
 candidus DC. 4.
 chinensis DC. 6.
 Cineraria DC. 5.
 filifolius Nutt. 9.
 gibbosus DC. 3.
 Kunthianus Walp. 8.
 martianus Rohb. 5.
Serratula conica Lam. V, 2.
 dubia Brot. V, 2.
 fruticosa Lam. V, 3.
 rosmarinifolia Cass. V, 2.
Solidago L. XVI.
 pauciflosculosa Mich. 1.
Sonchus L. XLVIII.
 spinosus DC. 1.
Sphaeromeria argentea Nutt. XLIV, 2.
 capitata Nutt. XXIV, 1.
Stachelina L. V.
 arborescens L. 4.
 baetica DC. 1.
 dubia L. 2.
 Chamaepeuce L. III, 1.
 fruticosa L. 3.
 tenuifolia Presl 4.
Stechmannia DC. IV.
 Stachelinae DC. 1.
Tanacetum L. XXIV.
 capitatum T. et Gr. 1.
 Nuttallii T. et Gr. 2.
 VahlII DC. 3.
Tessaria R. et P. XLIV.
 borealis T. et Gr. 1.
Tetradymia DC. XXVIII.
 inermis Nutt. 1.
 Nuttallii T. et Gr. 2.
 spinosa H. et Arn. 3.
 - Nutt. 2.
Varthemia DC. XLII.
 persica DC. 1.
Vernonia Schreb. VI.
 arborea Ham. 1.
 eriosematoides Walp. XLVII, 1.
 extensa DC. 3.
 volkammeriaefolia DC. 2.
Zexmenia Lall. et Lex. XXXV.
 brevifolia A. Gr. 1.
Zinnia L. XXIX.
 acerosa A. Gr. 2.
 juniperifolia A. Gr. 1.

ORDO XVII.

Diplostemoneae.

Fam. 99. Vacciniaceae.

I. *Vaccinium* L.

(apud Latinos planta nobis dubia; an teste aliorum eadem planta ac βακκινός?)

A. Folia decidua; Flor. fascic. aut racem. Germ. pseudo-10 loc.

- | | | |
|-------|--|----------------------|
| 1. 5 | <i>vaccillans</i> Kalm in Herb. Banks; Torr. fl. of the st. of N. York I, 444.
<i>virgatum</i> Big. fl. Boston. 152.
<i>pensylvanicum</i> Torr. fl. of the st. of N. York I, 416. | America foed. bor. |
| 2. 5 | <i>tenuellum</i> Pursh fl. Amer. sept. I, 288. Wats. dendr. brit. t. 35.
? <i>ramulosum</i> et <i>humile</i> Willd. enum. pl. hort. Berol. suppl. 20. 21 (teste Guimp.). | America borealis. |
| 3. 5 | <i>corymbosum</i> L. cod. Nro. 2705. bot. mag. t. 3433.
<i>album</i> Lam. enc. méth. I, 73, nec L. et Pursh.
<i>disomorphum</i> Mich. fl. bor. amer. I, 231.
<i>formosum</i> Andr. bot. repos. t. 97.
<i>fuscatum</i> Ait. hort. Kew. II, 11. DC. prodr. VII, 572. | America borealis. |
| | β) <i>calyce reflexo</i> ; <i>amoenum</i> Ait. hort. Kew II, 12. bot. rep. t. 138. | |
| 4. 5 | <i>canadense</i> Kalm in Herb. Banks; bot. mag. t. 3446.
? <i>disomorphum</i> Bigel. fl. Bost. 151. | Canada. |
| 5. 5 | <i>elevatum</i> Banks et Sol. in vet. acad. Stockh. handl. 1822, 8.
<i>Picrococcus elevatus</i> Nutt. in transact. of the amer. phil. soc. n. ser. VIII, 262. | America foederata |
| 6. 5 | <i>stamineum</i> L. cod. Nro. 2701.
<i>Picrococcus stamineus</i> Nutt. in transact. of the am. phil. soc. n. ser. VIII, 262. | America borealis. |
| | β) <i>Folia obovata</i> , subt. pubescentia; <i>album</i> Pursh fl. Amer. sept. I, 28. | |
| 7. 5 | <i>virgatum</i> Ait. hort. Kew. II, 12. bot. mag. t. 3433.
<i>corymbosum</i> β. <i>virgatum</i> Don dichlam. pl. III, 854.
β) <i>angustifolium</i> Wats. dendr. brit. t. 34. bot. mag. t. 3522.
<i>fuscatum</i> β. <i>angustifolium</i> Push Amer. sept. I, 287. | America foederata. |
| 8. 5 | <i>floridanum</i> Schwein. in transact. of the amer. phil. soc. n. ser. VIII, 262.
<i>Picrococcus floridanus</i> Nutt. in transact. of the amer. phil. soc. n. ser. VIII, 262. | America foed. austr. |
| 9. 5 | <i>arborescens</i> Mich. fl. bor. amer. I, 230.
<i>Bakodendron arborescens</i> Nutt. in transact. of the amer. phil. soc. n. ser. VIII, 261.
β) <i>diffusum</i> Ait. hort. Kew. II, 11; bot. mag. t. 1607. | America foed. austr. |
| 10. 5 | <i>pallidum</i> Ait. hort. Kew. II, 10. | America borealis. |
| 11. 5 | <i>albiflorum</i> Hook. bot. mag. t. 3428. | America borealis. |
| 12. 5 | <i>Marianum</i> (marilandicum Hort.) Wats. dendr. brit. t. 123. | America borealis. |
| 13. 5 | <i>grandiflorum</i> Wats. dendr. brit. t. 125 A. | America borealis. |
| 14. 5 | <i>elongatum</i> Wats. dendr. brit. t. 125 B. | America borealis. |

15. 5 minutiflorum (nec multiflorum DC. et Klotzsch) Wats.
dendr. brit. t. 125 C. America borealis.
16. 5 glabrum Wats. dendr. brit. t. 125 D. America borealis.
17. 5 ligustrinum Mich. fl. bor. amer. I, 283. America borealis.
18. 5 galezans (galegiformis Smith) Mich. fl. bor. amer. I, 283. America foed. bor.
19. 5 tenellum Ait. hort. Kew. II, 12. America foed. bor.
20. 5 Constablaei A. Gr. in Hook. Lond. journ. III, 233. America foed. bor.
21. 5 bracteatum Thunb. fl. jap. 156. Japonia.
22. 5 ciliatum Thunb. fl. jap. 156. Japonia.
- B. Germ. pseudo-10 loc.; Flor. racemosi; Folia persistentia.
23. h Myrsinites fl. bor. amer. I, 233. America foed. austr.
β) Fol. lanceolata et subrotundo-ovata Pursh fl. Amer. sept. I, 290.
24. 5 chinense Champ. in journ. of bot. a. Kew. gd. misc. IV, 297. China.
- C. Germ. 5-loculare; Flor. racemosi, raro solitarii; Folia decidua.
25. 5 Arcostaphylos L. cod. Nro. 2708. Oriens borealis.
? Maderense Gu. et H. Abbild. fr. Holzart. 39. t. 33.
- D. Germ. 5-loculare; Flores racemosi; Folia persistentia.
- * 26. h Vitis idaea L. cod. Nro. 2709. bot. cab. t. 1023. Europa, Caucasus,
punctatum Lam. enc. meth. I, 74. Sibiria, America arctica.
Vitis-idaea punctata Moench meth. 47.
27. h intermedium Ruthe Fl. d. Mark Brandenb. 377. t. 1. Germania bor. orient.
28. h myrtifolium Mich. fl. bor. amer. I, 229. America foed. austr.
carnosum Pers. syn. pl. I, 479.
crassifolium Andr. bot. repos. t. 105. bot. mag. t. 1152.
Andromeda luridifolia Gawl. rec. pl. 24.
Metagonia myrtifolia Nutt. in transact. of the am. phil. soc. n. ser. VIII, 265.
- * 29. 5 ovatum Pursh fl. Amer. sept. I, 290; bot. mag. t. 4732. America occid. boreal.,
Metagonia ovata Nutt. in transact. of the amer. phil. soc. n. California.
ser. VIII, 265.
β) lanceplatum Don in DC. prodr. VII, 571.
- * 30. h nitidum Pndr. in bot. repos. t. 440. bot. mag. t. 1550. America foed. austr.
31. 5 obtusum Pursh fl. Amer. septentr. I, 290. America bor. occid.
- E. Germ. 5-loculare; Flores solitarii, geminive; Folia decidua.
- * 32. h Myrtillus L. cod. Nro. 2700. Europa, Caucasus,
Vitis-idaea Myrtillus Moench meth. 47. Sibiria, ins. oceani
β) Baccae albae globosae aut pyriformes. orientalis arct.
33. h Chamissonis Bong. in mém. de l'acad. d. sc. de St. Pé. II, 151. Ins. oceani orient.
? Myrtillus Ch. et Schlecht. in Linn. I, 525. arcticae.
34. 5 ovalifolium Smith in Rees cyclop.; Don dichl. pl. III, 852. America arctica.
35. 5 parvifolium Smith in Rees cyclop.; Hook fl. bor. am. II, t. 127. America arctica.
36. h salicinum Ch. et Schlecht. in Linn. I, 525 (an idem ac pl. Lodd.?). Ins. oceani orient.
? salicifolium Steud. nomencl. bot. ed. 2. II, 740. arcticae.
37. h caespitosum Mich. fl. bor. amer. I, 234. bot. mag. t. 3429. America brit. et ross.
β) cuneifolium Nutt. in transact. of the am. phil. soc. n. ser. VIII, 263.
38. h humifusum Grah. in Edinb. philos. journ. 1831. p. 8. America boreali-occid.
39. 5 h myrtilloides Mich. fl. bor. amer. I, 234; bot. mag. t. 3447. America britannica.
angustifolium Ait. hort. Kew. II, 11. nec Wats.
β) macrophyllum; Myrtillus var. Smith in Rees cyclop.
γ) rigidum Hook. fl. bor. amer. II, 32.
40. h mucronatum L. cod. Nro. 2704. America britannica.
41. h praestans Lamb. in transact. of the Linn. soc. X, 264. t. 10. Camtschatka.
- * 42. h uliginosum L. cod. Nro. 2702. Europa, Sibiria,
rubrum Gilib. fl. lith. I, 4. America borealis.
gualtherioides Bigel. New-Engl. med. journ. V, 395.
Sedenense Pers. syn. pl. I, 478.
β) pubescens Wormsk. fl. dan. t. 1516.
43. h hirtum Thunb. fl. japon. 155. Japonia.
- Not. Species hortorum in G. Don dichlamydeous plants et in Stuedeli nomenclatore II, 739 et 740 enumeratae: 1) hallerifolium; 2) lucidum; 3) prunifolium; 4) rugosum et 5) sibiricum sunt mihi plane incognitae.

II. *Chiógenes* Salisb.(i. e. *nivis filia*, a. voc. χιών, nix, Schnee, et γένεσις, nasci, entstehen.)

1. *hispídula* T. et Gr. in Torr. fl. of the st. of N. York. I, 450. t. 68. America borealis.
serpyllifolia Salisb. in transact. of the hort. soc. II, 94.
Arbutus filiformis Lam. enc. méth. I, 228.
- *thymifolia* Ait. hort. Kew. II, 72.
Gaultheria hispidula Muehlb. cat. pl. Amer. sept. 44.
- *serpyllifolia* Pursh fl. Amer. sept. I, 283. t. 13.
Lasierpa hispidula Torr. in geol. rep. of N. York 1840, p. 152.
Phaleroocarpus serpyllifolia G. Don dichl. pl. III, 841.
Oxycoccus hispidulus Pers. syn. pl. I, 419.
Vaccinium hispidulum L. cod. Nro. 2711.

III. *Oxycoccus* Pers.

(ὄξυς, acidus, sauer, scharf, et κοκκός, bacca, Beere.)

- * 1. *h. palustris* Pers. syn. pl. I, 419. Europa, Sibiria,
europaeus Nutt. gen. of N. Amer. pl. I, 251. America borealis.
vulgaris Pursh fl. Amer. septentr. I, 263.
Schollera Oxycoccus Roth tent. fl. german. I, 170.
- *paludosa* Baumg. fl. transsylv. I, 331.
Vaccinium Oxycoccus L. cod. Nro. 2710.
2. *h. macrocarpus* Wats. dendr. brit. t. 122. America borealis.
palustris β. *macrocarpus* Pers. syn. pl. I, 419.
Schollera macrocarpa Roth (ubinam? teste Steud. nom. bot. ed. 2. II, 534).
Vaccinium hispidulum Wengen. Beitr. z. Forstw. amer.
Geh. 108. t. 30. f. 67.
- *macrocarpum* Ait. hort. Kew II, 13. t. 7; bot. mag. t. 25.
- *Oxycoccus* β. *oblongifolium* Mich. fl. bor. amer. I, 228.
- *oblongifolium* Hort.
3. *h. erythrocarpus* Pers. syn. pl. I, 419. America foederata.
erectus Pursh fl. Amer. sept. I, 264. Wats. dendr. brit. t. 31.
Schollera erythrocarpa Roth (ubinam? teste Steud. nom. bot. ed. 2. II, 534).
Vaccinium erythrocarpum Mich. fl. bor. amer. I, 227.

IV. *Gallussacis* H. B. K.

(Gay-Lussac, chemiae professor Parisiensis, † 1850.)

1. *h. hirtella* T. et Gr. in Torr. fl. of the st. of N. York I, 448. America foederata.
dumosa Torr. fl. of the st. of N. York I, t. 67.
Decamerion hirtellum Nutt. in transact. of the am. phil. soc. n. ser. VIII, 260.
Vaccinium hirtellum Ait. hort. Kew ed. 2. II, 357.
β) *dumosa* A. Gr. chlor. bor. amer. 50.
Decamerion dumosum Nutt. in transact. of the am. phil. soc. n. ser. VIII, 260.
Vaccinium dumosum Andr. in bot. rep. t. 112. bot. mag. t. 1106.
- γ) *humilis* Wats. dendrol. brit. t. 32 (sub *Vaccinio*).
2. 5 *frondosa* T. et Gr. in Torr. fl. of the st. of N. York I, 449. America foederata.
Decamerion frondosum Nutt. in transact. of the am. phil. soc. n. ser. VIII, 260.
Vaccinium decamerocarpum Dun. in DC. prodr. VII, 566.
- *glaucum* Mich. fl. bor. amer. I, 231.
- *frondosum* L. cod. Nro. 2706.
- *venustum* Ait. hort. Kew. II, 11.
3. 5 *resinosa* T. et Gr. in Torr. fl. of N. York I, 449. America borealis.
Andromeda baccata Wengen. Beitr. z. Forstw. 111. t. 30. f. 69.
Decamerion resinosum Nutt. in transact. of the am. phil. soc. n. ser. VIII, 260.
Vaccinium parviflorum Andr. bot. repos. 125.
- *resinosum* Ait. hort. Kew. II, 12; bot. mag. t. 1288.
4. 5 *ursina* A. Gr. in chlor. bor. amer. 49. t. 10. America foederata.
Vaccinium ursinum Curt. in Sillim. journ. XLIV, 82.
5. *h. brachycera* A. Gr. chlor. bor. amer. 54. America foederata
Vaccinium brachycerum Mich. fl. bor. amer. I, 234. bor. et média.
- *buxifolium* Salisb. parad. Londin. t. 4.

V. *Agapétes* D. Don. (an idem genus ac *Acosta* Lour.?).

(ἀγαπητός, singularis, vorzueglich, einzig.)

1. 5 *venosa* Wight ic. pl. Ind. orient. IV, t. 1185 (sub *Vaccinio*). Himalaya (Bhotan).
Epigynium venosum Klotzsch in Linn. XXIV, 49.

2. 5 *Dunaliana* Wight ic. pl. Ind. orient. IV, t. 1194 (sub *Vaccinio*). Himalaya (Bhotan).
Epigynium Dunalianum Klotzsch in Linn. XXIV, 49.

VI. *Acosta* Lour.

(*Christophorus Acosta, chirurgus lusitanicus. Indiam orientalem permigravit et de medicamentis indicis a. 1578 disseruit; in urbe hispanica Burgos monachus exeunte saeculo XVI mortuus est.*)

1. 5 *spicata* Lour. fl. cochinch. I, 338. China, Cochinchina.
Agapetes Acosta DC. prodr. VII, 556.
Gaultheria Acosta Steud. nomencl. bot. 2. edit. I, 665.
Vaccinium Acosta Raeusch. nomencl. 109.
 - orientale Swartz in Spreng. syst. veget. II, 212.
 - *spicatum* Poir. in enc. méth. suppl. I, 280.

VII. *Pentasterygia* Klotzsch.

(*πεντα, quinque, fuerit, et πτερύξ, ala, Fluegel, ob germen 5-alatum.*)

1. 5 *serpens* Klotzsch in Linn. XXIV, 47. Himalaya (Bhotan).
Vaccinium serpens Wight ic. pl. Ind. orient. IV, t. 1183.

Fam. 100. Ericaceae.

Trib. 1. Euericeae (Cor. marcescens; Caps. loculicide dehiscens).

VIII. *Calluna* Salisb.

(*καλλυνετι, mundare, reiaigen, quia herba passim scopis utuntur.*)

- * 1. *h vulgaris* Salisb. in transcript. of the Linn. soc. VI, 317. Europa, Africa borealis,
Erica DC. fl. franç. III, 690. Pontus, Terra nova,
Erica vulgaris L. cod. Nro. 2712 et 2772. montes Uralenses.
 * β) flore albo, coccineo, purpureo, atrorubente et pleno.
 * γ) foliis aureo- et argenteo-variegatis.
 * δ) decumbens Loud. arbor. et frut. brit. II, 1084.
 ε) serotina Loud. arbor. et frutic. brit. II, 1084.
 ζ) tomentosa; ciliaris Huds. fl. angl. ed. 1. 144.

IX. *Pentapera* Klotzsch.

(*πεντα, quinque, fuerit, et πηρα, pera, Tasche, ob germen 5-loc.*)

1. *h sicula* Klotzsch in Linn. XII, 497. Sicilia.
Erica sicula Guss. prodr. fl. sic. I, 463.

X. *Bruckenthalia* Rehb.

(*Samuelis et Michaelis a Bruckenthal, comites Saxonicae nationis in Transsylvania, prior gubernator ineunte hoc saeculo.*)

1. *h spiculiflora* Rehb. fl. Germ. exc. 414. Transsylvania, Turcia
Erica Bruckenthalii Spreng. n. Entd. im ganz. d. Pfl.-K. I, 271. europaea, Graecia,
 - *spiculiflora* Salisb. in transcript. of the Linn. soc. VI, Asia minor.
 324. fl. gr. t. 354.
 - *transylvanica* Willd. (ubinam? teste Steud. nomencl. bot. ed. 2. I, 230).
Menziesia Bruckenthalii Baumg. fl. transsyly. I, 333.

XI. *Erica* L.

(*ἐριζα, apud Veteres Erica arborea; vox a v. ἐριζειν, frangere, brechen, derivanda dicitur, quia herba Veterum opinione lapides vesicales frangit.*)

A. Flores umbellati aut capitati; Stamina inclusa.

- * 1. *h Tétralix* L. cod. Nro. 2728 et 2770. Europa occidentalis,
 botuliformis Salisb. prodr. stirp. hort. Chap. Allert. 369. Germania.
 β) flore albo, carneo et rubro.
 γ) *Martinesii* Lag. in DC, prodr. VII, 665.
 * 2. *h Mackayi* (Mackiana Bab.) Hook. in comp. bot. mag. I, 159. Hibernia.
Tétralix 4. Mackayana Loud. arbor. et frut. II, 1079.
 * 3. *h stricta* Donn hort. Cantabr. ed. 3. 69. Andr. heath. t. 92. Hispania, ? Hibernia,
 corsica DC. fl. franç. III, 677. ic. pl. rar. t. 17. Corsica, Sardinia,
 multicaulis Salisb. prodr. stirp. hort. Chap. Allert. 369. Syria.
 pendula Wendl. Eric. icon. et descr. fasc. 10.
 ramulosa Viv. ann. bot. I, 2. 169; fl. ital. fragm. I, t. 7.

4. *h. australis* L. cod. Nro. 2741. bot. cab. t. 1472. Hispania, Gallia,
pistillaris Salisb. in transcript. of the Linn. soc. VI, 368. Africa borealis.
5. *h. umbellata* L. cod. Nro. 2766 et 2774. bot. cab. t. 1217. Hispania Africa boreal
lentiformis Salisb. prodr. stirp. hort. Chap. Allert. 344.
Gypsocallis umbellata Don in Edinb. n. philos. journ. XVII, 153.
- B. Flores 1—3, terminales, paniculati; Stamina inclusa.
6. 5 *lusitanica* Rudolphi in Schrad. Journ. f. d. Bot. 1799. II, 286. Peninsula pyrenaica,
Actaea, strigosa et tenuis Hort. Gallia australis.
arborea Thore chlor. du départ. d. Land. 149.
codonodes Lindl. in bot. reg. t. 1698.
polytrichifolia Salisb. in transcript. of the Linn. soc. VI, 329.
- * 7. 5 *arborea* L. cod. Nro. 2725 et 2780. S. et Sm. fl. gr. t. 351. Europa australis,
caffra L. dissert. Nro. 22. Africa borealis.
procera Salisb. in transcript. of the Linn. soc. VI, 328. Ins. canar., Madeira.
scoparia Wuff. in Roem. Arch. III, 359.
triflora Berg. descr. pl. ex cap. Bonae. sp. 118. et Hfmsgg fl. portus I, 411.
a) elata Lk. et Hfmsgg fl. portug. I, 411.
stylosa Rudolphi in Schrad. Journ. f. Bot. 1800. II, 228.
y) minima Hort. in G. Don dichl. pl. III, 794.
b) squarrosa Hort. in G. Don dichl. pl. III, 794.
- * 8. *h. cinerea* L. cod. Nro. 2739 et 2775; bot. cab. t. 1469 et 1505. Europa occidentalis,
humilis Neck. del. gallo-belg. sylv. 182. Madeira.
mutabilis Salisb. prodr. stirp. hort. Chap. Allert. 369.
viridii-purpureo Gouan hort. Monspel 195. ? L. cod. Nro. 2720 et 2778.
a) flore albo, atropurpurea, carnescente et pallido Lodd. bot. cab. t. 1409 et 1507.
y) Maderepsis DC. prodr. VII, 166.
- C. Flores spicati aut racemosi; Antherae inclusae.
- * 9. *h. scoparia* L. cod. Nro. 2725 et 2776. Europa austro-occid.,
absinthioides Spreng. syst. veget. II, 196. Corsica, Sardinia,
fucata Thunb. diss. de Eric. Nro. 9. Wendl. Eric. ic. fasc. XV. Africa bor.-occidental.
virgulata Wendl. Eric. ic. et descr. fasc. XXI.
a) stigmata longe exserto, DC. prodr. VII, 692.
y) minima G. Don dichl. pl. III, 798.
- * 10. *h. ciliaris* L. cod. Nro. 2750 et 2780. bot. mag. t. 484. Europa austro-occid.,
a) Watsoni Benth in DC. prodr. VII, 665. Africa bor.-occidental.
- D. Flores spicati aut racemosi; Antherae exsertae.
- * 11. *h. carnea* L. cod. Nro. 2801. Jacq. fl. austr. t. 31. Alpes Europae mediae.
bracteata Moench meth. 50.
herbacea L. cod. Nro. 2769 et 2802 (planta autumnu florens).
saxatilis Salisb. in transcript. of the Linn. soc. VI, 343.
Gypsocallis carnea D. Don in Edinb. n. phil. journ. XVII, 153.
- * 12. *h. mediterranea* L. cod. Nro. 2771. bot. mag. 471. Europa australis.
carnea β . mediterranea DC. prodr. VII, 614.
lúgubris Salisb. in transcript. of the Linn. soc. VI, 343.
Gypsocallis mediterranea D. Don in Edinb. n. phil. joarn. XVII, 153.
13. *h. purpurascens* Tausch in Flora XXII, 80. ? L. cod. Nro. 2781. Europa australis.
14. *h. verticillata* Forsk. fl. aeg. arab. XXV. Europa austro-orient.,
anthura Link in bot. Zeit. III, 87. Oriens.
cretica Tausch in Flora XXII, 604.
Forskohlii Vitm. summ. veget. II, 414.
manipuliflora Salisb. in transcript. of the Linn. soc. VI, 344. fl. gr. t. 352.
mediterranea Wahlb. in Berggr. Resa II, Bihang; Vis. stirp. dalmat. 34.
vagans Benth. in DC. prodr. VII, 667 (ex p.) Koch syn. fl. Germ. II, 548.
Gypsocallis manipuliflora D. Don in Edinb. n. philos. journ. XVII, 153.
- * 15. *h. multiflora* L. cod. Nro. 2770 et 2804. bot. cab. t. 1572. Gallia, Hispania,
dianthera Moench meth. 50. Italia, Africa orientalis.
peduncularis (pedunculata Guss.) Presl del. Prag. 89.
umbellifera Lois fl. gall. I, 276.
vagans DC. fl. franc. III, 679.
Gypsocallis multiflora D. Don in Edinb. n. phil. journ. 153.
a) parviflora Gus. prodr. fl. sic. I, 447.
y) pubescens Guss. prodr. fl. sic. I, 447.
- * 16. *h. vagans* L. cod. Nro. 2768. Europa occidentalis.

- decipiens St. Amand. fl. Agen. 150.
 didyma Stokes in With. bot. arrang. of the veg. nat. grow. in Gr. Brit. 2. ed. 400.
 multiflora Huds. fl. angl. 166. DC. fl. franç. V, 430.
 vaga Salisb. in transcript. of the Linn. soc. VI, 344.
 Gypsocallis vagans Salisb. in Edinb. new phil. journ. XVII, 153.
 β) flore albo, pallido et atropurpureo.
 γ) purpurascens Lam. enc. méth. I, 488.
 pallide purpurea L. sp. pl. 354.
 Gypsocallis purpurascens D. Don in Edinb. n. phil. journ. XVII, 153.

Trib. 2. Arbuteeae (Corolla tubulosa; Bacca).

XII. *Arbutus* L.

(apud Latinos jam *Arbutus* Unedo; e vocibus celticis ar, rauh, herbe, et butus, arbustum, Gestraeuch derivanda dicitur.)

- * 1. 5 *Unedo* L. cod. Nro. 3107. Europa australis,
? Oriens.
 serratifolia Salisb. prodr. stirp. hort. Chap. Allert. 288.
 Unedo edulis Hoffm. Lk. fl. portug. I. 415.
 β) fol. lanceolatis; salicifolia Hoffm. Verz. d. Pflanz. Kult. 1824 p. 206.
 γ) - crispis; crispa Hoffm. Verz. d. Pflanz. Kult. 1824 p. 204.
 δ) - integris; integrifolia Sims bot. mag. t. 2319.
 ε) flor. rubescentibus, plenis et laceris.
 ζ) fructu turbinato Pers. syn. pl. I, 482.
 η) hibernica Hort.
- * 2. 5 *hybrida* Ker in bot. mag. t. 619. Planta hybrida.
 β) Milleri Mayes in Journ. of sc. and lit. Jan. 1835. Gard. mag. XI, 250.
- 3. 5 *andrachnoides* Link enum. pl. hort. Berol. I, 395. Oriens.
- * 4. 5 *Andrachne* L. cod. Nro. 3108; bot. mag. t. 2024; bot. reg. t. 113. Oriens, Krim,
Graecia.
 integrifolia Salisb. prodr. stirp. hort. Chap. Allert. 288.
 lucida Hort.
 Andrachne frutescens Ehr. phil. transcript. LVII, 114. t. 6.
 β) serratifolia Lodd. in bot. mag. eab. t. 590.
- 5. 5 *integrifolia* Lam. enc. méth. I, 227. Syria.
Creta.
- 6. 5 *Sieberi* Klotzsch in Linn. XXIV, 71. America bor.-occid.
- 7. 5 *procera* Dougl. in bot. rep. t. 1753. America bor.-occid.
- 8. 5 *Menziesii* Pursh fl. Amer. sept. I, 282. Mexico.
 β) oblongifolia; ? laurifolia L. fl. suppl. 238.
 γ) elliptica; ? obtusifolia Raf. in fl. Ludov. 55.
- 9. 5 *lanceolata* Lam. enc. méth. 227. America borealis.
 ? *Acadiensis* L. cod. Nro. 3109.

XIII. *Arctostaphylos* Adans.

(ἀρκτος, ursus, Βασρ, et σαρπυλη, uva, Traube, quia ursi bacis cupide vescuntur.)

- 1. ♀ *alpina* Spreng. syst. veget. II, 287. America britannica et
rossica, Sibiria, Europa
boreal. et media, Alpes
Arbutus alpina L. cod. Nro. 3110; fl. dan. 73; engl. bot. t. 2090.
Mairania alpina Desv. Journ. de bot. III, 38.
- * 2. ♀ *officinalis* Wimm. et Grab. fl. siles. I, 391. America britannica et
foederata borealis,
Sibiria, Europa borealis
et media, Alpes.
Uva ursi Spreng. syst. veget. II, 287.
Arbutus Uva ursi L. cod. Nro. 3111. Schk. bot. Handb. t. 116.
 - *buxifolia* Stok. bot. mat. med. 509.
 - *procumbens* Salisb. prodr. stirp. hort. Chap. Allert. 269.
Mairania Uva ursi Desv. Journ. de bot. III, 38.
Uva ursi buxifolia Sal. in Gray nat. arrang. of brit. pl. II, 400.
 - *procumbens* Moench meth. 470.
- 3. ♀ *procumbens* Kluck in Bess. prim. fl. Galic. austr. II, 355 (sub *Arbuto*). Gallia austriaca.

XIV. *Daphniodostaphylis* Klotzsch.

(δαφνη, laurus, Lorbeer, et σαρπυλη, uva, Traube.)

- 1. 5 *Hookeri* Klotzsch in Linn. XXIV, 80. California.
Arbutus pungens Hook. et Arn. in bot. of Beech. voy. III, 836.
Arctostaphylos Hookeri G. Don dichlam. pl. III, 836.
- 2. 5 *cordifolia* Klotzsch in Linn. XXIV, 80. America boreali-
occidentalis,
Arbutus obtusifolia Loud. arbor. et frut. brit. II, 1122.

- Arctostaphylos cordifolia* Lindl. bot. reg. ad tab. 1791, adnot.
Xerobotrys cordifolia Nutt. in transact. of the amer. phil. soc. n. ser. VIII.
 3. 5 *glauca* Klotzsch in Linn. XXIV, 80. California.
 - *Arbutus glauca* Loud. arbor. et frut. brit. II, 1122.
Arctostaphylos glauca Lindl. in bot. reg. ad tab. 1791, adnot.
Xerobotrys glauca Nutt. in transact. of the amer. phil. soc. n. ser. VIII.
 4. 5 *Fendleriana* Klotzsch in Linn. XXIV, 80. Nova-Mexico.
 5. *h* *pumila* Klotzsch in Linn. XXIV, 81. Nova-California.
Arctostaphylos pumila Nutt. in transact. of the amer. phil. soc. n. ser. VIII, 266.
 6. *h* *acuta* Klotzsch in Linn. XXIV, 81. Nova-California.
Arctostaphylos acuta Nutt. in transact. of the amer. phil. soc. n. ser. VIII, 267.

XV. *Comarostaphylis* Zucc.

(κομαρον, arbutus, Erdbeerstrauch, et σταφυλη, uva, Traube.)

1. 5 *bicolor* Klotzsch in Linn. XXIV, 87. Nova-California.
Xylococcus bicolor Nutt. in transact. of the amer. phil. soc. n. ser. VIII, 266.

XVI. *Xerobotrys* Nutt.

(ξερος, siccus, trocken, et βοτρυς, uva, Traube.)

1. 5 *tomentosus* Nutt. in transact. of the amer. phil. soc. n. ser. VIII, 267. Nova-California.
Andrómeda ? *bracteosa* DC. prodr. VII, 607.
Arbutus Madrono Humb. ess. pol. s. la Nouv. Esp. II, 454. nov. gen. et sp. am. III, 220.
 - *tomentosa* Pursh fl. Amer. sept. I, 282; bot. mag. t. 3320.
Arctostaphylos tomentosa DC. prodr. VI, 585 (ex p.).
Daphnidostaphylis tomentosa Klotzsch in Linn. XXIV, 79.
 β) *nuda* Hook. et Arn. in bot. of Beech. voy. 362 (sub *Arbutus*).
 2. 5 *arguta* Nutt. in transact. of the amer. phil. soc. n. ser. VIII, 267. Nova-California,
Arctostaphylos tomentosa β. *arguta* DC. prodr. VII, 585. Mexico.
 3. 5 *venulosus* Nutt. in transact. of the amer. phil. soc. n. ser. VIII, 267. Nova-California,
Andrómeda ? *venulosa* DC. prodr. VII, 607.

XVII. *Encyanthus* (*Encyanthus* et *Enkianthus*) Lour.

(εγκυος, praestans h. l. abundans, ueberfuellt, et εθος, flos, Bluethe.)

- * 1. 5 *quinqueflorus* Lour. fl. coch. I, 339; bot. reg. t. 201; bot. mag. t. 1649. China (Canton),
uniflorus Benth. in Hook. Lond. journ. of bot. I, 439 (teste Hook.). Hongkong).
 β) *brevicalyx*; *reticulatus* Lindl. in bot. reg. t. 885.
 2. 5 *biflorus* Lour. fl. cochinch. I, 340. China (Canton).

Trib. 3. *Andromedeae* (Cor. 1-petala, decidua; Caps. loculicide deh.)

XVIII. *Pieris* D. Don.

(*Pieris* musa aut filia Pieri.)

1. β *formosa* Don in Edinb. n. phil. journ. XVII, 159. Wight ic. t. 1200. Nepal.
Andrómeda formosa Wall. in asiat. research. XIII, 395. Don prodr. nep. 149.
 2. β *lanceolata* Don in Edinb. n. phil. journ. XVII, 159. Wight ic. t. 1198. Bengalia, Nepal.
Andrómeda lanceolata Wall. in asiat. research. XIII, 390. t. 10.
 - *squamulosa* D. Don in prodr. fl. nepal. 149 (teste G. Don).
 3. β *ovalifolia* Don in Edinb. n. phil. journ. XVII, 159. Wight ic. t. 1199. Nepal.
Andromeda ovalifolia Wall. in asiat. research. XIII, 391. t. 11.
 4. 5 *elliptica* S. et Z. in Abh. d. m. phys. Kl. d. baier. Ac. IV, 2. 126 (sub *Andrómeda*). Japonia.

XIX. *Zenobia* D. Don.

(*Zenobia* Palmyrae regina, doctrina infortunisque celeberrima.)

- * 1. 5 *speciosa* D. Don in Edinb. phil. journ. XVII, 158. br. fl. gard. t. 330. America foederata
Andrómeda speciosa Mich. fl. bor. amer. I, 256. bot. cab. t. 551. australis.
 - *cassinefolia* Vent. jard. de Cels t. 60.
 β) *pulverulenta* Bart. trav. tr. N. a. S. Car. Georg. II, 476. t. 3. f. 2. (sub *Androm.*)
Andrómeda dealbata Lindl. in bot. reg. t. 1010.
 - *speciosa* var. *glauca* Wats. dendr. brit. t. 126.

XX. Gautheria (nec Gautiera Endl. et Torr.) Kalm et L.
(Gauthier, medicus canadensis urbis Quebec medio saeculo XVIII.)

1. *h. procumbens* L. cod. Nro. 3106. bot. mag. t. 1966. America borealis
humilis Salisb. prodr. stirp. hort. Chap. Allert. 239. orientalis.
Arbutus Acadiensis L. cod. Nro. 1309 (teste Spreng.)
2. *h. Myrsinites* Hook. fl. bor. amer. II, 35. t. 129. America bor.-occid.
3. *h. nummularioides* Don prodr. fl. nep. 150. Royle ill. of the
himal. mount. t. 36. f. 2. Nepal.
Nummulariae DC. prodr. VII, 592.
4. *h. trichophylla* Royle illustr. of the him. mount. 260. t. 63. f. 3. Himalaya, Cashmir.
5. 5 fragantissima (fragrans D. Don) Wall. an asiat. res. XIII, 397. c. ic. Nepal.
6. 5 Griffithiana Wight ic. pl. Ind. orient. t. 1197. Himalaya (Bhutan).
7. 5 Shallon Pursh fl. Am. sept. I, 284. t. 4. bot. mag. t. 2843. America bor.-occid.
8. 6 triquetra S. et Z. in Abh. d. m. phys. Kl. d. baier. Ac. d.
W. IV, 3. 129. Japonia.

XXI. Weisteria S. et Z.

(G. Meister, per decennium Cleyeri in Java hortulanus, bis, a. 1682—1684 et
1685—1687, Japoniam adiit indeque plantas vivas, semina et icones plantarum
in Javam attulit; autor libri: orientalisch-indianischer Kunst- und Lustgaertner.)

1. 5 cernua S. et Z. in Abh. d. math. phys. Kl. d. baier. Acad.
IV, 2. 127. t. 3 A. Japonia.

XXII. Cassiope D. Don.

(Cassiope, mater Andromedae; ob similitudinem hujus generis.)

1. *h. lycopodioides* D. Don in Edinb. new phil. journ. XVII, 158. Sibiria orientalis,
Andróméda lycopodioides Pall. fl. ross. II, t. 73. f. 1. America maxime
Erica lycopodioides Waitz Besch. d. Gatt. u. Art. d. Haid. 156. boreal.-occid.
2. *h. Redowskii* G. Don dichlam. pl. III, 829. Sibiria orientalis.
Andróméda Redowskii Cham. et Schlecht. in Linn. I, 517.
3. *h. tetragóna* D. Don in Edinb. new phil. journ. XVII, 156. Ross. bor., Sibiria,
- Andróméda tetragóna L. cod. Nro. 3093. bot. mag. t. 3181. America, max. borealis.
4. *h. Mertensiana* G. Don dichlam. pl. III, 829. America maxime
Andróméda cupressima Hook. fl. bor. amer. II, 38. boreal.-occid.
- Mertensiana Bong. in mém. de l'ac. de St. Pé. II, 152. t. 5.
5. *h. ericoïdes* D. Don in Edinb. new phil. journ. XVII, 158. Sibiria.
Andróméda ericoïdes Pall. ross. II, 56. t. 73. f. 3.
Erica asiatica Waitz Besch. d. Gatt. u. Art. d. Haid. 157.
6. *h. hypnoides* D. Don in Edinb. new phil. journ. XVII, 158. Europa et Sibiria
Andróméda hypnoides L. cod. Nro. 3094; bot. mag. t. 2936. borealis.
7. *h. Stelleriana* DC. prodr. VII, 611. America maxime
Andróméda Stelleriana Pall. fl. ross. II, 58. t. 74. f. 2. boreal.-occid.
Bryanthus Stelleri D. Don in Edinb. new phil. journ. XVII, 160.
Erica Stelleriana Willd. sp. pl. II, 387.
Menziesia empetriformis Pursh fl. Amer. sept. I, 265.
8. 5 fastigiata D. Don in Edinb. new phil. journ. XVII, 158. Himalaya,
Andróméda fastigiata Wall. in asiat. res. XIII, 304. pl. Tataria chinensis.
rar. asiat. III, 394.
- cupressiformis Wall. in transact. of the Wern. soc. III, 407.

XXIII. Andróméda L.

(Andromeda, filia pulchra regis aethiopicici Cephei et Cassiope; nomen a Linnæo ob
plantarum amoenitatem hujus generis usurpatum.)

- * 1, 5 Polifolia L. cod. Nro. 3097. Hayne Arnz. Gew. III, t. 23. Europa media et bor.,
canadensis americana revoluta Hort. Sibiria, America
Rhododendron polifolium Scop. fl. carn. I, 287. brit. et. foed. bor.
- * *β) ericoïdes* Lodd. urb. et frut. brit. II, 1106.
- γ) flore minimo et revoluta*; bot. cab. t. 725.
- δ) glaucophylla (glaucifolia Wender.)* Lk enum. pl. hort. Berol. I, 394.
- ε) grandiflora* Lodd. bot. cab. t. 1714.
- ζ) latifolia* Lodd. bot. cab. t. 546; oleifolia G. Don dichl. pl. III, 829.
- * *η) rosmarinifolia* Pursh fl. Amer. sept. I, 291. fl. ross. t. 70. f. B.
kalmiaefolia Hfinsgg Verz. d. Pfl. Kult. I. Nachtr. 126.
- θ) subulata* G. Don dichlam. pl. III, 829.

2. 5 japonica Thunb. fl. japon. 181. t. 22.
Pieris japonica D. Don in G. Don dichl. pl. III, 832.
3. 5 villosa Wall. numer. list. Nro. 762.
Quae Andromeda sinensis Hort.?

Japonia.

Nepal.

XXIV. *Portuna* Nutt.

(Portunus, nec Portuna, deus marinus, ob similitudinem hujus generis cum Leucothoë; sed dea marina Leucothea, nec Leucothoë, quae filia Orchamis, regis Babyloniae.)

- * 1. 5 floribunda Nutt. in transact. of the amer. phil. soc. n. ser. VIII, 268. America borealis.
ser. VIII, 268.
Andrómēda floribunda Pursh fl. Amer. sept. I, 488. bot. mag. t. 1506.
Leucothoë floribunda D. Don in Edinb. philos. journ. XVII, 159.
Zenobia floribunda DC. prodr. VII, 568.

XXV. *Eubétryx* Nutt.

(εὐ, bene, wohl, et βεῖρυς, racemus, Traube, ob inflorescentiam.)

- * 1. 5 racemosa Nutt. in transact. of the amer. phil. soc. n. ser. VIII, 269. America borealis.
Andrómēda paniculata Walt. fl. carol. 138. II, t. 13.
- racemosa L. cod. Nro. 3102. l'Herit. stirp. nov. II, t. 13.
- spicata Wats. dendrol. brit. t. 36.
- tomentosa Dum. Cours. bot. cult. 2. edit. III, 495.
Leucothoë spicata G. Don dichlam. pl. III, 832.
Lyonia racemosa D. Don in Edinb. philos. journ. XVII, 159.
Zenobia racemosa DC. prodr. VII, 598.
2. 5 bracteata Nutt. in transact. of the amer. phil. soc. n. ser. VIII, 269. Amer. foed. austr.

XXVI. *Tritómodon* Turcz.

(τριτόμος, trifidus, dreitheilig, et ὄδους, dens, Zahn, ob petala apice 3-dentata.)

1. 5 japonicus Turcz. in bull. de la soc. d. nat. de Mose. XXI, 1. 585. Japonia (? an Java?).

XXVII. *Aegialea* Klotzsch.

(Aegialeus Sidonis primus rex et Medeae frater.)

1. 5 phillyreaefolia Hook. icon. plant. II, t. 122 (sub Andromeda). America foed. austr.
Pieris phillyreaefolia DC. prodr. VII, 599.
Andromeda phillyreaefolia Hook. ic. pl. II, t. 122.

XXVIII. *Epigaea* Swartz.

(ἐπιγαιος, humifusus, auf der Erde liegend.)

- * 1. $\bar{\eta}$ repens L. cod. Nro. 3105. bot. cab. t. 160. repos. t. 102. America borealis.
 β) rubicunda D. Don in brit. flow. gard. 2. ser. IV, t. 384.

XXIX. *Chamaedaphne* Moench.

(χαμαι, humi, auf der Erde, et δαφνη, laurus, Lorbeer.)

- * 1. 5 calyculata Moench meth. 457. Europa media et
Andrómēda calyculata L. cod. Nro. 1304; bot. mag. t. 1296. borealis, Sibiria et
Cassandra calyculata D. Don in Edinb. n. phil. journ. XVII, 158. America borealis.
Lyonia calyculata Rehb. fl. exc. I, 414.
 β) latifolia Lodd. bot. cab. t. 530.
 γ) nana Sims bot. mag. t. 862. bot. cab. t. 826.
 δ) ventricosa Sims in bot. mag. t. 1286.
2. $\bar{\eta}$ angustifolia Pursh fl. Amer. sept. I, 291 (sub Andromeda). America foederata
Andrómēda calyculata β . angustifolia Ait. hort. Kew II, 70. australis.
- crispa Desf. hort. Paris. et in enc. méth. suppl. I, 356.
Cassandra angustifolia G. Don dichl. pl. III, 830.

XXX. *Oxydendron* DC.

(ὄξύς, acidus, scharf, i. e. sauer, et δένδρον, arbor, Baum, ob folia gustu acida.)

- * 1. δ arbóreum DC. prodr. VII, 601. America foederata
Andromeda arborea L. cod. Nro. 1303. bot. mag. t. 905. (montes Alleghany).
Lyonia arborea D. Don in Edinb. new phil. journ. XVII, 159.

XXXI. *Lyonia* Nutt.

(Joannes Lyon multas plantas in montibus Americae foederatae collegit et detexit, decennio tertio hujus saeculi morbo pernicioso subito perit.)

- * 1. 5 paniculata Nutt. gen. of N. Amer. pl. I, 266. Wats. dendr. br. t. 37. America borealis.
ligustrina DC. prodr. VII, 569.

- Andrómēda ligústrina* Muehlb. cat. pl. Amer. sept. 44.
 - *paniculata* Willd. sp. pl. II, 612 (? L. cod. Nro. 3101.).
 - - *L. nudiflora* Mich. fl. bor. amer. I, 254.
 - *parabolica* nouv. Duh. I, 191.
 - *pitulifera et globulifera* Hort.
 - *racemosa* Lam. enc. méth. IV, 158.
Vaccinium ligustrinum L. cod. Nro. 2707.
 β) *salicifolia* Wats. dendrol. brit. I, t. 36.
Andromeda Watsoniana Steud. nom. bot. ed. 2, I, 89.
 2. 5 *multiflora* Wats. dendrol. brit. II, t. 128. America foed. austr.
Andrómēda polycantha Steud. nom. bot. ed. I, 89.
 3. 5 *capreaefolia* Wats. dendrol. brit. II, t. 127. America foederata.
 4. 5 *frondosa* Nutt. gen. of N. Amer. pl. I, 267. America borealis.
Andrómēda frondosa Pursh fl. Amer. sept. I, 295.
 - *paniculata* β. *foliosiflora* Mich. fl. bor. amer. I, 225.
 - *racemosa* Walt. fl. carol. 138.
Andrómēda rigida Pursh fl. Amer. sept. I, 292. bot.
 cab. t. 430.
 5. 5 *ferruginea* Nutt. gen. of N. Amer. pl. I, 266. America foed. australis,
Andrómēda ferruginea Walt. fl. carol. 138. Vent. jard. Mexico.
 de Malm. t. 80.
 -- *ferruginea* β. *fruticosa* Mich. fl. bor. amer. I, 252.
 β) *rigida* Nutt. gen. of N. Amer. pl. 266.

XXXII. *Leucothoë* (D. Don) DC.
 (*Leucothoë*, flia Orchami, regis Babyloniae.)

- * 1. 5 *axillaris* Don in Edinb. new phil. journ. XVII, 159. Loud. America foederata
 arb. brit. et frutic. II, f. 908. orientalis.
Andrómēda axillaris Sol. Ait. in hort. Kew. II, 89.
 β) *longifolia* Pursh fl. Amer. sept. I, 293; bot. mag. t. 2357.
 * 2. 5 *spinulosa* G. Don dichl. pl. III, 832. America foed. austr.
Andrómēda axillaris Mich. fl. bor. amer. I, 253. (Georgia, Carolina).
 - *Catesbaei* Walt. fl. carol. 137; bot. mag. 1955.
 - *spinulosa* Pursh fl. Amer. sept. I, 293.
 * 3. 5 *lanceolata* Dsf. cat. pl. hort. Paris. 136 (sub *Andromeda*). America foederata.
Andrómēda Fontanesiana Steud. nomencl. bot. ed. 2, I, 88.
 - ? *Walteri* Willd. enum. pl. hort. Berol. 453.
 * 4. 5 *acuminata* G. Don dichlam. pl. III, 832. America foed. austr.
Andrómēda acuminata Ait. hort. Kew. II, 70. Sm. ex bot. t. 89. (Georgia, Carolina).
 - *formosissima* Bartr. trav. tr. N. et S. Car. Georg.
 - *laurina* Mich. fl. bor. amer. I, 253.
 - *lucida* Jacq. ic. pl. rar. I, t. 79.
 - *populifolia* Lam. enc. méth. I, 159.
 - *reticulata* Walt. fl. carol. 137.
 - *serrata et serratifolia* Hort.
 * 5. 5 *coriacea* DC. prodr. VII, 602. America foed. austr.
Andrómēda coriacea Ait. hort. Kew. II, 70. bot. mag. t. 1095. (Carolina, Florida).
 - *lucida* Lam. enc. méth. I, 157.
 - *Mariana* Jacq. ic. pl. rar. III, t. 465.
 - *myrtifolia* Salisb. prodr. pl. hort. Chap. Allert. 290.
 - *marginata* nouv. Duh. I, 188. t. 40 et Pers. syn. pl. I, 491.
 - *nitida* Mich. fl. bor. amer. I, 252.
 - *rhomboidalis* Veill. in nouv. Duh. I, 192.
Lyonia marginata D. Don in Edinb. n. phil. journ. XVII, 159.
 - *rhomboidalis* G. Don dichl. pl. III, 831.
 β) *flore rubro* Lodd. bot. cab. t. 672.
 * 6. 5 *Mariana* DC. prodr. VII, 602. America borealis.
Andrómēda Mariana L. cod. Nro. 3096; bot. mag. t. 1579.
 - *pulchella* Salisb. prodr. pl. hort. Chap. Allert. 289.
Lyonia Mariana D. Don in Edinb. n. phil. journ. XVII, 159.
 β) *angustifolia* Pursh fl. Amer. sept. I, 294. Pluk. mant. t. 448.

Trib. 4. Rhodoraceae (Cor. 1-petala; Caps. septicida; Gemmae strobiliformes).

XXXIII. Rhododendron L.

(ρόδον, rosa, Rose, et δεινρόν, arbor, Baum.)

- A. Cal. nullus aut cupulif. Cor. saepe 7- et 10-lobata; Germ. 6-pluriloc.
1. 5 Griffithianum (nec Griffithii Hook. fl.) Wight ic. pl. Ind. orient. t. 1203. Himalaya (Bhutan).
Aucklandii Hook. fl. Rhod. of Sikk. Himal. II, 2. t. 9.
2. 5 Thomsoni Hook. Rhodod. of Sikk. Himal. II, 2. t. 12. Himalaya (Sikkim).
β) Candelabrum Hook. fl. Rhodod. of Sikk. Himal. II, 2. t. 29.
3. 5 grande Wight ic. pl. Ind. orient. t. 1202. Himalaya (Bhutan).
4. 5 Falconeri Hook. fl. Rhod. of Sikk. Himal. II, 1. t. 10. Sikkim-Himalaya.
5. 5 Jenkinsii Nutt. in journ. of bot. and. Kew. gd. misc. V, 362. Bhutan.
6. 5 argenteum Hook. fl. Rhod. of Sikk. Him. II, 1. t. 9. fl. d. serr. V, t. 473—476. Sikkim.
7. 5 Windsorii Nutt. in journ. of bot. a. Kew. gd. misc. V, 357. Bhutan.
8. 5 Hodgsoni Hook. fl. Rhodod. of Sikk. Him. II, 1. t. 15. Sikkim.
9. 5 Shepherdii Nutt. in journ. of bot. a. Kew. gd. misc. V, 361. Bhutan.
10. 5 Hookeri Nutt. in journ. of bot. a. Kew. gd. misc. V, 359. Bhutan.
11. 5 catophyllum Nutt. in journ. of bot. a. Kew. gd. misc. V, 362. Bhutan.
12. 5 eximium Nutt. in journ. of bot. a. Kew. gd. misc. V, 364. Bhutan.
13. 5 venosum Nutt. in journ. of bot. a. Kew. gd. misc. V, 365. Bhutan.
14. 5 planifolium Nutt. in journ. of bot. a. Kew. gd. misc. V, 365. Bhutan.
15. 5 longifolium Nutt. in journ. of bot. a. Kew. gd. misc. V, 366. Bhutan.
16. 5 Blumei Nutt. in journ. of bot. a. Kew. gd. misc. V, 366. Bhutan.
17. 5 Kendrickii Nutt. in ann. of nat. hist. 2. ser. XII, 10. Bhutan.
18. 5 arboreum Sm. exot. bot. t. 6. bot. mag. t. 3290. bot. reg. t. 800. 1962. Himalaya.
punctatum Roxb. fl. Ind. II, 409.
β) flore albo; album Wall. pl. asiat. rar. t. 123. bot. mag. t. 3290.
Campbelliae Hook. fl. Rhodod. of the Sikk. Him. II, 3. t. 6.
γ) flore candido maculato; cinnamomeum Wall. num. list. Nro. 760; bot. reg. t. 1982.
δ) flore roseo, bot. reg. t. 1240; nilagiricum Zenk. pl. Ind. t. 15.
ε) flore roseo crispato; venustum D. Don in brit. fl. gard. 2. ser. t. 288.
ζ) foliis glabris undulatis; undulatum Sweet. brit. fl. gard. 2. ser. t. 341.
η) foliis glabris subtus pallide ferrugineis; Altaclarensis Hook. bot. mag. t. 3423.
θ) foliis subtus albo-tomentosis; Smithii Sweet. brit. fl. gard. 2. ser. t. 50.
ponticum δ. Smithii G. Don dichlam. pl. III, 843.
ι) foliis subtenuiter tomentosis; Russellianum Sweet. br. fl. gard. 2. ser. t. 91.
Catawhiense β. Russellianum G. Don dichlam. pl. III, 843.
19. 5 Metternichii S. et Z. fl. japon. I, 23. t. 9. Japonia.
maximum Thunb. fl. japon. 181.
scabrum Don dichlam. pl. III, 446.
Hymenantes japonica Blume bijdr. 862.
- B. Calyx 5-fidus; Corolla subcampanulata; Folia saepe lepidota.
20. 5 Nuttallii Booth in journ. of bot. a. Kew. gard. misc. V, 355. Assam.
21. 5 Boothii Nutt. in journ. of bot. a. Kew. gard. misc. V, 355. Bhutan.
22. 5 Dalhousiae Hook. fl. Rhodod. of Sikk. Himal. II, 2. t. 1 et 2. fl. d. serr. V, t. 460—468. Sikkim.
23. 5 Edgeworthii Hook. fl. Rhodod. of Sikk. Himal. II, 2. t. 21. Sikkim.
24. 5 ciliatum Hook. fl. Rhodod. of Sikk. Himal. II, 2. t. 24. Sikkim.
25. 5 barbatum Wall. num. list. Nro. 767. bot. mag. t. 4361. Nepal, Sikkim.
lancofolium Hook. fl. Rhod. of Sikk. Himal. II, 2. t. 4.
26. 5 glaucum Hook. fl. Rhod. of Sikk. Himal. II, 2. t. 17. Sikkim.
27. 5 formosum Wall. (nec in num. list.) Nutt. journ. of bot. a. Kew. gard. misc. V, 354. Assam.
28. 5 pumilum Hook. fl. Rhod. of Sikk. Himal. II, 2. t. 14. Sikkim.
- C. Calyx parvus 5-lobus; Cor. subcampanulata; Folia saepe subtus pilosa.
29. 5 leucanthum Bge in mém. d. sav. étrang. de Pét. II, 113. China borealis.
30. 5 campanulatum D. Don in transact. of the Wern. soc. III, 409. bot. cab. t. 1944. Himalaya.
β) Wallichii Hook. Rhod. of Sikk. Himal. II, 4. t. 6.
γ) aeruginosum Hook. Rhod. of Sikk. Himal. II, 5. t. 22.

- * 31. 5 *niveum* Hook. fl. journ. of the hort. soc. VII, 78. Sikkim.
 * 32. 3 *lanatum* Hook. fl. Rhod. of Sikk. Himal. II, 5. t. 16. Sikkim.
 33. 5 *Wightii* Hook. fl. Rhod. of Sikk. Himal. II, 4. t. 27. Sikkim.
 * 34. 5 *campylocarpum* Hook. fl. Rhod. of Sikk. Himal. II, 5. t. 30. Sikkim.

D. Calyx 5-lobus aut 5-dentatus; Cor. infundibuliformis;
 Folia subtus lepidota.

35. 5 *Maddeni* Hook. fl. Rhod. of Sikk. Himal. II, 5. t. 18. Sikkim.
 * 36. 5 *cinnabarinum* Hook. fl. Rhod. of Sikk. Himal. II, 5. t. 8. Sikkim.
 Roylei Hook. fl. Rhod. of Sikk. Himal. II, 5. t. 7.
 37. 5 *Keysii* Nutt. in journ. of bot. a. Kew. gd. misc. V, 353. Bhutan.

E. Calyx 5-lobus; Corolla rotata aut hypocrateriformis; Stylus brevis;
 Folia lepidota aut lanata.

38. 5 *vaccinioides* Hook. in fl. Rhod. of Sikk. Himal. II, 3. Sikkim.
 39. 5 *pendulum* Hook. fl. Rhod. of Sikk. Himal. II, 6. t. 13. Sikkim.
 40. 5 *camelliaeflorum* Hook. fl. Rhod. of Sikk. Himal. II, 5. t. 28. Sikkim.
 41. 5 *sparsiflorum* Nutt. in journ. of bot. a. Kew. gd. misc. V, 363. Bhutan.
 42. 5 *lucidum* Nutt. in journ. of bot. a. Kew. gd. misc. V, 363. Bhutan.
 43. 5 *lepidotum* Wall. numer. list. Nro. 758. Himalaya.

obovatum Hook. fl. Rhod. of Sikk. Himal. II, 6.

β) *elaegnoides* Hook. fl. Rhod. of Sikk. Himal. II, 6. t. 23 B.

salignum Hook. fl. Rhod. of Sikk. Himal. II, 6. t. 23 A.

44. 5 *macronulatum* Kir. in bull. de la soc. de nat. de Moso. X, 155. et ? Turcz. XXII, 586. China borealis.
 45. 5 *micranthum* Kir. in bull. de la soc. d. nat. de Moso. X, 155. et Turcz. XXII, 586. China borealis.

F. Calyx 5-lobus; Cor. rotata, infundibuliformis, laciniis angustis;
 Stylus gracilis; Folia lepidota.

46. 5 *virgatum* Hook. fl. Rhod. of Sikk. Himal. II, 7. t. 26. Sikkim.
triflorum Hook. fl. Rhod. of Sikk. Himal. II, 6. t. 19.
 47. 5 *nivale* Hook. fl. Rhod. of Sikk. Himal. II, 7. t. 26 B.
 48. 5 *setosum* D. Don in tr. of the Wern. soc. III, 408. Hk. f. Sikkim, Nepal.
 Rhod. of Sikk. Himal. t. 20.

G. Calyx 5-lobus; Corolla subcampanulata; Stylus gracilis;
 Folia saepe glaberrima.

- * 49. 5 *Catawbiense* Mich. fl. bor. amer. I, 256; bot. mag. t. 1671. America foederata.
 β) *ellipticum* Hoffm. Verz. d. Pfl. Kult. 2. Nachtr. 494.
 50. 5 *macrophyllum* G. Don dichlam. pl. III, 843. America bor.-occid.
 51. 5 *Purshii* G. Don dichlam. pl. III, 843. America foederata
maximum β. album Pursh fl. Amer. I, 297. borealis.
 52. 5 *purpureum* G. Don dichlam. pl. III, 843. America foederata
maximum γ. purpureum Pursh fl. Amer. sept. I, 297. orientalis.
ponticum macrophyllum Lodd. catal.
 * 53. 5 *maximum* L. cod. Nro. 3092. bot. mag. t. 951. America borealis.
maximum L. roseum Pursh fl. Amer. sept. I, 297.
procerrum Salisb. prodr. stirp. hort. Chap. A Hort. 287.
 β) *flore albo*; *alba* Hoffm. Verz. d. Pflanz. Kult. 2. Nachtr. 193.
 γ) *flore pallide purpureo*; *hybridum* Hook. in bot. mag. t. 3454.
 ? *latifolium* Hoffm. Verz. d. Pflanz. Kult. 195.
 δ) *flore pallide roseo*; *bigener* Lindl. bot. reg. t. 195.
fragrans Hort. et Paxt. mag. of bot. I, 101. c. ic.
 * 54. 5 *ponticum* L. cod. Nro. 3091. bot. mag. 650. Oriens, Lusitania.
laeifolium Moench meth. 45.
 β) *foliis lanceolatis subdeciduis*; *azaleoides* Gu. et H. Abb. fr. H. t. 15.
ponticum β. *subdeciduum* Andr. bot. repos. t. 328.
 γ) *foliis obtusis*; *obtusum* Wats. dendrol. brit. II, t. 162.
 δ) *flore albo*; *Loweii* Loud. in Garden. Magaz. XI, 199.
 ε) *flore minore et foliis parvis*; *myrtifolium* Lodd. bot. cab. 908.
 * 55. 5 *chrysanthum* Pall. fl. ross. I, 44. t. 30. Sibiria,
officinale Salisb. parad. Lond. t. 80. insulae Beringiae.
 56. 5 *brachycarpum* G. Don dichlam. pl. III, 843. Japonia.

57. 5 *punctatum* Andr. bot. repos. t. 36. Wats. dendr. brit. t. 162. f. A. *America foederata*
minus Mich. fl. bor. amer. I, 258. *australi-orientalis.*
parviflorum Hort.

β) flore majori immaculato, pallide roseo; bot. t. 37.

H. Calyx 5-lobus; Cor. subrotata; Folia subtus saepe lepidota aut hirta.

- * 58. *dahuricum* (dauricum et davuricum) L. cod. Nro. 3088. *Sibiria.*
β) foliis persist. atrovividibus; bot. reg. t. 194. bot. mag. t. 1888.
γ) foliis deciduis, flore roseo; Pall. fl. ross. I, t. 32. bot. mag. t. 636.
δ) foliis deciduis, flore albo Turcz. in bull. de la soc. de Mosc. XXI, 501.
59. 5 *parvifolium* Adams in mém. de la soc. d. nat. de Mosc. IX, 237. *Sibiria.*
palustre Turcz. in DC. prodr. VII, 724.
* 60. 5 *caucasicum* Pall. fl. ross. I, 46. t. 31. *Caucasus,*
β) flore roseo; pulcherrimum Lindl. in bot. reg. t. 1820. *montes pontici.*
γ) flore roseo; Nobleianum Lindl. bot. reg. t. 1820. f. 1.
δ) flore extus stramineo, intus fulvo-maculato; stramineum
Hook. in bot. mag. t. 3422.
61. 5 *lapponicum* Wahlenb. fl. succ. t. 249. bot. mag. t. 3106. *Regiones arcticae.*
Azaléa lapponica L. fl. lapp. 99. t. 6. f. 1. Pall. fl. ross. II, 52.
- *ferruginosa* Pall. fl. ross. t. 70. f. 1.

I. Calyx 5-lobus, Corolla hypocrateriformis; Folia lepidota.

- * 62. 5 *ferrugineum* L. cod. Nro. 3087. fl. austr. t. 255. bot. cab. 68. *Pyrenaeus, Alpes.*
β) flore albo; Sweet in brit. flow. gard. 2. ser. t. 258.
63. 5 *intermedium* Tausch in Flora XIX, 36. *Alpes.*
* 64. 5 *hirsutum* L. cod. Nro. 3089. Jacq. fl. austr. t. 98. bot. mag. t. 1853. *Alpes.*
β) *latifolium* Heppé in Flora XXIII, 525.
γ) *variegatum* G. Don dichlam. pl. III, 844.

K. Folia hispida; Cal. lacinae foliaceae; Stam. saepe 5—9 (Tsutsia).

65. 5 *R. Breynii* Planch. in fl. d. serr. IX, 77. *Java.*
Azaléa indica L. cod. Nro. 1195 ex p.
66. 5 *R. Kaempferi* Planch. in fl. d. serr. IX, 77. *Japonia.*
Azaléa indica L. cod. Nro. 1195 ex p.
* 67. 5 *indicum* Sweet brit. fl. gard. 2. sér. t. 128. *Java, in Japonia et*
Simsii Planch. in fl. d. serr. IX, 78. *China cultum.*
Azaléa indica Sims in bot. mag. t. 1480.
β) flore coccineo-flammeo; ignescens Sweet in br. fl. gard. t. 128.
γ) - purpureo; purpureum Sims in bot. mag. t. 3067.
δ) - variegato; *Azalea indica variegata* Lindl. in bot. reg. t. 1716.
ε) - pleno incarnato; *Azalea indica plena* Sims in bot. mag. t. 1716.
68. 5 *pulchrum* Sweet brit. flaw. gard. 2. ser. t. 117. *? Planta hybrida*
indicum Smithii Sweet in brit. gard. 2. ser. t. 154. *R. ledifolia et Simsii,*
Japonia.
69. 5 *Burmanni* G. Don dichlam. pl. III, 845. *China.*
Azaléa rosmarinifolia Burm. fl. ind III, 845. *China.*
* 70. 5 *ledifolium* G. Don dichlam. pl. III, 846. *China.*
leucanthum Bge in mém. de sav. étrang. de Pét. II, 113 (teste DC. sed certe div.).
Azaléa indica alba Lindl. in bot. reg. t. 811. bot. cab. t. 1253.
- *ledifolia* Hook. in bot. mag. t. 2901.
liliiflora Poit. in ann. de From. I, 104.
β) *phoeniceum* G. Don dichlam. pl. III, 846.
indicum speciosum Sweet in brit. flaw. gard. 2. ser. 284.
Azaléa ledifolia β. *phoenicea* Hook. in bot. mag. t. 3239. br. fl. gard. t. 128.
71. 5 *mucronatum* G. Don dichlam. pl. III, 846. *China.*
Azalea mucronata Blume bijdr. 653.
72. 5 *R. Thunbergii* Planch. in fl. d. serr. IX, 78. *Japonia.*
Azaléa indica Thunb. fl. japon. 84.
73. 5 *puniceum* Planch. in fl. d. serr. IX, 77. *? China.*
Azaléa punicea Sweet in ann. de From. I, 104.
74. 5 *proliferrum* Poit. in ann. de From. I, 104 (sub *Azaléa*). *? China.*
Azaléa purpurea Sweet in ann. d. From. I, 104.
75. 5 *decumbens* G. Don dichl. pl. III, 846. *China.*
Danielsianum Planch. in fl. d. serr. IX, 79.
macranthum Sweet brit. fl. gard. 2. sér. t. 261.
Azaléa Danielsiana Paxt. mag. of bot. I, 129 c. ic.
decumbens DC. prodr. VII, 718.

76. 5 *lateriticum* Planch. in fl. d. serr. IX, 80. China.
Azaléa indica lateritia Lindl. in bot. reg. t. 1700.
77. 5 *obtusum* Planch. in fl. d. serr. IX, 80. China.
Azaléa obtusa Lindl. in Journ. of the hort. soc. of Lond. I, 152.
78. 5 *amoenum* Planch. in fl. d. serr. IX, 80. t. 885. China.
Azaléa amoena Lindl. in Paxt. fl. gard. 1852. t. 89. bot. mag. t. 4728.
79. 5 *Farrerae* Tate in Sweet brit. fl. gard. I, t. 95. China.
Azaléa squamata Lindl. in Journ. of the hort. soc. I, 2. 152; bot. reg. 1847. t. 3.
80. 5 *calycinum* Planch. in fl. d. serr. IX, 81. China.
Azaléa indica calycina Lindl. in Paxt. fl. gard. 1852. t. 70.
81. 5 *ramentaceum* Planch. in fl. d. serr. IX, 81. China.
Azaléa ramentacea Lindl. Journ. of the hort. soc. of Lond. IV, 291. c. ic.
82. 5 *linearifolium* S. et Z. Abh. d. m. phys. Kl. d. baier. Ac. IV, 2. 131. Japonia.
Azaléa mollis Blume Bijdr. 853. Japonia.
83. 5 *molle* S. et Z. Abh. d. m. phys. Kl. d. baier. Ac. IV, 3. 131. Japonia.
84. 5 *Calleryi* Planch. in fl. d. serr. IX, 81. China.
85. 5 *reticulatum* G. Don dichlam. pl. III, 846. Japonia.
86. 5 *vittatum* Planch. in fl. d. serr. IX, 82. China.
Azaléa indica vittata Hort. et fl. d. serr. IX, t. 86.
 β) *punctata* Planch. in fl. d. serr. IX, 82. t. 86.
Azaléa Bealii Hort. et Fort. in fl. d. serr. IX, 82.
87. 5 *narcissiflorum* Planch. in fl. d. serr. IX, 82. China.
Azaléa narcissiflora Fort. in Hort.
88. 5 *crispiflorum* Planch. in fl. d. serr. IX, t. 87. China.
Azaléa crispiflora Hook. in bot. mag. t. 4728.
- * 89. 5 *chinense* (sinense) Sweet br. fl. gard. j. ser. t. 290. China.
Azaléa sinensis Lodd. in bot. cab. t. 885.
 β) *macranthum* Bge in mém. d. sav. étr. de St. Pé. II, 113 (sub *Azalea*).
90. 5 *ovatum* Lindl. in Journ. of hort. soc. I, 149 (sub *Azalea*). China
91. 5 *albiflorum* Hook. fl. bor. amer. II, 43. t. 33; bot. mag. t. 3670. America bor. - occid.

L. Species ignota.

93. 5 *nobile* Walh. numer. list. 1521. India orient. Nepal.

XXXIV. *Anthécoma* (Anthopogon Rafin. Gentianeae genus) C. Koch.

(άνθος, flos, Blüthe, et κόμη, coma, Schopf.)

1. ♀ *aromatica* C. Koch msc. Himalaya, Nepalia.
aromaticum Wall. numer. list. Nro. 1520.
Rhododendron Anthopogon D. Don in tr. of the Wern. soc. III, 409. Royle ill. t. 64.

XXXV. *Rhodothamnus* Rehb.

(ρόδος, rosa, Rose, et θάμνος, virgultum, Gesträuch.)

1. ♀ *Chamaecistus* Rehb. fl. excurs. 417. Alpes europeae,
Rhododendron Chamaecistus L. cod. Nro. 3090. Sibiria orientalis.
2. ♀ *camtschaticum* Pall. fl. ross. I, 48. t. 33 (sub *Rhododendro*). Sibiria orient. c. insul.

XXXVI. *Osmothamnus* DC.

(όσμη, odor, Geruch, et θάμνος, virgultum, Gesträuch.)

1. 5 *fragrans* DC. prodr. VII, 715. Sibiria arctica.
Azaléa fragrans Adams in mém. de l'acad. d. sc. Pét. II, 332. t. 14.
2. ♂ *pallidus* DC. prodr. VII, 715. Sibiria.
Azaléa ferruginea Pall. ross. II, 52.
 - *lapponica* Pall. fl. ross. II, 70. f. I. A. B.
 - *pallida* Turcz. cat. pl. baical. Nro. 745.

XXXVII. *Rhodóra* Duh.

(apud Plinium herba nobis ignota, Galliae incota et foliis urticae.)

- * 1. 5 *canadensis* L. cod. Nro. 3086. bot. mag. i. 474. America britannica
congesta Moench meth. 68. et foederata borealia
Rhododendron pulchellum Salisb. prodr. stirp. hort. Chap. Affert. 287.
 - *Rhodóra* G. Don dichlam. III, 848.

XXXVIII. Azaléa L.

(ἀζαλέιος, siccus, troeken, a solo natali nomen derivatum dicitur.)

A. Corymbi foliosi.

1. 5 *pontica* L. cod. Nro. 1194. bot. mag. t. 433 et 2383. Caucasus, Pontus,
arborea L. sp. pl. ed. 1. p. 150. Lithuania, Podolia.
Anthodendron ponticum Rehb. in Moessl. Handb. d. Gew. K. 2. Aufl. I, 309.
Rhododendron flavum G. Don dichl. pl. III, 847.
- *ponticum* Schreb. in act. nov. Upsal. I, 90.
β) *flava* Hoffm. Verz. d. Pflanz. Kult. 2. Nachtr. 62.
Rhododendron flavum coronarium Sweet br. fl. gard. 2. ser. t. 331.
γ) *ignescens*; *Rhododendron flavum ardens* Sweet br. fl. gard. 2. ser. t. 306.
δ) *flore albo, croceo, ochroleuco, cupreo et tricolore.*
e) *spathulata* Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. III, 335.
2. 5 *fimbriata* Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. III, 337 (s. descr.) China.
3. 5 *lugens* Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. III, 337 (s. descr.) China.
4. 5 *viscosa* L. cod. Nro. 1197. America borealis.
fragrans Rafin. ann. of nat. p. 12.
virens Dum. Cours. bot. cult. 2. III, 335.
Anthodendron viscosum Rehb. in Moessl. Handb. d. Gew. K. 2. Aufl. I, 309.
Rhododendrum viscosum Torr. fl. of the north. a. middle sect. of the Un. St. I, 424.
β) *ornata*; *Rhododendron ornatum* Sweet br. fl. gard. 2. ser. t. 137.
γ) *flore rubro*, Andr. bot. cab. t. 441; *Rhododendron venustum* Salisb.
prodr. stirp. hort. Chap. Allert. t. 287.
δ) *fissa* Ait. hort. Kew. ed. 2. I, 319; *serotina* Dum. Cours.
bot. cult. 2. éd. III, 336.
e) *floribunda* Ait. hort. Kew. ed. 2. I, 319; Dum. Cours. bot.
cult. ed. 2. III, 334.
c) *vittata* Ait. hort. Kew. ed. 2. I, 319.
5. 5 *glauca* Meerb. pl. sel. ic. pict. t. 6; Wats. dendr. t. 5. America britannica et
viscosa glauca Mich. fl. bor. amer. I, 151. foederata borealis
Rhododendrum glaucum G. Don dichl. pl. III, 848. mediaeque.
- *viscosum glaucum* Torr. fl. of the n. a. m. sect. of the Un. St. 425.
6. 5 *hispida* Pursh fl. Am. sept. I, 154. Wats. dendr. brit. t. 6. America foed. borealis.
Rhododendron hispidum Torr. fl. of the n. a. m. sect. of Un. St. I, 425.
7. 5 *arborescens* Pursh fl. Amer. sept. I, 153. America foed. borealis.
Rhododendron arborescens Torr. fl. of the n. a. m. sect. of Un. St. I, 425.
8. 5 *nitida* Pursh fl. Am. sept. I, 153. bot. reg. t. 414. America foed. borealis.
Rhododendron nitidum Torr. fl. of the n. a. m. sect. of Un. St. 140.

B. Corymbi nudi.

9. 5 *nudiflora* L. cod. Nro. 1196. America borealis.
periclymenoides (*Periclymena* Pers.) Mich. fl. bor. amer. I, 151.
Anthodendron nudiflorum Rehb. in Moessl. Handb. d. Gew. R. 2. Aufl. I, 309.
Rhododendron nudiflorum Torr. fl. of the n. a. m. sect. of Un. St. I, 424.
β) *calyce foliaceo; papilionacea* Ait. hort. Kew. ed. 2. I, 319.
γ) *flore rubro, rutilante, coccineo, carneo, albo et versicolore.*
δ) - *polyandro* Pursh fl. Amer. sept. I, 152.
e) *flore partito; partita* Ait. hort. Kew. ed. 2. I, 319.
c) *ramis tomentosis; Govenianum* Don in brit. flow. gard. III, t. 263 (s. Rhod.)
10. 5 *speciosa* Willd. enum. pl. hort. Berol. suppl. 10. Wats. dendr. t. 46. Hybrida species.
Rhododendron speciosum G. Don dichl. pl. III, 848.
β) *coccinea; Azalea coccinea major* Lodd. bot. cab. t. 624.
11. 5 *bicolor* Pursh fl. Amer. sept. I, 153. Trew. pl. sel. t. 48. America foed. orientalis.
nudiflora et *bicolor* Ait. hort. Kew. ed. 2. I, 319.
Rhododendron bicolor G. Don dichl. pl. III, 847.
12. 5 *canescens* Mich. fl. bor. amer. I, 150. Wats. dendr. br. t. 116. America foed. australis.
Rhododendron canescens G. Don dichl. pl. III, 848.
13. 5 *calendulacea* Mich. fl. bor. amer. I, 151. bot. reg. t. 1454. America foederata.
aurantiaca Dietr. Darstell. vorz. Zierpfl. I, 5. t. 1.
nudiflora coccinea Ait. hort. Kew. I, 202.
pontica β. *calendulacea* Pers. syn. pl. I, 212.
rubra Meerb. pl. select. ic. pict. t. 8.
Rhododendron calendulaceum Torr. fl. of the n. a. m. sect. of Un. St. I, 425.

- β) flore croceo, albo, roseo, fulgido, cupreo et versicolore;
bot. mag. t. 1721 et 3437.
γ) Morterii Sweet fl. gard. 2. ser. t. 10 (hybr. nudiflorae).

Trib. 5. Menziesiaceae (Cor. 1-petala; Caps. septicida; Gemmae fl. nudaе).

XXXII. Bryanthus (S. G. Gmel.) D. Don.

(βρυον, muscus Moos, et ανθος, flos, Blume.)

1. 5 erectus Lindl. et Paxt. flow. gard. I, 97. t. 19. Patria ignota.
2. ♀ Gmelini D. Don in Edinb. new philos. journ. XVII, 160. Camtschatae,
Andrómeda Bryantha L. cod. Nro. 3098. Pall. fl. ross. II, t. 74. f. 1. Sibiria orientalis.
- musciformis Poir. in enc. méth. suppl. I, 353.
Erica Bryantha Thunb. diss. de Eric. Nro. 8.
Menziesia Bryantha Swartz in transact. of the Linn. soc. X, 378. t. 30. f. b.

XL. Phyllodoce Salisb.

(φυλλον, folium, Blatt, et δοκων, videri, scheinen; nomen poeticum exemplo Linnaei, quia planta toto anno, etiam sub nive, foliis ornatur.)

1. ♀ taxifolia Salisb. parad. Londin. t. 56. Europa, Asia
Andrómeda coerúlea L. cod. Nro. 3095. fl. lapp. ed. 1. t. 1. f. 5. et America arcticae,
- Daboecia Pall. fl. ross. II, 57. mons Pyrenaeus.
- taxifolia Pall. fl. ross. II, 64. t. 72. f. 2.
Erica coerúlea Willd. sp. pl. II, 393.
- arctica Waitz Beschr. d. Gatt. u. d. Art. d. Heid. 189.
Menziesia coerúlea Swartz in transact. of the Linn. soc. X, 377. t. 30. f. a.
β) flore carneo et candido Waitz Beschr. d. Gatt. u. d. Art. d. Heid. 190.
γ) flore pentameró Waitz Beschr. d. Gatt. u. d. Art. d. Heid. 190.
2. ♀ Pallasiana D. Don in Edinb. n. philos. journ. XVII, 159. America arctica
Menziesia aleutica Spreng. syst. veg. II, 202. Bong. in occid. (insulae).
mém. de l'acad. de St. Pé. II, t. 3.
3. ♀ empetriformis D. Don in Edinb. n. phil. journ. XVII, 160. America foederata
Menziesia empetriformis Smith in transact. of the Linn. orientalis et media.
soc. X, 280.
4. 5 Grahami Nutt. in transact. of the amer. phil. soc. n. ser. VIII, 269. America boreali-
empetriformis Grah. in bot. mag. t. 1176. occidentalis.
Menziesia Grahmi Hook. fl. bor. amer. II, 40.

XLI. Daboecia (nec Daboecia) D. Don.

(Dabeci nomen hujus plantae hibernicum teste Rajo.)

1. ♀ polifolia D. Don in Edinb. n. phil. journ. XVII, 160. Hibernia,
Andromeda Daboecia L. cod. Nro. 3099 (syst. p. 406). mons Pyrenaeus.
- montana Salisb. prodr. stirp. hort. Chap. Allert. 290.
Erica Daboecii L. sp. pl. 509.
Menziesia Daboecia DC. fl. franç. III, 674.
- polifolia Juss. in ann. du Mus. d'hist. nat. I, 55. t. 4. f. 1.
Vaccinium cantabricum Huds. fl. angl. I, 143.
β) flore albo Sweet brit. flow. gard. 2. ser. t. 276.

XLII. Menziesia Sm.

(Archib. Menzies, Scotus, chirurgus, navarchum Vancouver annis 1791—1794 comitatus, oras occidentali-boreales Americae permigravit.)

1. 5 urceolaris Salisb. parad. Londin. t. 44. America bor.-occident.
ferruginea Smith ic. ined. III, t. 56. DC. prodr. VII, 714.
2. 5 globularis Salisb. parad. Lond. ad tab. 44. adnot. America foed. orient.
ferruginea var. β. Sims bot. mag. t. 1571.
pilosa Juss. in ann. du Mus. d'hist. nat. I, 56. Gu. et H. Abb. fr. H. t. 27.
Smithii Mich. fl. bor. amer. I, 235.
Azaléa pilosa Mich. in journ. d'hist. nat. I, 410. enc. méth. suppl. I, 520.
Candollea azaleoides Baum. hort. Bollw.

Not. Quae M. alba in horto nostro dendrologico culta?

XLIII. Loiseleuria Desv.

(Loiseur-des-Longchamps, medicus Parisiensis, flora gallica bene meritis, † 1849.)

1. ♀ procumbens Desv. journ. de bot. 1813. III, 35. Europa, Sibiria,
Azaléa procumbens L. cod. Nro. 1199. fl. dan. t. 9. bot. cab. t. 762. Amer. bor. brit.

Chamaecistus serpyllifolius Gray nat. arrang. of brit. pl. II, 401.
Chamaelédon procumbens Link enum. pl. hort. Berol. I, 211.
 β) *tomentosa* Dum. Cours. bot. cult. 2. éd. III, 336 (sub *Azalea*);

XLIV. *Kalmia* L.

(Peter Kalm Americam borealem medio saeculo XVIII permigravit, professor botanices finnicae universitatis Abo, † 1779.)

- * 1. 5 *latifolia* L. cod. Nro. 3063. bot. mag. t. 175. America borealis.
 lucida, nitida et rubra Hort.
- * 2. 5 *angustifolia* L. cod. Nro. 3064. bot. mag. t. 331. America borealis.
 β) *marginata* Hort.
 γ) *ovata* Pursh fl. Amer. sept. I, 296.
- 3. 5 *cuneata* Mich. fl. bor. amer. I, 257. America foed. australis.
- * 4. 5 *glauca* Ait. hort. Kew. II, 64. t. 8. bot. mag. t. 177. America britannica et
 polifolia Wangh. in Schr. d. Ges. naturf. Fr. zu Berl. foederata borealis.
 VIII, 2, 129. t. 5.
- * β) *rosmarinifolia* Pursh fl. Amer. sept. I, 296.
- 5. 5 *hirsuta* Walt. fl. carol. 138. bot. mag. t. 138. America foed. australis.
 ciliata Bartr. trav. through N. a. S. Car. Georg. 18.

Trib. 6. *Clethreae* (Cor. pleiopetala; Caps. septica).

XLV. *Ammyrsine* Pursh (1812).

(ἀμυρς, arena, Sand, et μυρσινη, myrtus, Myrte.)

- 1. 5 *buxifolia* Pursh fl. Amer. sept. I, 301. bot. reg. t. 551. America foed. australis.
 Dendrium buxifolium Desv. in journ. de bot. 1813. III, 36.
 Fischera buxifolia Swartz in mém. de la soc. d. natur. de Mosc. V, 16.
 Ledum buxifolium Berg. act. Pétrop. 1777. 213. t. 3. f. 2. bot. reg. t. 531.
 - *thymifolium* Lam. enc. méth. III, 459. ill. d. genr. t. 363. f. 2.
 - *thymifolium* Don dichl. pl. III, 851.
 Leiophyllum buxifolium Ell. sk. of bot. of N. a. S. Car. 483 (nec Pers.).
- 2. 5 *serpyllifolium* DC. prodr. VII, 730 (sub *Leiophyllum*). America borealis.
 Ledum serpyllifolium l'Her. stirp. nov. aut nim. cogn. II, t. 10.
- 3. 5 *prostrata* Sweet hort. brit. ed. 1. Nro. 28221. America borealis.
 Lyoni Sweet hort. brit. ed. 3. p. 444.
 Leiophyllum prostratum Loud. arbor. et frut. brit. II, 1155.

XLVI. *Cladanthus* Bong.

(κλαδος, ramus, Zweig, et θαμνος, virgulum, Gestraeuch.)

- 1. 5 *pyrolaeiflorus* Bong. in mém. de l'ac. de Pét. 6. sér. II, 156. t. 1. America arctica
 Tolmiea occidentalis Hook. fl. bor. amer. II, 44. occidentalis.

XLVII. *Ledum* L.

(λεῖδον apud Veteres: Cisti species ladaniferae.)

- * 1. 5 *palustre* L. cod. Nro. 3065. bot. cab. t. 560. Europa med. et bor.,
 β) *decumbens* Ait. hort. Kew. ed. 2. III, 48. Sibiria, Amer. arct.
- * 2. 5 *latifolium* Ait. hort. Kew. II, 65. Gu. et H. Abb. fr. Holzzart. t. 50. America britannica
 groenlandicum Retz. fl. Scand. prodr. 2. ed. 493. et foederata borealis.
 palustre β) *latifolium* Mich. fl. bor. amer. I, 259.
- β) *canadense* Lodd. bot. cab. t. 1049.
- 3. 5 *glandulosum* Nutt. in transact. of the am. phil. soc. n.
 ser. VIII, 270. America bor.-occid.

XLVIII. *Bejaria* (nec *Befaria* L.) Mut.

(Bejar, professor botanices Gaditanus exeunte saeculo XVIII.)

- 1. 5 *racemosa* Vent. jard. du Cels t. 51. America foed. austr.
 paniculata Mich. fl. bor. amer. I, 280. t. 26.

XLIX. *Hilletia* Muehlenb.

(Steph. Elliot, botanices professor urbis americanae Charlestown, † 1830.)

- 1. 5 *racemosa* Muehlnb. in Ell. sk. of the bot. of S. Car. a. Fl. I, 448. America foed.-austr.

L. *Clethra* Gaertn.

(κλεθρα apud Veteres, Alnus, Erle, ob foliorum similitudinem.)

- * 1. 5 *alnifolia* L. cod. Nro. 3112. Gu. u. H. Abb. fr. Holzzart. t. 76. America borealis.
 dentata Ait. hort. Kew. II, 73.

- * 2. 5 *tomentosa* Lam. enc. méth. II, 46. Gu. et H. Abb. fr. H. t. 77. America foederata.
alnifolia Walt. fl. carol. 136.
 - β . *tomentosa* (pubescens Ait.) Mich. fl. bor. amer. I, 260.
incana Pers. syn. pl. I, 483.
pubescens Willd. enum. pl. hort. Berol. 455; Wats. dendrol. brit. t. 39.
- 3. 5 *scabra* Pers. syn. pl. 482. America foed. austr.
- 4. 5 *paniculata* Ait. hort. Kew. II, 73. America foed. austr.
- * 5. 5 *acuminata* Mich. fl. bor. amer. I, 260. bot. cab. 1427. America foed. austr.
montana Bartr. in cat. Fras. et Lois. in nouv. Duh. V, 130.
- 6. 5 *barbinervis* S. et Z. Abh. d. m. phys. Kl. d. baier. Ac. d. W. IV, 3. 128. Japonia.
 ? *japonica* Thunb. (ubinam?) teste Steud. nomencl. bot. ed. 2. I, 363.

Fam. 101. Pyroleae.

LI. *Chimóphila* (nec *Cheimaphila*) Pursh.

(χεμα, χειμων, hyems, Winter, et φλεην, amare, lieben; ob folia sempervirentia.)

- * 1. \hbar *umbellata* Nutt. gen. of N. Amer. pl. I, 274. Europa borealis et
corymbosa Pursh fl. Amer. septentr. I, 300. media, Sibiria, Mexico,
Pýrola umbellata L. cod. Nro. 3116; bot. mag. t. 897; fl. dan. 1336. America borealis.
 - *frutescens* Gilib. fl. lithuan. V, 195.
 β) *mexicana* DC. prodr. VII, 775.
- 2. \hbar *maculata* Pursh fl. Amer. septentr. I, 300. America borealis.
Pýrola maculata L. cod. Nro. 3117; bot. mag. t. 897.
- 3. \hbar *Menziesii* Spreng. syst. veget. II, 317. America boreali-occid.
Pýrola Menziesii R. Br. in transact. of the Werner. soc. V, 245..

Fam. 102. Cyrilleae.

LII. *Cyrilla* (rectius *Cirilla*) Garden.

(Domen. Cirillo, medicinae professor Neapoli de plantis neapolitanis et hortensibus
 plura in lucem edidit, † 1799.)

- 1. $\beta\beta$ *racemiflora* (racemosa Dun. et Loud.) L. cod. Nro. 1620. America foederata
caroliniana Mich. fl. bor. amer. I, 158. bot. mag. t. 2456. austr. orientalis.
Itea caroliniana Lam. illustr. d. genr. t. 147. f. 2.
 - *Cyrilla* Marsh. arb. amer. 13.
 - *racemiflora* Hort.

LIII. *Cliftonia* Banks.

(Franz. Clifton, medicus anglicus dimidia parte prima saeculi XVIII, multum de
 Hippocrate disseruit.)

- 1. 5 *ligustrina* Gaertn. d. fr. et sem. pl. III, 2. 246. t. 225. America foeder. austr.
Mylocarpum ligustrinum Willd. enum. pl. hort. Berol. 454; bot. mag. t. 1625.

Fam. 103. Myrsinaceae.

LIV. *Maesa* Forsk.

(Maas nomen aegyptiacum *M. lanceolatae* Forsk.)

- 1. 5 *acuminata* A. DC. prodr. VIII, 77. Nepal.
lanceolata Don prodr. fl. nepal. 148.
Baeobotrys acuminata Spreng. syst. veget. V, 89.
 - *lanceolata* Spreng. syst. veget. IV, 2. 83.
- 2. 5 *montana* A. DC. prodr. VIII, 79. India orientalis, Nepal,
memoralis A. DC. in transact. of the Linn. soc. XVII, China.
 134 (excl. syn. Vahl et Forest).
Baeobotrys indica Wall. numer. list. Nro. 2318 B.
 - *memoralis* Roxb. fl. ind. II, 232. Mart. amoen. bot. Monac. t. 5.
 β) Fol. lanceolata; *Baeobotrys indica* Hook. in bot. mag. t. 2052.
 γ) Fol. angusta; *Baeobotrys indica* Wall. in Roxb. fl. ind. II, 230 (ex p.).
- 3. 5 *Chisia* Don prodr. fl. nepal. 148. Nepal.
dioica DC. prodr. VIII, 79.
Baeobotrys indica Wall. in Roxb. fl. ind. II, 230 (ex p.).
- * 4. 5 *argentea* Wall. in Roxb. fl. ind. II, 233. ann. d. sc. nat. 2. sér. XV, t. 5. Nepal.
Baeobotrys lanceolata Wall. numer. list. Nro. 2316.

5. 5 *macrophylla* Wall. in Roxb. fl. ind. II, 234. Nepal.
 ? *tomentosa* Don prodr. fl. nepal. 148.
Baeobotrys macrophylla Wall. num. list. Nro. 2325.
 6. 5 *chinensis* (sinensis) A. DC. in ann. d. sc. nat. 2. sér. XVI, 80. China.
 β) *glabrior* Champ. in journ. of bot. and Kew. gd. misc. IV, 300.
 7. 3 *Doraena* Blume in Abh. d. math. phys. Kl. d. baier. Ac. IV, 3. 138. Japonia.
Doraena japonica Thunb. fl. japon. 6 et 84.
 8. ? *coriacea* Champ. in journ. of bot. a. Kew. gd. misc. IV, 300. China.

LV. *Embellia* Burm.
 (nomen zeylanicum.)

1. § *floribunda* Wall. in Roxb. fl. ind. II, 291. India orientalis, Nepal.
esculenta Don prodr. fl. nepal. 147.
 2. § *vestita* Roxb. fl. ind. II, 288. India orientalis, Nepal.
 3. § *Ribes* Burm. fl. ind. 62. t. 23. Ceylonia, India orient.
Burmanni Retz observ. bot. IV, 23. c. ins. Philipp., China,
indica Gmel. syst. I, 218. Cochinchina.
Antidesma Ribes Raeusch. nomencl. bot. 287.
 β) *Siletensis*; E. *Ribes* Wall. in Roxb. fl. ind. II, 285.
 γ) *garcinifolia* Wall. num. list. Nro. 2304 (*Ardisia crenulata* Bl. bijdr. 686).

LVI. *Choripetalum* A. DC.

(χωρίς, separate, getrennt, et πετάλον, petalum, Blumenblatt, ob petala separata.)

1. § *undulatum* A. DC. in transact. of the Linn. soc. XVII, 131. Nepal.
Myrsine ? *undulata* Wall. in Roxb. fl. ind. II, 299.
Embellia Nagushia Don prodr. fl. nepal. 147.

LVII. *Samara* Schreb.
 (derivatio mihi plane dubia.)

1. 5 *obovata* Champ. in journ. of bot. and Kew. gd. misc. IV, 301. China.
Choripetalum obovatum Benth. in Lond. journ. of bot. I, 490.
 - *Benthamii* Hance in Walp. ann. bot. system. III, 10.

LVIII. *Myrsine* L.

(μυρσίνη et μυρτος, myrtus, Myrte, ob similitudinem hujus plantae.)

1. 5 *floridana* A. DC. in transact. of the Linn. soc. XVII, 107. America foederata.
Bumelia ? *punctata* R. et S. syst. veget. IV, 498.
Sideroxylon punctatum Lam. illustr. d. gener. 2160.
 2. 5 *excelsa* Don prodr. fl. nepal. 147. Nepal.
 3. 3 *capitellata* Wall. in Roxb. fl. ind. II, 295; bot. mag. t. 3222. India orientalis,
 β) *angustifolia* Champ. journ. of bot. and Kew. gd. IV, 301. Nepal.
 γ) *grandiflora* A. DC. prodr. VIII, 95.
 δ) *parvifolia* A. DC.; *lanceolata* Wall. num. list. 2297.
 4. 5 *bifaria* Wall. in Roxb. fl. ind. II, 296. India orientalis.
Potama Don prodr. fl. nepal. 146.
 5. 5 *semiserrata* Wall. in Roxb. fl. ind. II, 294; tent. fl. nepal. t. 24. Nepal.
 6. 5 *sessilis* Don prodr. fl. nepal. 146. Nepal.
 7. 5 *subspinoso* Don prodr. fl. nepal. 147. Nepal.
 8. ? *nerifolia* S. et Z. in Abh. d. math. phys. Kl. d. baier. Ac. IV, 3. 137. Japonia.

LIX. *Ardisia* L.

(ἀρδία, cuspis, Spitze, ob antheras cuspidatas.)

1. 5 *Pickeringia* Torr. et Gr. in DC. prodr. VIII, 124. America foed. australis.
Cyrilla paniculata Nutt. in Silf. amer. journ. V, 290.
Pickeringia paniculata Nutt. in journ. acad. Philad. VII, 1. 95.
 2. 5 *floribunda* Wall. in Roxb. fl. ind. II, 272. Nepal.
 3. 5 *pauciflora* Heyne in Roxb. fl. ind. II, 279. China, Cochinchina,
 β) *eymosa* Blume bijdr. 689. India orientalis.
 4. η *macrocarpa* Wall. in Roxb. fl. ind. II, 277. Nepal.
 5. η *crispa* A. DC. in transact. of the Linn. soc. VXII, 124. Japonia, China,
crenulata Lodd. bot. cab. t. 2 (*crenulata* bot. mag. t. 1950). ins. Philippinae,
glandulosa Blume bijdr. 690. India orientalis, Java.
lentiginosa Lindl. in bot. reg. t. 553.
Bladhia crispa Thunb. fl. japon. 97; Banks in Kaempf. ic. pl. sel. t. 7. ic. med.
 β) *elegans* Andr. bot. repos. t. 623; Wall. num. list. Nro. 2262.
crenulata Roxb. fl. ind. II, 276.

6. *h* *primulaefolia* Gardn. et Ch. in Journ. of bot. a. Kew gd. misc. I, 324. China.
 7. *5* *punctata* Lindl. in bot. reg. t. 827. China.
 Lindleyana Dietr. syn. plant. I, 617.
 8. *5* *pentagóna* A. DC. in transact. of the Linn. soc. XVII, 124. China.
 quinquegóna Blume bijdr. 689.
 9. *h* *glabra* A. DC. in transact. of the Linn. soc. XVII, 350. Japonia.
 Bladhia glabra Thunb. in transact. of the Linn. soc. II, 331.
 * 10. *h* *japonica* Blume bijdr. 690. Japonia, China.
 Bladhia japonica Thunb. fl. japon. I, 96. t. 18.
 β) *Caule erecto*; Morr. et Dne bull. de l'acad. de Brux. 1836, 171.
 odontophylla Lindl. in bot. reg. t. 1892.
 11. *5* *thyrsiflora* Don prodr. fl. nepal. 148. Nepal.

Fam. 104. Aegiceraceae.

LX. Aegiceras Gaertn.

(*ἀίξ*, capra, Ziege, et *κερας*, cornu, Horn, ob fructum elongatum et arcuatum.)

1. δ *major* Gaertn. de fr. et sem. I, 216, t. 46. India orientalis,
fragrans Koen. in ann. of bot. I, 131. t. 3. China, Australia.
obovatum Blume bijdr. 693.
Rhizophora corniculata L. cod. Nro. 3432.

Fam. 105. Sapotaceae.

LXI. Achras L.

(*ἀχρας*, apud Graecos *Pirus sylvestris*, ob fructus edules.)

- * 1. δ *Sapóta* (*Zapota* Aut.) L. cod. Nro. 2550; bot. mag. Culta inter tropicos et
 t. 3111 et 3112. in Japonia, Chinaque
Sapóta Achras Mill. dict.; Gaertn. de fr. et sem. II, t. 104. sed in India occidentalis
 β) *Sapotilla* P. Browne civ. a. nat. hist. of Jam. 200. indigena.
 γ) *Fructu sphaerico*; Sloane voy. to the isl. Mad., Jam. etc. II, 171. t. 230.
 δ) *Corolla apice 3-dentata*; ? *Mimusops hexandra* Wall. num. list. Nro. 4148.

LXII. Sideroxylon L.

(*σίδηρον*, ferrum, Eisen, et *ξύλον*, lignum, Holz.)

1. δ *Wightianum* Wall. num. list. Nro. 4147; H. et Arn. bot. China (Macao).
 Beech. voy. 196. t. 41. India orientalis,
 2. δ *attenuatum* A. DC. prodr. VIII, 178. insulae Philippinae,
 Mimusops ? attenuata Wall. numer. list. Nro. 4150. China.
 β) *acuminatum* (sub *Chrysophyllo*) Boj. hort. Maurit. 197.
 3. *5* *Cantoniense* Lour. flor. cochinch. 151. China (Canton).
 4. δ *decandrum* L. cod. Nro. 1548b. America foed. australis.

LXIII. Bumella Swartz.

(*βουμेलία* apud Graecos *Fraxinus*, Esche.)

- * 1. *5* *lycioides* Gaertn. fl. suppl. carpol. 127. t. 120. Mexico,
 pubescens Ten. del. sem. hort. Neapol. 1827. America foederata
 Sideroxylon laeve Walt. fl. carol. 100. australis:
 - *lycioides* Willd. sp. pl. I, 1090.
 2. δ *tenax* Willd. sp. pl. I, 1085. America foederata
 chrysophylloides Pursh fl. Amer. sept. I, 155. australis (Carolina).
 Chrysophyllum carolinense Jacq. observ. bot. III, 3. t. 54.
 Sideroxylon chrysophylloides Mich. fl. bor. amer. I, 123.
 - *sericeum* Walt. fl. carol. 100.
 - *tenax* L. cod. Nro. 1545.
 3. δ *tomentosa* A. DC. prodr. VIII, 190. America foed. austr.
 4. δ *lanuginosa* Pers. syn. pl. I, 237. America foed. austr.
 Sideroxylon lanuginosum Mich. fl. bor. amer. I, 155.
 5. *h* *reclinata* Vent. choix d. plant. t. 22. America foed. austr.
 Sideroxylon reclinatum Mich. fl. bor. amer. I, 122.
 6. δ *oblongifolia* Nutt. gen. of N. Amer. pl. I, 135. America foed. media.

LXIV. Bassia Koen.

(Ferdin. Bassi, medicus Bononiensis et professor botanices, † 1774.)

1. δ *butyracea* Roxb. in asiat. res. VIII, 477. Himalaya, Nepal.

Fam. 106. *Styracaceae*.LIV. *Symplocos* Jacq.

(συμπλοκος, connexus, zusammengeluegt, ob calycem cum ovario connatum.)

1. ♂ tinetoria l'Her. in *transact. of the Linn. soc. I*, 176. America foederata.
Hoepa tinetoria L. cod. Nro. 5735; *Catesb. nat. hist. of Car. t. 54*.
2. ♂ Loha Don *prodr. fl. nep.* 144. Nepal.
3. ♂ Sumuntia Don *prodr. fl. nep.* 145. Nepal.
β) floribunda Wall. num. list. Nro. 4419.
4. ♂ leptostachys S. et Z. in *Abh. d. m. phys. Kl. d. baier. Ac. IV*, 3, 134. Japonia.
5. ♂ theophrastaeifolia S. et Z. in *Abh. d. m. phys. Kl. d. baier. Ac. IV*, 3, 134. Japonia.
6. ♂ neriifolia S. et Z. in *Abh. d. math. phys. Kl. d. baier. Ac. IV*, 3, 134. Japonia.
7. ♂ japonica A. DC. *prodr. VIII*, 255. Japonia merid.
β) crassifolia Champ. in *journal. of bot. and Kew. gd. misc. IV*, 303.
γ) lucida S. et Z. *fl. japon. I*, 56, t. 24.
8. ♂ prunifolia S. et Z. in *Abh. d. m. phys. Kl. d. baier. Ac. IV*, 3, 133. Japonia.
9. ♂ myrtacea S. et Z. in *Abh. d. math. phys. Kl. d. baier. Ac. IV*, 3, 133. Japonia.
10. ♂ lancifolia S. et Z. in *Abh. d. math. phys. Kl. d. baier. Ac. IV*, 3, 133. Japonia.
11. ♂ racemosa Roxb. *fl. ind. ed. 1832. II*, 539. India orient., Nepal.
theaeifolia Don *prodr. fl. nepal.* 145.
12. ♂ nervosa A. DC. *prodr. VIII*, 256. Nepal.
racemosa Wall. numer. list. Nro. 4418.
13. ♂ ramosissima Wall. num. list. Nro. 4425. Nepal.
14. ♂ crataegoides Don *prodr. fl. nepal.* 145. Nepal, Himalaya.
paniculata Wall. num. list. Nro. 4427.
Lhokra crataegoides Dne in *Jacq. voy. aux Ind. 103. t. 110*.
15. ♂ sinica Ker in *bot. reg. t. 710*. China.
? Myrtus chinensis Lour. *fl. cochinch. I*, 383.
16. ♀ microcarpa Champ. in *journal. of bot. and Kew. gd. misc. IV*, 304. China.
17. ♀ odoratissima Champ. in *journal. of bot. and Kew. gd. misc. IV*, 304. China.

LXVI. *Styrax* L.

(Jam apud Veteres gummi et arbor; nomen arabicum assthirax, a voce: stiria, i. e. gutta, Tropfen.)

- * 1. 5 officinalis L. cod. Nro. 3119; *bot. cab. t. 928*. Oriens, Graecia, Dalmat.
2. 5 pulverulenta Mich. *fl. bor. amer. II*, 41. Virginia, Carolina.
laevigata Sims in *bot. mag. t. 921*.
3. 5 grandifolia Ait. *hort. Kew. II*, 75; *Wats. dendr. brit. t. 129*. America foederata.
grandiflora Mich. *fl. bor. amer. II*, 41.
officinalis Walt. *fl. carol.* 140.
4. 5♂ Obassia S. et Z. *fl. japon. I*, 93, t. 46. Japonia.
5. 5 suberifolia H. et Arn. in *bot. of Beech. voy. 196. t. 40*. China australis.
6. 5 odoratissima Champ. in *journal. of bot. a. Kew. gd. misc. IV*, 304. China.
7. 5 japonica S. et Z. *fl. japon. I*, 53, t. 23. Japonia australis.
8. 5 americana Lam. *enc. méth. I*, 82. America foederata
glabra Cav. *diss. VI*, 500, t. 188, f. 1. australis.
laevis Walt. *fl. carol.* 140.
? laevigata Ait. *hort. Kew. II*, 75.
octandra l'Her. *stirp. aut. min. cogn. II*, t. 17.

LXVII. *Pterostyrax* S. et Z.

(πτερον, ala, Fluegel, et στυραξ, Styrax, Storaxbaum, ob drupam alatum.)

1. 5 corymbosa S. et Z. *fl. jap. I*, 94, t. 47. Japonia australis.
2. 5 micrantha S. et Z. in *Abh. d. math. phys. Kl. d. baier. Acad. IV*, 2, 132. Japonia.
3. 5 hispida S. et Z. in *Abh. d. math. phys. Kl. d. baier. Acad. IV*, 2, 132. Japonia.

LXVIII. *Halesia* L.

(St. Hales, clar. autor operis gravissimi „vegetable statiks“, sacerdos pagi Toddington in comitate Midlesex, † 1671.)

- * 1. 5 tetraptera L. cod. Nro. 3443; *bot. mag. t. 910*. America foed. austr.
- * 2. 5 diptera L. cod. Nro. 3443; *bot. cab. t. 1172*. America foed. austr.
3. ♂ parviflora Mich. *fl. bor. amer. II*, 40. America foed. austr.

Fam. 109. Ebenaceae.

LXIX. *Respidios* A. DC.
(anagramma vocis *Diospyri*.)

1. 5 *vaccinoides* A. DC. prodr. VIII, 220. China, Malacca.
Diospyros vaccinioides Lindl. in Hook. exot. fl. t. 139.

LXX. *Diospyros* L.

- (*Διοσπυρος*, i. e. *Jovis triticum*, h. l. fruges, jam apud Graecos *Diospyros Lotus* L.)
 * 1. 5 *texana* Scheele in Linn. XXII, 145. Texas.
 * 2. 5 *virginiana* L. cod. Nro. 7701; Mich. arbr. for. de l'Am. t. 12. America foederata.
 concolor Moench meth. 470.
 β) *microcarpa* Raf. med. fl. II, 153.
 pubescens Pursh fl. Amer. sept. 265.
 * 3. 5 *Lotus* L. cod. Nro. 7701; Pall. fl. ross. t. 58. China, Transc., Pontus.
 4. 5 *Morrisiana* Hance in Walp. ann. bot. system. III, 14. China (Hongkong).
 5. 5 *Kaki* L. fl. suppl. 439; Kaempf. amoen. p. 806. c. ic. China, Japonia.
 chinensis Blume in cat. hort. Buit. 110.
 β) *cordata* Wight ic. pl. Ind. orient. t. 415.
 6. 5 *japonica* S. et Z. in Abh. d. math. phys. Kl. d. baier. Ac. IV, 2 136. Japonia.
 Kaki β. *glabra* Thunb. fl. jap. 158.
 7. 5 *eriantha* Champ. in journ. of bot. and Kew. gd. misc. I, 324. China.
 8. 5 *grata* Wall. num. list. Nro. 2142. Nepal.

INDEX.

- Achras* L. LXI.
 Sapota L. (*Zapota* Aut.) 1.
 Sapotilla P. Browne 1 β.
Acosta Lour. VI.
 spicata Lour. 1.
Aegialea Klotzsch XXVII.
 phillyreaefolia C. Koch 1.
Aegiceras Gaertn. LX.
 fragrans Koen. 1.
 major Gaertn. 1.
 obovatum Blume 1.
Agapetes D. Don V.
 Acosta DC. VI, 1.
 Dunaliana C. Koch 2.
 venosa C. Koch. 1.
Amyrsine Pursh XLV.
 buxifolia Pursh 1.
 Lyonii Sweet 3.
 prostrata Sweet 3.
Andrachne frutescens Ehr. XII, 4.
Andromeda L. X.
 acuminata Ait. XXXII, 4.
 americana Hort. 1.
 angustifolia Pursh XXIX, 2.
 arbores L. XXX, 1.
 axillaris Mich. XXXII, 2. Sol. 1.
 baccata Wangenh. IV, 2.
 bracteosa DC. XVI, 1.
 Bryantha L. XXXIX, 2.
 calyculata L. XXIX, 1.
 canadensis Hort. 1.
 cassinefolia Vent. XIX, 1.
 Andromeda Catesbaei Walf. XXXII, 1.
 coerulea L. XL, 1.
 coriacea Ait. XXXII, 5.
 crispa Desf. XXIX, 2.
 cupressiformis Wall. XXII, 8.
 cupressina Hook. XXII, 4.
 Daboecia Pall. XL, 1 et L. XLI, 1.
 dealbata Lindl. XIX, 1 β.
 elliptica S. et Z. XVIII, 4.
 ericoides Pall. XXII, 5.
 fastigiata Wall. XXII, 8.
 ferruginea Nutt. XXXII, 5.
 floribunda Sims XXIV, 1.
 Fontanesiana Steud. XXXII, 3.
 formissima Bartr. XXXII, 14.
 formosa Wall. XVIII, 1.
 frondosa Pursh XXXI, 4.
 glaucofolia Wender. 1 β.
 glaucophylla Lk 1 β.
 globulifera Hort. XXXI, 1.
 hypnoides L. XXII, 6.
 japonica Thunb. 2.
 kalmiaefolia Hffmsgg 1 γ.
 lanceolata Don XVIII, 2.
 - Desf. XXXII, 3.
 laurina Mich. XXXII, 4.
 ligustrina Muehleb. XXXI, 1.
 lucida Jacq. XXXII, 4. et Lam. 5.
 luridifolia Gawl. 1, 27.
 lycopodioides Pall. XXIII, 1.
 marginata nouv. Duh. XXXII, 5.
 Mariana Jacq. XXXII, 5. L. 6.

Andromeda Mertensiana Bong. XXII, 4.
montana Salisb. XLI, 1.
muscifformis Poir. XXXIX, 2.
myrtifolia Salisb. XXXII, 5.
nuda Mich. XXXII, 5.
oleifolia Hort. 1 s.
ovalifolia Wall. XVIII, 3.
paniculata Walt. (et L.?) XXV, 1.
 - Willd. XXXI, 1.
 - β . *foliosiflora* Mich. XXXI, 4.
parabolica Duh. XXXI, 2.
phillyreaefolia Hook. XXVII, 1.
pilulifera Hort. XXXI, 1.
Polifolia L. 1.
polyantha Steud. XXXI, 2.
populifolia Lam. XXXII, 4.
pulchella Salisb. XXXII, 6.
pulverulenta Bartr. XIX, 1 β .
racemosa L. XXV, 1.
 - Lam. XXXI, 1. Walt. 4.
Redowskii Ch. et Schlecht. XXII, 2.
reticulata Walt. XXXII, 4.
revoluta Hort. 1.
rhomboidalis Duh. XXXII, 5.
rigida Pursh XXXI, 4 et Nutt. 5 β .
rosmarinifolia Pursh. 1 η .
serrata et serratifolia Hort. XXXII, 4.
sinensis Hort. ad fin.
speciosa Mich. XIX, 1.
spicata Walt. XXV, 1.
spinulosa Pursh XXXII, 2.
squamulosa Don XVIII, 2.
Stelleriana Pall. XXII, 7.
taxifolia Pall. XL, 1.
tetragona L. XXII, 3.
tomentosa Dum. C. XXV, 1.
venulosa DC. XVI, 3.
villosa Wall. 3.
Walteri Willd. XXXII, 3.
Watsoniana Steud. XXXI 1 β .
Anthocoma C. Koch XXXIV.
aromatica C. Koch 1.
Anthodendron nudiflorum Rehb. XXXVIII, 9.
ponticum Rehb. XXXVIII, 1.
viscosum Rehb. XXXVIII, 4.
Antidesma Ribes Raeusch. LV, 3.
Arbutus L. XII.
Acadiensis L. 9 et XX, 1.
alpina XIII, 1.
Andrachne L. 4.
andrachnoides Lk. 3.
buxifolia Stok. XIII, 2.
crispa Hffsmgg 1 γ .
filiformis Lam. II, 1.
glauca Loud. XIV, 3.
hibernica Hort. 1 η .
integrifolia Lam. 5.
 - Salisb. 4.
 - Sims 1 δ .
hybrida Ker. 2.
lanceolata Lam. 9.
laurifolia L. fil. 8 β .
lucida Hort. 4.
Madrono Humb. XVI, 1.
Menziesii Pursh 8.
Milleri Mayes 2 β .

Arbutus nuda Hook. et Arn. XVI, 1 β .
obtusifolia Loud. XIV, 2.
 - Rafin. 8 γ .
procera Dougl. 7.
procumbens Kluck XIII, 3.
 - Salisb. XIII, 2.
punctata Hook. et Arn.
pungens Hook. et Arn. XIV, 1.
salicifolia Hffsmgg 1 β .
serratifolia Lodd. 4 β .
 - Salisb. 1.
Sieberi Klotzsch 6.
thymifolia Ait. II, 1.
tomentosa Pursh XVI, 1.
Unedo L. 1.
Uva ursi L. XIII, 2.
Arctostaphylos Adans. XIII.
acuta Nutt. XIV, 6.
alpina Spreng. 1.
cordifolia Lindl. XIV, 2.
glauca Lindl. XIV, 3.
Hookeri Don XIV, 1.
officinalis Wimm. et Gr. 1.
pumila Nutt. XIV, 5.
tomentosa DC. XVI, 1.
 - β . *arguta* DC. XVI, 2.
Uva ursi Spreng. 2.
Ardisia L. LIX.
crenata bot. mag. 5 et Roxb. 5 β .
crenulata Blum. LV, 3 γ .
 - Lodd. 5.
crispa A. DC. 5.
cymosa Blume 3 β .
elegans Andr. 5 β .
floribunda Wall. 2.
glabra A. DC. 9.
glandulosa Blume 5.
japonica Blume 10.
lentiginosa Lindl. 5.
Lindleyana Dietr. 7.
macrocarpa Wall. 4.
odontophylla Lindl. 10 β .
pauciflora Heyne 3.
pentagona A. DC. 8.
Pickeringia T. et Gr. 1.
primulaefolia Gardn. et Champ. 6.
punctata Lindl. 7.
quinquegona Blume 8.
thyrsiflora Don 11.
Azalea L. XXXVIII.
amoena Lindl. 78.
arborea L. 1.
arborescens Pursh 7.
aurantiaca Dietr. 13.
Bealii Hort. XXXIII, 86 β .
bicolor Pursh 11.
calendulacea Mich. 13.
canescens Mich. 12.
chinensis Lodd. XXXIII, 89.
coccinea major Lodd. 10 β .
crispiflora Hook. XXXIII, 88.
Danielsiana Paxt. XXXIII, 75.
decumbens DC. XXXIII, 75.
ferruginea Pall. XXXVI, 2.
ferruginosa Pall. XXXIII, 60.
fimbriata Dum. C. 2.

- Azalea flava* Hfmsgg 1 β .
floribunda Dum. C. 4 α .
fragrans Adans. XXXVI, 1.
 - Rafn. 4.
glauca Meerb. 5.
hispida Pursh 6.
indica L. XXXIII, 65. 66. et Sims. 68.
 - Thunb. XXXIII, 72.
 - alba Lindl. XXXIII, 70.
 - calycina Lindl. XXXIII, 80.
 - latericia Lindl. XXXIII, 76.
 - vittata Hort. XXXIII, 86.
lapponica L. XXXIII, 60.
 - Pall. XXXVI, 2.
ledifolia Hook. 69.
lugens Dum. C. 3.
macrantha Bge XXXIII, 89 β .
mollis Blume XXXIII, 83.
Morterii Hort 13 γ .
mucronata Blume XXXIII, 70.
narcissiflora Fort. XXXIII, 87.
nitida Pursh 8.
nudiflora L. 9.
 - β . bicolor Ait. 11.
 - γ . coccinea Ait. 13.
obtusa Lindl. XXXIII, 77.
ovata Lindl. XXXIII, 90.
pallida Turcz. XXXVI, 2.
pallidissima Pers. 9.
periclymenoides Mich. 9.
pilosa Mich. XLII, 2.
pontica L. 1.
 - β . calendulacea Pers. 13.
procumbens L. XLIII, 1.
prolifera Poit. XXXIII, 74.
punicea Sweet XXXIII, 73.
purpurea Sweet XXXIII, 74.
ramentacea Lindl. XXXIII, 81.
rosmarinifolia Burm. XXXIII, 69.
rubra Meerb. 13.
serotina Dum. C. 4 δ .
sinensis Lodd. 2.
spathulata Dum. C. 1 α .
speciosa Willd. 10.
squamata Lindl. XXXIII, 79.
tomentosa Dum. C. XLIII, 1 β .
virens Dum. C. 4.
viscosa L. 4.
 - *glauca* Mich. 5.
Baeobotrys acuminata Spreng. LIV, 1.
indica Wall. et Hook. LIV, 2. 3.
lanceolata Spreng. 1 et Wall. 4.
macrophylla Wall. 5.
nemoralis Roxb. 2.
Bassia Koen. LXIV.
 - *butyracea* Roxb. 1.
Batodendron arboreum Nutt. 1, 9.
Bejaria (nec Befaria) Mut. XLVIII.
 - *paniculata* Mich. 1.
 - *racemosa* Vent. 1.
Bladha crispa Thunb. LIX, 5.
 - *glabra* Thunb. LIX, 9.
 - *japonica* Thunb. LIX, 10.
Bruckenthalia Rehb. X.
 - *spiculiflora* Rehb. 1.
Bryanthus S. G. Gmel. XXXIX.
Bryanthus erectus Lindl. et Paxt. 1.
 - *Gmelini* D. Don 2.
 - *Stelleri* D. Don XXII, 7.
Bumelia Swartz LXIII.
 - *chrysophylloides* Pursh 2.
 - *lanuginosa* Pers. 4.
 - *lycioides* Gaertn. 1.
 - *oblongifolia* Nutt. 5.
 - *pubescens* Ten. 1.
 - *punctata* R. et S. LVIII, 1.
 - *reclinata* Vent. 5.
 - *tenax* Willd. 2.
 - *tomentosa* A. DC. 3.
Calluna Salisb. VIII.
 - *Erica* DC. 1.
 - *vulgaris* Salisb. 1.
Candollea azaleoides Baum. XLII, 2.
Cassandra angustifolia G. Don XXIX, 2.
 - *calyculata* D. Don XXIX, 1.
Cassiope D. Don XXII.
 - *ericoides* D. Don 5.
 - *fastigiata* D. Don 8.
 - *hynoides* D. Don 6.
 - *lycopodioides* D. Don 1.
 - *Mertensiana* G. Don 4.
 - *Redowskii* G. Don 2.
 - *Stelleriana* DC. 7.
 - *tetragona* D. Don 3.
Chamaecistus serpyllifolius Gray XLIII, 1.
Chamaedaphne Moench XXIX.
 - *calyculata* Moench 1.
Chamaeledon procumbens Lk XLIII, 1.
Chimophila (nec Chimaphila) Pursh LI.
 - *corymbosa* Pursh 1.
 - *maculata* Pursh 2.
 - *Menziesii* Spreng. 3.
 - *umbellata* Nutt. 1.
Chiogenes Salisb. II.
 - *hispidula* T. et Gr. 1.
 - *serpillifolia* Salisb. 1.
Choripetalum A. DC. LVI.
 - *Benthami* Hance LVII, 1.
 - *obovatum* Benth. LVII, 1.
 - *undulatum* A. DC. 1.
Chrysophyllum acuminatum Boj. LXII, 1 β .
 - *carolinense* Jacq. LXIII, 2.
 - *obovatum* Wall. LXII, 1.
Cirilla v. Cyrilla.
Cladothamnus Bong. XLI.
 - *pyrolaeiflorus* Bong. 1.
Clethra Gaertn. L.
 - *acuminata* Mich. 5.
 - *alnifolia* L. 1. Walt 2.
 - *barbinervis* S. et Z. 6.
 - *dentata* Ait. 1.
 - *japonica* Thunb. 6.
 - *incana* Pers. 2.
 - *montana* Bartr. 5.
 - *paniculata* Ait. 4.
 - *pubescens* Willd. 2.
 - *scabra* Pers. 3.
 - *tomentosa* Lam. 2.
Cliftonia Banks LIII.
 - *ligustrina* Gaertn. 1.
Comarostaphylis Zucc. XV.
 - *bicolor* Klotzsch 1.

Cyrilla Garden. LII.
caroliniana Mich. 1.
paniculata Nutt. LIX, 1.
racemiflora (*racemosa*) L. 1.

Daboecia D. Don XLI.
polifolia D. Don 1.

Daphnidostaphylis Klotzsch XIV.
acuta Klotzsch 6.
cordifolia Klotzsch 2.
Fendleriana Klotzsch 4.
glauca Klotzsch 3.
Hookeri Klotzsch 1.
pumila Klotzsch 5.
tomentosa Klotzsch XVI, 1.

Decamerion dumosum Nutt. IV, β 1.
frondosum Nutt. IV, 2.
hirtellum Nutt. IV, 1.
resinosum Nutt. IV, 3.

Dendrium buxifolium Desv. XLV, 1.

Diospyros L. LXX.
chinensis Blume 5.
concolor Moench 1.
cordata Wight 5 β .
oriantha Champ. 7.
grata Wall. 8.
japonica S. et Z. 6.
Kaki L. fil. 5.
 - β . *glabra* Thunb. 6.

Lotus L. 3.
microcarpa Raf. 2 β .
Morrisiana Hance 4.
pubescens Pursh 2 β .
texana Scheele 1.
vaccinioides Lindl. LIX, 1.
virginiana L. 2.

Doraena japonica Thunb. LIV, 7.

Elliottia Muehlenb. XLIX.
racemosa Muehlenb. 1.

Embelia Burm. LV.
Burmanni Retz 3.
esculenta Don 1.
floribunda Wall. 1.
garcinifolia Wall. 3 γ .
indica Gmel. 3.
Nagushia Don LVI, 2.
Ribes Burm. 3.
vestita Roxb. 2.

Enkyanthus Lour. XVII.
biflorus Lour. 2.
quinqueflorus Lour. 1.
reticulatus Lindl. 1 β .
uniflorus Benth. 1.

Epigaea Swartz XXVIII.
repens L. 1.
rubicunda Don 1 β .

Epigynium Dunalianum Klotzsch V, 2.
venosum Klotzsch V, 1.

Erica L. XI.
absinthioides Spreng. 9.
Actaea Hort. 6.
anthura Lk 14.
arborea L. 7.
 - Thore 6.
arctica Waitz XL, 1.
australis L. 4.
asiatica Waitz XXII, 5.

Erica botuliformis Salisb. 1.

bracteata Moench 11.
Bruckenthalii Spreng. X, 1.
Bryantha Thunb. LXXIX, 2.
caffra L. 7.
carnea L. 11.
 - β . *mediterranea* DC. 12.
ciliaris L. 10. et Huss. VIII, 1 ζ .
cinerea L. 8.
codonodes Lindl. 6.
coerulea Willd. XL, 1.
corsica DC. 3.
cretica Tausch 14.
Daboecii L. XLI, 1.
decipiens Spreng. 16.
dianthera Moench 15.
didyma Stokes 16.
elata Link 7 β .
ForskahlIIi Vitm. 14.
fucata Thunb. 9.
herbacea L. 11.
humilis Neck. 8.
lentiformis Salisb. 5.
lugubris Salisb. 12.
lusitana Rudolphi 6.
lycopodioides Waitz XXII, 1.
Mackayi Hook. 2.
manipuliflora Salisb. 14.
mediterranea L. 12.
 - Wahlenb. 14.
multicaulis Salisb. 3.
multiflora Huds. 16.
 - L. 15.
mutabilis Andr. 8.
pallide-purpurea L. 16 γ .
peduncularis (*pedunculata* Guss.) Presl 15.
pendula Wendl. 3.
pistillaris Salisb. 4.
polytrichifolia Salisb. 6.
procera Salisb. 7.
purpurascens Lam. 16 β .
 - Tausch et ? L. 13.
ramulosa Viv. 3.
saxatilis Salisb. 11.
scoparia L. 9.
 - Wulff. 7.
sicula Guss. IX, 1.
spiculiflora Salisb. X, 1.
squarrosa Hort. 7 δ .
Stelleriana Willd. XXII, 7.
stricta Don 3.
strigosa Hort. 6.
stylosa Rudolphi 7 β .
tenuis Hort. 6.
Tetralix L. 1.
transsylvanica Willd. X, 1.
triflora L. 7.
umbellata L. 5.
umbellifera Lois. 15.
vagans L. (*vaga* Salisb.) 16.
 - Benth. 14. et DC. 15.
verticillata Forsk. 14.
virgulata Wendl. 9.
viridipurpurea Gouan 8.
vulgaris L. VIII, 1.

Eubotrys Nutt. XXV.

- Eubotrys brachiata* Nutt. 2.
racemosa Nutt. 1.
Fischera buxifolia Swartz XLV, 1.
Gaultheria Kalm (nec *Gauteria* Endl.) XX.
Acosta Steud. VI, 1.
fragrantissima (fragrans) Wall. 5.
Griffithiana Wight 6.
hispidula Muehbl. II, 1.
humilis Salisb. 1.
Myrsinites Hook. 2.
Nummulariae DC. 3.
nummularioides Don 3.
procumbens L. 1.
serpillifolia Pursh II, 1.
Shallon Pursh. 7.
trichophylla Royle 4.
triquetra S. et Z. 8.
Gaylussacia H. B. K. IV.
brachyceera A. Gr. 5.
dumosa Torr. 1. et A. Gr. 1 β.
frondosa T. et Gr. 2.
hirtella T. et Gr. 1.
resinosa T. et Gr. 3.
ursina A. Gr. 4.
Gypsocallis carnea D. Don XI, 11.
manipuliflora D. Don XI, 14.
mediterranea D. Don XI, 12.
multiflora D. Don XI, 15.
purpurascens D. Don XI, 16 γ.
umbellata D. Don XI, 5.
vagans Salisb. XI, 16.
Halesia L. LXVIII.
diptera L. 2.
parviflora Mich. 3.
tetraptera L. 1.
Hopea tinctoria L. LXV, 1.
Hymenanthus japonica Blume XXXIII, 19.
Itea caroliniana l'Her. LII, 1.
Cyrilla Marsh. LII, 1.
racemiflora Hort. 1.
Kalmia L. XLIV.
angustifolia L. 2.
ciliata Bartr. 5.
cuneata Mich. 3.
glauca Ait. 4.
hirsuta Walt. 5.
latifolia L. 1.
lucida Hort. 1.
marginata Hort. 2 β.
nitida Hort. 1.
ovata Pursh 2 γ.
polifolia Wangenh. 4.
rosmarinifolia Pursh 4 β.
rubra Hort. 1.
Lasierpa hispidula Torr. II, 1.
Ledum L. XLII.
buxifolium Berg. XLV, 1.
canadense Lodd. 2 β.
glandulosum Nutt. 3.
groenlandicum Retz 2.
latifolium Ait. 2.
palustre L. 1.
 - β. *latifolium* Mich. 2.
serpyllifolium l'Her. XLV, 2.
thymifolium Lam. XLV, 1.
Leiophyllum buxifolium Ell. XLV, 1.
Leiophyllum prostratum Loud. XLV, 3.
serpyllifolium DC. XLV, 2.
thymifolium Don XLV, 1.
Leucothoë (D. Don) DC. XXXII:
acuminata Don 4.
axillaris Don 1.
coriacea DC. 5.
floribunda Don XXIV, 1.
lanceolata Desf. 3.
Mariana DC. 6.
spicata Don XXV, 1.
spinulosa Don 2.
Lhodra crataegoides Dne LXV, 14.
Loiseleuria Desv. XLIII.
procumbens Desv. 1.
Lyonia Nutt. XXXI.
arbores Don XXX, 1.
calyculata Rehb. XXIX, 1.
capreaefolia Wats. 3.
ferruginea Nutt. 5.
frondosa Nutt. 4.
ligustrina DC. 1.
marginata Don XXXII, 5.
Mariana XXXII, 6.
multiflora Wats. 2.
paniculata Nutt. 1.
racemosa Don XXV, 1.
rhomboidalis Don XXXII, 5.
rigida Nutt. 5 β.
salicifolia Wats. 1 β.
Maesa Forsk. LIV.
acuminata A. DC. 1.
argentea Wall. 4.
chinensis A. DC. 6.
Chisia Don 3.
coriacea Champ. 8.
Doraena Blume 7.
dioica DC. 3.
lanceolata Don 1.
macrophylla Wall. 5.
montana A. DC. 2.
nemoralis A. DC. 2.
sinensis DC. 6.
tomentosa Don 5.
Mairania alpina Desv. XIII, 1.
Uva ursi Desv. XII, 2.
Meisteria S. et Z. XXI.
cernua S. et Z. 1.
Menziesia Sm. XLII.
alba Hort. ad fin.
aleutica Spreng. XL, 2.
Bruckenthalii Baumg. X, 1.
Bryantha Swartz XXXIX, 2.
coarulea Swartz XL, 1.
Daboecia DC. XLI, 1.
empetriformis Pursh XXII, 7.
 - Sm. XL, 3.
ferruginea Sm. 1.
 - var. β. Sims 2.
Grahami Hook. XL, 4.
globularis Salisb. 2.
pilosa Juss. 2.
polifolia Juss. XLI, 1.
Smithii Mich. 2.
urceolaris Salisb. 1.
Metagonia myrtifolia Nutt. I, 28.

- Metagonia ovata* Nutt. 1, 29.
Mimusops attenuata Wall. LXII, 2.
 hexandra Wall. LXI, 1 &.
Mylocarpum ligustrinum Willd. LIII, 1.
Myrsine L. LVIII.
 bifaria Wall. 4.
 capitellata Wall. 3.
 excelsa Don 2.
 floridana A. DC. 1.
 lanceolata Wall. 3 &.
 neriifolia S. et Z. 8.
 Potama Don 4.
 semiserrata Wall. 5.
 sessilis Don 6.
 subspinosa Don 7.
 undulata Wall. LVI, 1.
Myrtus chinensis Lour. LXV, 15.
Osmothamnus DC. XXXVI.
 fragrans DC. 1.
 pallidus DC. 2.
Oxycoocus Pers. III.
 erectus Pursh 3.
 erythrocarpus Pers. 3.
 europaeus Nutt. 1.
 hispidulus Pers. II, 1.
 macrocarpus Wats. 2.
 palustris Pers. 1.
 - β . *macrocarpus* Pers. 2.
 vulgaris Pursh 1.
Oxydendron DC. XXX.
 arboreum DC. 1.
Pentapera Klotzsch IX.
 sicula Klotzsch 1.
Pentapterygion Klotzsch VII.
 serpens Klotzsch 1.
Phalerocarpus serpyllifolia Don II, 1.
Phyllodoce Salisb. XL.
 empetriformis D. Don 3 et Gr. 4.
 Grahami Nutt. 4.
 Pallasiana D. Don 2.
 taxifolia Salisb. 1.
Pickeringia paniculata Nutt. LIX, 1.
Picrocoocus elevatus Nutt. I, 5.
 floridanus Nutt. 1, 8.
 stamineus Nutt. 1, 6.
Pieris D. Don XVIII.
 formosa Don 1.
 japonica D. Don XXIII, 2.
 lanceolata Don 2.
 ovalifolia Don 3.
 phillyreaefolia DC. XXVII, 1.
Portuna Nutt. XXIV.
 floribunda Nutt. 1.
Pyrola frutescens Gilib. LI, 1.
 maculata L. LI, 2.
 Menziesii R. Br. LI, 3.
 umbellata L. LI, 1.
Pterostyrax S. et Z. LXVII.
 corymbosa S. et Z. 1.
 micantha S. et Z. 2.
 hispida S. et Z. 3.
Rhizophora corniculata L. LX, 1.
Rhododendron L. XXXIII.
 aeruginosum Wall. 30 γ .
 albiflorum Hook. 91.
 album Hfsmgg 53 β . Wall. 18 β .
Rhododendron Altaiclerense Hook. 18 η .
 amoenum Planch. 78.
 Anthopogon D. Don XXXIV, 1.
 arborescens Torr. XXXVIII, 7.
 arboreum Sm. 17.
 argenteum Hook. fl. 6.
 aromaticum Wall. XXXIV, 1.
 Aucklandii Hook. fl. 1.
 azaleoides Gu. et H. 54 β .
 barbatum Wall. 25.
 bicolor Don XXXVIII, 11.
 bigener Lindl. 53 δ .
 Blumei Nutt. 16.
 Boothii Nutt. 21.
 brachycarpum G. Don 56.
 Breynii Planch. 65.
 Burmanni G. Don. 69.
 calendulaceum Torr. XXXVIII, 13.
 Calleryi Planch. 84.
 calophyllum Nutt. 11.
 calycinum Planch. 80.
 camelliaeflorum Hook. fl. 40.
 campanulatum Don 30.
 Campbelliae Hook. fl. 16 β .
 campylocarpum Hook. fl. 34.
 camtschaticum Pall. XXXV, 2.
 Candelabrum Hook. fl. 2 β .
 canescens G. Don XXXVIII, 12.
 Catawbiense Mich. 49.
 - β . *Russellianum* 18 ϵ .
 caucasicum Pall. 60.
 Chamaecistus L. XXXV, 1.
 chinense Sweet 89.
 chrysanthum Pall. 55.
 ciliatum Hook. fl. 24.
 cinnabarinum Hook. fl. 36.
 cinnamomeum Wall. 18 γ .
 crispiflorum Planch. 88.
 dahuricum (dauricum) L. 58.
 Dalhousiae Hook. fl. 22.
 Danielsianum Planch. 75.
 decumbens G. Don 75.
 Edgeworthii Hook. fl. 23.
 elaeanifolium Hook. fl. 43 β .
 ellipticum Hfsmgg 49 β .
 eximium Nutt. 12.
 Falconeri Hook. fl. 4.
 Farrerae Tate 79.
 ferrugineum L. 62.
 flavum G. Don XXXVIII, 1.
 formosum Wall. 27.
 fragrans Hort. et Paxt. 53.
 glaucum G. Don XXXVIII, 5.
 - Hook. fl. 26.
 Govenianum Sweet XXXVIII, 9 ζ .
 grande Wight 3.
 Griffithianum Wight 1.
 hirsutum L. 64.
 hispidum Torr. XXXVIII, 6.
 Hodgsonii Hook. fl. 8.
 Hookeri Nutt. 10.
 hybridum Hook. 53 γ .
 ignescens Sweet 67 β .
 Jenkinsii Nutt. 5.
 indicum Sweet 67.
 - *Smithii* Sweet 68.

- Rhododendron intermedium** Tausch 63.
Kaempferi Planch. 66.
Kendrickii Nutt. 17.
Keysii Nutt. 37.
lanatum Hook. fl. 32.
lanceifolium Hook. fl. 25; Mueh 54.
lapponicum Wahlenb. 61.
latericum Planch. 76.
latifolium Hoffm. 53 γ.
ledifolium Don 70.
lepidotum Wall. 43.
leucanthum Bge 29 et 70.
liliflorum Poit. 70.
linearifolium S. et Z. 82.
longifolium Nutt. 15.
Lowei Loud. 54 β.
lucidum Hook. fl. 42.
macranthum Sweet 75.
macrophyllum G. Don 50.
Maddenii Hook. fl. 35.
maximum L. 52; Thunb. 19.
 - β. album Pursh 51.
 - γ. purpureum Rurh 52.
Metternichii S. et Z. 19.
micranthum Kir. 45.
minus Mich. 57.
mucronatum G. Don 71.
molle S. et Z. 83.
mucronulatum Kir. et ? Turcz. 14.
myrtifolium Lodd. 54 α.
narcissiflorum Planch. 87.
nilagiricum Zenk. 18 β.
nitidum Torr. XXXVIII, 8.
nivale Hook. fl. 47.
niveum Hook. fl. 31.
nobile Wall. 93.
Nobleanum Hort. 60 γ.
nudiflorum Torr. XXXVIII, 9.
Nuttallii Broth. 20.
obovatum Hook. fl. 43.
obtusum Wats. 54 β. et Planch. 77.
officinale Salisb. 55.
ornatum Sweet XXXVIII, 4 β.
ovatum Lindl. 90.
palustre Turcz. 59.
parvifolium Adams 59; Hort. 57.
pendulum Hook. fl. 39.
phoenizeum G. Don 70 β.
planifolium Nutt. 14.
polifolium Scop. XXXIII, 1.
ponticum L. 54. et Schr. XXXVIII, 1.
 - β. macrophyllum Lodd. 52.
 - β. Smithii G. Don 18 β.
procerum Salisb. 53.
proliferum Poit. 74.
pulchellum Salisb. XXXVII, 1.
pulcherrimum Lindl. 60 β.
pulchrum Sweet 68.
pumilum Hook. fl. 28.
punctatum Andr. 57.
puniceum Roxb. 18 et Planch. 73.
purpureum G. Don 52. et Sims 67 γ.
Purshii G. Don 51.
ramentaceum Planch. 81.
reticulatum D. Don 85.
Rhodora Gmel. XXXVII, 1.
- Rhododendron Roylei** Hook. fl. 36.
Russellianum Sweet 18 α.
salignum Hook. fl. 43 β.
scabrum Don 19.
setosum Don 48.
Shepherdii Nutt. 9.
Simsii Planch. 67.
sinense Sweet 89.
Smithii Sweet 18 β.
sparsiflorum Hook. fl. 41.
speciosum Don XXXVIII, 10.
stramineum Hook. fl. 60 β.
Thomsonii Hook. fl. 2.
Thunbergii Planch. 72.
triflorum Hook. fl. 46.
undulatum Sweet 18 γ.
vaccinioides Hook. fl. 38.
venustum Don 18 α.
 - Salisb. XXXVIII, 4 γ.
virgatum Hook. fl. 46.
viscosum Torr. XXXVIII, 4.
 - β. glaucum Torr. XXXVIII, 5.
vittatum Planch. 86.
Wallichii Hook. fl. 30 β.
Wightii Hook. fl. 33.
Windsorii Nutt. 7.
Rhodora Duh. XXXVII.
canadensis L. 1.
congesta Moench 1.
Rhodothamnus Rehb. XXXV.
Chamaecistus Rehb. 1.
Rospidius A. DC. LXIX.
vaccinioides A. DC. 1.
Samara Schreb. LVII.
obovata Champ. 1.
Sapota Aehras Mill. LXI, 1.
Schollera erythrocarpa Roth III, 3.
macrocarpa Roth III, 2.
Oxycoecus Roth III, 1.
paludosa Baumg. III, 1.
Sideroxyylon L. LXII.
attenuatum A. DC. 2.
Cantoniense Lour. 3.
chrysophylloides Mich. LXIII, 2.
decandrum L. 4.
laeve Walt. LXIII, 1.
lanuginosum Mich. LXIII, 4.
lycioides Willd. LXIII, 1.
punctatum Lam. LVIII, 1.
reclinatum Mich. LXIII, 5.
sericeum Walt. LXIII, 2.
tenax L. LXIII, 2.
Wightianum Wall. 1.
Styrax L. LXVI.
americana Lam. 8.
glabra Cav. 8.
grandifolia Ait. 3.
grandiflora Mich. 3.
japonica S. et Z. 7.
laevis Walt. 8.
laevigata Ait. 8; Sims 2.
Obassia S. et Z. 4.
octandra l'Her. 8.
odoratissima Champ. 6.
officinalis L. 1; Walt. 3.
pulverulenta Mich. 2.

Styrax suberifolia H. et Arn. 5.
Symplocos Jacq. LXV.
 crataegoides Don 14.
 floribunda Wall. 3 β.
 japonica A. DC. 7.
 lancifolia S. et Z. 10.
 leptostachys S. et Z. 4.
 Loha Don 2.
 lucida S. et Z. 7 β.
 microcarpa Champ. 16.
 myrtacea S. et Z. 9.
 neriifolia S. et Z. 6.
 nervosa A. DC. 12.
 odoratissima Champ. 17.
 paniculata Wall. 14.
 prunifolia S. et Z. 8.
 racemosa Roxb. 11; Wall. 12.
 ramosissima Wall. 13.
 sinica Ker. 15.
 Sumuntia Don 3
 theseifolia Don 11.
 theophrastaefolia S. et Z. 5.
 tinctoria l'Her. 1.
Tolmiea occidentalis Hook. XLVI, 1.
Tritomodon Turcz. XXVI.
 japonicus Turcz. 1.
Uredo edulis Hfm. sgg XII, 1.
Uva-ursi buxifolia Salisb. XIII, 2.
 procumbens Moench XIII, 2.
Vaccinium L. 1.
 Acosta Raeusch. VI, 1.
 albiflorum Hook. 11.
 album Lam. 3.
 - Pursh 6 β.
 amoenum Ait. 3 β.
 angustifolium Ait. 39.
 - Wats. 7 β.
 arborescens Mich. 9.
 Arostaphylos L. 25.
 brachycerum Mich. IV, 5.
 bracteatum Thunb. 21.
 buxifolium Andr. IV, 5.
 caespitosum Mich. 37.
 canadense Kalm 4.
 cantabricum Huds. XLI, 1.
 carnosum Pers. 28.
 Chamissonis Bong. 33.
 chinense Champ. 24.
 ciliatum Thunb. 22.
 cinereum Hort. angl.
 Constablaei Asa Gr. 20.
 corymbosum L. 3.
 crassifolium Andr. 28.
 decamerocarpon IV, 2.
 diffusum Ait. 9 β.
 disomorphum Bigel. 4.
 - Mich. 3.
 dumosum Andr. IV, 1 β.
 elevatum Banks 5.
 elongatum Wats. 14.
 erythrocarpum Mich. III, 3.
 floridanum Schwein. 8.
 formosum L. 3.
 frondosum L. IV, 2.
 fuscatum Ait. 3.
 - β. *angustifolium* Pursh 7 β.

Vaccinium galegiformis Smith 18.
 galezans Mich. 18.
 glabrum Wats. 16.
 glaucum Mich. IV, 2.
 grandiflorum Wats. 13.
 gualtherioides Bigel. 42.
 halleriaefolium G. Don et Hort. ad fin.
 hirtellum Ait. IV, 1.
 hirtum Thunb. 43.
 hispidulum L. II, 1.
 - Wangenh. III, 2.
 humifusum Grah. 38.
 humile Wats. IV, 1 γ.
 - Willd. 2.
 intermedium Ruthe 27.
 ligustrinum L. XXXI, 1.
 - Mich. 17.
 lucidum Hort. angl. ad fin.
 macrocarpum Ait. III, 2.
 Maderense Gu. et H. 25.
 Marianum Wats. 12.
 marilandicum Hort. 12.
 minutiflorum Wats. 15.
 mucronatum L. 40.
 multiflorum DC. et Klotzsch 15.
 Myrsinites Lam. 23.
 myrtifolium Mich. 28.
 myrtilloides Mich. 39.
 Myrtillus Ch. et Schlecht. 33.
 - L. 32.
 - var. *Smith* 39. β.
 nitidum Andr. 30.
 oblongifolium Hort. III, 2.
 obtusum Pursh 31.
 orientale Swartz VI, 1.
 ovalifolium Smith 34.
 ovatum Pursh 29.
 Oxycoccus L. III, 1.
 - β. *oblongifolium* III, 2.
 pallidum Ait. 10.
 parviflorum Andr. IV, 3.
 parvifolium Smith 35.
 pensylvanicum Lam. 2.
 - Torr. 1.
 praestans Lamb. 41.
 prunifolium Lodd. ad fin.
 pubescens Wormsk. 42 β.
 punctatum Lam. 25.
 ramulosum Willd. 2.
 resinosum Ait. IV, 3.
 rigidum Hook. 39.
 rubrum Gilib. 42.
 rugosum Hort. ad fin.
 salicifolium Steud. 36.
 salicinum Cham. 36.
 Sedenense Pers. 42.
 serpens Wight VII, 1.
 sibiricum Hort. ad fin.
 spicatum Poir. VI, 1.
 stamineum L. 6.
 tenellum Ait. 19.
 - Pursh 2.
 uliginosum L. 42.
 ursinum Curt. IV, 4.
 vaccillans Kalm 1.
 venustum Ait. IV, 2.

Vaccinium virgatum Ait. 7.
- Bigel. 1.
Vitis-idaea L. 26.
Vitisidaea Myrtilus Moench 1, 32.
- *punctata* Moench 1, 26.
Xerobotrys Nutt. XVI.
- *argutus* Nutt. 2.
- *cordifolius* Nutt. XIV, 2.

Xerobotrys glaucus Nutt. XIV, 3.
- *tomentosus* Nutt. 1.
- *venulosus* Nutt. 3.
Xylococcus bicolor Nutt. XV, 1.
Zenobia D. Don XIX.
- *floribunda* DC. XXIV, 1.
- *racemosa* DC. XXV, 3.
- *speciosa* Don 1.



ACERINEAE	77
AEGICERACEAE	344
ALANGIACEAE	186
AMARANTACEAE	94
ASPELIDEAE	47
AMYGDALACEAE	138
AMYRIDEAE	199
ANACARDIACEAE	196
ANNONACEAE	6
AQUIFOLIACEAE	208
AQUILARIACEAE	201
ARALIACEAE	283
AURANTIACEAE	70
BEGONIACEAE	273
BERBERIDEAE	17
BIXACEAE	38
BUETTNERIACEAE	52
BURSERACEAE	199

CACTEAE	278
CAESALPINIACEAE	224
CALYCANTHEAE	183
CAPPARIDEAE	272
CAPRIFOLIACEAE	293
CARYOPHYLLEAE	100
CEDRELACEAE	72
GELASTRINEAE	211
CHENOPODIACEAE	94
CHRYSOBALANEAE	148
CISTINEAE	29
CLUSIACEAE	71
CNEOREAE	84
COMBRETACEAE	186
CONNARACEAE	201
CORIARIACEAE	85
CORNEAE	285
CRASSULACEAE	104
CRUCIFERAE	21
CUCURBITACEAE	213
CYRILLEAE	342

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews, while secondary data was obtained from existing reports and databases.

The third section provides a detailed description of the data analysis process. This involves identifying trends, patterns, and anomalies within the dataset. Statistical tools and software were used to facilitate this process, ensuring that the results are both accurate and reliable.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and their implications. It highlights the key insights gained from the study and offers recommendations for future research and practice. The author notes that while the current study provides valuable information, there are still several areas that require further investigation.

DILLENACEAE	3
DIPTEROCARPEAE	67
EBENACEAE	346
EMPETREAE	88
ERICACEAE	328
ERYTHROXYLEAE	72
EUPHORBIACEAE	85
FRANKENIACEAE	41
GRANATEAE	186
HAMAMELIDEAE	201
HIPPOCASTANEAE	59
HIPPOCRATEACEAE	61
HOMALINEAE	201
HYPERICINEAE	63
JUGLANDEAE	199
KRAMERIACEAE	61

LINEAE	63
LORANTHACEAE	287
MAGNOLIACEAE	3
MALPIGHIACEAE	81
MALVACEAE	52
MELIACEAE	71
MELASTOMATEAE	184
MELIOSMEEAE	59
MEMECYLEAE	185
MENISPERMACEAE	7
MIMOSEAE	222
MYRSINACEAE	342
MYRTACEAE	185
NITRARIACEAE	208
OCHNACEAE	83
OLACINEAE	69
ONAGRARIACEAE	273

PAPILIONACEAE	226
PASSIFLOREAE	272
PHILADELPHAEAE	106
PITTOSPOREAE	72
POLYGALEAE	61
POMACEAE	166
PYROLEAE	342
RANUNCULACEAE	8
REAUMURIACEAE	41
RHAMNEAE	202
RHIZOPHOREAE	187
RIBESIIACEAE	273
ROSACEAE <i>(see also Pomaceae & Amygdalae)</i>	108
RUBIACEAE	301
RUTACEAE	83
SALICARIACEAE	108
SALYDEAE	39
SAPINDACEAE	58
SAPOTACEAE	344
SAXIFRAGEAE	105

SCHISANDREAE	7
SILARUBACEAE	83
SPONDIACEAE	198
STAPHYLAEACEAE	77
STERCULIACEAE	52
STYRACACEAE	345
SURIANACEAE	104
SYNANTHEREAE	313
TAMARISCINEAE	39
TERNSTROEBIACEAE	67
TILIACEAE	49
UMBELLIFERAE	283
VACCINIACEAE	325
VIOLACEAE	29
ZANTHOXYLEAE	81
ZYGOPHYLLEAE	84

